

2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(师)
考前压轴密卷
模拟试卷(二)



考生姓名: _____
准考证号: _____
考场号: _____

答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(二)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 慢性肺源性心脏病最常见的病因为
A. 支气管哮喘
B. 胸廓畸形
C. COPD
D. 肺小动脉栓塞
E. 支气管扩张症
- 结核性腹膜炎的治疗原则不包括
A. 尽早给予合理抗结核治疗
B. 足够疗程
C. 注意休息
D. 保持合理营养
E. 手术治疗
- 偏头痛的性质是
A. 主要为一侧或双侧的搏动性头痛,多有家族史
B. 常为持续性头部胀痛,阵发性加剧,并伴有喷射状呕吐
C. 面部表现为常因轻触触发点而诱发的阵发性电击样短促剧痛
D. 头痛往往于晨起重
E. 体位变动而头痛加剧者
- 门静脉和腔静脉之间的交通支不包括
A. 食道胃底静脉交通支
B. 直肠下段、肛管交通支
C. 前腹壁交通支
D. 腹膜后交通支
E. 下腔静脉交通支
- 肿块型结肠癌的病理特点不包括
A. 好发于右半结肠
B. 易发生溃烂出血
C. 恶性程序较低,预后较好
D. 向周围浸润性小,生长缓慢
E. 肿瘤向腔内生长
- 纵隔向患侧移位的胸部疾病是
A. 急性脓胸
B. 损伤性血胸
C. 张力性气胸
D. 慢性脓胸
E. 开放性气胸
- 甲亢术后甲状腺危象的主要原因是
A. 术后出血
B. 感染
C. 精神紧张
D. 术前准备不充分
E. 术中补液不足
- 关于痛经的临床表现不正确的是
A. 疼痛最早出现于经前 12 小时,月经第一天最剧烈
B. 原发性痛经常见于青少年期
C. 疼痛持续时间长短不一,多于 2~3 天后缓解
D. 可伴有恶心、呕吐、腹痛、腹泻
E. 常呈持续性痉挛性疼痛
- 发展中国家小儿肺炎主要病原为
A. 病毒
B. 真菌
C. 衣原体
D. 支原体
E. 细菌
- 营养性缺铁性贫血的好发年龄是

- A.1个月
 B.2~3个月
 C.6个月内
 D.6个月~2岁
 E.3岁以上
- 11.婴儿开始出现生理性流涎常在生后
 A.1~2个月
 B.3~4个月
 C.5~6个月
 D.7~8个月
 E.9~10个月
- 12.引起门静脉高压症的主要原因是
 A.酒精性肝硬化
 B.血吸虫病性肝硬化
 C.肝炎后肝硬化
 D.布-加征
 E.肝外门静脉血栓形成
- 13.慢性肾衰竭患者发生贫血的主要原因是
 A.铁缺乏
 B.肾脏产生红细胞生成素减少
 C.叶酸缺乏
 D.代谢产物抑制骨髓造血
 E.红细胞寿命缩短
- 14.医院内的临床护理工作主要包括基础护理和
 A.护理科研
 B.社区护理
 C.护理管理
 D.专科护理
 E.护理教育
- 15.构成甲状腺素的主要成分是
 A.磷
 B.碘
 C.锌
 D.铁
 E.钙
- 16.短暂性脑缺血发作的主要病因是
 A.动脉硬化
 B.结节性动脉炎
 C.先天性血管畸形
 D.风湿性心脏瓣膜病
 E.持久发作心房颤动
- 17.冠状动脉粥样硬化性心脏病发生心绞痛的原因是
 A.坏死心肌刺激
 B.酶的活性增高
 C.心肌缺氧
 D.低血压
 E.神经功能失调
- 18.已知与肺癌发生有关的因素中最重要的是危险因素是
 A.饮食与营养
 B.电离辐射
 C.空气污染
 D.吸烟
 E.职业因素
- 19.急性胰腺炎的腹痛常位于
 A.中上腹
 B.中下腹
 C.左上腹
 D.左下腹
 E.右上腹
- 20.不是风湿病共同特点的是
 A.多为急性起病
 B.同一疾病表现可有很大差异
 C.病程中发作与缓解交替出现
 D.多有复杂的免疫学改变
 E.疗效有较大的个体差异
- 21.良性肿瘤是否危害生命最主要决定于
 A.肿瘤的病程
 B.肿瘤的大小
 C.肿瘤组织的来源
 D.肿瘤发生的部位
 E.肿瘤出现继发性变化
- 22.与胎盘早剥发生有关的可能因素是
 A.前置胎盘
 B.脐带过长
 C.胎死宫内

- D. 血管病变
E. 胎盘老化
23. 可成为胎儿的妊娠周数是
- A. 10 周
B. 9 周
C. 8 周
D. 12 周
E. 16 周
24. 成人蛋白尿是指
- A. 24 小时尿蛋白定量持续超过 500 mg
B. 24 小时尿蛋白定量持续超过 100 mg
C. 24 小时尿蛋白定量持续超过 150 mg
D. 24 小时尿蛋白定量持续超过 200 mg
E. 24 小时尿蛋白定量持续超过 300 mg
25. 门静脉高压症是指门静脉压力达到
- A. 13~24 cmH₂O
B. 24~30 cmH₂O
C. 8~12 cmH₂O
D. 6~12 cmH₂O
E. 30~50 cmH₂O
26. 下述关于前列腺增生说法正确的是
- A. 可引起尿潴留
B. 多在 50 岁以后增生
C. 发病原因与雌激素的作用无关
D. 不治疗可癌变
E. 增生的程度与尿流梗阻的程度成正比
27. 股骨颈骨折造成的肢体畸形是
- A. 缩短、内旋
B. 伸长、内旋
C. 缩短、外旋
D. 伸长、外旋
E. 伸长、内收
28. 直肠癌患者粪便为
- A. 鲜血便
B. 无血便
C. 脓血便
D. 果酱样便
E. 柏油样便
29. 产后子宫颈完全恢复正常状态的时间是
- A. 4 周
B. 6 周
C. 30 天
D. 28 天
E. 20 天
30. 新生儿室适宜的温度是
- A. 18~20 °C
B. 20~22 °C
C. 22~24 °C
D. 24~26 °C
E. 26~28 °C
31. 小儿营养性贫血好发年龄阶段为
- A. 新生儿期
B. 学龄期
C. 婴幼儿期
D. 学龄前期
E. 青春期
32. 浅昏迷的特点为
- A. 意识丧失
B. 瞳孔对光反射消失
C. 对强烈的疼痛刺激无反应
D. 无自主运动
E. 对声、光等刺激有反应
33. 重症肺炎患儿的酸碱平衡失调多属于
- A. 代谢性酸中毒
B. 呼吸性酸中毒
C. 混合性酸中毒
D. 呼吸性碱中毒
E. 代谢性酸中毒和呼吸性碱中毒
34. 在我国引起肝硬化的主要病因是
- A. 病毒性肝炎
B. 酒精中毒
C. 胆汁淤积
D. 遗传和代谢性疾病
E. 化学毒物或药物
35. 参与体液免疫的细胞是
- A. B 淋巴细胞
B. T 淋巴细胞

- C. 中性粒细胞
D. 浆细胞
E. 单核细胞
36. 蛛网膜下腔出血最常见的病因是
A. 抗凝治疗的并发症
B. 脑动脉炎
C. 高血压动脉硬化
D. 脑血管畸形
E. 先天性动脉瘤破裂
37. 长时间的低血压、低灌注量、酸中毒和大量游离的血红蛋白极易导致
A. 肝衰竭
B. 呼吸衰竭
C. 肾衰竭
D. 脑衰竭
E. 心力衰竭
38. 污染伤口是指
A. 伤后 12 小时以上处理的伤口
B. 切口感染的手术切口
C. 有异物存留 24 小时以上的伤口
D. 伤后 8 小时以内处理的伤口
E. 甲状腺手术的切口
39. 新生儿早期发现低血糖时,最易受损的系统为
A. 内分泌系统
B. 中枢神经系统
C. 免疫系统
D. 胃肠道系统
E. 心血管系统
40. 生殖权利的两个独立要素是指
A. 法律权利和社会权利
B. 自然权利和法律权利
C. 行为权利和法律权利
D. 自然权利和社会权利
E. 自然权利和行为权利
41. 宫内节育器取出术的时间是
A. 以月经干净 3~7 天为宜
B. 以月经干净 7~10 天为宜
C. 以月经干净 10~14 天为宜
D. 以月经干净 14~20 天为宜
E. 以月经干净 20~28 天为宜
42. 对 4 个月的小儿感知发育的描述正确的是
A. 开始认识母亲
B. 能区别父母的声音
C. 能区别好闻和难闻的气味
D. 能区分物体的冷暖属性
E. 有空间和时间知觉的萌芽
43. 正常新鲜尿离心镜检,红细胞数为
A. <10 个/HP
B. <5 个/HP
C. <3 个/HP
D. <2 个/HP
E. <1 个/HP
44. 中毒性痢疾的传播途径是
A. 呼吸道
B. 虫媒
C. 胃肠道
D. 土壤
E. 食物
45. 腹部反跳痛的发生机制是
A. 肠腔胀气及炎症
B. 内脏肿大及淤血
C. 肝胰肿瘤及淋巴结转移
D. 壁层腹膜受炎症累及
E. 胆总管结石并梗阻
46. 人体最重要的神经内分泌器官是
A. 下丘脑
B. 垂体
C. 甲状腺
D. 肾上腺
E. 性腺
47. 按照骨折的程度和形态分类,属于不完全骨折的是
A. 斜行骨折
B. 裂缝骨折
C. 凹陷骨折
D. 嵌插骨折
E. 压缩骨折
48. 原位癌是指

- A. 早期癌
B. 原发癌
C. 癌前病变
D. 未发生转移的癌
E. 未突破基底膜的癌
49. 男性尿道球部损伤可致肿胀和淤血的部位有
A. 阴茎
B. 阴囊
C. 两侧股部
D. 会阴、阴茎、阴囊和下腹壁
E. 会阴部
50. CPCR 是指
A. 心肺复苏术
B. 院前急救
C. 心肺脑复苏
D. 脑复苏
E. 后期复苏
51. 引起高渗性缺水的病因不正确的是
A. 食管癌
B. 高热
C. 管饲浓缩高蛋白饮食
D. 大量使用渗透性利尿剂
E. 长期胃肠减压
52. 有关功血描述不正确的选项是
A. 指的是功能失调性子宫出血
B. 分为排卵性和无排卵性功血
C. 是由调节生殖的神经内分泌机制失常所引起的异常子宫出血
D. 无全身及生殖器官的器质性病变
E. 绝大多数患者属于排卵性功血
53. 婴儿开始补充维生素 D的时间是
A. 生后 1 周
B. 生后 2 周
C. 生后 3 周
D. 生后 4 周
E. 生后 2 个月
54. 属于新生儿病态反应的是
A. 生后 5 天, 体重下降 8%
B. 生后 1 天出现黄疸, 并逐渐加重
C. 生后 5 天, 女婴出现乳腺肿大
D. 生后 1 天, 口腔牙龈切缘上有黄白色斑点
E. 生后 5 天, 女婴阴道流出少量血液
55. 引起病毒性脑膜炎最常见的原因是
A. 肠道病毒
B. 虫媒病毒
C. 腮腺炎病毒
D. 疱疹病毒
E. 流感病毒
56. 传染病的流行形式有
A. 散发
B. 播散
C. 虫媒传播
D. 土壤传播
E. 胃肠传播
57. 急性肾小球肾炎的性质属于
A. 感染后免疫反应性疾病
B. 病毒直接感染肾脏
C. 细菌直接感染肾脏
D. 单侧肾脏化脓性炎症
E. 双侧肾脏化脓性炎症
58. 与糖尿病周围神经病变的表现不符的是
A. 四肢麻木
B. 关节酸痛
C. 感觉过敏
D. 皮肤蚁走感
E. 舞蹈症
59. 引起腹外疝的两个主要原因是
A. 妊娠和体力劳动
B. 腹水和便秘
C. 腹壁强度低和腹内压增高
D. 外伤和感染造成的腹壁缺损
E. 腹股沟管和股管宽大
60. 下列胃直接分泌的物质,不包括
A. 盐酸
B. 黏液
C. 胃泌素
D. 胃蛋白酶

- E.碳酸氢盐
- 61.肾盂肾炎 1 小时尿中白细胞数可达
- A.10 万
B.20 万
C.35 万
D.40 万
E.60 万
- 62.破伤风患者产生的毒素是
- A.痉挛毒素
B.溶血毒素
C.血浆凝固酶
D.透明质酸酶
E.痉挛毒素和溶血毒素
- 63.空肠回肠的静脉血最终汇入
- A.下腔静脉
B.肠系膜上静脉
C.门静脉
D.肠系膜下静脉
E.髂内静脉
- 64.患者,男性,56 岁。急性化脓性阑尾炎。行阑尾切除术后 3 天,腹胀,伴溢出性呕吐。检查:全腹均匀膨胀,肠鸣音减弱,考虑肠梗阻。其肠梗阻的类型是
- A.绞窄性肠梗阻
B.血运行肠梗阻
C.痉挛性肠梗阻
D.麻痹性肠梗阻
E.机械性肠梗阻
- 65.患者,男性,46 岁。乙肝 10 年。今进食后突然呕血 600 mL。查体:右上腹部压痛,腹水征(+),肝质硬,体积变小,边缘锐利,表面有小结节。患者呕血最可能的原因是
- A.应激性溃疡
B.消化性溃疡
C.肝癌结节破裂出血
D.急性糜烂性胃炎
E.食管-胃底静脉破裂
- 66.患者,男性,57 岁。急性肾衰竭无尿期,出现呼吸困难、头痛、轻度腹胀,心电图示 T 波高尖、QT 间期延长。应考虑
- A.低钾血症
B.高钾血症
C.水中毒
D.尿毒症
E.酸中毒
- 67.患者,男性,41 岁。慢性肾小球肾炎入院。护士为患者选择的合适饮食中可减轻肾小球的高压、高灌注、高滤过状态的是
- A.低蛋白饮食
B.低蛋白低磷低钠饮食
C.优质蛋白饮食
D.高蛋白低磷饮食
E.高蛋白低钠饮食
- 68.初孕妇,25 岁。孕 38 周。主诉肋下有块状物。腹部检查:子宫呈纵椭圆形,胎先露部较软且不规则,胎心在脐上偏左,应诊断为
- A.面先露
B.臀先露
C.枕先露
D.肩先露
E.复合先露
- 69.患者,女性,36 岁。自诉近半年来月经提前,经期延长,经量增多,出现不定时的阴道出血,早晨可自行摸到腹部一块状物。经妇科检查后,一般考虑为
- A.子宫颈癌
B.子宫肌瘤
C.卵巢肿瘤
D.子宫内膜癌
E.子宫内膜异位症
- 70.患者,男性,45 岁。因颅脑外伤昏迷入院,当患者出现清醒后,又再次昏迷,其有效的处理是
- A.降温
B.脱水
C.手术
D.给氧
E.应用肾上腺皮质激素

71.患者,女性,55岁。5年来反复上呼吸道感染,3周来出现恶心、呕吐、腿肿、尿少、血压180/105 mmHg,尿蛋白(+++),尿红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$,该患者发病可能的原因是

- A.细菌感染
- B.免疫介导炎症反应
- C.病毒感染
- D.高血压
- E.白蛋白排出增加

72.患者,男性,67岁。消瘦6个月。查体:左锁骨上窝淋巴结增大,质地坚硬,无压痛,活动度小。可能的疾病是

- A.肺结核
- B.胸膜炎
- C.胃癌
- D.肺癌
- E.霍奇金病

73.患者,女性,第一胎,孕38周,单胎,经查胎位正常,脐绕颈1周,宫口开全2.5小时胎儿娩出,产后20分钟突然阴道出血200 mL,胎盘尚无剥离迹象。该产妇最及时的处理是

- A.观察胎盘剥离迹象,协助胎盘娩出
- B.牵拉脐带,挤压宫底,迫使胎盘娩出
- C.人工剥离胎盘
- D.检查软产道,排除损伤
- E.输液,静脉注射麦角新碱

74.患者,女性,59岁。风心病伴二尖瓣狭窄6年,伴心房颤动5年,无明显原因突然出现意识障碍,最可能的原因是

- A.发生室颤
- B.心排出量减少,脑供血不足
- C.心房血栓脱落,脑栓塞

- D.高凝状态,脑血栓形成
- E.发生房颤

75.3岁小儿出生时曾经接种卡介苗,2岁时PPD试验为 $5 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$,最近PPD反应为 $10 \text{ mm} \times 12 \text{ mm}$,下列情况可能性大的是

- A.卡介苗接种后反应
- B.结核试验假阳性反应
- C.新近有感染
- D.曾患结核感染
- E.受过结核感染,但体内不一定有活动病灶

76.某女士,30岁。平素月经规律,周期28~30天,要求安全期避孕,护士指导其确定安全期,正确的是

- A.宫颈黏液排卵前稀薄、透明、拉丝度达10 cm以上
- B.基础体温测定最低
- C.排卵时间为下次月经前10天
- D.宫颈黏液在排卵前减少
- E.情绪易激动期间

77.患者,男性,50岁。上腹不适,食欲不振3个月。1个月来出现黄疸进行性加重,有体重减轻,全身明显黄染,肝未触及,深吸气时可触到肿大胆囊底部,无触痛。化验血胆红素15 mg/dl尿检胆红素阳性。最可能是

- A.肝炎
- B.胆石症
- C.胰头癌
- D.慢性胰腺炎
- E.肝癌

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(78~81题共用备选答案)

- A.96%~98%
- B.98%

- C.99%
- D.99.7%
- E.99.95%

78.短效口服避孕药避孕率可达

79.长效口服避孕药避孕率可达

80.长效避孕针避孕率可达

81.速效避孕药探亲 1 号避孕率可达
(82~83 题共用备选答案)

A.动力性梗阻

B.机械性梗阻

C.先天性梗阻

D.上尿路梗阻

E.慢性梗阻

82.尿道狭窄引起的急性尿潴留属于

83.使用阿托品所致的急性尿潴留属于
(84~88 题共用备选答案)

A.明显口渴

B.脑水肿,颅内压增高

C.Chvostek 和 Trousseau 征阳性

D.肌无力,疲乏软弱

E.呼吸深快

84.高渗性缺水时出现

85.急性水中毒时出现

86.代谢性酸中毒时出现

87.低钙血症时出现

88.低钾血症时出现
(89~90 题共用备选答案)

A.鱼肝油、菜汤

B.米汤、鱼泥

C.粥、蛋

D.稠粥、软饭

E.饼干、肉末

89.4~6 个月的小儿应添加的辅食

90.10~12 个月的小儿应添加的辅食
(91~93 题共用备选答案)

A.2 500 mL

B.3 000 mL

C.750 mL

D.100 mL

E.400 mL

91.少尿是指 24 小时尿量少于

92.无尿是指 24 小时尿量少于

93.多尿是指 24 小时尿量大于
(94~95 题共用备选答案)

A.ITP

B.过敏性紫癜

C.各种血友病

D.白血病

E.再生障碍性贫血

94.由于血小板破坏性增加引起的出血性疾病是

95.由于血管脆性增加引起的出血性疾病是
(96~98 题共用备选答案)

A.嵌顿性股疝

B.肠蛔虫团堵塞

C.乙状结肠扭转

D.肠套叠

E.急性肠炎

96.属于单纯机械性不完全性肠梗阻的是

97.属于动力性肠梗阻的是

98.属于血运性肠梗阻且易发于婴儿的是
(99~100 题共用备选答案)

A.甲状腺功能亢进

B.甲状旁腺反应迟钝

C.甲状腺功能低下

D.甲状旁腺功能代偿性增强

E.常染色体隐性遗传

99.维生素 D 缺乏性手足抽搐症的发病机制

100.维生素 D 缺乏性佝偻病的发病机制

相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 食管曲张静脉已被证实,患者入院后又大量呕血,此时最简单而有效的应急措施是
 - A. 三腔管压迫止血
 - B. 经皮肝食管曲张静脉栓塞
 - C. 内镜硬化剂注射
 - D. 口服止血药
 - E. 冰氯化钠液洗胃
2. 有关急性颅内压增高的表现错误的一项是
 - A. 早期有性格改变
 - B. 可见复视
 - C. 多呈喷射性呕吐
 - D. 婴儿在发病早期头痛明显
 - E. 新生儿可表现为睁眼不睡,尖叫
3. 属于无菌手术的是
 - A. 疝修补术
 - B. 子宫切除术
 - C. 肺叶切除术
 - D. 开放损伤清创术
 - E. 痔切除术
4. 绒毛膜癌合并脑转移抽搐的患者,床头必备物品为
 - A. 导尿管
 - B. 吸氧用药
 - C. 静脉输液用物
 - D. 开口器
 - E. 气管切开包
5. 预防维生素 D 中毒的关键措施是
 - A. 定期测体重
 - B. 定期测血钙
 - C. 间断应用维生素
 - D. 严格按医嘱用药
 - E. 严密观察,及时发现中毒
6. 急性喉炎出现下列症状时,应及时输入足量广谱抗生素的是
 - A. 发热
 - B. 声音嘶哑
 - C. 呼吸困难
 - D. 喉鸣
 - E. 犬吠样咳嗽
7. 下列关于心尖搏动描述不正确的是
 - A. 正常人位于左侧第 5 肋间锁骨中线内 0.5~1.0 cm
 - B. 搏动范围直径约 2.0~2.5 cm
 - C. 左室增大时,心尖搏动向左下移位
 - D. 右室增大时,多向右侧移位
 - E. 一侧肺不张时移向患侧
8. 治疗慢性粒细胞白血病慢性期的首选药物为
 - A. 羟基脲
 - B. 白消安
 - C. 二溴甘露醇
 - D. 氮芥
 - E. 干扰素
9. 类风湿关节炎缓解期最主要的护理是
 - A. 注意观察病情
 - B. 避免过度疲劳
 - C. 指导关节功能锻炼
 - D. 避免精神刺激
 - E. 给予饮食指导
10. 亚硝酸盐中毒,解毒剂选用
 - A. 二巯基丙醇
 - B. 贝美格
 - C. 亚甲蓝
 - D. 硫代硫酸钠
 - E. 阿托品、解磷定
11. 治疗成人急性呼吸窘迫综合征患者

低氧血症的最佳措施是

- A. 避免输液过量过快
- B. 持续高流量吸氧
- C. 呼气末正压通气
- D. 鼓励深呼吸和排痰
- E. 按时使用有效抗生素

12. 急性肾小球肾炎前驱感染史通常为

- A. 链球菌感染后 3~4 天
- B. 链球菌感染后 1~3 周
- C. 链球菌感染后 6 个月
- D. 链球菌感染后 1 个月
- E. 链球菌感染后 1 年

13. 用普鲁卡因行局部浸润麻醉后, 为了预防患者出现毒性反应, 恰当的措施是

- A. 将麻药直接注入血管
- B. 一次性给足麻醉药
- C. 对虚弱患者应增加药物浓度
- D. 对虚弱患者应增加药量
- E. 普鲁卡因中加少量肾上腺素

14. 骨盆直肠间隙脓肿的特点是

- A. 属于慢性化脓性感染
- B. 肛周红、肿、热、痛明显
- C. 全身感染中毒症状不明显
- D. 可有直肠坠胀感, 便意不尽
- E. 在直肠肛管周围脓肿中最多见

15. 需要用肠外营养支持的是

- A. 拒绝进食者
- B. 昏迷患者
- C. 化疗期间患者
- D. 低位肠痿患者
- E. 急性胰腺炎患者病情稳定后

16. 以意识丧失和全身抽搐为特征的癫痫发作为

- A. 简单的部分性发作
- B. 单纯失神发作
- C. 精神运动性兴奋
- D. 复杂的部分性发作
- E. 强直阵挛发作

17. 结节性甲状腺肿患者的颈部肿块特

点是

- A. 表面不平
- B. 质地较硬
- C. 边界不齐
- D. 随吞咽上下移动
- E. 双侧弥漫性肿大

18. 急性白血病的临床特征是

- A. 发烧、贫血、出血
- B. 全血细胞减少
- C. 恶病质
- D. 肝、脾、淋巴结肿大
- E. 发烧、贫血、出血、白血病细胞浸润

19. 阑尾炎时闭孔内肌试验阳性, 其临床意义在于

- A. 提示阑尾位置较深
- B. 提示阑尾位置较低
- C. 提示异位阑尾
- D. 确诊阑尾炎
- E. 提示阑尾炎波及盆腔

20. 以非手术治疗为主的肝脏疾病是

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 阿米巴性肝脓肿
- C. 肝海绵状血管瘤
- D. 原发性肝癌
- E. 肝包虫病

21. 葡萄胎随访时必须进行的检查是

- A. 阴道脱落细胞涂片检查
- B. 测尿中的 HCG 值
- C. 多普勒超声检查听取胎心
- D. B 型超声检查有无胎囊
- E. CT 检查脑转移情况

22. 下列哪种物质适用于高铁血红蛋白血症的解毒

- A. 解磷定
- B. 阿托品
- C. 纳洛酮
- D. 氯磷定
- E. 小剂量亚甲蓝

23. 肺结核患者服用两种以上抗结核药

物的最主要的原因是

- A. 缩短疗程
- B. 延缓耐药性的产生
- C. 增加患者的耐受性
- D. 减少药物的副作用
- E. 减少用药的剂量

24. 先天性心脏病最常见的类型是

- A. 动脉导管未闭
- B. 室间隔缺损
- C. 法洛四联症
- D. 房间隔缺损
- E. 肺动脉狭窄

25. 关于基础体温测定, 下列选项恰当的是

- A. 一般连续测 5 个月经周期以上
- B. 基础体温是指人日常的平均体温
- C. 测量前需经过 1~2 小时的睡眠
- D. 清晨排空膀胱再测体温
- E. 常用于测定黄体功能

26. 以下可能通过化学疗法达到临床治愈的恶性肿瘤是

- A. 胃癌
- B. 乳癌
- C. 鼻咽癌
- D. 食管癌
- E. 白血病

27. 在系统性红斑狼疮的多系统损害中, 以下哪项发生率最高

- A. 关节
- B. 皮肤
- C. 肾脏
- D. 心血管
- E. 肺和脑膜

28. 风湿性心脏病患者出现下列何种临床征象, 可提示脑动脉栓塞发生

- A. 偏瘫
- B. 呼吸困难、咯血
- C. 严重腰痛、血尿
- D. 休克

E. 严重胸痛

29. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄并发栓塞时, 最常见的栓塞部位在

- A. 脾动脉
- B. 肺动脉
- C. 肾动脉
- D. 脑动脉
- E. 四肢动脉

30. 以下哪项不符合急性特发性血小板减少性紫癜的表现

- A. 多见于儿童
- B. 多有畏寒、发热
- C. 可见内脏出血
- D. 多见皮肤、黏膜出血
- E. 脾肿大和贫血显著

31. 甲亢危象时使用碘剂的主要目的是

- A. 增强抗甲状腺药物的作用
- B. 抑制 TH 的合成
- C. 降低基础代谢率
- D. 抑制已合成的甲状腺激素 (TH) 的释放
- E. 阻断甲状腺素兴奋交感神经作用

32. 患者, 男性, 49 岁。发作性胸痛, 疑为心绞痛, 在疼痛发作时, 首先应做的检查是

- A. 心电图
- B. X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 放射性核素检查
- E. 运动负荷试验

33. 患者, 男性, 36 岁。近日头晕、乏力, 活动后症状加重伴心慌、气促, 在骨髓图片中肉眼可看到脂肪滴, 骨髓结果回报: 骨髓增生减低, 三系细胞均有不同程度的减少, 慢性再障诊断成立。目前首选的治疗药物是

- A. 糖皮质激素
- B. 盐皮质激素
- C. 雄激素

D. 雌激素
 E. 抗胸腺细胞球蛋白和抗淋巴细胞球蛋白

34. 患者, 女性, 停经 40 天, 下腹痛及阴道出血 1 天, 量多, 有血块; 查体: 子宫稍大, 宫口有胚胎组织填塞, 最有效的治疗措施是

- A. 压迫腹部, 排出胚胎组织
- B. 刮宫术
- C. 输血
- D. 注射维生素 K
- E. 纱布填塞阴道, 压迫止血

35. 患者, 男性, 56 岁。有便秘史, 反复发作肛门疼痛伴大便表面鲜红血 2 年余, 近来加重。病人不敢解大便, 最可能的诊断是

- A. 内痔出血
- B. 复杂性肛瘘
- C. 直肠息肉出血
- D. 肛裂
- E. 直肠黏膜脱垂

36. 患者, 女性, 宫内妊娠 39 周, 规律宫缩 13 小时, 阴道流水 6 小时, 急诊入院, 查体: 宫高 35 cm, 腹围 90 cm, 宫缩 25 秒/4 分钟, LOA, 胎心 158 次/分, 0+1, 宫缩时, 骨盆外测量骶耻外径 18.5 cm, 坐骨结节间径 7.5 cm, 后矢状径 6.5 cm。下列处理正确的是

- A. 等待自然分娩
- B. 静滴缩宫素
- C. 胎头吸引术
- D. 产钳术
- E. 剖宫产

37. 患者, 女性, 70 岁。住院心电图监测时发生室性心动过速, 心率 172 次/分, 血压 120/80 mmHg, 意识清楚, 双肺呼吸音清晰, 无湿性啰音。首选的治疗药物是

- A. 阿托品
- B. 硝酸甘油
- C. 利多卡因
- D. 地高辛

E. 呋塞米

38. 患者, 女性, 20 岁。全身重度水肿, 尿蛋白 6.4 g/24 小时, 血浆白蛋白 23 g/L, 血压 80/60 mmHg, 肾功能 BUN 9.1 mmol/L, Cr 100 μmol/L, 应选择的主要治疗措施是

- A. 输新鲜血浆
- B. 输白蛋白
- C. 应用速尿
- D. 使用环磷酰胺
- E. 糖皮质激素

39. 患者, 女性, 20 岁。因血压高、视力障碍、恶心、呕吐来院就诊, 体检: 血压 8/16 kPa (210/120 mmHg), 心界向左右下扩大, 血红蛋白 65 g/L, 尿蛋白(+++), 红细胞 5~10/HP, 血 Cr 560 μmol/L; B 超双肾缩小, 眼底有渗血, 考虑最可能的诊断是

- A. 慢性肾炎高血压型
- B. 慢性肾炎伴高血压
- C. 慢性肾衰竭尿毒症期
- D. 恶性高血压
- E. 急性高血压

40. 患者, 男性, 36 岁。油漆厂工人, 近半年头晕、乏力, 未重视, 上周感冒后症状加重, 伴发热、体温最高达 39℃, 急查血常规: 血红蛋白 75 g/L, 白细胞 $2.9 \times 10^9/L$, 血小板 $50 \times 10^9/L$ 查体肝、脾未触及。根据临床特点, 最可能的诊断是

- A. 急性再生障碍性贫血
- B. 慢性再生障碍性贫血
- C. 白血病
- D. 缺铁性贫血
- E. 多发性骨髓瘤

41. 患者, 女性, 37 岁。药剂师, 头晕、乏力 1 个月, 多次查血常规全血细胞均减少, 为明确诊断首先应行

- A. 抗核抗体的检测
- B. 肿瘤系列检测
- C. 骨髓象检测
- D. 染色体检测

E.凝血时间检测

42.患者,男性,50岁。突然大量呕血,既往无腹痛病史,体温 36.5°C ,脉搏96次/分,血压96/70 mmHg,巩膜黄染,肝未触及,脾大达肋下4 cm,红细胞 $32.0\times 10^{12}/\text{L}$; Hb 70 g/L,白细胞 $6.5\times 10^9/\text{L}$,血小板 $80\times 10^9/\text{L}$,可以诊断为

- A.食管胃底静脉曲张出血
- B.胃癌出血
- C.应激性溃疡出血
- D.胆道出血
- E.溃疡病出血

43.患者,男性,34岁。因车祸2小时送入急诊科,查体:意识丧失,血压测不到,瞳孔散大,心脏弱而缓慢的跳动,叹息样呼吸,心电图微弱波形。患者可能发生的是

- A.休克
- B.心跳停止
- C.心跳、呼吸骤停
- D.呼吸衰竭
- E.昏迷

44.患者,女性,40岁。因右上腹阵发性绞痛伴恶心,呕吐3小时来院急诊。体温 37°C ,右上腹深部轻压痛,Murphy征阴性,进一步检查应首选

- A.血白细胞计数和分类
- B.腹部X线透视
- C.B型超声波检查
- D.口服胆囊造影术
- E.血淀粉酶测定

45.患者,女性,56岁。门静脉高压拟行手术治疗,术前给予保肝治疗,不正确的措施是

- A.宜给予低脂、高蛋白、高热量、高维生素饮食
- B.应给予芳香族氨基酸
- C.贫血者给予输新鲜血
- D.凝血机制障碍者给予维生素
- E.避免使用巴比妥类有害肝功能的

药物

46.患者,男性,59岁。肝区持续性疼痛半年,伴乏力,消瘦明显,食欲减退,恶心,低热。肋下可及肿大之肝脏,质硬,诊断为原发性肝癌,下列化验最有诊断价值的是

- A. γ -谷氨酰转酞酶
- B.SGOT,SGPT
- C.AKP
- D.LDH
- E.AFP

47.急性肾炎患儿,T 36.8°C ,BP 18.7/14.7 kPa,水肿渐加重,尿量减少,突然呼吸困难,不能平卧,肺底湿啰音,心音钝奔马律,肝在肋下2 cm压痛(+),白细胞数正常,考虑伴有

- A.肺炎
- B.肾衰竭
- C.高血压脑病
- D.严重循环充血
- E.呼吸衰竭

48.患者,男性,21岁。20天前无明显诱因出现发热,体温最高达 39°C 。查体双侧颈部可触及数个黄豆大小的淋巴结,胸骨压痛阳性,骨髓检查提示急性白血病,为进一步区分是急淋还是急非淋,需首选的检查是

- A.细胞化学染色
- B.免疫学检查
- C.染色体
- D.基因检查
- E.复查骨髓检查

49.患者,男性,54岁。糖尿病病史20年,近期加重,其呼出的气味可能为

- A.恶臭味
- B.氨味
- C.烂苹果味
- D.刺激性大蒜味
- E.肝腥味

50.患者,女性,70岁。主因“慢性咳嗽、痰咳30年,活动后气促15年,双下肢水肿5

年,加重 20 天”入院,患者下肢水肿应考虑

- A. 肺心病右心衰
- B. 低蛋白血症
- C. 摄盐过多
- D. 合并肾炎
- E. 冠心病

51. 患者,女性,68 岁。入院诊断:慢性心力衰竭,遵医嘱服用地高辛每日 0.125 mg,某日患者将白墙看成黄墙,提示患者出现

- A. 心衰好转征象
- B. 心律恢复正常
- C. 洋地黄药物中毒
- D. 血钾过低
- E. 血钠过高

52. 患者,男性,42 岁。腹部外伤 2 小时就诊,体格检查血压 90/60 mmHg,脉搏 110 次/分,全腹压痛,伴腹肌紧张和反跳痛,血红蛋白 10 g/L,此时的治疗措施应为

- A. 留置尿管,胃肠减压
- B. 输血、输液、抗休克治疗
- C. 腹部 X 线立、卧位片
- D. 立即剖腹探查
- E. 观察病情变化

53. 患者在上班途中发生车祸,当即昏迷,持续时间约 30 分钟,醒后主诉有轻微头痛,四肢活动好,次日感到头痛加重,呕吐数次,嗜睡而就诊,最恰当的处理方式是

- A. 给予止呕处理,休息 1 周
- B. 给予镇痛处理,休息 1 周
- C. 给予脱水利尿治疗,同时进一步检查
- D. 立即行脑室穿刺外引流术
- E. 给予口服脱水、利尿药随诊

54. 患者,男性,45 岁。因车祸外伤骨折,行内固定手术,术后 3 天,伤口处出现大小不等的水疱,轻压可有捻发音,并有稀薄、恶臭的血性分泌物流出,初步考虑是

- A. 局部化脓感染
- B. 气性坏疽
- C. 破伤风

D. 败血症

E. 菌血症

55. 患者,女性,38 岁。因甲亢行甲状腺大部切除术,术后 18 小时出现高热、脉快、大汗、烦躁不安,伴呕吐、水样便,该患者出现

- A. 喉返神经损伤
- B. 喉上神经损伤
- C. 呼吸困难和窒息
- D. 甲状腺危象
- E. 甲状旁腺损伤

56. 患者,女性,宫内妊娠 40+ 周,当决定行产钳助产时,为了确诊胎方位,应以哪条颅缝结合囟门检查作为依据

- A. 人字缝
- B. 冠状缝
- C. 矢状缝
- D. 额缝
- E. 颞缝

57. 患者,男性,50 岁。反复呕吐 4 日,尿少,四肢厥冷。查体:BP 70/40 mmHg,血钠 125 mmol/L,血清 K 3.4 mmol/L。诊断为低渗性缺水,对该患者的治疗首先是

- A. 补钾
- B. 给予升压药
- C. 扩充血容量
- D. 纠正酸中毒
- E. 急诊手术

58. 患儿,男,5 岁。幼儿园老师反映上课时不停摇椅,多跑动,不专心,不能完成手工作业,但智力正常。诊断为注意缺陷多动障碍,其患儿的临床表现是

- A. 注意力缺陷
- B. 活动过度
- C. 其他表现
- D. 注意力缺陷和活动障碍同时出现
- E. 多动障碍

59. 患者,女性,35 岁。因阴道分泌物增多,诊断为慢性宫颈炎,遵医嘱行局部物理

治疗,在治疗前需常规做的检查是

- A.阴道分泌物悬滴检查
- B.阴道分泌物细菌培养
- C.阴道镜检查
- D.子宫颈刮片
- E.宫腔镜检查

60.患儿,5岁。重症室间隔缺损,并发肺炎3天,咳嗽、呼吸急促,其处理重点是

- A.建立合理的生活制度
- B.控制感染
- C.对症治疗
- D.手术治疗
- E.加强锻炼

(61~63题共用题干)

患者,女性,36岁。以寒战、高热,皮肤黏膜出血1周入院。查体:肝、脾及淋巴结肿大,胸骨压痛。

61.首先考虑为

- A.特发性血小板减少性紫癜
- B.过敏性紫癜
- C.淋巴瘤
- D.急性白血病
- E.再生障碍性贫血

62.患者出现高热的主要原因是

- A.出血
- B.贫血
- C.感染
- D.代谢亢进
- E.脑膜浸润

63.降温不宜采用

- A.温水擦浴
- B.冰水冷敷
- C.放置冰袋
- D.乙醇擦浴
- E.给退热药

(64~66题共用题干)

患者,女性,35岁。甲状腺肿大、突眼、心慌、失眠,心率100次/分,血压100/90 mmHg诊断为甲亢。

64.患者的基础代谢率是

- A.+20%
- B.+29%
- C.+30%
- D.+39%
- E.+49%

65.术前服用碘剂的目的是

- A.稳定情绪
- B.抑制甲状腺素分泌
- C.抑制甲状腺素合成
- D.增加甲状腺球蛋白分解
- E.防止缺碘

66.甲亢患者在术前不宜使用下列哪种

药物

- A.碘剂
- B.甲硫氧嘧啶
- C.普萘洛尔
- D.阿托品
- E.丙硫氧嘧啶

(67~68题共用题干)

患者,女性,28岁。慢性风湿性心脏病,联合瓣膜病。患者自幼好发扁桃体炎,5年前于劳动时出现呼吸困难,咳粉红色泡沫痰并双下肢水肿。

67.护士向患者解释双下肢水肿的原因是

- A.左心衰竭
- B.右心衰竭
- C.全心衰竭
- D.呼吸衰竭
- E.下肢静脉栓塞

68.查体:水冲脉、毛细血管搏动征阳性。

分析其原因是

- A.肺动脉高压
- B.大循环淤血
- C.脉压增大
- D.肺动脉高压
- E.病毒感染

(69~71题共用题干)

患儿,女,8岁。被开水烫伤后3小时送至急诊,患儿躯干前侧包括会阴部均为薄壁的大水疱,疼痛剧烈,双下肢红斑性改变。

69.该患儿 I 度烫伤面积是

- A.10%
- B.12%
- C.30%
- D.20%
- E.36%

70.该患儿躯干前侧烫伤的深度达到

- A.表皮浅层
- B.真皮浅层
- C.真皮深层
- D.皮肤全层
- E.骨骼

71.该患儿双下肢损伤的深度达到

- A.表皮浅层
- B.真皮浅层
- C.真皮深层
- D.筋膜

E.皮肤全层

(72~73 题共用题干)

患者,男性,46岁。头部外伤后当即意识丧失,20分钟后清醒,诉头痛,呕吐3次。1小时前患者再次出现昏迷,格拉斯哥7分,右侧瞳孔散大,对光反射消失,左侧肢体肌张力增高,膝腱、跟腱反射亢进。

72.患者再次昏迷的主要原因是

- A.脑缺血
- B.脑水肿
- C.脑震荡
- D.脑挫裂伤
- E.颅内血肿

73.格拉斯哥昏迷评分项目包括

- A.瞳孔变化、言语反应、运动反应
- B.库欣反应、言语反应、睁眼反应
- C.睁眼反应、言语反应、运动反应
- D.库欣反应、睁眼反应、运动反应
- E.瞳孔变化、睁眼反应、库欣反应

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(74~75 题共用备选答案)

- A.出现生理性贫血
- B.血白细胞分类中中性粒细胞与淋巴细胞比例相等
- C.红细胞较大、染色较深
- D.出现生理性溶血
- E.血中有少量有核红细胞

74.4~6岁小儿

75.2~3个月小儿

(76~77 题共用备选答案)

- A.位于心尖搏动部,即第5肋间左锁骨中线内侧
- B.胸骨左缘第2肋间
- C.第一听诊区在胸骨右缘第2肋间,第二听诊区在胸骨左缘第3肋间
- D.胸骨体下端左缘,即胸骨左缘第4、5

肋间处

E.胸骨左缘第3肋间

76.二尖瓣听诊区为

77.三尖瓣听诊区为

(78~81 题共用备选答案)

- A.应用可待因
- B.保持舒适体位,转移注意力
- C.应用吗啡
- D.应用氯丙嗪
- E.应用非麻醉性药物

78.恶性骨肿瘤患者轻痛时

79.恶性骨肿瘤患者一般疼痛时

80.恶性骨肿瘤患者中度疼痛时

81.恶性骨肿瘤患者持续性剧痛时

(82~84 题共用备选答案)

A.固定胸壁

- B.剖胸探查
C.迅速封闭胸壁伤口
D.抗感染
E.穿刺排气减压
- 82.进行性血胸的紧急处理应
83.多根多处肋骨骨折的紧急处理应
84.开放性气胸的紧急处理应
(85~86题共用备选答案)
A.局部浸润麻醉
B.区域阻滞麻醉
C.表面麻醉
D.神经阻滞
E.椎管内麻醉
- 85.将渗透性能强的局麻药与局部黏膜接触,穿透黏膜,作用于神经末梢所产生的感觉消失状态称为
86.将局麻醉药注射到神经干(丛)旁,暂时性地阻滞神经的传导功能,称为
(87~88题共用备选答案)
A.瘦长体形及慢性消耗性疾病者
B.肺气肿患者或者老年人和矮胖体形者
C.缺乏维生素D者
D.大量胸腔积液、气胸、胸腔肿瘤的患者
E.肺不张、广泛胸膜粘连患者
- 87.扁平胸见于
88.胸部局部异常隆起见于
(89~90题共用备选答案)
A.青霉素
B.红霉素
C.氯霉素
D.甲硝唑
E.糖皮质激素
- 89.厌氧菌感染治疗首选
90.肺炎球菌肺炎治疗首选
(91~92题共用备选答案)
A.渗出型
B.粘连型
C.干酪型
D.混合型
E.空洞型
- 91.结核性腹膜炎合并肠梗阻,多见于
92.结核性腹膜炎合并肠痿,多见于
(93~95题共用备选答案)
A.术后第一日晨
B.7~14天
C.10~14天
D.7天
E.5~7天
- 93.外阴癌手术后一般多久拔出尿管
94.尿痿患者一般情况尿管要保留
95.常规妇科手术拔导管的时间是
(96~97题共用备选答案)
A.宫颈脱落细胞检查巴氏Ⅲ级
B.子宫异常出血
C.子宫内膜异位症
D.卵巢囊肿
E.浆膜下子宫肌瘤
- 96.阴道镜检查的适应证
97.宫腔镜检查的适应证
(98~100题共用备选答案)
A.2%碳酸氢钠
B.1:5000高锰酸钾
C.清水或生理盐水
D.鸡蛋清、牛奶
E.10%活性炭
- 98.对硫磷中毒洗胃禁用
99.敌百虫(美曲膦酯)中毒洗胃禁用
100.急性安眠药中毒洗胃液应用

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 急性出血坏死型胰腺炎的局部并发症是

- A. 急性呼吸窘迫综合征
- B. 消化道出血
- C. DIC
- D. 胰腺脓肿
- E. 急性肾衰竭

2. 特发性血小板减少性紫癜急性型和慢性型的临床特点,下列不妥的是

A. 急性型多见于儿童,慢性型多见于年轻女性

B. 急性型起病前多有上呼吸道感染史,慢性型起病前隐匿,不易察觉

C. 急性型出血症状较重,可见广泛皮肤、黏膜大片瘀斑,慢性型出血症状一般较轻

D. 急性型大部分会转变为慢性型

E. 急性型一般 4~6 周可恢复,慢性型则反复发作

3. 关于肾盂造瘘者叙述正确的是

- A. 常规冲洗,保持引流管通畅
- B. 低压冲洗
- C. 冲洗量 15~20 mL 为宜
- D. 高压冲洗
- E. 冲洗量 10~15 mL 为宜

4. 骨肿瘤患者护理措施不正确的是

- A. 高蛋白、高热量、高维生素饮食
- B. 采用三级止痛方案止痛
- C. 膝部术后膝关节应屈曲 15°
- D. 下肢手术患者术前 3 周开始股四头肌收缩练习
- E. 化疗患者密切观察其反应,尤其血液变化

5. 门静脉高压症患者的胃管

A. 术晨留置

B. 术前 1 日留置

C. 待麻醉后留置

D. 术前 4 小时留置

E. 术前 12 小时留置

6. 甲状腺术前指导患者练习的体位是

A. 侧卧位

B. 半坐卧位

C. 仰卧位

D. 俯卧位

E. 颈过伸位

7. 胎头在进行内旋转动作时,除子宫收缩力外,下列为主要参与因素的是

A. 胎儿胸锁乳突肌收缩

B. 膈肌收缩力

C. 腹肌收缩力

D. 肛提肌收缩

E. 会阴深横肌收缩

8. 先兆临产比较可靠的征象是

A. 假临产

B. 见红

C. 胎儿下降感

D. 胎动活跃

E. 尿中 hCG 明显增多

9. 能通过胎盘到达胎儿体内的免疫球蛋白是

A. IgA

B. IgD

C. IgG

D. IgE

E. IgM

10. 稽留流产是指

A. 胚胎停止发育,尚未自然排出

B. 胚胎停止发育 2 周以上,尚未自然

排出

C.胚胎停止发育 4 周以上,尚未自然

排出

D.胚胎停止发育 8 周以上,尚未自然

排出

E.胚胎停止发育 10 周以上,尚未自然

排出

11.MRI 扫描前应指导患者

A.禁食 4 小时

B.多喝水

C.去掉患者随身携带的金属物件

D.前 1 日进清淡饮食

E.排空膀胱

12.支气管哮喘的典型症状是

A.反复发作的吸气性呼吸困难

B.反复发作的呼气性呼吸困难

C.混合性呼吸困难

D.逐渐加重的咳嗽、咳痰

E.逐渐加重的呼吸困难

13.下列有关系统性红斑狼疮的描述不正确的是

A.大多以青年女性多见,育龄妇女占大多数

B.临床表现可有典型的面部蝶形红斑

C.90% 以上患者有关节受累,大多数关节肿痛是首发症状

D.肾脏损害最多见,部分患者可累及心血管、肺、消化、神经等系统

E.病因可能与精神刺激,创伤等应急因素有关

14.对颅脑外伤后躁动的患者,下列护理措施不正确的是

A.查明原因及时处理

B.立即应用镇静剂

C.不可强力约束

D.加上床档,防止意外发生

E.如患者有尿潴留应立即导尿

15.气性坏疽的潜伏期一般是

A.5~6 小时

B.1~4 天

C.7~10 天

D.15~30 天

E.40 天

16.肠外营养与导管有关的并发症不正确的是

A.空气栓塞

B.穿刺部位感染

C.静脉血栓形成

D.气胸和血胸

E.低血糖症

17.对 ARDS 患者,预防液体过量及肺水肿的措施下列不正确的是

A.准确记录出入量

B.控制输液总量,液体以胶体液为主,晶体液为辅

C.患者若有低血容量,必须及时补液以支持循环

D.液体入量过多时,适当使用利尿剂

E.输液防过量及过快

18.下列不属于骨折一般症状的是

A.疼痛、压痛

B.骨摩擦音

C.局部肿胀

D.功能障碍

E.瘀斑

19.腹部体征的观察不正确的是

A.腹膜刺激征的程度和范围变化

B.有无移动性浊音

C.肝浊音界有无缩小或消失

D.肠鸣音

E.有无皮肤破损

20.手术前呼吸道准备不正确的是

A.戒烟

B.积极治疗呼吸道疾患

C.胸部手术者训练胸式呼吸

D.进行深呼吸训练

E.有效排痰的训练

21.口服补钾的时间宜选择在

- A.饭前
B.饭后
C.与餐同服
D.无时间限制
E.与第一口饭同服
- 22.类风湿关节炎所造成的关节痛的性质是
- A.多呈对称性、持续性,但时轻时重
B.多呈对称性、持续性,逐渐加重
C.不对称性、持续性,时轻时重
D.不对称性、间断性,逐渐加重
E.不对称性、间断性,时轻时重
- 23.对系统性红斑狼疮患者实施正确的护理保健指导,下列指导不妥的是
- A.保持心情舒畅及乐观情绪
B.介绍药物知识,积极配合治疗
C.注意劳逸结合,适当锻炼
D.注意口腔、皮肤、会阴等易感部位的卫生
E.病室清新并保持光线充足
- 24.蛛网膜下腔出血的临床表现中,不应有的症状或体征是
- A.颈项强直
B.呕吐
C.双下肢手套袜套样感觉
D.意识不清
E.头痛
- 25.休克代偿期的临床表现为
- A.血压稍低、脉快、脉压缩小
B.血压稍高、脉缓慢、脉压缩小
C.血压稍升高、脉搏无变化、脉压缩小
D.收缩压正常或稍高、脉稍快、脉压缩小
E.血压稍低、脉快、脉压正常
- 26.外科感染的预防措施不正确的是
- A.注意个人卫生
B.防止外伤
C.外科操作注意无菌
D.预防注射
E.经常服用抗生素
- 27.心内注射给药的部位是
- A.胸骨左缘第4肋间1.5~2 cm处
B.胸骨右缘第4肋间1.5~2 cm处
C.胸骨左缘第4肋间3~4 cm处
D.胸骨右缘第4肋间3~4 cm处
E.胸骨右缘第4肋间5~6 cm处
- 28.急性肾衰竭患者的饮食,下列正确的是
- A.高蛋白、高糖、高维生素
B.高脂、高糖、高蛋白
C.低蛋白、高脂、低维生素
D.低蛋白、低糖、高维生素
E.低蛋白、高糖、高维生素
- 29.下列代谢性酸中毒的临床表现中不正确的是
- A.呼吸深而快
B.呼气中带有酮味
C.心率加速
D.面部潮红
E.耳前叩击试验阳性
- 30.宫缩的特点,下列不正确的是
- A.对称性
B.节律性
C.随意性
D.极性
E.缩复作用
- 31.支气管哮喘发作时,最适宜的体位是
- A.仰卧位
B.侧卧位
C.平卧位
D.头低足高位
E.端坐位
- 32.关于痰液的体位引流,下列描述不妥的是
- A.引流时使病变部位支气管开口向下
B.引流应在餐后
C.为加强引流效果,可同时辅以胸部叩击

- D.每次引流时间不超过 30 分钟
E.引流过程中注意观察病情
- 33.甲亢危象的主要临床表现是
A.心率增快,血压增高,脉压增大
B.高热,心率增快,呕吐腹泻,烦躁
C.血压增高,心力衰竭,肺水肿
D.低血压,低体温,休克
E.心率增快,心律失常,心力衰竭
- 34.关于胰岛素注射下列说法错误的是
A.常用注射部位有臀大肌、上臂外侧、腹部、股外侧
B.胰岛素应冷藏保存
C.混合注射胰岛素时,应先抽中长效胰岛素
D.1 周内同一部位不应注射两次
E.使用前 1 小时自冰箱取出
- 35.中心静脉导管护理不正确的是
A.导管穿刺点消毒每周 2 次
B.观察穿刺点有无感染的征象
C.保持导管的通畅
D.输注结束用肝素稀释液封管
E.不经导管抽血
- 36.关于皮肤黑痣的描述,不正确的是
A.皮内痣易恶变
B.来源于黑色素细胞
C.可恶变为黑色素瘤
D.溃破、发炎是恶变的征象
E.痣细胞分泌色素
- 37.骨折牵引的护理中可以防止牵引过度的是
A.将患者床头或床尾抬高 15~20 cm
B.皮肤牵引一定注意皮肤护理
C.防止牵引针左右移动
D.骨牵引针孔,滴 75%酒精 1~2 次/日
E.定时测量肢体的长度
- 38.暴露疗法护理不正确的是
A.约束肢体,防止抓伤
B.随时冲洗创面
C.创面不应覆盖任何敷料
D.避免创伤受压
E.注意观察创面的血运
- 39.下列患者自控镇痛(PCA)不包括的是
A.患者自控静脉镇痛
B.患者自控硬膜外镇痛
C.皮下 PCA
D.蛛网膜下腔自控镇痛
E.神经干旁阻滞镇痛
- 40.膀胱癌的血尿特点
A.全程间歇性无痛肉眼血尿
B.间歇无痛初始肉眼血尿
C.活动后血尿
D.无痛性中段肉眼血尿
E.全程肉眼血尿伴疼痛
- 41.下列支气管扩张的护理措施正确的是
A.在餐后做体位引流
B.出现大咯血的患者也可以做体位引流
C.保持口腔清洁
D.要绝对卧床休息
E.给予高热量、低蛋白饮食
- 42.急性左心衰竭为减轻呼吸困难首先采取的护理措施是
A.高浓度吸氧
B.利尿低盐饮食
C.端坐,双腿下垂
D.平卧,抬高双腿
E.皮下注射吗啡
- 43.贫血最突出的体征为
A.头晕、耳鸣、记忆力不集中
B.皮肤、黏膜苍白
C.活动后心悸、气促
D.多尿、尿比重低
E.贫血性心脏病
- 44.关于糖尿病足部护理措施正确的是
A.定期检查足部皮肤
B.多运动

- C.穿紧身裤、吊带袜
 D.注意保暖,可以使用电热毯进行保暖
 E.使用热水袋水温可达到 70 ℃
- 45.甲状腺危象的诱因,下列哪项是错误的
- A.应激
 B.感染
 C.¹³¹I治疗
 D.手术准备不充分
 E.碘缺乏
- 46.化脓性腹膜炎的临床表现中,出现早期呕吐的原因是
- A.胃肠痉挛
 B.反射性呕吐
 C.肠麻痹
 D.神经性呕吐
 E.肠梗阻
- 47.急腹症诊断不明时,应慎用
- A.阿托品
 B.安眠药
 C.吗啡
 D.镇静剂
 E.索米痛片
- 48.颅内压增高“三主征”中,头痛部位常位于
- A.头顶部、两侧颞部
 B.枕后、头顶部
 C.前额、两侧颞部
 D.眶部、头顶部
 E.前额、枕后
- 49.下列属于暖休克表现的是
- A.躁动、淡漠
 B.皮肤苍白、发绀
 C.皮肤温度湿冷
 D.脉搏慢、搏动清楚
 E.尿量<30 mL/h
- 50.破伤风患者肌肉呈阵发性强烈痉挛,按出现顺序最初受影响的肌群是
- A.颈项肌
 B.面肌
 C.背腹肌
 D.四肢肌群
 E.咀嚼肌
- 51.患者,女性,孕 38 周初产妇。因重度妊娠期高血压疾病住院治疗 3 天,症状不见改善,血压 185/120 mmHg,尿蛋白(+++),尿蛋白 4 mg/24 h。突然阴道流水,羊水 IV 度粪染,胎心 115 次/分,应采取的措施是
- A.立即剖宫产术
 B.继续解痉、降压治疗
 C.缩宫素静点引产
 D.人工破膜加缩宫素静点引产
 E.吸氧加抗生素
- 52.患者,男性,35 岁。颅脑损伤,压迫眶上神经后可睁眼,回答问题含糊不清,肢体过伸位,该患者的格拉斯哥昏迷计分应为
- A.7 分
 B.8 分
 C.9 分
 D.10 分
 E.11 分
- 53.患者,女性,52 岁。行乳腺癌根治术,术后责任护士指导其进行患肢功能锻炼不正确的是
- A.24 小时内肩关节保持制动,可活动手、腕部
 B.术后 3~5 天活动肘部
 C.1 周后手臂越过头顶摸到对侧耳朵
 D.伤口完全愈合后锻炼肩关节的灵活度
 E.皮瓣基本愈合后进行肩部活动
- 54.患者,男性,急性肾衰竭,每日尿量 200 mL,对该患者限制入水量的标准下列不正确的是
- A.每日补液量 = 显性失水 + 隐性失水 - 内生水
 B.中心静脉压在正常范围
 C.无肺水肿、脑水肿及循环衰竭表现

- D.每日减轻体重 0.5 kg
E.血钠高于 127 mmol/L
- 55.患者,男性,30岁。2天前右上腹开始疼痛,后**全腹痛并有高热**,查体:体温 39.5℃,脉率 120 次/分,血压 85/60 mmHg,面色苍白,神志淡漠,白细胞 $12 \times 10^9/L$,**板状腹,尿少**。根据症状、体征,其休克属下列哪种类型
- A.过敏性休克
B.心源性休克
C.感染性休克
D.神经性休克
E.低血容量性休克
- 56.患者,女性,35岁。孕 39 周,自感**腹痛伴阴道出血 2 小时**,查体:血压 168/110 mmHg,下肢水肿(++),尿蛋白(+++),**子宫硬如板状**,胎心音未闻及,肛查宫颈口未开,出现这些表现最有可能的是
- A.重度妊娠期高血压疾病
B.重度妊娠期高血压疾病合并胎盘早剥
C.重度妊娠期高血压疾病先兆早产
D.先兆子宫破裂
E.前置胎盘
- 57.患儿,女,20 天。母乳喂养,生后 3 天出现黄疸,持续不退,精神、食欲好,体重增长正常,初诊为**母乳性黄疸**,为明确诊断应采取的措施是
- A.血常规
B.测血清胆红素
C.肝功能
D.网织红细胞
E.暂停母乳 3 天
- 58.患儿,5 岁。主因支气管肺炎入院。2 小时前突然喘憋加重,口鼻周发绀,**心率 168 次/分,呼吸 60 次/分,肝肋下 3 cm,奔马律**,最可能的诊断是
- A.气胸
B.肺不张

- C.脓胸
D.心力衰竭
E.肺脓肿
- 59.患者,女性,46 岁。上腹部胀闷不适 3 年,伴反酸、嗝气、厌油和右肩不适反复发作,曾有一次胆绞痛史,**B 超诊断慢性胆囊炎**,各项检查化验完善,其手术安排的合适手术间为
- A.无菌手术间
B.一般手术间
C.感染手术间
D.正负压切换手术间
E.正压手术间
- 60.患者,男性,56 岁。因胃溃疡行胃大部切除术,**术后 24 小时内应重点注意观察**
- A.体温变化情况
B.腹痛情况
C.切口情况
D.胃肠减压引流液情况
E.肛门排气、排便情况
- 61.患者,女性,25 岁。宫内妊娠 38 周,因**漏斗骨盆行剖宫产术**,当**新生儿娩出后**,首要护理措施是
- A.刺激新生儿大声啼哭
B.清理呼吸道
C.外旋转
D.处理脐带
E.检查新生儿有无畸形
- 62.患儿,男,孕 33 周早产。**生后 4 小时出现呼吸困难,青紫,鼻扇,呼气性呻吟,并有呼吸暂停**,该患儿可能为
- A.新生儿窒息
B.新生儿肺透明膜病
C.新生儿羊水吸入性肺炎
D.新生儿湿肺
E.新生儿感染性肺炎
- 63.患者,女性,35 岁。G3P0,妊娠 37 周,**夜间醒后发现阴道流血多量,无腹痛**,妊娠 20 周后反复出血 4 次,给予保胎治疗,子

宫软,压痛(-),无宫缩,胎位LSA,臀部位于耻骨联合上方高浮,胎心140次/分,耻骨联合上方闻及胎盘杂音,最可能的诊断是

- A. 中央性前置胎盘
- B. 部分性前置胎盘
- C. 边缘性前置胎盘
- D. 低置前置胎盘
- E. 轻度胎盘早剥

64. 患者,男性,52岁。主因“左上腹饱胀不适2年余,视物模糊2周”入院,查体:双下肢皮肤散在瘀斑,血常规提示:白细胞为 $12 \times 10^9/L$,B超提示脾大,骨髓象提示慢性粒细胞白血病,给予羟基脲治疗,以下护理不妥的是

- A. 嘱患者取右侧卧位,以缓解腹胀
- B. 鼓励患者多喝水,每日的饮水量要大于1500 mL
- C. 定期复查血象
- D. 注意休息,避免劳累
- E. 注意个人卫生、饮食卫生,预防感染

65. 患儿,女,足月剖宫产,生后20小时出现黄疸,进行性加重,精神反应差,拒乳,次日主因嗜睡,尖叫,抽搐,该患儿可能的诊断是

- A. 新生儿颅内出血
- B. 新生儿缺血缺氧性脑病
- C. 新生儿胆红素脑病
- D. 新生儿化脓性脑膜炎
- E. 新生儿破伤风

66. 患者,女性,30岁。大便后滴血,有时用力排便或负重后有肿块从肛门脱出,最可能的诊断是

- A. 直肠内息肉
- B. 直肠癌
- C. 外痔
- D. 肛裂出血
- E. II度内痔

67. 患者,男性,68岁。以往进食时偶发哽咽感,胸骨后刺痛,食后症状消失,近来自

觉吞咽困难,明显消瘦,乏力,首先考虑

- A. 食管炎
- B. 食管癌
- C. 食管息肉
- D. 胃癌
- E. 胃十二指肠溃疡

68. 患者,男性,37岁。活动后突发右腰部疼痛,伴大汗淋漓、恶心、呕吐,已持续2小时,尿常规红细胞15~20个/HP,血常规白细胞 $7 \times 10^9/L$,B超提示右肾积水,未见高密度回声,右输尿管上段扩展。最可能的诊断是

- A. 膀胱结石
- B. 右输尿管结石
- C. 胆结石
- D. 胆总管结石
- E. 右肾结石

(69~71题共用题干)

患者,男性,31岁。无明显诱因出现皮肤紫癜2周,口腔血泡1周,多次查血小板均减少,白细胞正常,血红蛋白正常,目前血小板为 $29 \times 10^9/L$ 。骨髓象显示:骨髓巨核细胞增多,形成血小板的巨核细胞减少。

69. 根据临床特点和骨髓象本患者的诊断是

- A. 白血病
- B. 过敏性紫癜
- C. ITP
- D. 再障
- E. 骨髓瘤

70. 该患者首选的治疗是

- A. 肾上腺糖皮质激素
- B. 脾切除
- C. 免疫抑制剂
- D. 输浓缩红细胞
- E. 大剂量丙种球蛋白

71. 下列护理措施不妥的是

- A. 多休息,少活动,注意保持心情平静
- B. 饮食不受限制,但要注意卫生

C.血小板低于 $20 \times 10^9/L$,要卧床休息
D.避免便秘,警惕脑出血的发生
E.注意观察皮肤紫癜的生长与消退情况

(72~74 题共用题干)

患儿,女,6个月。主因咳嗽,咳痰2天,喘息伴发绀1小时入院,入院体温 39.5°C ,心率 180 次/分。呼吸 78 次/分,肝肋下 3 cm,心电图示 T 波低平。

72.该患儿可能的诊断为

- A.支气管炎
- B.肺炎合并心衰
- C.支气管哮喘
- D.腺病毒性肺炎
- E.哮喘性支气管炎

73.该患儿最主要的护理诊断是

- A.体温过高
- B.体液不足
- C.心排出量减少
- D.气体交换受损
- E.活动无耐力

74.对该患儿的护理措施中最主要的是

- A.帮助患儿翻身变换体位
- B.少食多餐
- C.超声雾化
- D.立即吸氧
- E.病室内空体流通,温湿度适宜

(75~77 题共用题干)

患者,男性,16岁。3周前腹泻1周,感觉四肢无力,行走困难,并进行性加重,于上午10时来就诊,查体:患者神志清楚,肢体感觉异常,迟缓性瘫痪,腱反射消失,病理反射阴性。腰穿后脑脊液化验结果:细胞数正常,蛋白质明显增高。

75.此患者可能为

- A.短暂性脑缺血发作
- B.癫痫发作
- C.脑梗死
- D.脊髓疾病

E.急性感染性多发性神经根炎

76.引发此病的诱因有

- A.受凉、疲劳、创伤
- B.剧烈运动
- C.情绪激动
- D.钾摄入不足
- E.血钾偏高

77.该患者的最佳饮食安排是

- A.低脂饮食
- B.清淡易消化饮食
- C.高蛋白、高热量、易消化软食
- D.低钠饮食
- E.高钙饮食

(78~79 题共用题干)

患者,女性,34岁。尿频,尿急,尿痛半年余,应用抗生素效果不佳,现尿液呈洗米水状,尿频进行性加重。

78.该患者初步诊断为

- A.肾肿瘤
- B.肾结石
- C.肾结核
- D.肾囊肿
- E.肾脓肿

79.确定肾结核治疗方案的主要手段,最为重要的检查是

- A.尿常规检查
- B.尿液结核杆菌检查
- C.尿动力学检查
- D.膀胱镜检查
- E.X线检查

(80~81 题共用题干)

患者,女性,40岁。诊断为巨大结节性甲状腺肿,行一侧甲状腺全切,另一侧甲状腺大部切除术,术后第3天突然发生窒息,面肌和手足持续性痉挛。

80.患者最可能出现的并发症是

- A.喉上神经损伤
- B.喉返神经损伤
- C.甲状旁腺损伤

D. 甲状腺危象
 E. 呼吸困难和窒息
 81. 此时首要的措施是
 A. 检查引流管是否通畅
 B. 气管切开
 C. 立即拆除颈部切口缝线, 检查有否积血

D. 立即喉镜检查
 E. 立即静脉注射 10% 葡萄糖酸钙 20 mL (82~83 题共用题干)

患者, 女性, 65 岁。拟行择期**囊肿切除术**。患者咳嗽、多痰, 体温 38.1 ℃, 近 3 年每到冬季就开始咳嗽、咳痰, 持续 3~4 个月方可缓解。

82. 依据病史, 该患者并发

- A. 慢性支气管炎
- B. 急性支气管炎
- C. 慢性支气管炎急性发作
- D. 上呼吸道感染
- E. 哮喘

83. 麻醉前准备, 下述检查必不可少的是

- A. 肺功能测试
- B. 血糖
- C. 血脂
- D. 全身 CT
- E. 脑电图

(84~86 题共用题干)

患者, 女性, 34 岁。体重 59 kg, 主因阵发性腹痛伴呕吐 3 天入院, 查体: **舌干, 神志清, 表情淡漠, 皮肤弹性差, 眼窝凹陷, 尿少, 四肢肌肉软弱无力, 双膝腱反射减弱, 呼吸深快, T 38 ℃, P 120 次/分, R 25 次/分, BP 100/70 mmHg, 血清钾 3.1 mmol/L, 血钠 158 mmol/L。**

84. 该患者出现的代谢紊乱是

- A. 低渗性缺水, 代谢性碱中毒合并低血钾
- B. 代谢性酸中毒, 水中毒合并高血钾
- C. 代谢性酸中毒, 高渗性缺水合并低血钾

D. 呼吸性酸中毒, 低渗性缺水合并低血钾

E. 呼吸性碱中毒, 高渗性缺水

85. 该患者水分丧失量约为体重的

- A. 2%~4%
- B. 3%~5%
- C. 4%~6%
- D. 5%~7%
- E. 6%~7%

86. 首选输注的液体是

- A. 5% 葡萄糖液
- B. 生理盐水加氯化钾
- C. 50% 葡萄糖液加胰岛素
- D. 5% 碳酸氢钠溶液
- E. 复方氯化钠溶液

(87~89 题共用题干)

患儿, 男, 1 岁。体重 6 kg, 身高 70 cm, 精神萎靡, 皮肤弹性差, 腹部皮下**脂肪 3 cm**, 肌肉松弛。

87. 该患儿诊断是

- A. 轻度营养不良
- B. 中度营养不良
- C. 重度营养不良
- D. 中度脱水
- E. 营养不良性贫血

88. 该患儿次日起床后, 突然出现面色苍白, 出汗, 脉搏细弱, 肢体冰冷, 意识模糊, 此时首先应考虑该患儿发生了

- A. 心力衰竭
- B. 低血糖
- C. 脱水
- D. 低血钙
- E. 缺氧

89. 此时, 首先应做的治疗是

- A. 予强心剂
- B. 静脉缓慢推注 25% 葡萄糖
- C. 输入生理盐水
- D. 补钙
- E. 吸氧

(90~91 题共用题干)

患者,男性,48 岁。体重 50 kg。上午 9 时被热液烧伤,意识清楚,心率 96 次/分,血压 125/75 mmHg,躯干、双上肢及头面颈部深 II 度烧伤,上午 10 时开始静脉输液,上午 11 时行手术清创,下午 1 时送回病房。

90.此患者的烧伤总面积为

- A.49%
- B.51%

C.55%

D.54%

E.52%

91.伤后第一个 24 小时补液总量为

- A.6 050 mL
- B.5 300 mL
- C.7 300 mL
- D.4 770 mL
- E.6 770 mL

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(92~94 题共用备选答案)

- A.柔红霉素
- B.阿糖胞苷
- C.甲氨蝶呤
- D.三尖杉
- E.环磷酰胺

92.使用上述药物可引起口腔黏膜溃疡的是

93.使用上述药物可引起出血性膀胱炎的是

94.使用上述药物可引起静脉炎的是

(95~96 题共用备选答案)

- A.动脉导管未闭
- B.房间隔缺损
- C.肺动脉狭窄
- D.法洛四联症
- E.室间隔缺损

95.先天性心脏病有蹲踞、发绀现象的是

96.先天性心脏病可发生差异性发绀

的是

(97~98 题共用备选答案)

- A.高钾血症
- B.低钾血症
- C.高血压
- D.直立性低血压
- E.皮炎

97.使用排钾利尿剂应注意

98.使用血管紧张素转换酶抑制剂应注意

(99~100 题共用备选答案)

- A.白色泡沫样
- B.宿食
- C.胆汁
- D.咖啡色甚至鲜红色
- E.黄绿色

99.上消化道出血时呕吐物呈

100.消化性溃疡并发幽门梗阻时呕吐物呈

实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 患者在患病期间,表现出无精打采、注意力不集中,此时最可能的心理反应是
 - 否认和怀疑
 - 羞辱和罪恶
 - 退化和依赖
 - 卑微和孤独
 - 退缩和抑郁
- 入院时,对乙肝患者个人衣服的恰当处理方法是
 - 交给家属带回
 - 包好后存放
 - 用含氯消毒剂消毒后存放
 - 日光暴晒后存放
 - 消毒后交患者保管
- 每次吸痰时间不宜超过 15 秒的最主要原因
 - 减轻气管黏膜受损
 - 减少患者痛苦
 - 防止患者缺氧
 - 避免痰液阻塞导管
 - 保持导管处于无菌状态
- 下列不属于热力消毒灭菌方法的是
 - 压力蒸汽灭菌法
 - 燃烧法
 - 干烤法
 - 煮沸法
 - 紫外线消毒法
- 新生儿,出生 3 天,进行卡介苗的接种,其恰当的部位及方法是
 - 前臂掌侧下段,皮内注射
 - 三角肌下缘,皮内注射
 - 臀小肌,皮下注射
 - 上臂外侧,皮下注射
 - 股外侧,皮下注射
- 描述炎性浸润期褥疮,不恰当的是
 - 皮肤呈紫色
 - 皮下结节
 - 水疱表皮剥脱露出湿润的创面
 - 有大小水疱
 - 创面上有脓性分泌物
- 不宜采用燃烧法灭菌的物品是
 - 换药碗
 - 坐浴盆
 - 特殊感染伤口的敷料
 - 污染的纸张
 - 手术刀
- 不慎受到严重创伤,需随时观察及抢救的患者应给予
 - 陪护
 - 一级护理
 - 三级护理
 - 二级护理
 - 特别护理
- 胃癌患者行胃大部切除术后取半坐卧位的目的是
 - 减少局部出血
 - 减轻伤口缝合处的张力
 - 使感染局限化
 - 减轻肺部淤血
 - 有利于呼吸
- 需准备麻醉床的患者是
 - 外科新入院的患者
 - 行胆管造影的患者
 - 肠梗阻待手术的患者
 - 腰椎穿刺术后的患者
 - 腹腔镜术后的患者
- 需采集静脉血同时进行多项化验检查时如将血液同时抽出,血液注入各试管的

顺序是

A. 血常规试管→血培养瓶→查电解质的试管

B. 血常规试管→查电解质的试管→血培养瓶

C. 血培养瓶→查电解质的试管→血常规试管

D. 血培养瓶→血常规试管→查电解质的试管

E. 查电解质的试管→血培养瓶→血常规试管

12. 应放在有色密盖瓶内的药物是

- A. 易氧化的药物
- B. 易挥发的药物
- C. 易燃烧的药物
- D. 易潮解的药物
- E. 易风化的药物

13. 测口温时将体温计的水银端置于

- A. 舌根部
- B. 舌面
- C. 颊部
- D. 舌下热窝
- E. 上腭

14. 以下需用抗凝管采血的是

- A. ESR
- B. Ca、K
- C. T_3 、 T_4
- D. C_3 、 C_4
- E. AFP、CEA

15. 自我照顾模式是由谁提出的

- A. 纽曼
- B. 佩普劳
- C. 马斯洛
- D. 汉斯·席尔
- E. 奥瑞姆

16. 当个体发生疾病时采取的第三线防卫是

- A. 正确对待问题
- B. 正确对待情感

C. 减少压力的生理性影响

D. 向朋友寻求帮助

E. 寻求医护人员的帮助

17. 预防褥疮时,为缓解对局部的压迫不宜使用

宜使用

A. 气垫褥

B. 海绵垫

C. 橡皮气圈

D. 水褥

E. 海绵褥

18. 脉搏短绌常见于哪种患者

- A. 甲状腺功能亢进的患者
- B. 甲状腺功能减退的患者
- C. 主动脉瓣关闭不全的患者
- D. 主动脉狭窄的患者
- E. 心房纤维性颤动的患者

19. 为男性患者导尿,提起阴茎与腹壁呈 60° 角,可使

- A. 耻骨下弯消失
- B. 耻骨前弯消失
- C. 尿道膜部扩张
- D. 耻骨下弯和耻骨前弯均消失
- E. 尿道三个狭窄都消失

20. 紫外线杀菌的最佳波长是

- A. 254 nm
- B. 245 nm
- C. 452 nm
- D. 250 nm
- E. 425 nm

21. 对芽孢无效的化学消毒剂是

- A. 环氧乙烷
- B. 碘伏
- C. 甲醛
- D. 过氧乙酸
- E. 碘酒

22. 发生青霉素过敏性休克时,临床最早出现的症状是

- A. 烦躁不安、血压下降
- B. 四肢麻木、头晕眼花

- C.意识丧失、尿便失禁
D.腹痛、腹泻
E.喉头水肿、呼吸道症状
- 23.下列哪个区域是传染病区的半污染区
- A.治疗室、库房
B.内走廊及病区化验室
C.病室、厕所
D.浴室、洗涤间
E.配餐室、更衣室
- 24.下列哪项不是临床死亡期的特征
- A.呼吸停止
B.心跳停止
C.延髓处于深度抑制状态
D.各种反射消失
E.组织细胞新陈代谢停止
- 25.急性胃肠炎最典型的临床表现是哪组
- A.上腹疼痛、呕吐物带血液、上腹压痛
B.上腹疼痛伴压痛
C.上腹痛、发热失水、酸中毒
D.恶心、呕吐伴腹泻
E.腹痛、呕吐伴腹泻
- 26.胎儿娩出后,首先处理应是
- A.保暖
B.断脐
C.擦净皮肤上黏液
D.清除口鼻腔黏液
E.处理胎盘
- 27.膀胱刺激征的表现是
- A.尿急、腰痛、尿频
B.原频、尿急、尿多
C.尿频、尿急、尿痛
D.尿频、尿多、尿痛
E.尿多、尿急、尿痛
- 28.全身感染症状最明显的直肠肛管感染是
- A.肛瘘
B.内痔嵌顿
C.肛门周围脓肿
D.骨盆直肠间隙脓肿
E.坐骨肛管间隙脓肿
- 29.柏油样便常见于
- A.溃疡性结肠炎
B.痢疾
C.十二指肠溃疡出血
D.结肠癌
E.胃穿孔
- 30.甲亢所致甲状腺肿大最有鉴别意义的特征是
- A.弥漫性对称性肿大
B.有震颤和杂音
C.质地柔软
D.表面光滑
E.随吞咽上下移动
- 31.下肢静脉曲张患者,禁忌做高位结扎及剥脱术的是
- A.浅静脉瓣膜闭锁不全
B.交通支瓣膜闭锁不全
C.深静脉阻塞
D.小腿有色素沉着
E.小腿有慢性溃疡
- 32.格林-巴利综合征的主要表现如下,但除外
- A.四肢对称性迟缓性瘫痪
B.一侧中枢性面瘫
C.手套、袜套状感觉障碍
D.四肢肌萎缩
E.脑脊液蛋白增高,细胞数不变
- 33.做口腔霉菌培养时,采取分泌物的部位宜在
- A.扁桃体
B.两侧腭弓
C.舌苔部
D.溃疡面
E.咽部
- 34.下列对纽曼健康系统模式论关于弹性防线的描述正确的是

A.是人在生命历程中建立起来的健康状态或稳定状态

B.是由生物体共有的生存基本因素所组成

C.常常处于波动之中,并在短期内缓慢变化着

D.防止压力源入侵缓冲及保护正常防线

E.受到压力源侵犯时个体可表现出稳定性降低和疾病

35.有膀胱刺激征的患者常伴有

A.血红蛋白尿

B.血尿

C.胆红素尿

D.乳糜尿

E.多尿

36.大肠的运动不包括

A.环形运动

B.袋状往返运动

C.分节运动

D.蠕动

E.集团蠕动

37.应单独存放于阴凉低温处,远离明火的药物是

A.氨茶碱

B.盐酸肾上腺素

C.氯安定

D.乙醇

E.疫苗

38.各类环境空气、物体表面、医务人员手不得检出致病微生物,是指

A.肺炎链球菌

B.葡萄球菌

C.金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌

D.大肠埃希菌

E.铜绿假单胞菌

39.主要用于维持体液容量和渗透压平衡的晶体溶液是

A.5%~10%葡萄糖溶液

B.5%葡萄糖氯化钠

C.5%碳酸氢钠

D.11.2%乳酸钠溶液

E.25%~50%葡萄糖溶液

40.扁桃体摘除术后使用冷疗法的目的是

A.减轻局部充血或出血

B.保持呼吸道通畅

C.降低体温

D.控制炎症扩散

E.促进血液循环利于创面愈合

41.热疗适用的患者是

A.心肝肾功能不全

B.皮肤湿疹

C.恶性肿瘤

D.末梢循环不良

E.孕妇

42.氧气疗法对下列缺氧效果最好的是

A.低张性缺氧

B.血液性缺氧

C.循环性缺氧

D.组织性缺氧

E.阻塞性缺氧

43.洗胃液的温度为

A.20~22℃

B.25~38℃

C.30~33℃

D.35~37℃

E.28~40℃

44.护士小王为一患儿行头皮静脉穿刺,疑误入动脉,下列可作为支持依据的是

A.血管呈微蓝色

B.血管壁易压扁

C.血管不宜滑动

D.血液色暗红

E.推注药液阻力大

45.患者,女性,小脑疾病1年,走路时重心不稳,该患者的步态是

A.蹒跚步态

- B.剪刀步态
- C.醉酒步态
- D.间歇跛行
- E.慌张步态

46.通过手的感觉来感知患者身体部位有无异常的检查方法是

- A.视诊
- B.听诊
- C.触诊
- D.叩诊
- E.嗅诊

47.下列关于护理诊断排序时的注意事项错误的是

- A.优先满足患者生理需要,再考虑其他层次的需要
- B.对于因果关系的诊断,先解决属于原因的问题,后解决其导致的结果问题
- C.排序时,不需要考虑护理对象对解决问题顺序的意愿
- D.护理诊断的顺序不是一成不变的
- E.排序时也可以从护理的角度去判断

48.下列是弗洛伊德学说三大理论要点之一的是

- A.意识层次理论
- B.性蕾期理论
- C.自我理论
- D.潜意识理论
- E.精神分析法

49.王某,男性,26岁。腿部外伤后发展为气性坏疽,消毒其换下的敷料的最佳方法是

- A.75%乙醇浸泡
- B.燃烧
- C.高压蒸汽灭菌
- D.微波消毒灭菌
- E.煮沸

50.肖某,男性,40岁。因火灾全身重度烧伤,不能经口进食,消化功能不良,需要补充营养,医嘱给予要素饮食,下列做法不恰

当的是

- A.为了保持管道通畅,护士应每日冲洗管腔1~2次
- B.滴注要素饮食时,保持液体温度在45~50℃
- C.要素饮食期间应定期检查
- D.血糖和尿糖要素饮食最大浓度不能超过25%
- E.要素饮食应保证在无菌条件下配制

51.王某,女性,32岁。体温39.5℃,遵医嘱行乙醇拭浴时,置热水袋于足部,其目的主要是

- A.防止脑水肿
- B.防止腹泻
- C.防止局部冻伤
- D.避免患者寒战和不适
- E.防止反射性心律失常

52.患者,男性,36岁。已确诊为“白血病”1年,患者对自己的病情非常了解。患者喜欢独处,睡眠时间增加,情感减退。其属于临终患者的阶段是

- A.否认期
- B.愤怒期
- C.协议期
- D.忧郁期
- E.接受期

53.解女士,25岁。妊娠39周,于2:30正常分娩。6:40患者主诉下腹胀、痛。视诊:下腹膀胱区隆起;叩诊:耻骨联合上鼓音。患者存在的健康问题是

- A.体液过多
- B.分娩后疼痛
- C.排尿异常
- D.尿潴留
- E.有子宫内膜感染的可能

54.吕先生,72岁。下肢瘫痪,近期发现其骶尾部呈紫色,皮下有硬结和水疱。请判断是褥疮哪一期

- A.炎性红润期

- B.淤血红润期
C.炎性浸润期
D.浅层溃疡期
E.深层溃疡期
- 55.李女士,患糖尿病3年,近日出现糖尿病酮症酸中毒,其呼吸特点为
- A.呼吸节律异常
B.呼吸频率异常
C.呼吸音响异常
D.深度呼吸
E.浮浅性呼吸
- 56.石先生,56岁。患尿毒症,精神萎靡。下腹无胀满,24 h尿量为60 mL。请问患者的排尿状况属于
- A.正常
B.尿闭
C.尿滞留
D.少尿
E.尿量偏少
- 57.方先生,63岁。晨起取牛奶的路上突然摔到,意识、丧失,大动脉搏动消失。此时恰巧被张护士遇到,请问张护士对该患者应立即采取的措施是
- A.呼叫120来抢救
B.呼叫医生迅速来抢救
C.立即送回医院实施抢救
D.先畅通气道,再行人工呼吸、人工循环
E.先人工呼吸、人工循环,再畅通气道
- 58.赵女士,25岁。阴道上皮增生、角化,糖原增多,阴道酸度增强。此变化受哪种激素影响
- A.雄激素
B.雌激素
C.绒毛膜促性腺激素
D.孕激素
E.胎盘生乳素
- 59.吴先生,50岁。喉癌手术进行气管切开,患者痰液较多,为其吸痰时哪项操作

不对

- A.一根管吸净口腔痰液后再吸气管内痰液
B.插管时,关闭吸引负压
C.吸痰时从深部向上提拉,左右旋转
D.一次吸引不超过15秒
E.吸痰未净,需休息2 min再吸
- 60.某先生,40岁。突发上腹剧痛半小时,伴恶心就诊。查体:痛苦面容,屈曲体位,全腹软,右上腹近剑突处深压痛,Murphy征(-)最可能的诊断是
- A.急性胆囊炎
B.急性胃肠炎
C.肾绞痛
D.胆道蛔虫症
E.急性胃十二指肠溃疡穿孔
- 61.王先生,50岁。呕血4次,量约1 200 mL,黑便两次,量约600 g,伴头晕、心悸,BP 80/60 kPa,心率118次/分,诊断食管静脉曲张破裂出血,此时应给予患者最重要的措施是
- A.补液
B.吸氧
C.用止血药
D.清除血块
E.双气囊三腔,压迫止血
- 62.患者,女性,52岁。因车祸损伤支配膀胱的神经导致尿失禁。护理措施中不妥的是
- A.加强皮肤护理,预防褥疮
B.控制患者饮水,减少尿量
C.用接尿器接尿
D.臀部垫尿布
E.视病情留置导尿管(63~65题共用题干)
- 某患儿,1岁。因支气管肺炎住院,体温38.7℃,脉搏110次/分,呼吸25次/分。口服维生素C 0.2 g,枇杷止咳露5 mL,每日3次。

63. 患儿体温 38.7℃, 可采用的最佳降温方法是

- A. 冰袋头顶冷敷
- B. 冰帽头部冷敷
- C. 70%乙醇拭浴
- D. 32℃温水拭浴
- E. 冰囊冷敷血管处

64. 青霉素皮试阴性后, 肌内注射应选择的最佳部位是

- A. 上臂三角肌下缘
- B. 上臂外侧肌
- C. 臀大肌
- D. 臀中肌、臀小肌
- E. 股外侧肌

65. 帮助病儿口服枇杷止咳露的正确方法是

- A. 喂奶前服用, 服后少饮水
- B. 喂奶后服用, 服后多饮水
- C. 睡前喂服, 服后多饮水
- D. 咳嗽时服, 服后多饮水
- E. 在其他药后服, 服后不饮水

(66~68 题共用题干)

章冰, 男性, 5 岁。误服灭鼠药物(磷化锌)后被送至医院抢救, 护士立即实施抢救工作。请问

66. 应选择的洗胃液是

- A. 蛋清水
- B. 1%盐水
- C. 5%醋酸
- D. 2%~4%碳酸氢钠
- E. 硫酸铜

67. 电动吸引洗胃压力应保持在

- A. 5.5 kPa
- B. 7.5 kPa
- C. 9.5 kPa
- D. 11.3 kPa
- E. 13.3 kPa

68. 洗胃过程中若有血性液体流出, 应采取的护理措施是

A. 立即停止操作并通知医生

B. 减低洗胃吸引压力

C. 更换洗胃液, 重新灌注

D. 灌入止血剂, 以止血

E. 灌入蛋清水, 保护胃黏膜

(69~71 题共用题干)

黄女士, 55 岁。因脑出血昏迷一年余, 每日给鼻饲、翻身等处理。眼睑不能闭合。有尿失禁, 已留置尿管。

69. 对黄女士的眼睑保护方法最好是用

- A. 干纱布覆盖
- B. 湿纱布覆盖
- C. 油纱布覆盖
- D. 予以暴露
- E. 按揉到闭合

70. 保护双眼的目的是预防

A. 倒睫

B. 结膜炎

C. 麦粒肿

D. 外伤

E. 睫状体炎

71. 对黄女士留置尿管的护理应注意

A. 保持尿管通畅防止逆行感染

B. 每天倒一次引流袋

C. 每日更换一次尿管

D. 每周进行一次膀胱冲洗

E. 每周更换一次引流袋

(72~74 题共用题干)

男, 25 岁。化脓性扁桃体炎, 医嘱青霉素过敏试验。

72. 过敏试验液注入皮下的剂量为

A. 50 U

B. 100 U

C. 150 U

D. 200 U

E. 250 U

73. 3 分钟后患者出现濒危感, 伴烦躁不安, 呼吸困难, 出冷汗, 血压下降, 判断患者出现

- A.青霉素毒性反应
- B.呼吸道迟缓反应
- C.消化道过敏反应
- D.青霉素过敏性休克
- E.血清病型反应

74.遇到上述情况,首先采取的紧急措施是

- A.立刻平卧,皮下注射1%肾上腺素
- B.立刻给予升压药多巴胺
- C.立即静脉注射地塞米松
- D.立即给呼吸兴奋药物山梗菜碱
- E.立即静脉注射葡萄糖酸钙

(75~77题共用题干)

患儿,8个月,单纯母乳喂养,从未加辅食。近来面色蜡黄,表情呆滞,舌面光滑,有轻微震颤,肝于肋下4cm,血常规检查:HB 90g/L,RBC $2 \times 10^{12}/L$,血清维生素B₁₂降低。

75.你考虑该患儿可能发生的疾病是

- A.营养性巨幼红细胞性贫血
- B.营养性缺铁性贫血
- C.营养性混合性贫血
- D.溶血性贫血
- E.感染性贫血

76.该患儿最适宜的治疗是给予

- A.输血
- B.铁剂+维生素C
- C.维生素B₁₂+叶酸
- D.泼尼松
- E.补钙剂

77.预防该疾病应强调

- A.预防感染
- B.多晒太阳
- C.按时添加辅食
- D.培养良好的饮食习惯
- E.加强体格锻炼

(78~79题共用题干)

鲁女士,45岁。患糖尿病5年,1个月前诊断为卵巢癌。患者皮肤黏膜干燥,皮下

脂肪菲薄,身体极度衰弱。

78.护士做晨间护理的时候发现患者有头虱,应选用

- A.百部30g,75%乙醇100mL,50%乙酸2mL
- B.百部30g,50%乙醇100mL,100%乙酸1mL
- C.百部40g,75%乙醇100mL,50%乙酸2mL
- D.百部40g,50%乙醇100mL,100%乙酸1mL
- E.百部50g,75%乙醇100mL,100%乙酸1mL

79.行顺铂和更生霉素化疗过程中,患者出现剧烈呕吐反应,下列护理措施不当的是

- A.安慰患者,减少患者情绪上的波动
- B.协助患者清洁口腔,必要时行特殊口腔护理
- C.更换污床单,保持床单位清洁
- D.鼓励患者进高蛋白、高脂肪食物
- E.遵医嘱给予止吐药物

(80~81题共用题干)

患者李某,在出差途中,不幸感染急性甲型肝炎,在外地住院。

80.他需要将自己生病的情况告知家人,于是给家里写信,他的信件在寄出前的正确处理是

- A.用氯胺溶液喷雾
- B.用紫外线照射
- C.高压蒸汽灭菌
- D.甲醛熏蒸柜熏蒸
- E.过氧乙酸擦拭

81.对他的护理措施不妥当的是

- A.接触患者应穿隔离衣
- B.患者的排泄物直接倒入马桶中冲洗
- C.护理患者前后均应洗手
- D.给予低脂肪食杨
- E.患者剩余的饭菜可用漂白粉混合搅拌后倒掉

(82~84题共用题干)

患者,男性,38岁。支气管炎,遵医嘱给予糜蛋白酶+地塞米松超声雾化吸入。

82.给予糜蛋白酶的作用是

- A.稀释痰液
- B.消炎
- C.湿化呼吸道
- D.解除支气管痉挛
- E.减轻呼吸道黏膜水肿

83.治疗时间每次是

- A.1~2分钟

B.5~10分钟

C.10~15分钟

D.15~20分钟

E.20~30分钟

84.甲醛化学法柜内消毒灭菌需密闭时间为

A.5~10小时

B.6~12小时

C.8~12小时

D.7~12小时

E.10~12小时

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~86题共用备选答案)

- A.病室内光线充足
- B.病室内放花卉
- C.提高病室温度
- D.注意室内通风
- E.注意室内色调

85.为了使患者舒适、利于观察病情应做到

86.为了使病室美观、增添生机可以

(87~89题共用备选答案)

- A.过氧乙酸
- B.甲醛
- C.碘酊
- D.苯扎溴铵
- E.乙醇

87.可用于深部伤口冲洗的化学消毒剂是

88.需加防锈剂的化学消毒剂是

89.对呼吸道和眼睛有刺激性的化学消毒剂是

(90~91题共用备选答案)

- A.昏迷患者
- B.间歇期后继续进行化疗的白血病患者
- C.脑中风一侧肢体瘫痪的患者

D.腹部手术后第2天的患者

E.剖宫产术后康复准备出院的产妇

90.以上哪类患者适合使用全补偿系统进行护理

91.以上哪类患者适合使用辅助-教育系统进行护理

(92~93题共用备选答案)

- A.潮式呼吸
- B.毕奥呼吸
- C.库斯莫呼吸
- D.浮浅呼吸
- E.蝉鸣样呼吸

92.尿毒症患者常见的呼吸为

93.喉头水肿患者常见的呼吸为

(94~96题共用备选答案)

- A.全补偿系
- B.部分补偿系统
- C.支持教育系统
- D.预防系统
- E.帮助系统

94.根据自理模式理论,应使用

95.根据自理模式理论,对糖尿病患者进行护理时对剖腹产术后第三天患者的护理应使用

96.根据自理模式理论,对昏迷患者进行

护理时应使用

(97~98 题共用备选答案)

A.50 mL

B.100 mL

C.200 mL

D.300 mL

E.400 mL

97.少尿是指 24 小时尿量少于

98.无尿是指 24 小时尿量少于

(99~100 题共用备选答案)

A.吗啡中毒

B.颅内压增高

C.小脑幕裂孔疝早期

D.虹膜粘连

E.青光眼

99.一侧瞳孔散大、固定

100.双侧瞳孔缩小



考前点睛班