

口腔解剖学---牙体之恒牙 2

31.邻面接触区的正确位置是（ A ）

A.前牙在切 1 / 3，后牙在牙合 1 / 3

B.前磨牙在牙合 1 / 3 偏舌侧

C.前磨牙在牙合 1 / 3 偏中 1 / 3

D.磨牙在牙合 1 / 3 偏颊侧

E.磨牙在牙合 1 / 3 偏舌侧

32.端生牙是指（ C ）

A.除生长在颌骨表面，还生长在黏膜表面的牙

B.牙集中分布于颌骨表面

C.此类牙无牙根，借纤维附着于颌骨边缘

D.此类牙有牙根，借纤维附着于颌骨边缘

E.爬行纲属端生牙

33.上颌第一磨牙的斜嵴是由（ C ）

A.近中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴相连

B.近中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连

C.远中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连

D.远中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴相连

E.由牙尖的两斜面相遇而成的嵴

34.颊尖偏向远中的牙是（ B ）

A.下 4

B.上 4

C.下 5

D.上 5

E.全部都是

35.对建立正常的咬关系起重要作用，应尽量保留，避免拔除的牙是

(D)

A.尖牙

B.第一前磨牙

C.第二前磨牙

D.第一磨牙

E.第二磨牙

36.拔除那个切牙时最宜用旋转力 (A)

A.上颌中切牙

B.上颌侧切牙

C.下颌中切牙

D.下颌侧切牙

E.个切牙均可

37.关于上颌第一磨牙外形高点哪项是正确的 (E)

A.颊面外形高点在颊面中 1 / 3 处

B.舌面外形高点在舌面颈 1 / 3 处

C.近中邻面外形高点在颈 1 / 3 处

D.远中面外形高点在颊面颈 1 / 3 处

E.舌面外形高点在舌面中 1 / 3 处

38.牙体组织中最硬的组织是（ C ）

- A.牙骨质
- B.牙本质
- C.牙釉质
- D.牙髓
- E.牙槽骨

39.上颌尖牙唇轴嵴正确的是（ E ）

- A.唇轴嵴与颈嵴约相平行
- B.由颈缘延至中 1 / 3 处
- C.由牙尖的顶端伸延至中 1 / 3 处
- D.由颈缘延至颈 1 / 3 处
- E.由牙尖的顶端伸延至颈 1 / 3 处

40.下颌中切牙不正确的描述是（ A ）

- A.牙冠宽度约为上颌中切牙的 1 / 3
- B.牙冠宽度约为上颌中切牙的 2 / 3
- C.近中缘于远中缘对称
- D.近中切角与远中切角约相等
- E.全口牙中最小者

41.下列对下颌尖牙牙冠唇面形态描述哪个不正确（ C ）

- A.牙尖的近中斜缘约占唇面宽度的 1 / 3
- B.牙尖的远中斜缘约占唇面宽度的 2 / 3
- C.两斜缘的交角为 90°

D.唇轴嵴止于牙冠中 1 / 3 处

E.冠与根的近中缘相延续呈直线

42.下颌第一磨牙合面的发育沟有 (D)

A.颊沟、近中沟、远中沟

B.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟

C.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中舌沟

D.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中颊沟

E.颊沟、舌沟、中央沟

43.上颌第一磨牙牙冠颊面形态错误的是 (E)

A.近远中宽度大于合颈高度

B.近中缘长而直，远中缘稍短而突

C.合缘长于颈缘

D.近中颊尖宽于远中颊尖

E.外形高点在颈 1 / 3 与中 1 / 3 交界处

44.上颌第一磨牙牙根描述错误的是 (C)

A.由三根组成，三根分开

B.两根在颊侧，一根在舌侧

C.两颊根相距较远

D.颊根与舌根之间分开较远

E.牙根未分叉部分叫根干

45.在磨牙组中哪个牙的远中根可分为颊舌二根 (A)

A.下颌第一磨牙

B. 下颌第二磨牙

C. 第三磨牙

D. 上颌第一磨牙

E. 上颌第二磨牙

46. 上颌第一磨牙牙尖从大到小的顺序是 (E)

A. 近中颊尖>远中颊尖>近中舌尖>远中舌尖

B. 近中颊尖>近中舌尖>远中颊尖>远中舌尖

C. 近中舌尖>远中舌尖>近中颊尖>远中颊尖

D. 近中舌尖>近中颊尖>远中舌尖>远中颊尖

E. 近中舌尖>近中颊尖>远中颊尖>远中舌尖

47. 下颌第一磨牙牙冠上不可能有的发育沟是 (E)

A. 颊沟

B. 远中颊沟

C. 近中沟

D. 远中沟

E. 远中舌沟

48. 上颌第一磨牙舌面近中舌尖与远中舌尖之间的沟称为 (C)

A. 舌沟

B. 近中舌沟

C. 远中舌沟

D. 近中沟

E. 远中沟

49. 下颌磨牙远中根可分为颊舌二根的是 (A)

- A. 下颌第一磨牙
- B. 下颌第二磨牙
- C. 下颌第三磨牙
- D. 下颌第一、二磨牙
- E. 下颌第二、三磨牙

50. 上颌第一前磨牙近远中接触区的位置是 (A)

- A. 近远中接触区均在颊 1 / 3 近合缘处
- B. 近远中接触区均在中 1 / 3 近合缘处
- C. 近远中接触区均在舌 1 / 3 近合缘处
- D. 近中接触区在颊 1 / 3 近合缘处，远中接触区在中 1 / 3 近合缘处
- E. 近中接触区在中 1 / 3 近合缘处，远中接触区在颊 1 / 3 近合缘处

51. 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为 (C)

- A. 同形牙，有较完善的牙根，位于颌骨的牙槽窝内
- B. 同形牙，无牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘
- C. 异形牙，牙根发达，深埋于颌骨的牙槽窝内
- D. 同形牙，有较完善的牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘
- E. 异形牙，牙根小，埋于颌骨的一侧

52. 下述对上颌第二前磨牙合面形态描述中正确的是 (D)

- A. 颊缘大于舌缘的宽度
- B. 合面为显著的六边形
- C. 颊尖高大，舌尖短小

D.近远中点隙相距较近

E.中央窝窄而深

53.下颌第一前磨牙的横嵴将合面分成（ B ）

A.较大的三角形近中窝，较小的长圆形远中窝

B.较小的三角形近中窝，较大的长圆形远中窝

C.较大的长圆形近中窝，较小的三角形远中窝

D.较小的长圆形近中窝，较大的三角形远中窝

E.近远中窝相近，均为三角形

54.下颌第一磨牙有5个牙尖，它们的大小顺序是（ D ）

A.近中颊尖>远中颊尖>近中舌尖>远中舌尖>远中尖

B.近中颊尖>近中舌尖>远中颊尖>远中舌尖>远中尖

C.近中舌尖>近中颊尖>远中颊尖>远中舌尖>远中尖

D.近中舌尖>远中舌尖>近中颊尖>远中颊尖>远中尖

E.远中颊尖>近中颊尖>近中舌尖>远中舌尖>远中尖

55.下述上颌第一、第二磨牙间形态差别哪个是错误的（ C ）

A.上颌第二磨牙极少有第五牙尖

B.上颌第二磨牙的斜嵴不如第一磨牙明显

C.上颌第二磨牙近远中舌尖大小差别不如上颌第一磨牙悬殊

D.上颌第二磨牙颊侧两根分叉度较小

E.上颌第二磨牙颊根与舌根的分叉度较小

56.上颌第一前磨牙合面中央窝内近远中向的发育沟称为（ D ）

A.近中沟

B.远中沟

C.近远中沟

D.中央沟

E.中央近远中沟

57.上颌第一磨牙（ A ）

A.近颊合角、远舌合角为锐角；远颊合角，近舌合角为钝角

B.近颊合角、远舌合角为钝角；远颊合角，近舌合角为锐角

C.近颊合角、远颊合角为钝角；远舌合角，近舌合角为锐角

D.近颊合角、远颊合角为锐角；远舌牙合角，近舌合角为钝角

E.近颊合角为直角，远颊合角为钝角

58.下列对上颌第一前磨牙的描述中错误的是（ B ）

A.颊尖略偏远中，舌尖略偏近中

B.颊面外形高点在中 1/3 处

C.邻面是四边形

D.有近中沟

E.有半数分为颊舌二根

59.下颌第二磨牙合面的发育沟是（ B ）

A.颊沟、近中沟、远中沟

B.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟

C.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中颊沟

D.颊沟、舌沟、远中舌沟

E.颊沟、舌沟、近中沟

60. 一个 68 岁患者，因牙齿缺失，欲行义齿修复，患者主诉多年来口内多数牙都因龋坏松动拔除或自行脱落。临床检查发现：口内仅剩四个尖牙。而且松动度在 I 度以内，除牙尖有明显磨耗外，无龋坏，四个尖牙之所以还能留在口内的原因，从牙体解剖的角度分析，其原因是（ B ）

- A. 尖牙位于口角，口角有促进牙齿自洁的作用
- B. 尖牙的牙根长，而且牙冠各面光滑，自洁作用好
- C. 尖牙的作用是穿刺和撕裂食物，这种作用有利于牙齿稳固
- D. 从牙体解剖的角度无法说尖牙比其它牙在口内保留时间更长
- E. 以上都不是

金英杰 郝老师