

## 口腔专业·2018.11.30·必备速记·口组（14-15）

### 一、颌骨上皮性囊肿

发育性	牙源性	婴儿龈囊肿(Epstein珠);牙源性角化囊肿;含牙(滤泡)囊肿;萌出囊肿;发育性根侧囊肿;成人龈囊肿;腺牙源性囊肿
	非牙源性	鼻腭管(切牙管)囊肿;鼻唇(鼻牙槽)囊肿;球状上颌囊肿
炎症性	牙源性	根尖和根尖侧囊肿;残余囊肿;牙旁囊肿

### 二、口腔、面颈部软组织囊肿

- (1) 皮样和表皮样囊肿
- (2) 鳃裂(淋巴—上皮)囊肿
- (3) 甲状腺囊肿
- (4) 黏液外渗、黏液潴留和舌下囊肿

#### 第一节 牙源性囊肿

牙源性囊肿是指牙齿形成器官的上皮或上皮剩余发生的一组囊肿。根据囊肿的发生性质不同，可分为**发育性和炎症性**两大类。牙源性囊肿的衬里上皮来源于**牙源性上皮剩余**，而不同囊肿可能来源于不同的上皮剩余：①牙板上皮剩余或Serres上皮剩余可发生发育性根侧囊肿和牙龈囊肿；②缩余釉上皮发生的囊肿有含牙囊肿，萌出囊肿以及炎性牙旁囊肿；③Mallassez上皮剩余发生根尖周炎周囊肿，残余囊肿和炎性根侧囊肿。

#### 一、含牙囊肿

含牙囊肿又称滤泡囊肿，若位于软组织时，称为萌出囊肿。含牙囊肿囊腔内一定含有一个牙齿(严格说是牙冠)，但是含有牙齿的囊肿或病变并不一定都是含牙囊肿。因此不能仅仅通过X线表现做含牙囊肿的诊断

镜下所见：

1. 囊壁内衬复层鳞状上皮，一般较薄，仅由2~5列扁平细胞或矮立方形细胞构成，表层无角化，上皮厚薄较一致，无上皮钉突，类似于缩余釉上皮；
2. 外层囊壁由纤维结缔组织构成，无明显炎症，有时可见牙源性上皮岛；
3. 囊肿继发感染时，上皮增生，上皮钉突明显，可见大量炎细胞浸润

#### 第二节 非牙源性囊肿

非牙源性囊肿是指与牙齿发育或病变无关的一类囊性病损。

#### 一、鳃裂囊肿

鳃裂囊肿又称为**颈部淋巴上皮囊肿**。

##### (一) 临床表现：

1. 年龄：该囊肿好发于20~40岁患者。
  2. 性别：男女无差异。
  3. 部位：常位于颈上部近下颌角处，胸锁乳突肌上1/3前缘。
  4. 症状：囊肿生长缓慢，无明显症状，继发感染时可伴有疼痛。
  5. 体征：囊性肿物柔软，界限清楚，可活动，一般发生于单侧颈部，少数情况可双侧颈部同时发生。
- (二) 病理改变：肉眼见囊肿直径为2~4cm，囊壁薄，内壁光滑或有芝麻大小的颗粒状小突起，囊腔内含有**黄绿色或棕色清亮液体**，或含浓稠胶样、黏液样物。

镜下所见：

1. 90%以上的囊壁内衬复层鳞状上皮，可伴或不伴角化，部分囊壁内衬假复层柱状上皮；

2. 纤维囊壁内含有大量淋巴样组织并形成淋巴滤泡。

(三) 生物学行为: 鳃裂囊肿手术摘除后, 几乎无复发, 但可癌变。

(四) 组织发生: 鳃裂或咽囊的上皮剩余。

## 二、甲状腺囊肿

甲状腺囊肿是胚胎发育时期**甲状腺导管不消失或发育异常所导致的囊肿**。

(一) 临床表现:

1. 年龄: 可发生于**任何年龄**, 但青少年较多见。

2. 性别: 男女性别之比为**2:1**。

3. 部位: 常位于颈部中线或近中线处, 以甲状腺骨区发生者最多见。

4. 症状和体征: 一般无自觉症状, 囊肿直径为**2~3cm**, 表面光滑, 边界清楚, 触之有波动感, 能随吞咽上下活动。

(二) 病理改变: 肉眼观囊肿直径多为2~3cm, 囊壁较薄, 囊内容物为清亮黏液样物质, 若继发感染则为脓性或黏液脓性内容物

## 三、黏液囊肿

黏液囊肿是一类由于小唾液腺导管破裂或阻塞所致的黏液外渗(外渗性囊肿)或潴留而发生的软组织囊肿(**潴留性黏液囊肿**)。

(一) 临床表现:

1. 年龄: 可发生于任何年龄。

2. 性别: 无明显差异。

3. 部位: **以下唇黏膜最常见**, 其次为口底、舌腹、腭、颊、上唇及磨牙后区等黏膜。

4. 症状: 一般无自觉症状, 囊肿可自行消退或被咬破, 但不久又再次肿胀。

5. 体征: 囊肿为圆形或椭圆形, 大小不等, 位于组织内深浅不一, 浅在者可高出黏膜表面, 呈半透明, 浅蓝色; 深在者与黏膜颜色相同

非牙源性囊肿的鉴别(**重要!**)

	好发部位	组织起源	囊肿衬覆上皮类型
鼻腭管(切牙管)囊肿	位于切牙管的下段甚至完全位于切牙乳头的软组织内	鼻腭管上皮剩余	变异较大, 可以是复层鳞状上皮, 含黏液细胞的假复层纤毛柱状上皮, 单独或联合存在, <b>可见神经血管</b>
鼻唇(鼻牙槽)囊肿(助理不考)	牙槽突表面近鼻孔基部软组织内	胚胎性鼻泪管剩余或成熟管的下前部发生	一般为无纤毛的假复层柱状上皮, 含黏液细胞和杯状细胞。也可见复层鳞状上皮或立方上皮
球状上颌囊肿(助理不考)	上颌恒侧切牙和单尖牙牙根之间	未定	多为复层鳞状上皮和(或)纤毛柱状上皮 (邻牙活髓倒梨状)
鳃裂囊肿(助理不考)	颈上部下颌角附近, 胸锁乳突肌上1/3前缘	一般认为鳃裂囊肿来自鳃裂或咽囊的上皮剩余	复层鳞状上皮, 也可含一些假复层柱状上皮
甲状腺囊肿	舌盲孔与甲状腺之间即导管经过的任何部位, 以甲状腺骨区发生者最多见	甲状腺舌导管残余上皮	假复层柱状上皮, 可有纤毛。有时衬以复层鳞状上皮或呈现二者的过渡形态
黏液囊肿	下唇黏膜	唾液腺导管	外渗性没有; 潴留性有假复层或双层柱状或立方状上皮细胞