

# 中医外科学

## 一、疮疡

### 1. 临床表现

疖——肿势局限，范围多在 3 cm 左右，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。

有头疖——突起根浅，中心有一脓头，出脓即愈。

无头疖——无脓头。

蝼蛄疖——多发于儿童头部。

疖病——好发于项后发际、背部、臀部

### 2. 辨证论治

热毒蕴结证——发热，口渴，溲赤，便秘——五味消毒饮、黄连解毒汤加减。

暑热浸淫证——舌苔薄腻，脉滑数——清暑汤加减

体虚毒恋，阴虚内热证——病情反复伴口干唇燥，舌质红苔，脉细数——仙方活命饮合增液汤加减。

体虚毒恋，脾胃虚弱证——伴面色萎黄，神疲乏力，纳少便溏——五神汤合参苓白术散加减。

## 二、疔

### 1. 临床表现

多发于颜面和手足等处。其特点根脚坚硬，有如钉丁之状，容易造成毒邪走散。

### 2. 辨证论治

热毒蕴结证——红肿高突，根脚收束——清热解毒——五味消毒饮、黄连解毒汤加减。

火毒炽盛证——疮形平塌，肿势散漫——凉血清热解毒——犀角地黄汤、黄连解毒汤、五味消毒饮加减

## 三、痈

### 1. 痈

火毒凝结证（初）——光软无头，迅速结块，皮肤焮红——仙方活命饮加减。

热胜肉腐证（中）——痛如鸡啄，溃后脓出痛止——仙方活命饮合五味消毒饮加减

气血两虚证（后）——脓水稀薄，疮面新肉不生，色淡红——托里消毒散加减

### 2. 颈痈

### 1. 临床表现

冬春季易发，多生于儿童的颈旁两侧，也可发生于耳后、项后、颌下、颏下。

### 2. 辨证论治

风热痰毒证——初起色白需肿，形如鸡卵，灼热疼痛——牛蒡解肌汤或银翘散加减。

## 四、发

初起无头，红肿蔓延成片，中央明显，四周较淡，边界不清，灼热疼痛

结喉处——锁喉痈，臀部——臀痈，手背部——手发背，足背——足发背

### 1. 锁喉痈

痰热蕴结证（未化脓——早期）——吞咽困难，舌红绛，苔黄腻——普济消毒饮加减

热胜肉腐证（未化脓——中期）——脓出黄稠，热退肿减——仙方活命饮加减

热伤胃阴证——溃后脓出稀薄，疮口有空壳——益胃汤加减

### 2. 臀痈

(1) 临床表现

臀痈由肌肉注射引起者，发病来势急，病位深，范围大，难于起发，成脓较快，但腐溃较难，收口亦慢。

## (2) 辨证论治

湿火蕴结证——臀部红肿热痛（先痛后肿）——黄连解毒汤合仙方活命饮加减

湿痰凝滞证——漫肿不红，结块坚硬——桃红四物汤合仙方活命饮加减

气血两虚证——疮口较深，形成空腔——八珍汤加减

## 五、有头疽（助理不考）

### 1. 临床表现

初起——粟粒样脓头——溃如莲蓬、蜂窝——范围常超过 9~12 cm——多发于项后、背部——多见中老年人及消渴病患者——易内陷

### 2. 辨证论治

火毒凝结证——根脚收束，迅速化脓脱腐，脓出黄稠——黄连解毒汤合仙方活命饮加减

湿热壅滞证——全身壮热、胸闷呕恶，舌苔白腻或黄腻——仙方活命饮加减

阴虚火炽证——伴发热烦躁，口干唇燥——竹叶黄芪汤加减

气虚毒滞证——多见体虚、气血不足患者，化脓迟缓，腐肉难脱，易形成空腔——八珍汤合仙方活命饮加减

## 六、流注（助理不考）

### 1. 临床表现

发生在肌肉深部的转移性、多发性脓肿为表现的全身感染性疾病，漫肿疼痛，皮色正常，好发于四肢、躯干肌肉丰厚之深处

### 2. 辨证论治

余毒攻窜证——发病前有疔疮、痈、疖等病史——黄连解毒汤合犀角地黄汤加减

暑湿交阻证——多发于夏秋之间——清暑汤加减

瘀血凝滞证——脓如败浆，新肉难生，多发于四肢内侧，跌打损伤诱发者，多发于伤处——活血散瘀汤加减

## 七、丹毒

### 1. 临床表现

病起突然，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，边界清楚，迅速扩大。

### 2. 辨证论治

风热毒蕴证——发于头面部——普济消毒饮加减

肝脾湿火证——发于胸腹腰胯部——柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减

湿热毒蕴证——发于下肢——五神汤合萆薢渗湿汤加减

胎火蕴毒证——发于新生儿，多见于臀部——犀角地黄汤合黄连解毒汤加减

## 八、走黄与内陷（助理不考）

走黄：继发于疔疮的常称为走黄。

内陷：因疽毒或除疔以外的其他疮疡引起者称为内陷。

火陷——有头疽 1~2 候毒盛期

干陷——发于 2~3 候溃脓期

虚陷——发于 4 候收口期

## 九、乳痈

### 1. 临床表现

乳汁郁积导致——多为金黄色葡萄球菌——产后 3~4 周的哺乳期妇女

### 2. 辨证论治

气滞热壅证——恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘——瓜蒌牛蒡汤加减

热毒炽盛证——皮肤焮红灼热，肿块变软，有应指感——透脓散加味

正虚毒恋证——溃后疮口脓水不断，脓汁清稀——托里消毒散加减

## 十、粉刺性乳痈（助理不考）

粉刺性乳痈即西医学的浆细胞性乳腺炎

非哺乳（妊娠）期发病——乳头凹陷或溢液——初起肿块于乳晕部——溃破脓中夹有脂质样物质

## 十一、乳癖

### 1. 临床表现

乳癖——良性增生性疾病——乳房胀痛为主，偶有刺痛或牵拉痛——与月经周期及情志相关——边界不清，质地不硬，活动度好——25~45岁中的中青年女性

### 2. 辨证论治

肝郁痰凝证——乳房肿块随喜怒消长，伴胸闷胁胀——逍遥蒌贝散加减

冲任失调证——乳房肿块月经前加重——二仙汤合四物汤加减

## 十二、乳核

### 1. 临床表现

大多在0.5~5cm之间，边界清楚，质地坚实，表面光滑，按之有硬橡皮球之弹性，活动度大，触诊常有滑脱感——无疼痛，与月经无关——20~25岁青年妇女

### 2. 辨证论治

肝气郁结证——伴胸闷叹息，苔薄白，脉弦——逍遥散加减

血瘀痰凝证——肿块较大，坚硬木实，伴胸闷牵痛——逍遥散合桃红四物汤加山慈菇、海藻

## 十三、乳岩

### 1. 临床表现

无痛、无热、皮色不变——质地坚硬的肿块——推之不移，表面不光滑——病灶中心酒窝征——晚期溃烂，凹如泛莲——40~60岁

### 2. 辨证论治

肝郁痰凝证——情志抑郁，或性情急躁，胸闷胁胀——神效瓜蒌散合开郁散加减

冲任失调证——经事紊乱，素有经前期乳房胀痛——二仙汤合开郁散加减

正虚毒炽证——溃后愈坚，渗流血水，不痛或剧痛；精神萎靡——八珍汤加减

气血两亏证——瘤肿晚期或手术、放化疗后+面色萎黄或㿠白，神疲乏力，少气懒言——一人参养荣汤加味

脾虚胃弱证——手术或放化疗后+食欲不振、神疲肢软——参苓白术散或理中汤加减参苓白术散或理中汤加减

## 十四、气瘿

### 1. 临床表现

甲状腺弥漫性肿大——表面较平坦——质软不痛——皮色如常

### 2. 辨证论治

肝郁气滞证——随着喜怒而消长，伴急躁易怒，善太息——四海舒郁丸加减

## 十五、肉瘿

### 1. 临床表现

喉结一侧或两侧——柔韧而圆如肉团——随吞咽动作移动——发展缓慢——好发于青年女性及中年人

### 2. 辨证论治

气滞痰凝证——一般无明显全身症状，苔薄腻，脉弦滑——逍遙散合海藻玉壺湯加減  
气阴两虚证——伴有汗出心悸，消谷善饥——生脉散合海藻玉壺湯加減

## 十六、癰癧

### 1. 临床表现

结喉两侧结块——色红灼热——疼痛肿胀——甚而化脓

### 2. 辨证论治

风热痰凝证——伴恶寒发热、头痛、口渴——牛蒡解肌湯加減

气滞痰凝证——重按才痛，其痛牵引耳后枕部，或有喉间梗塞感——柴胡疏肝湯加減

## 十七、脂瘤

### 1. 临床表现

皮肤间出现圆形质软的肿块——中央有粗大毛孔——可挤出有臭味的粉渣样物

### 2. 辨证论治

痰气凝结证——咽喉如有梅核堵塞，情志抑郁，胸膈痞闷——二陳湯合四七湯加減

痰湿化热证——瘤体红肿、有疼痛灼热感，甚至跳痛化脓——龍膽泻肝湯合仙方活命飲加減

## 十八、血瘤

### 1. 临床表现

局部色泽鲜红或暗紫——或局限性柔软肿块——边界不清——触之如海绵

### 2. 辨证论治

心肾火毒证——多见于初生婴儿——芩連二母丸合涼血地黃湯加減

肝经火旺证——多发于头面或大腿部，肿块呈丘疹或结节状——丹梔逍遙散合清肝芦荟丸加減

脾统失司证——边界不清，好发于下肢，质地柔软易出血——順氣歸脾丸加減

## 十九、肉瘤

软似棉——肿似馒——皮色不变——不紧不宽——如肉之隆起

## 二十、热疮

### 1. 临床表现

皮损初为红斑，灼热而痒——后形成针头大小簇集成群的水疱——破裂后露出糜烂面——常见于口角、唇缘、鼻孔周围、面颊、外阴

### 2. 辨证论治

肺胃热盛证——心烦郁闷，大便干，小便黄——辛夷清肺饮合竹叶石膏湯

湿热下注证——水疱易破糜烂，伴有发热、尿赤、尿频、尿痛——龍膽泻肝湯加板藍根、紫草、玄胡

阴虛内热证——病程反复，伴口干唇燥，午后微热——增液湯加板藍根、馬齒莧、紫草、石斛、生薏苡仁

## 二十一、蛇串疮

### 1. 临床表现

红斑、水疱或丘疱疹——累累如串珠——排列带状——沿一侧周围神经分布区出现——局部刺痛

### 2. 辨证论治

肝經郁熱证——口苦咽干，心烦易怒，大便干燥，小便黃——龍膽泻肝湯加紫草、板藍根、延胡索等

脾虛濕蕴证——食少便溏，大便时溏，苔白腻——除湿胃苓湯加減

气滞血瘀证——痛不可忍，坐卧不安，舌暗，苔白，脉弦细——柴胡疏肝散合桃红四物汤加减

## 二十二、癣

### 1. 头癣

白秃疮——多见于儿童——头皮有圆形或不规则的覆盖灰白鳞屑的斑片——病损区毛发干枯无泽——易折断，自觉瘙痒

肥疮——初起为红色丘疹，或有脓疱——有黄癣痂堆积——上有毛发贯穿——质脆易粉碎——有特殊的鼠尿臭

### 2. 手足癣

鹅掌风——夏天起水疱病情加重——冬天则枯裂疼痛明显

脚湿气——分为水疱型、脱屑型、糜烂型——常以1~2种皮损为主。

### 3. 体癣

皮损特征为圆形、钱币状，边界清楚，中心消退，外围扩张的斑块——多发于夏季——青壮年男性多见——好发于面部、颈部、躯干及四肢近端。

### 4. 花斑癣

皮损好发于颈项、躯干，尤其是多汗部位以及四肢近心端。

### 5. 治疗

白秃疮、肥疮——5%硫黄软膏或雄黄膏。

鹅掌风、脚湿气——糜烂型可选用1:1500高锰酸钾溶液——脱屑型如角化增厚较剧，可选10%水杨酸软膏厚涂

## 二十三、白屑风

### 1. 临床表现

头发、皮肤多脂发亮，油腻，瘙痒——出现红斑白屑——脱而复生——以青壮年为多

### 2. 辨证论治

风热血燥证——干燥，脱屑，瘙痒——消风散合当归饮子加减

肠胃湿热证——有油腻性痴屑，甚至糜烂、渗出——参苓白术散合茵陈蒿汤

## 二十四、油风

### 1. 临床表现

头发成片迅速脱落——脱发区皮肤变薄，呈圆形、椭圆形或不规则形——无自觉症状

### 2. 辨证论治

血热风燥证——突然脱发展成片，偶尔会有头皮瘙痒——四物汤合六味地黄汤加减

气滞血瘀证——头发脱落前先有头痛或胸胁疼痛等症——通窍活血汤加减

气血两虚证——毛发稀疏枯槁，触摸易脱，伴唇白，心悸——八珍汤加减

肝肾不足证——伴头昏，耳鸣，目眩，腰膝酸软——七宝美髯丹加减

## 二十五、湿疮

### 1. 临床表现

对称分布——剧烈瘙痒——反复发作——易成慢性

### 2. 辨证论治

湿热蕴肤证——灼热瘙痒无休，抓破渗液流脂水，伴心烦口渴，身热不扬——龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤加减

脾虚湿蕴证——抓后糜烂渗出，可见鳞屑，伴纳少，腹胀便溏——除湿胃苓汤或参苓白术散加紫荆皮、地肤子、白鲜皮

血虚风燥证——剧痒难忍，遇热或肥皂水洗后瘙痒加重，伴有口干不欲饮——当归饮子或四物消风饮加丹参、鸡血藤、乌梢蛇

## 二十六、婴儿湿疮的特点、辨证论治（助理不考）

### 1. 临床表现

特点——好发于头面，重者可延及躯干和四肢

### 2. 辨证论治

胎火湿热证——红斑水疱，抓痒，大便干——消风导赤汤加减。

脾虚湿蕴证——大便稀溏或完谷不化——小儿化湿汤加土茯苓、鱼腥草

## 二十七、药毒

### 1. 临床表现

用药史——有一定的潜伏期——一般呈现全身性，对称性

### 2. 辨证论治

湿毒蕴肤证——伴口干，大便燥结，小便黄赤——萆薢渗湿汤加减

热毒入营证——伴高热，神志不清，舌红绛，镜面舌——清营汤加减

气阴两虚证——药疹后期大片脱屑，伴低热，神疲乏力——增液汤合益胃汤加减

## 二十八、瘾疹

### 1. 临床表现

皮肤出现红色或苍白色风团——时隐时现的瘙痒性——过敏性皮肤病

### 2. 辨证论治

风寒束表证——风团色白，遇寒加重——麻黄桂枝各半汤加减

风热犯表证——风团鲜红，灼热剧痒，遇热加重，得冷则减——消风散加减

胃肠湿热证——伴脘腹疼痛，恶心呕吐，神疲纳呆——防风通圣散加减

血虚风燥证——午后或夜间加剧——当归饮子加减

## 二十九、牛皮癣

### 1. 临床表现

皮肤状如牛项之皮——皮损多呈圆形或多角形的扁平丘疹融合成片——剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深——极易形成苔藓化

### 2. 辨证论治

肝郁化火证——伴心烦易怒，口苦咽干——龙胆泻肝汤加减

风湿蕴肤证——皮损呈淡褐色片状，粗糙剧痒——消风散加减

血虚风燥证——皮损色淡或灰白，肥厚粗糙——当归饮子加减

## 三十、白疕

### 1. 临床表现

红斑有松散的银白色鳞屑——抓之有薄膜及露水珠样出血点

### 2. 辨证论治

血热内蕴证——伴口干舌燥，咽喉疼痛，心烦易怒，便干溲赤——犀角地黄汤加减

血虚风燥证——鳞屑减少，干燥皲裂，自觉瘙痒，伴口咽干燥——当归饮子

气血瘀滞证——鳞屑较厚，颜色暗红，舌质紫暗有瘀点——桃红四物汤

湿毒蕴阻证——伴关节酸痛、肿胀、下肢沉重——萆薢渗湿汤

火毒炽盛证——伴壮热、口渴、头痛、畏寒，大便干燥，小便黄赤——清瘟败毒饮

## 三十一、淋病

### 1. 临床表现

不洁性交或间接接触传染史——男性淋病较明显，尿道口溢脓——女性淋病的急性淋病  
主要类型有淋菌性宫颈炎、淋菌性尿道炎、淋菌性前庭大腺炎。

### 2. 辨证论治

湿热毒蕴证（急性淋病）——尿道口溢脓，尿频、尿急、尿痛——龙胆泻肝汤酌加土茯苓、红藤、萆薢等

阴虚毒恋证（慢性淋病）——小便不畅，短涩，淋沥不尽——知柏地黄丸加土茯苓、萆薢等

### 三十二、梅毒（助理不考）

#### 1. 临床表现

一期梅毒——疳疮（硬下疳）——不洁性交后 2~4 周——外生殖器部位——一般无全身症状。

二期梅毒——主要表现为杨梅疮——一般发生在感染后 7~10 周。

三期梅毒——亦称晚期梅毒——主要表现为杨梅结毒。

胎传梅毒——多发生在妊娠 4 个月后——发病时小于 2 岁者称早期胎传梅毒，大于 2 岁者称晚期胎传梅毒

#### 2. 辨证论治

肝经湿热证——多见于一期梅毒——龙胆泻肝汤酌加土茯苓、虎杖

血热蕴毒证——见于二期梅毒——清营汤合桃红四物汤加减

毒结筋骨证——见于杨梅结毒——五虎汤加减

肝肾亏损证——见于三期梅毒脊髓痨者——地黄饮子加减

心肾亏虚证——见于心血管梅毒患者——苓桂术甘汤加减

### 三十三、痔

#### 1. 临床表现

内痔——便血——痔核脱出——肛周潮湿、瘙痒、疼痛、便秘——好发于膀胱截石位的 3、7、11 点处

外痔——齿状线以下——自觉肛门坠胀、疼痛，有异物感。

混合痔——同一方位的内、外痔静脉丛曲张——多发于膀胱截石位 3、7、11 点处——以 11 点处最为多见。

#### 2. 辨证论治

风伤肠络证——滴血或重者呈喷射状出血，血色鲜红色——凉血地黄汤加减

湿热下注证——肛内肿物脱出，可以自行还纳——脏连丸加减

气滞血瘀证——甚或嵌顿、肛门紧缩、坠胀疼痛，甚则肛门周缘有血栓，形成水肿——止痛如神汤加减

脾虚气陷证——需用手托住方能复位——补中益气汤加减

### 三十四、肛漏

#### 1. 临床表现

肛周反复流脓水——疼痛、瘙痒——从流脓外口触及或探及管道通向直肠

#### 2. 治疗

挂线疗法——适用于距离肛门 4cm 以内，有内外口的低位肛漏。

切开疗法——适应证低位单纯性肛漏和低位复杂性肛漏。

### 三十五、子痈

#### 1. 临床表现

子痈——睾丸或附睾肿胀疼痛为特点——急性子痈突然发作，行动或站立时加重

#### 2. 辨证论治

湿热下注证——阴囊皮肤红肿，焮热疼痛——枸橘汤或龙胆泻肝汤加减

气滞痰凝证——舌淡或有瘀斑，苔薄白或腻，脉弦滑——橘核丸加减

### 三十六、子痰

## 1. 临床表现

子痰——附睾尾部有结节，形成脓肿——溃破后脓液稀薄如痰——20~40岁

## 2. 辨证论治

浊痰凝结证——附睾硬结，子系呈串珠状肿硬——阳和汤加减，配服小金丹

阴虚内热证——有低热，盗汗倦怠——滋阴除湿汤合透脓散加减

气血两亏证——脓肿破溃，脓液稀薄，夹有败絮样物质——十全大补汤加减，兼服小金丹

## 三十七、精浊

湿热蕴结证——尿道有灼热感，排尿终末或大便时偶有白浊——八正散或龙胆泻肝汤

气滞血瘀证——坠胀不适、疼痛，舌暗有瘀斑——前列腺汤加减

阴虚火旺证——腰膝酸软，五心烦热——知柏地黄汤加减

肾阳虚损证——排尿淋沥，腰膝酸软，阳痿早泄，形寒肢冷——济生肾气丸加减

## 三十八、精癃

### 1. 临床表现

进行性尿——以夜间为明显——伴排尿困难，尿线变细。

### 2. 辨证论治

湿热下注证——小便频数黄赤，尿道灼热或涩痛，排尿不畅，甚或点滴不通——八正散加减

脾肾气虚证——尿频，滴沥不畅，尿线细，甚或夜间遗尿或尿闭不通——补中益气汤加菟丝子、肉苁蓉、补骨脂、车前子等

气滞血瘀证——舌质黯或有瘀点瘀斑——沉香散加减

肾阴亏虚证——头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热——知柏地黄丸加丹参、琥珀、王不留行、地龙等

肾阳不足证——小便频数，夜间尤甚，尿线变细，余沥不尽——济生肾气丸加减

## 三十九、烧伤

I 度烧伤——红斑性烧伤——不留瘢痕

浅II度烧伤——大小不一水疱——剧痛——不留瘢痕

深II度烧伤——较小水疱——痛觉消失——可有瘢痕和瘢痕收缩引起的局部功能障碍

III度烧伤——焦痂型烧伤

## 四十、肠痈

### 1. 临床表现

初期：腹痛起于脐周或上腹部——数小时后转移并固定在右下腹部——右下腹压痛——压痛点通常在麦氏点

酿脓期：腹痛加剧——右下腹明显压痛、反跳痛——局限性腹皮挛急——右下腹可触及包块。

溃脓期：腹痛扩展至全腹——腹皮挛急——全腹压痛、反跳痛

### 2. 辨证论治

瘀滞证——转移性右下腹痛，呈持续性、进行性加剧，右下腹局限性压痛或拒按——大黄牡丹汤合红藤煎剂加减

湿热证——腹痛加剧，右下腹或全腹压痛、反跳痛，右下腹可触及包块——复方大柴胡汤加减

热毒证——腹痛剧烈，全腹压痛、反跳痛——大黄牡丹汤合透脓散加减

## 四十一、股肿

### 1. 临床表现

肢体肿胀、疼痛——局部皮温升高——浅静脉怒张——好发于下肢髂股静脉和股腘静脉  
——可并发肺栓塞和肺梗死而危及生命

## 2. 辨证论治

湿热下注证——局部发热、发红，疼痛—— 四妙勇安汤加味

血脉瘀阻证 ——皮色紫暗，有固定性压痛，舌暗有瘀斑——活血通脉汤加减。

气虚湿阻证——下肢肿胀日久，活动后加重，皮色略暗——参苓白术散加味

## 四十二、脱疽

### 1. 临床表现

患肢末端发凉、怕冷、苍白、麻木——可伴间歇性跛行——继则疼痛剧烈——日久患趾  
(指) 坏死变黑——甚至趾(指)节脱落

## 2. 辨证论治

寒湿阻络证——患趾(指)喜暖怕冷，麻木，坠胀疼痛，皮肤苍白，发凉—— 阳和汤  
加减

血脉瘀阻证——皮色暗红或紫暗，皮肤发凉干燥，趺阳脉搏动消失——桃红四物汤加减

湿热毒盛证——患肢剧痛，局部肿胀，皮肤紫暗，呈浸淫蔓延，溃破腐烂——四妙勇安  
汤加减

热毒伤阴证——皮肤干燥，趾(指)甲呈干性坏疽——顾步汤加减

气阴两虚证——疮面久不愈合，肉芽暗红——黄芪鳖甲汤加减

扫码关注公众号，获取更多资料与资讯



金英济医学  
JINYINGJIE.COM