

2021 中 西 医 执 业 医 师 考 试

模拟密押卷

2021 年

中 西 医 执 业 医 师

资 格 考 试 专 用

第一单元

一、A₁型选择题（1~90题）

1、中医学整体观念的内涵是

- A、人体是一个有机整体
- B、人和自然界是一个整体
- C、人和社会是一个整体
- D、五脏与六腑是一个整体
- E、人体是一个有机整体，人和环境相互统一

2、在脾胃的相互关系中，最根本的是

- A、脾主升清，胃主降浊
- B、胃主纳谷，脾主磨谷
- C、脾燥胃湿，燥湿相济
- D、胃为水谷之海，脾为胃行其津液
- E、太阴湿土得阳始运，阳明燥土得阴自安

3、肾在志为

- A、喜
- B、思
- C、悲
- D、恐
- E、怒

4、热者寒之属于

- A、正治、逆治
- B、反治、从治
- C、正治、从治
- D、反治、逆治
- E、标本同治

5、五脏六腑的病理特点及治疗原则是

- A、脏病多虚，五脏宜补
- B、脏病多实，五脏宜泻
- C、腑病多虚，六腑宜泻
- D、腑病多实，六腑宜补
- E、脏病多实，五脏宜补

6、肝之华在

- A、面
- B、毛
- C、唇
- D、爪
- E、发

7、以下瘀血的致病特点不正确的是

- A、易于阻滞气机
- B、影响血脉运行
- C、为阴邪，易伤阳气
- D、影响新血生成
- E、病位固定，病证繁多

8、《内经》将人体的思维活动概括为

- A、意志思虑智
- B、怒忧思悲恐
- C、意志魂虑智
- D、意神思虑智
- E、神魂魄意志

9、来源于脾胃所化生的水谷之精微的是

- A、营气和元气
- B、卫气和宗气
- C、宗气和元气

D、卫气和营气

E、宗气和营气

10、在十二经脉走向中，足之三阴是

A、从足走头

B、从手走头

C、从脏走手

D、从头走足

E、从足走腹

11、寒者热之所体现的阴阳关系是

A、阴阳交感

B、阴阳互根

C、阴阳对立

D、阴阳消长

E、阴阳转化

12、肾精所化生的液是

A、泪

B、汗

C、涎

D、涕

E、唾

13、产后大出血，继则冷汗淋漓，甚则晕厥，其病机是

A、气不摄血

B、气随血脱

C、气血两虚

D、气血失和

E、气滞血瘀

14、不属于脾虚气陷证临床表现的是

A、久泄不止

B、肛门重坠

C、便意频数

D、子宫下垂

E、四肢不温

15、“阴阳离决，精气乃绝”所反映的阴阳关系是（ ）

A. 对立制约

B. 互根互用

C. 相互交感

D. 消长平衡

E. 相互转化

16、肝阳上亢的治法是

A. 泻南补北

B. 扶土抑木

C. 滋水涵木

D. 培土生金

E. 佐金平木

17、下列哪一项不是脾的主要生理功能

A. 主统血

B. 主藏血

C. 主升清

D. 主运化水谷

E. 主运化水液

18、下列各项，与肺主通调水道功能关系最密切的是

A. 气机的调节

B. 朝百脉

C. 主宣发与肃降

D. 司呼吸

E. 宗气的生成

19、心主神志最主要的物质基础是

A. 津液

B. 精液

C. 血液

D. 宗气

E. 营气

20、下列各项，与肺主通调水道功能关系最密切的是

A. 气机的调节

B. 朝百脉

C. 主宣发与肃降

D. 司呼吸

E. 宗气的生成

21、肺与肝的关系主要表现在

A. 气血互用方面

B. 气机升降方面

C. 血液运行方面

D. 精神互养方面

E. 以上都不是

22、患者因受精神刺激而气逆喘息，

面红目赤，呕血，继则昏厥卒倒。其病机是

A. 怒则气上

B. 悲则气消

C. 喜则气缓

D. 思则气结

E. 恐则气下

23、气机升降出入的枢纽是

A. 肝、肺

B. 肺、肾

C. 脾、胃

D. 肝、胆

E. 心、肾

24、患者自汗，多尿，滑精。是因气的何种作用失常所致

A. 推动

B. 温煦

C. 防御

D. 固摄

E. 气化

25、三阴三阳经中，行于头部两侧的经脉是

A. 太阳经

B. 阳明经

C. 少阳经

D. 厥阴经

E. 少阴经

26、寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是

A. 身热不扬

B. 脘腹痞闷

C. 面黄不泽

D. 口渴喜饮

E. 白带量多

27、脉短如豆，滑数有力的是

A. 疾脉

B、促脉

C、实脉

D、动脉

E、短脉

28、属于正常人从出生至死一生基本不变的面色是

A、主色

B、客色

C、善色

D、恶色

E、病色

29、寒痰的咳痰特点是

A、咳吐脓血腥臭痰

B、痰中带血，色鲜红

C、痰少而黏，难于咯出

D、痰白而清稀，有灰黑点

E、痰白滑而量多，易咯出者

30、口之形态中口撮可见于

A、痫病

B、中风

C、疟疾发作

D、小儿脐风

E、以上都不是

31、形瘦多食者，多属于

A、中气虚弱

B、中焦有火

C、阴虚不足

D、阳气不足

E、痰湿内盛

32、下列各项中，不属于引起舌象生理变异的因素是

A、年龄因素的影响

B、地域因素的影响

C、女性生理特点的影响

D、禀赋体质因素的影响

E、气候、环境因素的影响

33、身重兼脘闷苔腻者，多因

A、湿困脾阳

B、水湿泛滥

C、脾气虚

D、脾肾阳虚

E、食滞胃脘

34、饥不欲食兼见胃中有嘈杂、灼热感，舌红少苔，脉细数者多见于

A、胃强脾弱

B、脾胃湿热

C、胃阴不足

D、肝胃蕴热

E、胃火亢盛

35、下列属于阳证的是

A、食少乏味

B、倦怠无力

C、身体蜷卧

D、呼吸怯弱

E、小便短赤涩痛

36、下列面色中，湿热熏蒸的面色为

A. 黄如烟熏

B. 黄而色苍

- C. 黄而鲜明
- D. 淡黄浮肿
- E. 淡黄消瘦

37、在舌诊中，邪热夹酒毒上壅的舌象为

- A. 舌多瘀斑
- B. 舌色晦暗
- C. 舌脉粗长
- D. 舌色青紫
- E. 舌紫肿胀

38、独语，病因多属

- A. 热扰心神
- B. 痰火扰心
- C. 风痰阻络
- D. 心气不足
- E. 心阴大伤

39、有形实邪闭阻气机所致的疼痛，其疼痛性质是

- A. 胀痛
- B. 灼痛
- C. 冷痛
- D. 绞痛
- E. 隐痛

40、濡脉与弱脉的主要不同点，在于

- A. 脉位的浮沉
- B. 脉力的大小
- C. 脉形的长短
- D. 脉率的快慢
- E. 脉律的齐否

41、下列各项，不属于风淫证的是

- A. 风邪袭表证
- B. 风水相搏证
- C. 阳亢化风证
- D. 风邪中络证
- E. 风邪犯肺证

42、下列各项，不属于暑证临床表现的是

- A. 有严格的季节性
- B. 多发于夏月炎暑之季
- C. 感受暑热之邪
- D. 恶热，汗出，口渴喜饮，气短神疲，小便短赤
- E. 局部肿疡

43、内科辨证论治的核心是

- A. 脏腑辨证
- B. 气血津液辨证
- C. 八纲辨证
- D. 三焦辨证
- E. 卫气营血辨证

44、下列哪项是燥邪犯肺证与肺阴虚证的鉴别要点

- A. 有无发热恶寒
- B. 有无胸痛咳血
- C. 有无口干咽燥
- D. 痰量的多少
- E. 咯痰的难易

45、酸枣仁汤组成的药物中含有下列各项，属于辛温解表药的是

- A、荆芥、防风、蔓荆子
- B、藁本、牛蒡子、辛夷
- C、紫苏、香薷、白芷
- D、白芷、桂枝、葛根
- E、麻黄、羌活、桑叶

46、柴胡与升麻均具有的功效是

- A、解表生津
- B、清热解毒
- C、疏肝解郁
- D、透发麻疹
- E、升阳举陷

47、内服清热泻火，除烦止渴，火煨外用敛疮生肌、收湿、止血的药物是

- A、知母
- B、栀子
- C、石膏
- D、芦根
- E、竹叶

48、凉血不留瘀，活血不动血，又能退无汗骨蒸的药物是

- A、赤芍
- B、白薇
- C、生地黄
- D、牡丹皮
- E、郁金

49、用大黄泻下攻积，最恰当的用法是

- A、酒炒后下
- B、醋炒先煎

C、炒炭研末服

D、生用后下

E、生用先煎

50、下列各项，不属主治风湿热痹的药物的是

- A、黄柏、木瓜
- B、木通、防己
- C、独活、威灵仙
- D、白鲜皮、薏苡仁
- E、连翘、络石藤

51、性微温而善于芳香化湿解暑的药物是

- A、香薷
- B、佩兰
- C、砂仁
- D、豆蔻
- E、藿香

52、治疗暑湿泄泻，利小便以实大便，应选用的药物是

- A、木通
- B、车前子
- C、茯苓
- D、茵陈
- E、石韦

53、能行气化痰消痞，破气除满止痛的药物是

- A、陈皮
- B、青皮
- C、佛手

D、枳实

E、木香

54、被称为“回阳救逆第一品药”的药物是

A、人参

B、肉桂

C、鹿茸

D、附子

E、干姜

55、具有凉血功效的药物是

A. 石膏

B. 知母

C. 芦根

D. 天花粉

E. 栀子

56、具有养阴生津功效的药物是

A. 生地黄

B. 牡丹皮

C. 赤芍

D. 紫草

E. 金银花

57、桑寄生、五加皮除均可祛风湿外还具有的功效是

A. 清热安胎

B. 利尿消肿

C. 定惊止痉

D. 温通经络

E. 补肝肾，强筋骨

58、藿香的功用是

A. 化湿，解暑

B. 燥湿健脾，祛风散寒

C. 化湿，止呕，解暑

D. 燥湿消痰，下气除满

E. 化湿行气，温中止泻，安胎

59、具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

A. 泽泻

B. 滑石

C. 茵陈

D. 萆薢

E. 地肤子

60、治疗中焦虚寒，肝气上逆之巅顶头痛，宜选用

A. 丁香

B. 肉桂

C. 吴茱萸

D. 干姜

E. 花椒

61、既能疏肝破气，又能散结消滞的药物是

A. 陈皮

B. 青皮

C. 枳实

D. 木香

E. 香附

62、内服善于治疗下焦血热出血，外用又能疗烫伤、湿疹的药物是

A、栀子

- B、地肤子
- C、紫花地丁
- E、白及
- D、地榆

63、具有利尿通淋功效的药物是

- A. 川芎
- B. 丹参
- C. 郁金
- D. 桃仁
- E. 牛膝

64、桔梗具有的功效是

- A. 温肺祛痰
- B. 降气止呕
- C. 开宣肺气
- D. 燥湿化痰
- E. 利气宽胸

65、既能活血消肿，又能解郁安神的药物是

- A. 合欢皮
- B. 酸枣仁
- C. 远志
- D. 琥珀
- E. 磁石

66、既能平肝潜阳，又能清肝明目的药物是

- A. 珍珠母
- B. 牡蛎
- C. 代赭石
- D. 石决明

E. 牛黄

67、生用燥湿利水，炒用健脾止泻的药物是

- A. 西洋参
- B. 白术
- C. 黄芪
- D. 人参
- E. 甘草

68、山茱萸具有的功效是

- A. 补益肝肾，敛疮
- B. 收敛固涩，止咳
- C. 收敛固涩，止血
- D. 补益肝肾，润肺
- E. 补肾涩精，止泻

69、主治疥癣湿疹，虚寒冷哮，应选用的药物是

- A、雄黄
- B、芡实
- C、乌梅
- D、硫黄
- E、白矾

70、天王补心丹的辨证要点是指

- A、失眠，惊悸，舌红苔黄，脉细数
- B、失眠，心悸，手足心热，舌红少苔，脉细数
- C、虚烦失眠，咽干口渴，舌红，脉弦细
- D、精神恍惚，悲伤欲哭，舌红苔少，脉细

E、心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱

71、葛根芩连汤适应的病证是

- A、脾虚泄泻
- B、湿热血痢
- C、表证未解，邪热入里证
- D、热毒血痢
- E、暑湿吐泻

72、参苓白术散的功用是

- A、健脾益气，和中养胃
- B、健脾益气，渗湿止泻
- C、健脾益气，升阳举陷
- D、健脾养胃，理气化痰
- E、健脾助运，养胃渗湿

73、牡蛎散中功专收敛止汗的药物是

- A、煅牡蛎
- B、麻黄根
- C、生黄芪
- D、小麦
- E、白术

74、半夏泻心汤适用于

- A、脾胃虚弱，寒热错杂。症见脘腹痞胀，恶食懒倦，大便不畅者
- B、脾胃虚弱，寒热错杂。症见心下痞满，但满不痛，呕吐下利者
- C、脾胃虚弱，水热互结。症见心下硬满，干噎食臭，肠鸣下利者
- D、脾胃虚弱，痰浊内阻。症见心下痞硬，噎气不除，苔腻脉滑者

E、胃虚有热，和降失常。症见心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮

75、苏合香丸主治

- A、心绞痛属痰浊气滞血瘀者
- B、寒闭证
- C、暑秽
- D、热闭证
- E、痰热内闭心包证

76、以降逆化痰、益气和胃为主要功用的方剂是

- A、半夏厚朴汤
- B、半夏泻心汤
- C、丁香柿蒂汤
- D、旋覆代赭汤
- E、橘皮竹茹汤

77、生化汤重用全当归为君，意在

- A、养血补肝
- B、养血滋阴
- C、养血润肠
- D、化瘀生新
- E、和血止痛

78、以养阴透热为主要功用的方剂是

- A、清胃散
- B、犀角地黄汤
- C、竹叶石膏汤
- D、青蒿鳖甲汤
- E、清营汤

79、乌梅丸重用乌梅的作用是

- A、敛肺止咳

B、敛阴止汗

C、涩精止遗

D、固精缩尿

80、和解少阳的代表方剂是

A、四逆散

B、逍遥散

C、小柴胡汤

D、大柴胡汤

E、半夏泻心汤

81、导赤散主治心经有热之证，属于下列何种情况者为宜

A. 气火内郁，暗耗阴血，虚热上炎者

B. 气郁化火，心火内炽，循经上炎者

C. 气郁化火，炼液为痰，痰火内扰者

D. 心火上炎，或下移小肠，水虚火不实者

E. 心火亢盛，烦热谵语，口舌生疮，邪实而正不虚者

82、新加香薷饮的功用是

A. 祛暑解表，化湿和中

B. 祛暑解表，清热化湿

C. 清暑解热，化气利湿

E. 祛暑化湿，健脾和中

E. 祛暑化湿，健脾和中

83、具有补气生血功用的方剂是

A. 四君子汤

B. 参苓白术散

C. 当归补血汤

D. 补中益气汤

E. 生脉散

84、牡蛎散中功专收敛止汗的药物是

A、煅牡蛎

B、麻黄根

C、生黄芪

D、小麦

E、白术

85、下列哪项不属于安宫牛黄丸的辨证要点

A、高热烦躁

B、神昏谵语

C、斑疹吐衄

D、舌红或降

E、脉数

86、枳实薤白桂枝汤中，具有通阳散寒、降逆平冲作用的药物是

A. 枳实

B. 薤白

C. 桂枝

D. 厚朴

E. 瓜蒌

87、半夏厚朴汤的主治病证是

A. 肠风

B. 暗瘕

C. 脏毒

D. 脏躁

E. 梅核气

88、以宣降肺气、清热化痰为主要功用的方剂是

- A、泻白散
- B、桑杏汤
- C、定喘汤
- D、苇茎汤
- E、清气化痰丸

89、苏子降气汤中配伍肉桂的主要用意是

- A、温阳散寒
- B、温通经脉
- C、鼓舞气血
- D、温肾纳气
- E、散寒止痛

90、痰多胸闷，心烦，口苦，头重，目眩，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选方剂

- A. 导痰汤
- B. 六磨汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 二陈汤
- E. 胃苓汤

91、《温热论》中提到“营分受热”的情况，如从湿热陷入者，宜加下列哪组药物

- A、水牛角（代犀角）、竹叶
- B、羚羊角、竹叶
- C、赤芍、丹皮
- D、水牛角（代犀角）、银花露
- E、银花、连翘

92、小青龙汤证中“服汤已，渴者”

的机理是

- A、水饮未化不能上润
- B、津液大伤难以上润
- C、温解之余，上焦津液一时尚少
- D、余邪化热，灼伤津液
- E、温解过度，津液受损

93、《素问·经脉别论》所述“毛脉合精，行气于府”之“府”是指

- A、六腑
- B、神明之府
- C、经脉
- D、肝脉
- E、胸中之府

94、桂枝加龙骨牡蛎汤证的临床表现，下列哪项不是

- A、梦交
- B、少腹弦急
- C、头眩
- D、发落
- E、肠鸣

二、A2型选择题（91 ~ 102 题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

95、患者突起胃脘疼痛，呕吐清涎，面色苍白，舌苔白润，脉沉紧，其临床意义是

- A、表实寒证
- B、表实热证
- C、里实寒证
- D、里虚寒证
- E、里虚热证

96、患者消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔的临床意义是

- A、太阳病证
- B、阳明病证
- C、少阳病证
- D、少阴病证
- E、厥阴病证

97、患者消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蛔的临床意义是

- A、太阳病证
- B、阳明病证
- C、少阳病证
- D、少阴病证
- E、厥阴病证

98、患者舌短缩，色红绛而干的临床意义是

- A、寒凝筋脉
- B、气血俱虚
- C、痰湿内蕴
- D、热盛伤津
- E、动风先兆

99、患者，女，23岁。心烦失眠1个月。患者因最近与同事发生矛盾，心情烦躁，入夜难以入睡，自觉手足心

发热，口干欲饮，但所饮不多，舌红苔薄而干，脉细数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证
- C、心火上炎证
- D、肝火上炎证
- E、肝气郁结证

100、患者，女，17岁。因高考将至，过度紧张，而致心情烦躁，入夜难眠，口干多饮，舌红苔黄干，脉数的临床意义是

- A、心阴虚证
- B、肝阴虚证
- C、心血虚证
- D、心火亢盛证
- E、肝火上炎证

101、患者，女，53岁。腹中可扪及积块，软而不坚，固着不移，胀痛并见，脉弦。其证候是

- A. 肝气郁滞
- B. 瘀血内结
- C. 气滞血阻
- D. 气滞痰阻
- E. 气虚血瘀

102、患者，女，42岁。眩晕昏蒙，头重如裹，胸闷恶心，纳呆多寐，舌苔白腻，脉濡滑。其病机是

- A. 风湿
- B. 气虚

- C. 血虚
- D. 痰浊
- E. 肾虚

103、患者，男，50岁。咳嗽喘促，呼多吸少，动则益甚。声低息微，腰膝酸软，舌淡，脉沉细两尺无力。其病机是

- A. 肺气虚损
- B. 肺阴虚亏
- C. 肺肾气虚
- D. 肺肾阴虚
- E. 肾气虚衰

104、患者，女，26岁，已婚。胃脘痞满，不思饮食，频频泛恶。干呕，大便秘结，舌红少津，脉细弱。其病机是

- A. 脾阴不足
- B. 胃阴不足
- C. 胃燥津亏
- D. 胃热炽盛
- E. 肝胃不和

105、患者，女，47岁，眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，腰膝痠软，舌红，脉弦细数。此证候属

- A. 肝阳上亢
- B. 肝火上炎
- C. 肝阳化风
- D. 肝阴不足
- E. 肝气郁结

106、患者，男，67岁，心悸怔忡，神识朦胧，困倦易睡，急躁易怒。腰膝酸软，头重足轻，舌红，脉弦细，畏寒肢冷，肢面浮肿，下肢为甚，舌淡暗苔白滑，脉沉细微。其证候是

- A. 痰湿困脾
- B. 脾气虚弱
- C. 心肾阳衰
- D. 脾肾阳虚
- E. 以上均非

107、患者，男，35岁。2日来发热微恶寒，口苦，胁痛，尿短黄，大便黏臭，舌红苔薄白，脉数。其证候是

- A. 表里俱热
- B. 表寒里热
- C. 真寒假热
- D. 真热假寒
- E. 表热里寒

108、患者，女，58岁，久病，纳食减少，疲乏无力，腹胀腹痛而喜揉按，舌胖嫩而苔润，脉细弱而无力。其病机是

- A. 真虚假实
- B. 真实假虚
- C. 真实病证
- D. 真虚病证
- E. 虚中夹实证

109、患者，男，49岁。小便开始或末尾尿液混浊，色如米泔，伴有小便不

畅，舌质淡，苔薄黄，脉象弦滑。用药应首选的药物是

- A、木通
- B、茯苓
- C、萆薢
- D、车前子
- E、泽泻

110、者，男，42岁。胁肋胀痛，脘腹灼热疼痛，口苦，舌质红，脉弦数。

用药应首选的药物是

- A、木香
- B、香附
- C、乌药
- D、川楝子
- E、佛手

111、患者，男，41岁。午后呕吐2次，腹泻5次，经输液治疗后，夜间吐泻未作，天明前左腿抽筋2次，起床后仍感疼痛。用药应首选的药物是

- A、藿香
- B、佩兰
- C、木瓜
- D、石菖蒲
- E、苍术

112、患者，男，40岁。腰腿怕冷，痿软无力，伴有阳痿、早泄、尿频症状，舌淡苔白，脉沉迟少力。用药应首选的药物是

- A、干姜

- B、细辛
- C、肉桂
- D、吴茱萸
- E、小茴香

113、患者，男，33岁，身热多汗，心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮，舌红少苔，脉虚数。治疗应首选

- A. 导赤散
- B. 凉膈散
- C. 生脉散
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清暑益气汤

114、患者，女，58岁，恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

115、患者，女，37岁，症见眩晕，头痛，胸膈痞满，恶心呕吐，舌苔白腻，脉弦滑者，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

116、患者，女，33岁，恶寒发热，头

痛，胸膈满闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，善泄泻，舌苔白腻，应选用的治则是：

- A. 燥湿运脾，行气和胃
- B. 解表化湿，理气和中
- C. 清热，利湿，退黄
- D. 清热泻火，利水通淋
- E. 宣畅气机，清利湿热

117、患者，女，28岁，胆怯易惊，虚烦不宁，失眠多梦，或呕恶呃逆，或眩晕，或癫痫等，苔腻微黄，脉弦滑，治宜选用

- A. 温胆汤
- B. 清气化痰丸
- C. 茯苓丸
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 小陷胸汤

118、患者，男，15岁，食少难消，脘腹痞满，大便溏薄，倦怠乏力，苔腻微黄，脉虚弱治宜选用

- A. 健脾丸
- B. 保和丸
- C. 四逆散
- D. 痛泻要方
- E. 葛根黄芩黄连汤

119、患者外感风寒湿邪，症见恶寒发热头痛，肌表无汗，肢体酸楚疼痛，口苦而渴者，治宜选用

- A. 参苏饮
- B. 败毒散

- C. 桂枝汤
- D. 小青龙汤
- E. 九味羌活汤

120、患者，女，31岁，两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚者。治宜选用

- A. 四逆散
- B. 柴胡疏肝散
- C. 逍遥散
- D. 一贯煎
- E. 痛泻要方

121、患者，女，42岁，咳嗽痰稠带血，咯吐不爽，心烦易怒，胸胁作痛，咽干口苦，赤便秘，舌红苔黄，脉弦数。

- A. 十灰散
- B. 黄土汤
- C. 止嗽散
- D. 咳血方
- E. 小蓟饮子

122、患者，女，37岁，带下色白，清稀如涕，面色㿔白，倦怠便溏，舌淡苔白，脉缓或濡弱。

- A. 逍遥散
- B. 完带汤
- C. 易黄汤
- D. 桑螵蛸散
- E. 参苓白术散

三、B1型选择题（123～150题）

答题说明： 以下提供若干组考题，每

组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A、上出息道，下走气街
- B、熏于肓膜，散于胸腹
- C、通过三焦，流行全身
- D、上荣头目，达于周身
- E、与血同行，环周不休

123、宗气的分布是

124、卫气的分布是

- A、胆
- B、胃
- C、小肠
- D、大肠
- E、膀胱

125、具有“主津”功能的脏是

126、具有“主液”功能的脏是

- A、大汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，神情淡漠，呼吸微弱，脉微欲绝
- B、形体消瘦，五心烦热，颧红盗汗，口燥咽干，皮肤干燥，脉象细数
- C、身热大汗，汗热质黏，面色潮红，躁扰不安，渴喜冷饮，脉细数疾
- D、高热肢厥，神识昏沉，胸腹灼热，口渴喜饮，面色紫暗，脉沉有力
- E、经常畏冷，四肢不温，渴喜热饮，

常自汗出，尿清便溏，脉迟无力

127、真热假寒证的临床表现是

128、亡阳证的临床表现是

A、发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数

B、发热，神昏谵语，斑疹紫暗，出血动风，舌质深绛

C、身热夜甚，心烦，舌红绛，脉细数

D、壮热，汗出，口渴，脉洪大

E、发热，汗出，口渴，舌红苔黄，脉数

129、血分证的辨证要点是

130、营分证的辨证要点是

- A、气陷证
- B、气虚证
- C、气不固证
- D、气脱证
- E、血脱证

131、年高体弱，小便淋漓不尽，夜尿多，神疲，气短，动则汗出，脉弦缓的临床意义是

132、外伤后腹痛，出冷汗，面色苍白，脉微的临床意义是

- A、胸胁闷胀窜痛，肋下痞块，刺痛拒按，妇女闭经，舌紫暗或紫斑，脉涩
- B、面色晦暗，身倦乏力，刺痛拒按不移，舌淡暗或有瘀斑，脉沉涩
- C、头昏目眩，少气懒言，乏力自汗，面色萎黄，心悸失眠，舌淡嫩，脉细

弱

D、面色无华，倦怠乏力，崩漏，舌淡脉细弱

E、面色苍白，四肢乏力

133、气滞血瘀的临床表现是

134、气血两虚的临床表现是

A、泻下力强

B、泻下力缓

C、偏于活血

D、清上焦火热

E、善止血

135、生大黄的作用特点是

136、大黄炭的作用特点是

A、木通

B、金钱草

C、石韦

D、地肤子

E、海金沙

137、具有利尿通淋、止咳功效的药物是

138、具有清热利湿、止痒功效的药物是

A、利尿渗湿，除痹

B、利尿通淋，通乳

C、利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿

D、利尿渗湿，健脾，止咳

E、利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰

139、车前子的功效是

140、金钱草的功效是

A、青蒿鳖甲汤

B、茵陈蒿汤

C、半夏泻心汤

D、四逆散

E、蒿芩清胆汤

141、清胆利湿，和胃化痰的方剂是

142、寒热平调，消痞散结的方剂是

A、止嗽散

B、泻白散

C、清气化痰丸

D、苏子降气汤

E、贝母瓜蒌散

143、热痰咳嗽。症见胸膈痞闷，气急呕恶，咯痰不爽，苔黄而腻者，治宜选用

144、燥痰咳嗽。症见呛咳气急，咯痰不爽，咽喉干燥，苔白而干者，治宜选用

A、解表化湿，理气和中

B、理气化湿，和中止呕

C、祛湿化浊，和中止泻

D、解暑化湿，和中止泻

E、祛暑解表，清热化湿

145、新加香薷饮的功用是

146、藿香正气散的功用是

A、宣白承气汤

B、牛黄承气汤

C、增液承气汤

D、导赤承气汤

E、新加黄龙汤

147、“阳明温病，下之不通”，若因“应下失下，正虚不能运药”者，宜选用

148、“阳明温病，下之不通”，若因兼肺气不降，而见“喘促不宁，痰涎壅滞，右寸实大”者，宜选用

A、理中汤

B、四逆汤

C、桂枝人参汤

D、干姜黄芩黄连人参汤

E、白头翁汤

149、太阴病，见腹满而吐，腹痛，食不下，自利益甚者，宜选用

150、少阴病，见脉微细，但欲寐，恶寒蜷卧，下利清谷者，选用

C. 霍奇金病

D. 败血症

E. 风湿热

3、慢性进行性头痛伴呕吐、视神经盘

水肿提示

A. 脑血栓形成

B. 颅骨骨折

C. 偏头痛

D. 颅内占位性病变

E. 三叉神经痛

4、按压形成后的皮肤凹陷在按压结束后很快恢复见于

A. 心源性水肿

B. 肾源性水肿

C. 肝源性水肿

D. 营养不良性水肿

E. 内分泌源性水肿

5、下列除哪项外，均可引起中枢性呕吐

A. 耳源性眩晕

B. 洋地黄中毒

C. 尿毒症

D. 胆囊炎

E. 妊娠反应

6、下列除哪项外均属于现病史的内容

A. 起病情况

B. 主要症状及伴随症状

C. 诊疗经过

D. 病程中的一般情况

第二单元

1、支气管哮喘可出现的呼吸困难是

A. 混合性呼吸困难

B. 心源性呼吸困难

C. 吸气性呼吸困难

D. 呼气性呼吸困难

E. 中毒性呼吸困难

2、引起稽留热的常见疾病是

A. 肺炎球菌肺炎

B. 肺结核

E. 家族成员患同样疾病的情况

7、适用于大量腹水而肝、脾难以触及时的触诊方法是

- A. 浅部触诊法
- B. 深部滑行触诊法
- C. 双手触诊法
- D. 深压触诊法
- E. 冲击触诊法

8、下列疾病中除哪项外均可见脉压增大

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 动脉导管未闭
- D. 严重贫血
- E. 老年动脉硬化

9、落日征可见于

- A. 小头畸形
- B. 维生素 D 缺乏佝偻病
- C. 脑膜炎
- D. 脑积水
- E. 颅内出血

10、正常支气管呼吸音的最明显听诊部位在

- A. 喉部
- B. 肩胛下部
- C. 胸骨角附近
- D. 右肺尖
- E. 肩胛上部

11、蛛网膜下隙出血的特征是

- A. 昏迷
- B. 脑膜刺激征阴性
- C. 血性脑脊液
- D. “三偏”征
- E. 失语

12、血白细胞总数增多，可见于

- A. 伤寒杆菌感染
- B. 再生障碍性贫血
- C. 急性失血
- D. 使用氯霉素的影响
- E. 脾功能亢进

13、诊断心绞痛最常用的方法是

- A. 超声检查
- B. 心电图
- C. 血清淀粉酶检查
- D. 冠状动脉造影
- E. 放射性核素检查

14、下列关于胸肺部 X 线检查临床应用的叙述，错误的是

- A. 诊断呼吸系统疾病
- B. 检测呼吸功能
- C. 防癌
- D. 防痨
- E. 防职业病

15、X 线钡餐检查显示“皮革胃”，多见于

- A. 浅表性胃炎
- B. 萎缩性胃炎
- C. 浸润型胃癌

D. 溃疡型胃癌

E. 肿块型胃癌

16、肺炎球菌肺炎的痰液特征是

A. 粉红色泡沫样痰

B. 鲜红色痰

C. 棕褐色痰

D. 铁锈色痰

E. 灰黄色痰

17、下列除哪项外，均可引起阻塞性黄疸

A. 疟疾

B. 胆管癌

C. 肝癌

D. 胆道蛔虫症

E. 总胆管结石

18、成人血清钠的正常值是

A. 110~120mmol/L

B. 121~130mmol/L

C. 135~145mmol/L

D. 150~155mmol/L

E. 156~160mmol/L

19、下列关于血尿素氮的改变及临床意义的叙述。正确的是

A. 上消化道出血时，血尿素氮减少

B. 大面积烧伤时，血尿素氮减少

C. 严重的肾盂肾炎，血尿素氮减少

D. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性差

E. 血尿素氮对早期肾功能损害的敏感性
性强

20、对二尖瓣狭窄程度的判定最有价值的检查是

A. 听诊

B. 胸部 X 线摄影

C. T 扫描

D. 胸部

E. 二维超声心动图检查

21、以下关于选择性叙述错误的是

A、选择性是药物分类和临床选药的依据

B、选择性低的药物作用范围广

C、选择性低的药物不良反应多见

D、剂量增大，选择性提高

E、药物作用的选择性是相对的

22、强心苷治疗慢性心功能不全的最基本作用是

A、使已扩大的心室容积缩小

B、增加心肌收缩力

C、增加心室工作效率

D、降低心率

E、增加心率

23、治疗有机磷农药中毒毒蕈碱样症状的药物是

A、阿托品

B、氯磷定

C、利多卡因

D、甲硝唑(灭滴灵)

E、双复磷

24、阿托品禁用于

A. 膀胱刺激征

B. 中毒性休克

C. 青光眼

D. 房室传导阻滞

E. 麻醉前给药

25、关于 β 受体阻滞药的禁忌证，错误的是

A、严重心功能不全

B、支气管哮喘

C、高血压

D、重度房室传导阻滞

E、窦性心动过缓

26、下列哪项为痛风患者慎用的药物

A. 阿司匹林

B. 扑热息痛

C. 氢氯噻嗪

D. 布洛芬

E. 吲哚美辛

27、关于丙戊酸钠，下列叙述哪项不正确

A. 为广谱抗癫痫药

B. 其抗癫痫作用与 GABA 有关

C. 对小发作优于乙琥胺，为治疗小发作的首选药物

D. 对大发作疗效不及苯妥英钠

E. 对精神运动性发作疗效近似卡马西平

28、下列哪种原因所致的呕吐，用氯丙嗪治疗无效

A. 尿毒症

B. 癌症

C. 放射病

D. 药物中毒

E. 晕动病

29、治疗肝性脑病的抗震颤麻痹药是

A. 左旋多巴

B. 苯海索

C. 苯扎托品

D. 金刚烷胺

E. 司来吉兰

30、镇痛效力为吗啡的 100 倍的是

A. 哌替啶

B. 喷他佐辛

C. 美沙酮

D. 芬太尼

E. 可待因

31、下列关于对乙酰氨基酚的叙述，错误的是

A、镇痛作用较强

B、解热作用较强

C、抗炎作用与阿司匹林相近

D、用于神经痛、关节痛、肌肉痛

E、用于感冒发热

32、 H_2 受体阻滞药物的应用是

A、晕动病呕吐

B、胃十二指肠溃疡

- C、皮肤瘙痒和水肿
- D、支气管哮喘
- E、过敏性鼻炎

33、痛风患者应慎用的药物是

- A. 甘露醇
- B. 丙磺舒
- C. 氯沙坦
- D. 卡托普利
- E. 氢氯噻嗪

34、禁用于消化性胃溃疡患者的降压药是

- A、可乐定
- B、卡托普利
- C、硝普钠
- D、利血平
- E、硝苯地平

35、普萘洛尔抗心律失常的主要作用是

- A. 治疗量的膜稳定作用
- B. 扩张血管，减轻心脏负荷
- C. 消除精神紧张
- D. 加快心率和传导
- E. 阻断心脏的 β 受体，降低自律性，减慢心率

36、强心苷中毒的特征反应是

- A、胃肠道反应
- B、视觉障碍（黄视、绿视及视物模糊）
- C、室性早搏
- D、室性心动过速

E、房室传导阻滞

37、普萘洛尔、硝酸甘油、硝苯地平治疗心绞痛的共同作用是

- A. 减慢心率
- B. 缩小心室容积
- C. 扩张冠脉
- D. 降低心肌氧耗量
- E. 抑制心肌收缩力

38、小剂量阿司匹林预防血栓形成的机制是

- A. 抑制单胺氧化酶
- B. 抑制 TXA₂ 生成
- C. 抑制胆碱酯酶
- D. 激动多巴胺受体
- E. 阻断多巴胺受体

39、治疗消化性溃疡的药物中，能引起轻微的腹泻的药物

- A. 碳酸钙
- B. 三硅酸镁
- C. 奥美拉唑
- D. 胶体果胶铋
- E. 氢氧化镁

40、抢救新生儿窒息和一氧化碳中毒的首选呼吸兴奋药是

- A. 咖啡因
- B. 尼可刹米
- C. 回苏灵
- D. 山梗菜碱
- E. 土的宁

41、病原体进入人体后，是否引起疾病，主要取决于

- A. 病原体的数量
- B. 病原体的毒力
- C. 病原体的致病能力和抗体的免疫功能
- D. 病原体的侵袭力
- E. 机体的抵抗能力

42、转为慢性肝炎比例最高的是

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 丁型肝炎病毒
- E. 戊型肝炎病毒

43、高热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，颈项强直，最可能的诊断是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 伤寒
- E. 中毒性细菌性痢疾

44、下列有关消毒的叙述，错误的是

- A. 是切断传播途径，防止传染发生的重要措施
- B. 可保护医护人员免受感染
- C. 可防止患者再被其他病原体感染
- D. 即使有了强有力的消毒措施，医护人员也必须采取防护措施
- E. 对不同的传染病消毒效果相似

45、关于乙脑的表现说法错误的是

- A. 起病急骤
- B. 头痛是最早出现的症状
- C. 神志不清可于病程第 2 天出现
- D. 呼吸衰竭以中枢性为主
- E. 病程 2 周后才出现肢体瘫痪

46、在感染过程中，最常见的表现形式是

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

47、下列关于布鲁菌病临床特征的描述，正确的是

- A. 发热并伴有寒战
- B. 血压升高
- C. 关节、肌肉疼痛
- D. 乏力，多汗，多疲劳不堪
- E. 眼结膜水肿

48、下列有关标准预防的叙述，错误的是

- A. 要防止血源性 & 非血源性疾病的传播
- B. 强调双向防护
- C. 所有的患者均被视为具有潜在感染者
- D. 要根据疾病的主要传播途径，采取相应的隔离措施

E、脱去手套后可以不洗手

49、AIDS 患者肺部继发感染的常见病原体是

A、肺炎球菌

B、葡萄球菌

C、链球菌

D、军团菌

E、肺孢子菌

50、下列各项，可致人群对某种传染病易感性增高的是

A、该传染病流行过后

B、人群中一般抵抗力的提高

C、人群中自动免疫的推广

D、病原体的变异

E、抗生素的广泛应用

51、普通型流脑的临床表现是

A、低热、头痛、瘀点

B、高热、循环衰竭、大片瘀斑

C、高热、瘀斑、昏迷、呼吸衰竭

D、高热、头痛、瘀斑、脑膜刺激征

E、间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养可阳性

52、下列各项，属随时消毒的是

A、患者转科前的沐浴

B、传染病死亡患者的尸体处理

C、传染病室日常紫外线照射

D、SARS 患者出院后对其原办公室的消毒

E、传染病患者转院后病室的消毒

53、下列哪个部位是手阳明大肠经和足阳明胃经的交接处

A. 眶下孔凹陷处

B. 下眼眶缘

C. 鼻翼旁

D. 颧骨旁

E. 口角旁

54、下列哪个体位最适宜同时取头、面、胸、腹部腧穴

A. 俯伏坐位

B. 俯卧位

C. 侧卧位

D. 仰卧位

E. 侧伏坐位

55、在八脉交会穴中，通督脉的是

A. 足临泣

B. 公孙

C. 后溪

D. 照海

E. 列缺

56、奇经八脉与十二经脉之气相交会的八个腧穴称为

A. 原穴

B. 郄穴

C. 八会穴

D. 下合穴

E. 八脉交会穴

57、骨度分寸规定，髌枢至膝中的距离是

- A. 13 寸
- B. 14 寸
- C. 16 寸
- D. 18 寸
- E. 19 寸

58、手三里穴位于阳溪穴与曲池穴连线上，曲池穴下

- A. 5 寸
- B. 4 寸
- C. 3 寸
- D. 2 寸
- E. 1 寸

59、在胸部，距前正中线 4 寸循行的经脉是

- A、足少阴肾经
- B、足阳明胃经
- C、手太阴肺经
- D、足太阴脾经
- E、手厥阴心包经

60、下列哪项不属足太阴经的主治范围

- A. 妇科病
- B. 口舌病
- C. 前阴病
- D. 肾脏病
- E. 脾胃病

61、阴郄穴位于尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕掌侧远端横纹上

- A. 0.5 寸

- B、1 寸
- C、1.5 寸
- D、2 寸
- E、2.5 寸

62、下列穴位中有纠正胎位作用的是

- A. 隐白
- B. 中渚
- C. 至阴
- D. 涌泉
- E. 合谷

63、下列腧穴中，治疗汗证首选的是

- A、复溜
- B、然谷
- C、太溪
- D、阴谷
- E、大钟

64、在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中的腧穴是

- A、少海
- B、小海
- C、曲泽
- D、曲池
- E、尺泽

65、足少阳胆经悬钟穴位于

- A. 外踝下缘中点上 3 寸，腓骨后缘
- B. 外踝前缘中点上 3 寸，腓骨后缘
- C. 外踝后缘中点上 3 寸，腓骨后缘
- D. 外踝高点上 3 寸，腓骨后缘
- E. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘

66、叶天士《温热论》中提到，温病辨卫气营血虽与伤寒同，但哪项与伤寒大异

- A、治则
- B、治法
- C、治方
- D、治药
- E、治气血

67、以下哪项不是湿伏中焦的临床表现

- A、发热
- B、胸痞
- C、口渴
- D、无汗
- E、舌白

68、麻黄汤证“无汗而喘”的机理是

- A、风寒束表，腠理闭塞，肺气不宣
- B、外寒内饮，壅塞于肺，肺失清肃
- C、风寒束表，卫强营弱，肺气上逆
- D、素有喘疾，外感风寒，引动素疾
- E、风寒束表，久郁化热，肺气上逆

69、据《素问·阴阳应象大论》的内容，“壮火”能够

- A、散气
- B、生气
- C、耗津
- D、耗血
- E、耗精

70、《素问·至真要大论》认为“皆属

于心”的病证为

- A、诸热瞀瘵
- B、诸痛痒疮
- C、诸躁狂越
- D、诸禁鼓栗，如丧神守
- E、诸厥固泄

71、四肢才觉重滞，以下治疗方法哪项欠妥当

- A、导引
- B、服药
- C、吐纳
- D、针灸
- E、膏摩

72、正确处理医务人员之间关系的道德原则，不包括

- A、互相尊重
- B、互相支持
- C、互相爱护
- D、互相监督
- E、互相学习

73、现代医学模式强调哪三个因素

- A. 生理、心理、自然
- B. 自然、人体、社会
- C. 生物、心理、社会
- D. 生理、心理、社会
- E. 人体、人际关系、生存环境

74、医学人道主义的核心内容是

- A. 仁爱、严谨、公正
- B. 公正对待服务对象

C. 尊重患者的生命、人格和权利

D. 善待生命，体贴患者

E. 救死扶伤，忠于医业

75、对不伤害原则的解释，正确的是

A. 不伤害原则就是消除任何医疗伤害

B. 不伤害原则就是要求医生对患者丝毫不能伤害

C. 因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害，所以不伤害原则是做不到的

D. 不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡，把可控伤害控制在最低限度之内

E. 对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害

76、能体现医生特殊干涉权的是

A. 医生对自杀的病人予以制止

B. 医生的行为以保护病人利益、促进病人健康、增进其幸福为目的

C. 医生要保护病人的隐私

D. 医生的行为要遵循医德规范的要求

E. 医生在紧急灾难(如传染病流行)面前要服从卫生部门调遣

77、人体实验是

A. 以病人作为受试对象的试验

B. 以人作为受试对象的试验

C. 人体实验时必须要做到真正的知情同意

D. 选择受试者的时候需遵循的保障受试者身心安全

E. 维护受试者的身心健康与安全

78、我国卫生法基本原则不包括的内容是

A. 保护公民身体健康

B. 患者有权自主选择医疗机构

C. 预防为主

D. 兼顾经济与社会效益

E. 卫生工作社会化

79、医师甲经执业医师注册，在某医疗机构执业。1年后，该医师受聘到另一医疗机构执业。其改变执业地点的行为

A. 医疗机构允许即可

B. 应到准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续

C. 无须经过准予注册的卫生行政部门办理变更注册手续

D. 任何组织和个人无权干涉

E. 只要其医术高明，就不受限制

80、除特殊需要外，第一类精神药品的处方，每次不得超过多少日的常用量

A. 1 日

B. 3 日

C. 5 日

D. 7 日

E. 14 日

81、国家实行预防接种证制度的对象是

- A、儿童
- B、在校学生
- C、未成年人
- D、成年人
- E、全体社会公民

82、突发公共卫生事件严重危害

- A、公众权益
- B、社会公众利益
- C、经济秩序
- D、社会秩序
- E、社会公众健康

83、医疗机构施行特殊治疗，无法取得患者意见又无家属或者关系人在场，或者遇到其他特殊情况时经治医师应当提出医疗处置方案，在取得

- A. 病房负责人同意后实施
- B. 科室负责人同意后实施
- C. 医疗机构质监部门负责人批准后实施
- D. 医疗机构负责人或者被授权负责人员批准后实施
- E. 科室全体医师讨论通过后实施

二、A2 题型

84、患者呼吸急促，查体：气管向左偏移。右侧胸廓饱满，叩诊出现实音。

应首先考虑的是

- A. 右侧胸腔积液

- B. 右侧气胸

- C. 肺气肿
- D. 右侧大叶性肺炎
- E. 右侧肺不张

85、患者，女，20 岁。突然发作上腹痛，按压后疼痛程度减轻。应首先考

虑的是

- A. 胃溃疡
- B. 胃痉挛
- C. 胃炎
- D. 急性胃扩张
- E. 胃穿孔

86、患者，女，32 岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐，呕后腹痛反而加重，服解痉剂无效。检查：体温 39℃。心率 120 次/分，腹部紧张，有压痛，反跳痛，血清淀粉酶 400U，血钙

1.63mmol/L。应首先考虑的是

- A. 急性心肌梗死
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 急性肠梗阻

87、患者饱餐后上腹部持续疼痛 1 天。

查体：上腹部压痛、反跳痛。应首先

考虑的是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性肝炎

D. 右肾结石

E. 肝癌

88、患者，男，58岁。胸痛患者，诊断为右侧胸膜炎而住院治疗，药物治疗1天胸痛消失，气促加重。该患者最大可能为

A. 炎症缓解

B. 胸水增多

C. 胸水减少

D. 入院后焦虑心情减轻

E. 采用了患侧卧位

89、男性，40岁。10年前曾行阑尾切除术。2天来频繁呕吐、腹痛，无排便排气。你认为查体时不出现下列哪一项

A. 全腹膨隆

B. 腹壁静脉曲张

C. 肠鸣音为气过水声

D. 有轻压痛

E. 叩诊呈高度鼓音

90、男性，24岁。腹部被倒墙压伤，中腹部剧痛伴呕吐3小时。血压

120/86mmHg，体温38℃，腹胀、肌紧张、压痛、反跳痛阳性，肠鸣音消失。

最可能的诊断是

A. 腹壁挫伤

B. 腹膜后血肿

C. 肝破裂

D. 小肠破裂

E. 右肾挫伤

91、男，45岁。双眼睑下垂6~7天，渐加重，近一两天四肢或活动无力，晨起轻，下午重，休息后减轻，活动后加重。诊断：重症肌无力。对该病人最好用哪种药物治疗

A. 毛果芸香碱

B. 毒扁豆碱

C. 新斯的明

D. 阿托品

E. 加兰他敏

92、关于阿托品常见的不良反应，错误的是

A. 皮肤苍白、体温升高

B. 便秘

C. 口干

D. 视力模糊

E. 心悸、眩晕

93、关于抗高血压药物的合理应用，错误的是

A. II级高血压可采用一线降压药的任何两类联用

B. III级高血压在联合用药基础上可加用直接血管扩张药

C. 高血压危象宜采用静脉滴注或肌注快速起效

D. 同类药物联合用药

E. 联合用药可从不同环节协同降压

94、大剂量可用于抗凝血类灭鼠药中毒的解救的药物是

- A、维生素 K3
- B、双香豆素
- C、维生素 K1
- D、醋硝香豆素
- E、维生素 B12

95、抗消化性溃疡药的分类与代表药的正确搭配是

- A、抗酸药——替硝唑
- B、黏膜保护药——胶体果胶铋
- C、H₂受体阻断药——奥美拉唑
- D、质子泵抑制药——胃舒平
- E、抗幽门螺杆菌药——西咪替丁

96、小剂量糖皮质激素替代疗法的临床应用是

- A、肾上腺皮质癌
- B、肾病综合征
- C、肾上腺嗜铬细胞瘤
- D、垂体肿瘤
- E、垂体前叶功能减退

97、患儿，3岁，尚热、头痛、呕吐，全身皮肤散在瘀点，脑膜刺激征阳性，烦躁不安。实验室检查：血白细胞升高，脑脊液呈化脓性改变。最可能的诊断是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 流行性乙型脑炎

D. 伤寒

E. 中毒性细菌性痢疾

98、35岁女性。因剧烈的呕吐和腹泻水样物1天入院，查BP 80/60mmHg，P 100次/分，腹部无压痛。心肺正常。首先需要处置的是

- A、做血、便常规检查，以明确诊断
- B、应用血管收缩剂
- C、抗生素应用
- D、补充液体
- E、以上都不可以

99、5岁女童，因发热头痛3天，昏迷半天，于2013年9月3日入院。体查：体温40℃，浅昏迷，颈软，双侧瞳孔缩小，有时不等大，膝反射活跃，巴氏征阳性，血象WBC $15.0 \times 10^9/L$ ，N 0.75，L 0.25，脑脊液无色透明，WBC $120 \times 10^9/L$ ，N 0.80，L 0.20，糖2.5mmol/L，氯化物119mmol/L，蛋白定量0.5g/L，可能的诊断为

- A、流行性脑脊髓膜炎
- B、结核性脑膜炎
- C、化脓性脑膜炎
- D、流行性乙型脑炎
- E、脑型疟疾

100、女，32岁，2天前入院被确诊为肾病综合征出血热，现热退但症状加重，出血点增加，四肢厥冷，脉搏细弱，BP70/50mmHg，现最佳治疗原则是

- A、以补充血容量为主
- B、以应用血管活性药物为主
- C、以应用激素为主
- D、以纠正酸中毒为主
- E、以输入胶体液为主

101、患儿，4岁，近日常感无力，精神萎靡，食欲不佳，并诉右上腹隐痛。检查：面色黄，肝于肋缘下3cm可触及，有压痛。实验室检查：尿胆红素(+)，尿胆原(+)。应首先考虑的是

- A. 蚕豆病
- B. 胃炎
- C. 胆道蛔虫症
- D. 急性病毒性肝炎
- E. 胆结石

102、患者，男，45岁。自觉心慌，时息时作，健忘失眠。治疗应首选

- A. 三阴交
- B. 神门
- C. 足三里
- D. 太溪
- E. 合谷

103、患者，老年男性。无明显诱因突然昏仆，不省人事，半身不遂，目合口张，鼻鼾息微，遗尿，汗出，四肢厥冷，脉细弱。治疗应首选

- A. 背俞穴，灸法
- B. 足阳明经穴，灸法
- C. 足厥阴经穴，针刺用泻法

- D. 任脉经穴，灸法
- E. 督脉经穴，灸法

104、某男，因恼怒后两胁胀痛，胸闷不舒，呕恶不欲食，口苦，舌红，脉弦滑。针灸取穴为

- A. 期门、阳陵泉、太冲、足三里
- B. 支沟、阳陵泉、期门、丘墟
- C. 期门、阳陵泉、膈俞、三阴交
- D. 肝俞、肾俞、期门、三阴交
- E. 大包、阳陵泉、三阴交、足三里

105、患者因气候突变，感受风寒之邪而发前额头痛，其痛阵作，如锥如刺，无其他兼症。针灸治疗时宜选用

- A. 百会、通天、行间、阿是穴
- B. 上星、头维、合谷、阿是穴
- C. 率谷、太阳、侠溪、阿是穴
- D. 后顶、天柱、昆仑、阿是穴
- E. 风池、悬颅、侠溪、行间

106、患者男性青年，感冒后遗留咽喉肿痛，查体见咽喉红肿，兼口渴咽干，便秘，舌红苔黄。针灸治疗宜选

- A. 太溪、照海、鱼际
- B. 大椎、风门、列缺
- C. 鱼际、太渊、曲池
- D. 内关、廉泉、天突

E. 少商、合谷、尺泽、陷谷、关冲

107 患者，女，31岁。崩漏下血量多，色暗红，质稠，夹有血块，腹痛拒按，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选

- A. 阴陵泉
- B. 中极
- C. 三阴交
- D. 太冲
- E. 隐白

108、患者，女，63岁。牙痛隐隐，时作时止，伴有牙齿松动，舌红少苔，脉细数。治疗除主穴外，还应选取的

配穴是

- A. 阳溪、列缺
- B. 气海、足三里
- C. 内庭、二间
- D. 太溪、行间
- E. 外关、风池

109、患者突然心前区刺痛，心痛彻背，心慌汗出，面色晦暗，唇甲青紫，舌有瘀斑，脉涩。针灸取穴是内关、郄门、阴郄、膻中以及

- A. 神阙、关元
- B. 血海、太冲
- C. 中脘、丰隆
- D. 心俞、至阳
- E. 心俞、脾俞

110、患者右上腹痛，阵发性加剧，并向右肩部放射，伴有恶心、呕吐，黄疸，舌苔黄腻，脉滑数，针灸取穴除阳陵泉、胆囊、胆俞、日月外，应对证加用

- A. 内庭、阴陵泉

- B. 太冲、丘墟
- C. 肩井、内关
- D. 中脘、天枢
- E. 梁丘、太冲

三、B型题

- A. 瘧病
- B. 破伤风
- C. 脑血管疾病
- D. 中毒性痢疾
- E. 脑膜炎

111、抽搐伴高血压，肢体瘫痪，见于

112、抽搐伴苦笑面容，见于

- A. 面色晦暗，双颊紫红，口唇发绀
- B. 表情淡漠，反应迟钝，呈无欲状态
- C. 眼裂增大，眼球突出，目光闪烁，呈惊恐貌

D. 面色苍白，颜面水肿

E. 面色潮红，兴奋不安，口唇干燥

113、典型二尖瓣面容的特点是

114、典型伤寒面容的特点是

- A. 红细胞管型
- B. 白细胞管型
- C. 上皮细胞管型
- D. 透明管型
- E. 蜡样管型

115、正常人尿中可以偶见的管型是

116、主要见于肾盂肾炎的管型是

- A. P波
- B. QRS波群

C. S-T 段

D. T 波

E. Q-T 间期

117、代表心室除极和复极总时间的是

118、代表心房除极波形的是

A、氨茶碱

B、沙丁胺醇

C、哌仑西平

D、色甘酸钠

E、二丙酸倍氯米松

119、抢救哮喘持续状态宜选用

120、伴有心脏功能不全的哮喘急性发作患者，宜选用

A、阿司匹林

B、布洛芬

C、塞来昔布

D、保泰松

E、对乙酰氨基酚

121、主要用于解热镇痛，抗炎作用较弱的药物是

122、选择性抑制 COX-2，主要用于类风湿关节炎、骨关节炎的药物是

A、乙琥胺

B、苯妥英钠

C、硝西洋

D、地西洋

E、丙戊酸钠

123、治疗癫痫小发作的首选药是

124、治疗癫痫持续状态的首选药是

A、异烟肼

B、链霉素

C、阿米卡星

D、利福平

E、庆大霉素

125、对结核杆菌和麻风杆菌作用强的药物是

126、对结核杆菌有高度选择性的药物是

A、老年人

B、婴幼儿

C、发热患者

D、免疫力低下者

E、合并慢性基础病患者

127、不属流感高危人群的是

128、不属流感疫苗接种对象的是

A、高热持续，24 小时内体温波动不超过 1℃

B、24 小时内体温波动超过 2℃，但最低未达正常水平

C、24 小时内体温波动于高热与正常体温之间

D、高热骤起、持续数日后骤退，间歇无热数日，高热重复出现

E、发热患者体温曲线无规律

129、弛张热

130、稽留热

A、太溪、肾俞

B、阴陵泉、外关

- C、太冲、血海
- D、气海、脾俞
- E、关元、归来

131、针灸治疗气血虚弱痛经，宜加用

132、针灸治疗肾气亏损痛经，宜加用

- A、太冲、太溪
- B、太溪、悬钟
- C、中脘、丰隆
- D、血海、膈俞
- E、脾俞、足三里

133、治疗痰浊头痛，除主穴外应配合

134、治疗血虚头痛，除主穴外应配合

- A、毫针补法
- B、毫针泻法
- C、毫针平补平泻法
- D、温和灸
- E、点刺出血

135、治疗失眠取照海穴，宜用

136、治疗失眠取申脉穴，宜用

- A、风门、肺俞
- B、曲池、内关
- C、天枢、足三里
- D、脾俞、足三里
- E、大椎、风门

137、治疗风热犯表型瘾疹，应加用

138、治疗风寒束表型瘾疹，应加用

- A、汗出肤冷，倦卧不语，脉虚和缓
- B、肤冷汗出，躁扰不卧，脉弦而数
- C、肤冷汗出，躁扰不卧，脉象急数

D、肤冷汗出，躁扰不卧，脉虚而缓

E、汗出肤冷，倦卧不语，脉象细数

139、战汗后邪退气虚正安的主要表现为

140、战汗后气脱的主要表现为

- A、桂枝汤
- B、桂枝加葛根汤
- C、葛根汤
- D、麻黄汤
- E、小青龙汤

141、太阳病，项背强几几，无汗恶风，治疗宜用

142、太阳病，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，无汗而喘，脉浮紧，治疗宜用

- A、医患双方不是双向作用，而是医生对患者单向发生作用
- B、医患双方在医疗活动中都是主动的，医生有权威性，充当指导者
- C、医生和患者具有近似同等的权利
- D、长期慢性病患者已具有一定医学知识水平
- E、急性病患者或虽病情较重但他们头脑是清醒的

143、指导-合作型的特点是

144、主动-被动型的特点是

- A、维护病人利益原则
- B、知情同意原则
- C、伦理审查与科学审查统一原则

D、科学对照原则

E、医学目的原则

145、受试者利益第一，医学利益第二，体现的是

146、为了提高医疗水平，改进预防和治疗措施，体现的是

A、在诊疗活动中应当向患者说明病情和医疗措施

B、互相尊重，维护自身权益，应当遵守有关法律、法规的规定

C、对其医务人员进行医疗卫生法律、法规、规章和诊疗相关规范、常规的培训，并加强职业道德教育

D、遵守医疗秩序和医疗机构有关就诊、治疗、检查的规定，如实提供与病情有关的信息，配合医务人员开展诊疗活动

E、改善医疗服务，提高医疗质量

147、预防医疗纠纷，医疗机构应当

148、预防医疗纠纷，医务人员应当

A、戒毒药品

B、麻醉药品

C、精神药品

D、放射性药品

E、医疗用毒性药品

149、毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近，使用不当会致人中毒或死亡的药品是

150、连续使用后易产生生理依赖性、

能成瘾癖的药品是

第三单元

一、A₁型选择题（1～30题）

答题说明：每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1.慢性支气管炎X线检查可见

A.两肺纹理增粗，呈网状或条索状，以下肺野较明显

B.肺纹理增粗或呈卷发状

C.两肺野的透亮度增加，肺血管纹理外带纤细、稀疏和变直，内带的血管纹理可增粗或紊乱

D.块状阴影或结节状影

E.肺动脉影增宽

2.慢性呼吸衰竭患者，应采取的吸氧方法为

A.间歇高浓度

B.持续高浓度

C.间歇低浓度

D.持续低浓度

E.面罩持续吸氧

3.肺心病肺动脉高压形成的主要原因是

A.肺小动脉痉挛

B.肺血管玻璃样改变

C.血容量增加

D.右心室肥大

E.左心衰竭

4.治疗冠心病心绞痛气阴两虚证，可采用的是

A.血府逐瘀汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、钙离子拮抗药

B.补阳还五汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、利尿药

- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤与硝酸酯制剂、ACEI 药、钙离子拮抗药
D. 生脉散合炙甘草汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药、钙通道阻滞药
E. 当归四逆汤合苏合香丸与利尿药、硝酸酯制剂、 β 受体阻滞药

5. 属于左向右分流的先天性心脏病是
A. 二尖瓣关闭不全
B. 室间隔缺损
C. 肺动脉瓣狭窄
D. 主动脉缩窄
E. 右位心

6. 洋地黄中毒引起的心律失常最常见的是
A. 房性期前收缩
B. 室性期前收缩
C. 室上性心动过速
D. 室性心动过速
E. 房室传导阻滞

7. 风心病二尖瓣狭窄最重要的体征是
A. 心尖区第一心音亢进
B. 心尖区舒张中、晚期隆隆样杂音
C. 肺动脉瓣区第二心音亢进
D. 心房纤颤
E. 心尖搏动向左下移动

8. 我国高血压病最常见的死亡原因是
A. 高血压危象
B. 急性脑血管病
C. 尿毒症
D. 心力衰竭
E. 缺血性心脏病

9. 下列各项中，不属于房性早搏心电图表现的是
A. 提早出现的P'波，形态与窦性P波不同
B. P'-R>0.12秒
C. QRS形态正常，亦可增宽（室内差异性传导）或未下传
D. 代偿间歇不完全

E. 代偿间歇完全

10. 怀疑胃溃疡恶变时的最佳处理措施是

- A. 边治疗溃疡边密切观察
B. 胃镜取活检明确诊断，指导治疗
C. 服中药活血化瘀，清热解毒
D. 立即化疗
E. 立即手术

11. 男性肝硬化患者常出现性欲减退，睾丸萎缩，乳房发育，蜘蛛痣。其主要原因是

- A. 垂体功能减低
B. 雌激素过多
C. 雄激素过多
D. 肾上腺皮质激素过多
E. 脾功能亢进

12. 发展中国家，引起慢性肾衰竭最常见的病因是

- A. 糖尿病肾病
B. 高血压肾病
C. 肾小球肾炎
D. 多囊肾
E. IgA 肾病

13. 尿路感染初发者应首选的治疗药物是

- A. 红霉素
B. 左氧氟沙星
C. 链霉素
D. 氯霉素
E. 四环素

14. 符合肾病综合征诊断的是

- A. 蛋白尿 4.6g/24h，血浆白蛋白 28g/L
B. 蛋白尿 2.5g/24h，血浆白蛋白 27g/L
C. 蛋白尿 4.6g/24h，血浆白蛋白 38g/L
D. 蛋白尿 2.5g/24h，血浆白蛋白 40g/L
E. 蛋白尿 2.5g/24h，血浆总蛋白 64g/L

15. 下列各项中，不属于缺铁性贫血中医证型的是

- A. 脾胃虚弱证
- B. 心脾两虚证
- C. 热毒壅盛证
- D. 脾肾阳虚证
- E. 虫积证

16. 原发性血小板减少性紫癜，血小板被破坏的场所是

- A. 脾脏
- B. 肝脏
- C. 肾脏
- D. 肺脏
- E. 胰腺

17. 下列哪种疾病，骨髓中巨核细胞明显减少

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 脾功能亢进
- E. 巨幼细胞性贫血

18. 下列哪项不是急性白血病痰热瘀阻证的表现

- A. 心烦口苦
- B. 腹部癥积
- C. 舌质紫暗
- D. 口渴喜饮
- E. 痰多胸闷

19. 雄激素最适合治疗

- A. 缺铁性贫血
- B. 海洋性贫血
- C. 慢性感染性贫血
- D. 铁粒幼红细胞贫血
- E. 再生障碍性贫血

20. 甲亢患者，给予他巴唑 20mg，一日 3 次，在家中治疗。之后应到医院复查

- A. 心率、心律
- B. 心电图
- C. 甲状腺大小
- D. 白细胞计数
- E. 突眼程度

21. 下列哪项不属于消渴的并发症

- A. 雀目
- B. 中风
- C. 耳聋
- D. 疮痍
- E. 咳嗽

22. 下列关于甲减实验室检查的说法，错误的是

- A. 血清 TSH 升高
- B. FT₄ 升高
- C. TT₃ 正常
- D. FT₃ 正常
- E. 心电图见低电压

23. 血府逐瘀汤适用于治疗糖尿病的证型是

- A. 痰瘀互结
- B. 气阴两虚
- C. 阴虚燥热
- D. 阴阳两虚
- E. 脉络瘀阻

24. 系统性红斑狼疮常见的死亡原因是

- A. 狼疮性肺炎
- B. 狼疮性心肌炎
- C. 心力衰竭
- D. 尿毒症
- E. 狼疮性脑病

25. 下列各项中，不属于类风湿关节炎关节症状的是

- A. 晨僵
- B. 疼痛与压痛
- C. 关节肿大
- D. 皮肤红
- E. 关节畸形

26. 晚期帕金森病的典型步态是

- A. 小步态
- B. 慌张步态
- C. 蹒跚步态

- D. 间歇跛行
- E. 拖曳步态

28. 治疗气秘的首选方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 五磨饮子
- C. 四磨汤
- D. 六磨汤
- E. 枳实导滞丸

28. 血管性痴呆最常见的类型是

- A. 多发梗死性痴呆
- B. 单发梗死性痴呆
- C. 特殊部位梗死性痴呆
- D. 皮质下动脉硬化性脑病
- E. 中毒性脑病

29. 慢性髓细胞性白血病阴虚内热证，治疗应首选的方剂是

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 青蒿鳖甲汤
- C. 八珍汤
- D. 清营汤
- E. 犀角地黄汤

30. 中医学认为，白血病的主要病因是

- A. 素体不足
- B. 热毒和正虚
- C. 脾肾亏虚
- D. 水湿和痰饮
- E. 七情内伤

二、A₂型选择题（31 ~ 106题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

31. 患者，男，50岁。咳嗽2个月，痰中带血。不发热，抗感染治疗效果不明显。3次X线检查均显示右肺中叶炎症。为确诊，下列哪项检查最重要

- A. 血常规
- B. 血培养
- C. 结核菌素试验
- D. 痰结核菌检查
- E. 纤维支气管镜检查

32. 患者，男，21岁。呼吸困难，咳嗽，汗出1小时而就诊。查体：端坐呼吸，呼吸急促，口唇微绀，心率114次/分，律齐，双肺满布哮鸣音。为迅速缓解症状，应立即采取的最佳治法是

- A. 口服氨茶碱
- B. 肌注氨茶碱
- C. 喷吸沙丁胺醇
- D. 口服强的松
- E. 口服阿托品

33. 患者，女，32岁。10年前患风湿热，检查：心尖部听到舒张期隆隆样杂音。X线显示左心房增大应首先考虑的是

- A. 二尖瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 主动脉瓣关闭不全
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 肺动脉瓣狭窄

34. 患者，男，58岁。高血压病史20年，近1年常心慌，气短，昨夜睡眠中突然憋醒，胸闷，咳嗽，气喘，急诊入院。经检查诊断为急性肺水肿，左心衰竭。治疗应选

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 山莨菪碱
- D. 吗啡
- E. 以上均非

35. 患者，男，55岁。患慢性冠状动脉供血不足5年。其心电图诊断之一为“一度房室传导阻滞 房室传导延缓”。其心电图表现应为

- A. P波增宽
- B. P-R间期延长

- C. QRS 波群时限延长
- D. ST 段延长
- E. Q-T 间期延长

36. 患者，女，40 岁。平素善惊易恐，因受惊吓而心悸 1 个月余，坐卧不安，少寐多梦，舌苔薄白，脉虚弦。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 炙甘草汤
- C. 朱砂安神丸
- D. 天王补心丹
- E. 安神定志丸

37. 患者，男，40 岁。十二指肠溃疡病史 15 年。近 2 个月来自感头痛、眩晕而就诊。检查：血压 160/100mmHg，诊断为高血压，下列降压药应禁用的是

- A. 利血平
- B. 硝苯地平
- C. 氢氯噻嗪
- D. 胍苯酞嗪
- E. 卡托普利

38. 患者，女，30 岁。反复上腹痛 6 年，饥饿时加重，进食后减轻。近 1 周来进食后上腹部胀痛加重，但大量呕吐后减轻。查体：轻度脱水，上腹部膨隆有振水音。应首先考虑的是

- A. 多发性溃疡病
- B. 复合性溃疡病
- C. 胃溃疡恶变
- D. 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- E. 胃窦部溃疡伴急性穿孔

39. 患者，男，46 岁。反复右胁腹疼痛 10 年。现症见肋下积块坚实，痛定不移，脘腹胀满，甚则腹大如鼓，面目发黄晦暗，肌肤甲错，高热烦渴，小便黄赤，大便干黑，舌红有瘀斑，苔黄腻，脉弦数。经诊断为“原发性肝细胞癌”。其治法是

- A. 养阴清热，解毒祛瘀
- B. 疏肝理气，活血化瘀

- C. 清热利湿，化瘀解毒
- D. 理气活血，化瘀解毒
- E. 运脾利湿，化气行水

40. 男性，35 岁。上腹隐痛 1 年，饭后腹胀，食欲减退，体检一般情况尚可。测定基础胃酸排出量减少，胃镜下可见黏膜充血，粗糙不平，有出血点。

其诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 慢性浅表性胃炎
- C. 胃癌
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 胃黏膜脱垂症

41. 患者，女，35 岁。与家人聚会饱餐后出现胃痛，饱胀拒按，恶心欲吐，吐后症轻。舌苔厚腻，脉弦滑。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 清中汤
- B. 柴胡疏肝散
- C. 香苏散
- D. 保和丸
- E. 一贯煎

42. 男性，30 岁。无规律上腹隐痛 3 个月，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，神疲乏力，舌质淡红，苔薄白，脉沉细。胃镜下可见黏膜呈灰白色，

血管暴露。其病证结合诊断是

- A. 慢性萎缩性胃炎+脾胃虚弱证
- B. 慢性萎缩性胃炎+胃阴不足证
- C. 胃溃疡+胃阴不足证
- D. 胃溃疡+脾胃虚弱证
- E. 慢性浅表性胃炎+脾胃虚弱证

43. 患者，男，56 岁，患肝病反复发作 20 余年，近日出现乏力、嗜睡、厌食、脾大、脾功能亢进、腹水，应首先考虑诊断为

- A. 急性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 黑热病
- D. 肝癌

E. 肝性脑病

44. 某患者，男性，30岁。1年来胃痛，多发生于夜间，以背部疼痛为主，内科治疗效果差。应首先考虑的诊断是

- A. 食管溃疡
- B. 胃大弯溃疡
- C. 幽门管溃疡
- D. 十二指肠球后溃疡
- E. 胃小弯溃疡

45. 女性患者，20岁，大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。其治疗首选方剂为

- A. 黄连上清丸
- B. 麻子仁丸
- C. 大承气汤
- D. 导赤散
- E. 三黄泻心汤

46. 患者小便淋沥不已，时作时止，每于劳累后发作，尿热，时有尿痛，面色无华，神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振，口干不欲饮水，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治疗应首选的方剂是

- A. 八正散
- B. 丹栀逍遥散
- C. 无比山药丸
- D. 知柏地黄丸
- E. 补中益气汤

47. 张某，男性，36岁。体检时发现蛋白尿阳性，24小时定量为1.3g，下肢轻度浮肿，血压150/96mmHg，血肌酐124 $\mu\text{mol/L}$ 。其诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾功能衰竭
- E. 慢性肾盂肾炎

48. 患者王某，男性，45岁。慢性肾炎

12年，现面浮肢肿，身热汗出，口干不欲饮，胸脘痞闷，腹部胀满，纳差，尿黄短少，便溏，舌红，苔黄腻，脉滑数。其中医治法是

- A. 益气养阴
- B. 活血化瘀
- C. 清热利湿
- D. 健脾化湿
- E. 温补脾肾

49. 边某，男，54岁，慢性肾衰竭病史两年，近两日精神萎靡，恶心，呕吐，血肌酐940 $\mu\text{mol/L}$ ，二氧化碳结合力15mmol/L，血钾6.8mmol/L，应首选的治疗措施是

- A. 静点碳酸氢钠
- B. 口服碳酸氢钠
- C. 血液透析
- D. 腹膜透析
- E. 静脉注射利尿剂

50. 6岁女童，喜食泥块，面色萎黄，血红蛋白92g/L，治疗应首选的药物是

- A. 抗生素
- B. 葡萄糖
- C. 维生素类
- D. 铁剂
- E. 钙剂

51. 某男，50岁，确诊为慢性髓细胞白血病患者慢性期。首选治疗是

- A. 骨髓移植
- B. 泼尼松
- C. 长春新碱
- D. 尼洛替尼
- E. 环磷酰胺

52. 孙某，因发热就诊，血常规示白细胞 $70 \times 10^9/L$ ，见大量幼稚细胞，骨髓象提示有核细胞增生活跃，原始细胞占35%。患者表现为壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，咽喉肿痛，面颊肿胀疼痛，牙龈出血，舌质红绛，苔黄，脉大。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+痰热瘀阻证
- B. 再障+痰热瘀阻证
- C. 再障+热毒炽盛证
- D. 骨髓增生异常综合征+热毒炽盛证
- E. 白血病+热毒炽盛证

53. 患者安某，服用氯霉素后出现乏力、出汗、周身不适，外周血象粒细胞计数为 $3.0 \times 10^9/L$ 。就诊时面色萎黄，头晕目眩，倦怠乏力，少寐多梦，心悸怔忡，纳呆食少，腹胀便溏，舌质淡，苔薄白，脉细弱。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+气血两虚证
- B. 粒细胞减少症+肝肾阴虚证
- C. 白血病+肝肾阴虚证
- D. 粒细胞减少症+外感温热证
- E. 粒细胞减少症+气血两虚证

54. 高某，两周前患上呼吸道感染，口服药物治疗后症状减轻，但近日皮肤多处瘀点、瘀斑，牙龈出血，不伴发热。血象检查：白细胞 $0.9 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $130g/L$ ，血小板 $38 \times 10^9/L$ 。应首先考虑的诊断是

- A. 上呼吸道感染
- B. 白血病
- C. 过敏性紫癜
- D. 原发免疫性血小板减少症
- E. 再生障碍性贫血

55. 王某，女，47岁。1周前曾患上呼吸道感染，现患者自觉颈前肿胀并伴有疼痛，心悸，出汗，口苦咽干，食欲减少，烦躁易怒，舌质红，苔薄黄，脉浮数。首选的中医治法是

- A. 活血化瘀，软坚散结
- B. 疏肝理气，消肿止痛
- C. 清肝泻胆，消肿止痛
- D. 滋阴降火，软坚散结
- E. 益气养阴，软坚散结

56. 患者，男性，58岁，糖尿病史5年，服格列本脲血糖控制在 $8.6-9.6mmol/L$

之间。近3天尿频、尿痛、尿急，昨天出现昏迷，查空腹血糖 $24.0mmol/L$ ，血钠 $148.5mmol/L$ ，血尿素氮 $7.08mmol/L$ ，尿糖(+++)，尿酮(++)。应首先考虑的诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒
- B. 脑血管意外
- C. 乳酸中毒昏迷
- D. 低血糖昏迷
- E. 高渗性非酮症糖尿病昏迷

57. 患者，男性，60岁，口渴欲饮6年，近半年小便频数，混浊如膏，甚则饮一溲一，面色黧黑，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿，舌淡苔白，脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 七味白术散
- B. 肾气丸
- C. 六味地黄丸
- D. 玉女煎
- E. 消渴方

58. 患者，男性，56岁，凌晨关节疼痛惊醒、进行性加重、剧痛如刀割样或咬噬样，伴有发热、头痛、恶心、心悸、寒战，血液中血尿酸 $420 \mu mol/L$ ，最可能是

- A. 类风湿关节炎
- B. 化脓性关节炎
- C. 创伤性关节炎
- D. 痛风
- E. 继发性高尿酸血症

59. 某患者，多食，消谷善饥，形体壮实，脘腹胀满，面色红润，心烦头晕，口干口苦，胃脘灼痛、嘈杂得食则缓，舌红，苔黄腻，脉弦滑。其治法应是

- A. 滋养肝肾
- B. 行气化瘀
- C. 健脾化湿
- D. 温阳化湿
- E. 清胃泄热

60. 某女，两手指间和掌指关节强直不

舒两年，近两周病情加重，关节疼痛、肿大变形，伴活动受限。查血沉 45mm/h，类风湿因子(++)。其诊断是

- A. 痛风
- B. 风湿性关节炎
- C. 类风湿关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 骨性关节炎

61. 患者女性，发热 4 天，体温 38℃，两膝关节肿痛，行动不便，下肢沉重酸胀，伴饮食无味，纳呆，偶有恶心呕吐，全身困乏无力，下肢浮肿，在某医院诊断为类风湿关节炎，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 丁氏清络饮
- B. 四妙丸
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 独活寄生汤
- E. 身痛逐瘀汤

62. 患者女性，发热 5 天，现体温 39℃，肢厥，神志昏迷，谵语，舌蹇，舌色鲜绛，脉细数。治疗应首选清宫汤送服

- A. 安宫牛黄丸
- B. 苏合香丸
- C. 神犀丹
- D. 玉枢丹
- E. 通关散

63. 男孩，突然意识短暂丧失，面色变白，双目凝视，手中的筷子掉在地下，口角出现细小颤动，持续约 15 秒后立即清醒。其诊断是

- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫不典型失神发作
- C. 癫痫典型失神发作
- D. 精神运动性癫痫
- E. 癫痫单纯部分性运动性发作

64. 患者平素头晕头痛，耳鸣目眩，突然发生口眼喎斜，舌强语蹇，半身不遂，舌质红，苔黄，脉弦。诊断为脑

血栓形成，其中医证型是

- A. 风痰入络证
- B. 肝阳暴亢，风火上扰证
- C. 痰爽热腑实，风痰上扰证
- D. 气虚血瘀证
- E. 阴虚风动证

65. 患者突然跌倒，神志不清，口吐涎沫。两目上视，四肢抽搐。口中如作猪羊叫声，移时苏醒，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选

- A. 定痫丸
- B. 导痰汤
- C. 二阴煎
- D. 涤痰汤
- E. 控涎丹

66. 患者短暂性脑缺血发作，头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷，舌质暗，苔白腻，脉滑数，其首选方剂是

- A. 补阳还五汤合生脉散加减
- B. 镇肝息风汤合涤痰汤加减
- C. 黄连温胆汤合桃红四物汤加减
- D. 天王补心丹合血府逐瘀汤加减
- E. 通窍活血汤合四君子汤加减

67. 女性患者，突然昏迷，抽搐，呼气有大蒜味，瞳孔明显缩小，皮肤冷汗，两肺湿啰音。下列各项中，应首先考虑的诊断是

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安定中毒
- C. 脑出血
- D. 有机磷杀虫药中毒
- E. 蛛网膜下腔出血

68. 患者，男，15 岁。因晚上房间内烧炭取暖，晨起被发现时昏睡不醒，面色潮红，口唇呈樱桃红色。查体：呼吸浅快，四肢肌张力增高。血液 COHB 50%。首先考虑的诊断是

- A. 急性一氧化碳中毒
- B. 糖尿病酮症酸中毒

- C. 脑出血
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 脑血栓形成

69. 患者，男，27岁。高温下作业7小时后，大汗出，腹部痉挛和疼痛，四肢抽搐。查体：颜面潮红，口唇干燥，体温39℃。首选的诊断是

- A. 中暑（热痉挛）
- B. 中暑（热射病）
- C. 中暑（热衰竭）
- D. 轻度中暑
- E. 中暑先兆

70. 患者患喘证20年，现症见喘促短气，气怯声低，喉有鼾声，咳声低弱，痰吐稀薄，自汗畏风，痰少质黏，烦热而渴，咽喉不利，面颧潮红，舌质淡红，脉细数。其中医治法是

- A. 补肾纳气
- B. 扶阳固脱，镇摄肾气
- C. 补肺益气养阴
- D. 开郁降气平喘
- E. 化痰降逆

71. 患者，男，75岁。哮喘病史二十余年。动则喘甚，呼多吸少，气不得续，形瘦神惫，跗肿，汗出肢冷，面青唇紫，舌淡苔白，脉微细。其证候是

- A. 肺气虚耗证
- B. 肾虚不纳证
- C. 痰浊阻肺证
- D. 痰热郁肺证
- E. 肺气郁痹证

72. 头痛患者，疼痛日久，其痛如锥刺，固定不移，舌质紫，脉细涩。其证候是

- A. 肝阳
- B. 痰浊
- C. 血虚
- D. 肾虚
- E. 瘀血

73. 郭某，男性，54岁。心悸不安，胸闷不舒，心痛时作，唇甲青紫，舌紫暗，脉涩，治疗应选用

- A. 桃仁红花煎
- B. 朱砂安神丸
- C. 丹参饮
- D. 归脾汤
- E. 天王补心丹

74. 患者女性，45岁，脘腹痞闷，胸胁胀满，心烦易怒，善太息，呕恶暖气，大便不爽，舌质淡红，苔薄白，脉弦。

治疗首选方剂是

- A. 泻心汤合连朴饮
- B. 补中益气汤
- C. 越鞠丸合枳术丸
- D. 保和丸
- E. 益胃汤

75. 女性患者，20岁，大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，有身热，小便短赤，舌红，苔黄燥，脉滑数。其治疗首选方剂为

- A. 黄连上清丸
- B. 麻子仁丸
- C. 大承气汤
- D. 导赤散
- E. 三黄泻心汤

76. 支气管哮喘典型发作的表现是

- A. 吸气性呼吸困难
- B. 伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难
- C. 伴有哮鸣音的混合性呼吸困难
- D. 伴有哮鸣音的呼吸困难，粉红色泡沫痰
- E. 发作24小时以上伴咯血

77. 患者鼓胀，骤然大量呕血，血色鲜红，大便下血，暗红。多属瘀热互结，热迫血溢，治宜

- A. 清热凉血，活血止血
- B. 清热活血，化瘀止痛
- C. 清热利湿，凉血活血
- D. 清热凉血，化瘀止血

E. 清热凉血，活血化瘀

78. 肺癌恶性肿瘤细胞的起源部位是

- A. 肺组织
- B. 支气管平滑肌
- C. 肺间质组织
- D. 支气管黏膜
- E. 支气管软骨

79. 某患者，身目俱黄，其色不甚鲜明，身热不扬，头重身困，胸脘痞满，食欲减退，恶心呕吐，厌食油腻，腹胀，便溏，小便短黄，舌苔厚腻微黄，脉濡缓，治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 茵陈蒿汤
- C. 茵陈四苓散
- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

80. 早期诊断心脏骤停的最佳指标是

- A. 瞳孔明显放大
- B. 测不到血压
- C. 颈动脉和股动脉搏动消失
- D. 呼吸停止
- E. 皮肤黏膜呈青紫色

81. 患者女性，33岁。劳累后心悸气促7年，气促，不能平卧伴咯血。查体：二尖瓣面容，第一心音亢进，心尖部可闻及隆隆样舒张期杂音， $P_2 > A_2$ ，心律规则。其治疗措施是

- A. 吸氧
- B. 西地兰静脉注射
- C. 镇咳剂
- D. 速尿静脉注射
- E. 止血剂

82. 患者刘某，男性，34岁。水肿反复消长不已，面浮身肿，腰以下肿甚，按之凹陷不起，腰部冷痛酸重，尿量减少，四肢厥冷，怯寒神疲，面色灰滞，舌质淡胖，苔白，脉沉细。其中医证型是

- A. 脾阳虚衰证
- B. 肾阳衰微证
- C. 脾肾气虚证
- D. 肝肾阴虚证
- E. 瘀水互结证

83. 患者，女，26岁。因产后大出血，突然昏厥，面色苍白，口唇无华，四肢震颤，自汗肢冷，目陷口张，呼吸微弱，舌质淡，脉扰。其治法是

- A. 补养气血
- B. 补气，回阳，醒神
- C. 平肝潜阳，理气通瘀
- D. 益气养血，化瘀通络
- E. 平肝潜阳，理气通瘀

84. 女性患者，29岁，风湿热病史7年，现呼吸困难、咳嗽、咳痰、咯血，查体心尖部闻及舒张中晚期杂音，心电图显示左房增大，该患者的诊断是

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 联合瓣膜病变

85. 患者，男，63岁。素有咳喘宿痰，今与家人争执后突然昏厥，喉有痰声，呼吸气粗，舌苔白腻，脉沉滑。治疗本病应首选的方剂是

- A. 五磨饮子
- B. 导痰汤
- C. 人参养营汤
- D. 生脉饮
- E. 通瘀煎

86. 女性患者，20岁，感冒后出现心悸、气短，查体第一心音减弱，心电图检查显示PR间期0.24秒，每个P波后均有QRS波，其心电图诊断是

- A. 窦房阻滞
- B. 一度房室传导阻滞
- C. 二度I型房室传导阻滞
- D. 二度II型房室传导阻滞

E. 束支阻滞

87. 十二指肠溃疡发病的最主要因素是

- A. 胃酸分泌增高
- B. 胃黏膜屏障减弱
- C. 遗传因素
- D. 免疫因素
- E. 饮食因素

88. 张某, 男, 46 岁, 四肢痿软, 身体困重, 下肢尤甚, 足胫热气上腾, 发热, 胸痞脘闷, 小便短赤涩痛, 苔黄腻, 脉细数。其中医诊断是

- A. 痿证之肝肾亏损、髓枯筋痿证
- B. 痹证之湿热痹证
- C. 痿证之湿热浸淫、气血不运证
- D. 痹证之肝肾亏虚证
- E. 痿证之脾胃亏虚、精微不运证

89. 男性, 56 岁, 腰部弛痛, 痛处伴有热感, 暑湿阴雨天加重, 活动后可减轻, 小便短赤, 苔黄腻, 脉濡数。其中医证型是

- A. 寒湿腰痛证
- B. 瘀血腰痛证
- C. 湿热腰痛证
- D. 肾阴虚腰痛证
- E. 肾阳虚腰痛证

90. 溃疡性结肠炎病变最常发生的部位是

- A. 降结肠
- B. 横结肠
- C. 回肠末段及升结肠
- D. 直肠及乙状结肠
- E. 全结肠

三、A₃ 型选择题 (107~130 题)

答题说明: 以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据题干所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(107~111 题共用题干)

某男, 76 岁。慢性阻塞性肺病史 17 年, 长期咳嗽、咳痰伴气短、憋喘。近 3 天来咳嗽、憋喘加剧。现呼吸困难, 浅短难续, 张口抬肩, 心悸, 气短, 头痛, 夜间失眠, 白天嗜睡, 神情淡漠, 不欲饮食。查体: 口唇发绀, 颈静脉怒张, 全身浮肿, 肝脏增大, 三尖瓣区收缩期杂音, 心率 120 次/分, 律不齐, 双肺哮鸣音及肺底湿性啰音。舌胖紫暗, 苔白滑, 脉沉滑。动脉血气分析: PaO₂ 50mmHg, PaCO₂ 60mmHg, pH7.2, AB>SB。

107. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性阻塞性肺病 (脾肾阳虚证)
- B. 慢性呼吸衰竭 (脾肾阳虚证)
- C. 慢性呼吸衰竭 (阳微欲脱证)
- D. 慢性阻塞性肺病 (痰浊阻肺证)
- E. 慢性呼吸衰竭 (痰蒙神窍证)

108. 可能的酸碱平衡紊乱是

- A. 代偿性呼吸性酸中毒
- B. 失代偿性呼吸性酸中毒
- C. 代偿性呼吸性碱中毒
- D. 失代偿性代谢性酸中毒
- E. 代偿性代谢性酸中毒

109. 以下不恰当的处理措施是

- A. 清除气道内分泌物, 保持呼吸道通畅
- B. 较高浓度 (>35%) 给氧以迅速缓解低氧血症
- C. 明确致病菌, 并选用敏感有效的抗生素
- D. 若出现呼吸肌疲劳, 及时使用机械通气
- E. 补充 5%碳酸氢钠, 使 pH 值上升至 7.25 左右

110. 中医治法是

- A. 化痰降气, 活血化瘀
- B. 补益肺肾, 纳气平喘
- C. 温肾健脾, 化湿利水
- D. 益气温阳, 固脱救逆
- E. 涤痰开窍, 息风止痉

111. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 独参汤灌服
- B. 真武汤合五苓散加减
- C. 补肺汤合参蛤散加减
- D. 涤痰汤送服安宫牛黄丸、至宝丹
- E. 二陈汤合三子养亲汤加减

(112~115 题共用题干)

患者，女，24 岁。餐后上腹部不适，隐痛两年余，加重 1 周。现胃痛隐隐，喜温喜按，畏寒肢冷，泛吐清水，腹胀便溏。查体上腹部轻微压痛，舌淡胖边有齿痕，苔白，脉迟缓。胃镜示胃窦部有一圆形溃疡面，边缘光整，底部覆有灰黄色，周围黏膜充血。X 线钡餐检查胃窦部龛影。幽门螺杆菌检测阳性。

112. 首先考虑的诊断是
- A. 胃溃疡
 - B. 十二指肠溃疡
 - C. 慢性胃炎
 - D. 慢性胆囊炎
 - E. 急性胃炎
113. 若胃排空延迟，上腹胀满，餐后加重，其最可能的并发症是
- A. 胃出血
 - B. 胃壁穿孔
 - C. 幽门梗阻
 - D. 胃癌
 - E. 急性胃炎
114. 中医治法是
- A. 清胃泄热，疏肝理气
 - B. 疏肝理气，健脾和胃
 - C. 健脾养阴，益胃止痛
 - D. 活血化瘀，通络和胃
 - E. 温中散寒，健脾和胃
115. 治疗此证应首选的方剂是
- A. 柴胡疏肝散合五磨饮子加减
 - B. 黄芪建中汤加减
 - C. 益胃汤加味
 - D. 化肝煎合左金丸加减
 - E. 活络效灵丹合丹参饮加减

(116~119 题共用题干)

患者，女，4 岁。3 日前发热，流涕，

咽喉疼痛。1 日前全身皮肤出现瘀点、瘀斑。骨髓象：巨核细胞数量轻度增加，红系及粒、单核系正常。血象：血红蛋白 110g/L，血小板 $15 \times 10^9/L$ 。

116. 首先考虑的诊断是
- A. 原发性免疫性血小板减少症
 - B. 阵发性睡眠性血红蛋白尿症
 - C. 慢性粒细胞性白血病
 - D. 慢性溶血性贫血
 - E. 骨髓增生异常综合征
117. 首选治疗措施是
- A. 脾切除
 - B. 休息及防止出血
 - C. 休息及输注血小板
 - D. 免疫抑制剂治疗
 - E. 达那唑治疗

118. 若患者皮肤紫癜，色泽新鲜，起病急骤，紫斑以下肢最为多见，伴发热、口渴、便秘、尿黄，舌质红，苔薄黄，脉弦数。首选的中医治法是

- A. 益气摄血
 - B. 滋阴降火，清热止血
 - C. 清热凉血
 - D. 健脾养血
 - E. 活血化瘀止血
119. 首选的方剂是
- A. 桃红四物汤加减
 - B. 归脾汤加减
 - C. 茜根散或玉女煎加减
 - D. 犀角地黄汤加减
 - E. 清营汤加减

四、B₁ 型选择题 (131~150 题)

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(131~132 题共用备选答案)

- A. 鳞状上皮细胞肺癌
- B. 未分化小细胞肺癌
- C. 腺癌

- D. 细支气管肺泡癌
E. 腺鳞混合癌
131. 对放疗及化疗最敏感的肺癌是
132. 最常见的周围型肺癌是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛
B. 无明显心肌需氧增加的情况下发生的心绞痛
C. 心绞痛发作时，心电图某些导联 ST 段抬高
D. 心尖部针刺样疼痛，发作时有心电图异常
E. 心前区压迫样疼痛 15 分钟以上，心电图有病理性 Q 波
133. 劳力型心绞痛的诊断标准是
134. 变异型心绞痛的诊断标准是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 呕吐物为隔夜食物，带腐臭味
B. 呕吐物为黄绿色，带粪臭味
C. 呕吐物为大量黏液及食物
D. 呕吐物为血液
E. 吐出胃内容物后仍干呕不止
135. 急性胃炎的临床表现是
136. 急性胆囊炎的临床表现是

(137~138 题共用备选答案)

- A. 呋塞米
B. 泼尼松
C. 环磷酰胺
D. 麦考酚吗乙酯
E. 双嘧达莫
137. 肾病综合征应首选的治疗药物是
138. 肾病综合征激素抵抗型应首选的治疗药物是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 八珍汤合无比山药丸
B. 归脾汤
C. 左归丸
D. 右归丸
E. 四物汤

139. 缺铁性贫血脾肾阳虚证的治疗方剂为

140. 再生障碍性贫血脾肾亏虚证的治疗方剂为

(141~142 题共用备选答案)

- A. 三仁汤
B. 清瘟败毒饮
C. 清燥救肺汤
D. 益胃汤
E. 加味二妙散

(143~144 题共用备选答案)

- A. 布洛芬
B. 萘普生
C. 丙磺舒
D. 吲哚美辛
E. 秋水仙碱

143. 促进尿酸排泄常用的药物有

144. 治疗痛风急性发作的特效药是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 1 日常用量
B. 2 日常用量
C. 3 日常用量
D. 1 日极量
E. 2 日极量

145. 为门（急）诊癌症疼痛患者开具的第一类精神药品注射剂，每张处方的限量是

146. 医疗用毒性药品每次处方的最大剂量是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 清热利湿，祛风通络
B. 养阴清热，祛风通络
C. 祛风散寒，清热化湿
D. 益肝肾，补气血，祛风湿，通经络
E. 活血化瘀，祛痰通络

147. 活动期湿热痹阻证的中医治法是

148. 活动期寒热错杂证的中医治法是

(149~150 题共用备选答案)

- A. 丙戊酸钠

- B. 苯妥英钠
- C. 卡马西平
- D. 扑痫酮
- E. 乙琥胺

149. 治疗癫痫小发作发作，应首选的药物是

150. 治疗癫痫大性发作，应首选的药物是

- A. 肠内营养
- B. 肠外营养
- C. 外科补液
- D. 静脉输液
- E. 胃肠造瘘

5. 关于溶血性反应的治疗，下列哪项是错误的

- A. 抗休克
- B. 保护肾功能
- C. 防治弥散性血管内凝血
- D. 换血治疗
- E. 使用抗组胺药物

6. 休克厥逆证的治疗方药是

- A. 清营汤加减
- B. 人参养营汤加减
- C. 四味回阳饮加减
- D. 保元汤合固阳汤加减
- E. 独参汤合四逆汤加减

7. 经常哮喘发作者，术前可选用①，以减轻气管黏膜水肿。

- A. 麻黄素
- B. 地塞米松
- C. 氨茶碱
- D. 抗生素
- E. 多巴胺

8. 多器官功能障碍综合征是指

- A. 微循环缺血期间出现凝血机制障碍及血管内小血栓形成
- B. 缺氧、酸中毒及细菌内毒素的刺激使组织释放血管活性物质
- C. 各种因素引起的有效循环血量不足使肾脏处于低灌流状态
- D. 细菌毒素、代谢产物、有害物质由肠道进入门静脉时，肝脏即出现病理性损伤
- E. 急性疾病过程中 2 个或 2 个以上的重要器官或系统的急性功能障碍综合征

9. 下列哪项不属于麻醉性镇痛药

第四单元

一、A1 型选择题（1~94 题）

答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

1. 下列不属于“外感六淫”的是

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 痰

2. 高压蒸汽灭菌温度能提高到

- A. 115℃~120℃
- B. 118℃~123℃
- C. 120℃~125℃
- D. 121℃~126℃
- E. 122℃~128℃

3. 下列哪项不属于腰麻的常见并发症

- A. 术后头痛
- B. 尿潴留
- C. 腰背痛
- D. 下肢瘫痪
- E. 四肢麻木

4. 病人在不进食的情况下一般采取

- A. 可待因
- B. 二氢埃托啡
- C. 布洛芬
- D. 哌替啶
- E. 吗啡

10. 下列哪项为腹腔镜术后 CO₂ 气腹相关并发症

- A. 肠粘连
- B. 胆漏
- C. 内出血
- D. 下肢静脉瘀血和血栓形成
- E. 腹壁血肿

11. 急性淋巴结炎属中医 ○ 的范畴

- A. 内痈
- B. 外痈
- C. 疽
- D. 发
- E. 痰核

12. 挤压综合征主要是指挤压之后出现

- A. 呼吸困难
- B. 肢体坏死
- C. 昏迷
- D. 休克、急性肾衰
- E. 心衰

13. 神经纤维瘤的特点不包括

- A. 数目不定，几个甚至上千个不等
- B. 大者可达十数千克
- C. 肿瘤沿神经干走向生长
- D. 呈圆形、扁圆形或分叶状
- E. 皮肤出现咖啡斑，大小不定

14. 下列哪项不是甲亢的诊断要点

- A. 甲状腺抗体阳性
- B. 性情急躁，易激动
- C. 有突眼征
- D. 两手颤动
- E. 甲状腺肿大，常可扪及震颤或听到血管杂音

15. 对于原发性周围型肺癌，首选的治疗方法是

- A. 中医中药治疗
- B. 免疫治疗
- C. 放射治疗
- D. 化学治疗
- E. 手术治疗

16. 下列哪项不属于乳腺癌的典型表现

- A. 乳内无疼痛、单发包块
- B. 质地硬
- C. 局部皮肤橘皮样改变
- D. 表面不光滑，与周围组织粘连，不易推动
- E. 边界清楚

17. 胃癌的组织学分型错误的是

- A. 鳞腺癌
- B. 鳞癌
- C. 腺癌
- D. 类癌
- E. 十二指肠溃疡瘢痕性幽门梗阻

18. 原发性肝癌的首选治疗方法是

- A. 肿瘤局部放射治疗
- B. 生物治疗
- C. 中医中药治疗
- D. 手术治疗
- E. 全身化疗

19. 我国妇女最常见的骨盆类型是

- A. 女型
- B. 男型
- C. 扁平型
- D. 漏斗型
- E. 类人猿型

20. 身体无病，每三月一行经者，称为

- A. 激经
- B. 暗经
- C. 居经
- D. 避年
- E. 并月

21. 下列各项，不属不孕症的必查项目的是

- A. 体格检查
- B. 妇科检查
- C. 卵巢功能测定
- D. 盆腔 CT 检查
- E. 精液常规检查

22. 治疗暑入阳明型产褥中暑，应首选的方剂是

- A. 清暑益气汤
- B. 白虎汤
- C. 紫雪丹
- D. 竹叶石膏汤
- E. 清营汤

23. 下列各项，能引起胎儿在很短的时间内死亡的是

- A. 脐带过长
- B. 脐带脱垂
- C. 脐带过短
- D. 脐带假结
- E. 脐带扭转

24. 下列各项，不属热伤冲任所致病证的是

- A. 月经先期
- B. 月经过多
- C. 月经过少
- D. 崩漏
- E. 经行吐衄

25. 宫颈癌的临床分期是根据

- A. 有无淋巴结转移
- B. 术后所见分期
- C. 肉眼所见病灶大小
- D. 病灶累及的范围
- E. 临床症状严重程度

26. 下列各项，不属盆腔炎性疾病后遗症临床

- A. 下腹疼痛
- B. 发热恶寒

- C. 腰骶酸痛
- D. 带下量多
- E. 伴有不孕

27. 下列各项，属妊娠剧吐主要发病机理的是

- A. 冲气上逆，胃失和降
- B. 痰浊上扰，胃失和降
- C. 肝胃不和，胃失和降
- D. 脾气虚弱，胃失和降
- E. 阴血下注，阳气偏亢

28. 下列各项，属胎膜早破时阴道流液 pH 值的是

- A. ≤ 4.5
- B. 4.6~5.4
- C. 5.5~6.0
- D. 6.1~6.4
- E. > 6.5

29. 下列各项，不属肝肾阴虚型阴痒主证的是

- A. 阴部皮肤变白、干燥
- B. 阴部干涩
- C. 带下量多，色黄如脓
- D. 阴道口缩小
- E. 阴部萎缩、平坦

30. 下列关于加强子宫收缩的处理措施的叙述，属需专人监护的是

- A. 灌肠
- B. 人工破膜
- C. 针刺
- D. 缩宫素静脉滴注
- E. 排空膀胱

31. 下列关于无排卵性异常子宫出血的叙述，错误的是

- A. 多见于青春期及绝经过渡期
- B. 基础体温单相型
- C. 周期短，规律，经量多少不定
- D. 药物治疗是异常子宫出血的一线治疗
- E. 月经前刮宫，内膜为增殖期

32. 下列关于初乳的叙述, 错误的是

- A. 呈淡黄色, 含有丰富的脂质
- B. 含蛋白质多
- C. 含乳糖较少
- D. 含 β 胡萝卜素多
- E. 含大量免疫抗体, 如分泌型 IgA

33. 胎头衔接指的是

- A. 枕骨进入骨盆入口, 双顶径接近或达到坐骨棘水平
- B. 顶骨进入骨盆入口, 双顶径接近或达到坐骨棘水平
- C. 双顶径进入骨盆入口, 颅骨最低点接近或达到坐骨棘水平
- D. 双顶径进入骨盆入口, 双顶径到达坐骨棘水平
- E. 双顶径进入骨盆入口, 双顶径到达坐骨结节水平

34. 下列各项, 不属中医妇科常用外治法的是

- A. 电疗法
- B. 熏洗法
- C. 纳药法
- D. 灌肠法
- E. 割治法

35. 下列各项, 不属盆腔子宫内膜异位症主症的是

- A. 痛经
- B. 性交痛
- C. 白带量多, 色黄
- D. 不孕
- E. 月经不调

36. 下列各项, 属 II 度重型子宫脱垂临床表现的是

- A. 下坠感
- B. 外阴部有肿物脱出
- C. 排尿困难
- D. 排便困难
- E. 张力性尿失禁

37. 一般认为女孩在 () 岁, 男孩 () 岁以前出线性发育征象, 临床可判断为性早熟。

- A. 7, 8
- B. 8, 9
- C. 9, 10
- D. 9, 8
- E. 10, 9

38. 风湿性心内膜炎最常受累的瓣膜是

- A. 肺动脉瓣
- B. 主动脉瓣
- C. 二尖瓣及三尖瓣
- D. 三尖瓣
- E. 二尖瓣

39. 过敏性紫癜患儿最易出现的内脏损害是

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脾

40. 皮肤黏膜淋巴结综合征最早出现的症状是

- A. 淋巴结肿大
- B. 出疹
- C. 发热
- D. 杨梅舌
- E. 结膜充血

41. 蛋白质-能量营养不良的发病年龄是

- A. 主要见于 3 岁以下
- B. 主要见于 3~4 岁
- C. 主要见于 4~5 岁
- D. 主要见于 5~6 岁
- E. 青春期

42. 蛋白质-能量营养不良最为常见的并发症是

- A. 感染

- B. 佝偻病
- C. 微量元素缺乏
- D. 自发性低血糖
- E. 营养性贫血

43. 佝偻病肾虚骨弱证的治法是

- A. 补肾壮骨
- B. 补肾填精，佐以健脾益气
- C. 平肝潜阳
- D. 健脾补肾，填精补髓
- E. 温脾助运

44. 下列各项，不属维生素 D 缺乏性手足搐搦症临床表现的是

- A. 惊厥
- B. 肌张力降低
- C. 手足搐搦
- D. 喉痉挛
- E. 多汗易惊

45. 降低麻疹发病率的关键措施是

- A. 早发现，早隔离，早治疗
- B. 易感者按时注射麻疹减毒活疫苗
- C. 注射丙种球蛋白
- D. 易感儿不到人群密集场所
- E. 病人停留过的房间应开窗通风半小时

46. 幼儿急疹最主要的临床特点是

- A. 发热 3~4 天，热退疹出
- B. 发热 3~4 天高热出疹，疹退后有糠麸样脱屑及色素沉着
- C. 发热 1~2 天后出疹，疹间无正常皮肤，疹退后有片状脱皮
- D. 发热 2~3 天后出疹，伴疱疹性咽峡炎，肌痛
- E. 发热 1~2 天后出疹，伴枕后淋巴结肿大

47. 下列各项，不属猩红热临床表现的是

- A. 发热数小时至一天出疹的
- B. 初起发热，咽喉红肿糜烂
- C. 皮疹呈鲜红点状

D. 恢复期皮肤有色素沉着

E. 有环口苍白圈，杨梅舌，皮肤皱褶处可见线状疹

48. 手足口病的病变部位是

- A. 肝脾
- B. 心肺
- C. 肺脾
- D. 心肝
- E. 脾肾

49. 尿血的中医辨证分型不包括

- A. 风热伤络证
- B. 下焦湿热证
- C. 脾肾两虚证
- D. 肝脾不和证
- E. 阴虚火旺证

50. 治疗便秘的基本法则是

- A. 消积导滞
- B. 清热和中
- C. 清腑泄热
- D. 疏肝理气
- E. 润肠通便

51. 小儿感冒主要的病原体是

- A. 病毒
- B. 肺炎支原体
- C. 衣原体
- D. 葡萄球菌
- E. 立克次体

52. 肺炎按病因分类，下列错误的是

- A. 大叶性肺炎
- B. 过敏性肺炎
- C. 病毒性肺炎
- D. 霉菌性肺炎
- E. 细菌性肺炎

53. 对诊断小儿支气管哮喘最有意义的肺部体征是

- A. 两肺满布哮鸣音，呼气延长
- B. 双肺呼吸音减弱
- C. 双下肺中细湿啰音

- D. 双肺呼吸音增粗
- E. 右肺中湿啰音，随体位改变

54. 小儿鹅口疮口腔局部的临床特征是

- A. 口腔黏膜出现单个或成簇的小疱疹
- B. 口腔黏膜充血，水肿，可有疱疹
- C. 口腔创面有纤维素渗出物形成或灰白色假膜，易擦去
- D. 口腔黏膜表面覆盖白色乳凝块样片状物，不易擦去
- E. 口腔黏膜出现大小不等的糜烂或溃疡

二、A₂ 型选择题 (55 ~ 114 题)

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案。

55. 患者，男，60 岁。因门静脉高压症导致食管、胃底静脉曲张破裂出血，现症见面色灰白，精神恍惚，汗出身冷，口燥咽干，肌肤干皱，四肢厥冷，尿少，舌淡无苔，脉细欲绝。除相关西医治疗外，首选的中医治疗方药是

- A. 清营汤加减
- B. 人参养营汤加减
- C. 四味回阳饮加减
- D. 保元汤合固阳汤加减
- E. 独参饮合四逆汤加减

56. 患者，男，3 岁，啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块，平卧时可自行回纳。应首先考虑的诊断是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

57. 患者，女，50 岁，教师，右下肢沉重、酸胀 2 年余，检查可见右下肢浅静脉隆起、迂曲，状如蚯蚓。为确诊，

应做的检查是

- A. 多普勒肢体血流图
- B. 静脉造影
- C. 红外热像仪测定
- D. 肢体光电容积描记
- E. 血液流变学检查

58. 患者，男性，63 岁，颈部出现片状稍隆起的紫红色浸润区，质地坚韧，界限不清，中央形成多个脓栓，应首先考虑的诊断是

- A. 疖
- B. 痈
- C. 疽
- D. 丹毒
- E. 痰核

59. 患者，男，60 岁。右足划伤 3 天，局部沉重疼痛，持续加重，迅速向上蔓延，伤口大量液体渗出并可见气泡冒出。应首选的抗生素是

- A. 庆大霉素
- B. 青霉素
- C. 妥布霉素
- D. 氧氟沙星
- E. 甲硝唑

60. 患者，男，24 岁，头部被木棒击伤昏迷半小时后转醒，左颞骨线性骨折，3 小时后转入昏迷状态，出现瞳孔散大，应首先考虑的诊断是

- A. 脑震荡
- B. 脑挫伤
- C. 原发性脑干损伤
- D. 硬膜外血肿
- E. 继发性脑干损伤

61. 患者，24 岁，不慎跌入 80℃ 热水池内，池水淹没下半身超过臀部，初步估计烫伤面积为

- A. 30%~34%
- B. 35%~39%
- C. 40%~44%
- D. 45%~50%

E. >60%

62. 患者，女，31岁，甲状腺弥漫性肿大，可触及震颤，伴有杂音，核素扫描为热结节，吸碘率增高，应首先考虑的诊断为

- A. 甲状腺瘤
- B. 结节性甲状腺肿
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲状腺癌
- E. 甲状腺功能亢进症

63. 患者，女，38岁，颈前肿痛，胸闷不适，口苦咽干，急躁易怒，心悸多汗；苔薄黄，脉弦数。其中医证型是

- A. 气滞痰凝
- B. 火毒炽盛
- C. 肝郁胃热
- D. 胃火炽盛
- E. 肝郁痰结

64. 患者，女，75岁。长期饮食困难，近于梗阻，呕恶气逆，形体枯羸，目不识人，气短乏力，语声低微，面色苍白，大便难下，舌质暗绛，舌体瘦小，无苔，脉沉细无力。应首先考虑的诊断为

- A. 肺癌
- B. 肝癌
- C. 胃癌
- D. 肺结核
- E. 食管癌

65. 患者，女性，36岁，乳房内多发性肿块，伴疼痛，月经后有所缩小、变软，应首先考虑的诊断为

- A. 乳腺增生病
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 积乳囊肿
- E. 急性乳腺炎

66. 患者，女，35岁，乳房胀痛半年，经前加重，经后痛减；伴情绪抑郁，

心烦易怒，失眠多梦，胸胁胀满；舌质淡红苔薄白，脉细涩。其中医证型是

- A. 痰瘀凝结
- B. 肝郁气滞
- C. 气滞血瘀
- D. 冲任失调
- E. 毒热蕴结

67. 患者，男，45岁，消化性溃疡反复发作20年，近1个月来出现食欲减退，上腹部饱胀及沉重感，呕吐频繁，呕吐量大且含有酸臭味的宿食，呕吐物中不含胆汁，吐后上腹饱胀减轻，腹痛消失，明显消瘦，可见到上腹部的胃蠕动波、胃型、胃振水音，应首先考虑的诊断为

- A. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- B. 肠梗阻
- C. 贲门梗阻
- D. 弥漫性腹膜炎
- E. 食管癌

68. 患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，发生大量呕血，考虑食道胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

- A. 三腔二囊管压迫
- B. 胃内注射或口服去甲肾上腺素
- C. 胃管注入冰水
- D. 使用生长抑素
- E. 内镜治疗

69. 患者，女，35岁，反复右上腹阵发性绞痛，痛连右肩背1个月，B超示胆囊大小正常，胆汁回声正常，胆总管轻度扩张，下端见直径0.5cm结石1枚，胰腺未见异常。应首选的治疗方法是

- A. 排石疗法
- B. 溶石疗法
- C. 碎石疗法
- D. 取石疗法
- E. 外科手术

70. 患者，男，55岁，胁下积块，腹大如鼓，黄疸日深，纳呆乏力，小便短赤，腹水肢肿。应首先考虑的中医诊断是

- A. 噎膈
- B. 鼓胀
- C. 伏梁
- D. 肺积
- E. 反胃

71. 患者，男，80岁，出现便血，伴贫血、腹痛、右下腹肿块1个月，无发热，伴明显消瘦、腹胀，应首先考虑的诊断是

- A. 慢性阑尾炎
- B. 阑尾类癌
- C. 结肠癌
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 肠结核

72. 患者，女，36岁，肾绞痛突然发作，尿液检查可见镜下血尿。应首先考虑的诊断是

- A. 肾结石
- B. 膀胱结石
- C. 急性睾丸炎
- D. 尿道结石
- E. 肾结核

73. 患者，男，40岁，腰痛，少腹急满，小便频数短赤，伴有涩痛难忍，淋漓不爽，口干欲饮；舌红，苔黄腻，脉弦细。治疗应首选的方剂是

- A. 石韦散
- B. 八正散
- C. 济生肾气丸
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 仙方活命饮

74. 患者，男，45岁，小便不畅，尿液点滴而下小腹拘急胀痛；舌质紫暗有瘀斑，脉涩。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 石韦散

- C. 八正散
- D. 沉香散
- E. 天台乌药散

75. 初产妇，孕40周临产，规则宫缩12小时，破膜10小时，肛查：宫口开大5cm，先露+0.5，首先应考虑的诊断是

- A. 胎膜早破
- B. 正常潜伏期
- C. 正常活跃期
- D. 潜伏期延长
- E. 第一产程延长

76. 患者，女，29岁。妊娠53天，呕吐剧烈，吐出物带血丝，消瘦明显，嘴唇燥裂，口渴，大便干燥，皮肤弹性差，精神萎靡，舌红，苔花剥，脉细滑无力。其中医证型是

- A. 脾胃虚弱型
- B. 肝胃不和型
- C. 痰湿阻滞型
- D. 气阴两亏型
- E. 阴虚火旺型

77. 患者，女，24岁。停经67天，腹痛伴阴道流血3天。妇科检查：宫口见有胚胎样组织物堵塞，子宫孕9周大小。首先应考虑的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 过期流产
- E. 流产感染

78. 临产妇，28岁，G₁P₀足月临产12小时，宫口开大6cm，产程缓慢，胎心140次/分，胎头矢状缝与坐骨棘间径一致，枕骨在母体右侧S+1。首先应考虑的诊断是

- A. 右枕前位
- B. 持续性右枕横位
- C. 持续性左枕横位
- D. 持续性右枕后位

E. 持续性左枕后位

79. 患者，女，27岁。产后2周，高热汗出，烦躁，斑疹隐隐，舌红绛，苔黄燥，脉弦细而数。化验血常规：白细胞： $20 \times 10^9/L$ 。治疗应首选的方剂是

- A. 解毒活血汤
- B. 荆防败毒散
- C. 紫雪丹
- D. 安宫牛黄丸
- E. 清营汤

80. 患者，女，28岁。外阴一侧红肿疼痛，结块拒按，破溃溢脓，恶寒发热，口渴咽干，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。其诊断为

- A. 滴虫性阴道炎
- B. 外阴炎
- C. 前庭大腺炎
- D. 细菌性阴道病
- E. 阴道外伤

81. 患者，女，35岁，G3P2。流产后月经9~10天/28~30天，量中等，痛经(-)，基础体温为双相但下降缓慢。首先应考虑的诊断是

- A. 无排卵性异常子宫出血
- B. 黄体功能不全
- C. 排卵期出血
- D. 子宫内膜不规则脱落
- E. 正常月经

82. 患者，女，23岁，未婚。月经不定期、经期延长，量时多时少已3年余，肛检外阴发育正常，宫体较小。前次月经约行20天方净。本次又值经期，已4天，量多如注，色鲜红，质稍稠，腰膝酸软，头晕耳鸣，心烦口干，舌红，少苔，脉细数。应首选的方剂是

- A. 固本止崩汤
- B. 左归丸合二至丸
- C. 清热固经汤
- D. 固经丸

E. 保阴煎

83. 患者，女，28岁，G₃P₁。以往月经尚规律，量中等，近2年月经开始渐渐后错，量少，现已半年余月经未潮，尿妊娠试验(-)，小腹隐隐作痛，喜温喜按，舌淡，苔薄白，脉沉细。首先应考虑的诊断是

- A. 月经后期
- B. 月经过少
- C. 原发性闭经
- D. 继发性闭经
- E. Turner 综合征

84. 患者，女，16岁。1年来每逢月经来潮时下腹冷痛，拒按，得热痛减，经血量少，色暗有块，畏寒，舌淡暗，苔白腻，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 理冲汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 血府逐瘀汤
- E. 艾附暖宫丸

85. 患者，女，38岁。月经数月不行，形体肥胖，胸脘满闷，呕恶痰多，带下量多，舌苔白腻，脉滑，尿妊娠试验(-)。其中医治法是

- A. 燥湿祛痰，行气通经
- B. 健脾祛湿，活血调经
- C. 燥湿祛痰，理气活血
- D. 燥湿健脾，活血通经
- E. 燥湿化痰，活血通经

86. 患者，女，40岁。月经规律，性生活后阴道有少量流血2个月，无腹痛等其他不适症状。首先应考虑的诊断是

- A. 子宫内膜癌
- B. 宫颈癌
- C. 卵巢肿瘤
- D. 输卵管癌
- E. 子宫肌瘤

87. 患者，女，35岁。近半年感下腹部有一包块，固定不移，胀痛拒按，面色晦暗，舌边有瘀点，脉沉涩。B超示：子宫肌瘤。治疗应首选的方剂是

- A. 银甲丸
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 失笑散
- D. 温经汤
- E. 桂枝茯苓丸

88. 患者，女，41岁，G₂P₁。诊断为葡萄胎，子宫小于14周大小。应首选的治疗措施是

- A. 清除宫腔内容物
- B. 切除卵巢
- C. 切除子宫
- D. 化疗
- E. 先化疗再清宫

89. 患者，女，30岁，G₂P₀。痛经5年。妇科检查：阴道后穹隆可扪及触痛结节，宫体后壁有多个小结节，右附件可扪及5cm×4cm×4cm大小囊肿，欠活动，压痛，诊断为子宫内膜异位症。下列的处理错误的是

- A. 达那唑治疗
- B. 孕三烯酮治疗
- C. 子宫及右附件切除术
- D. 雷诺德治疗
- E. 腹腔镜手术

90. 患者，女，38岁。痛经6年，盆腔检查扪及与子宫相连的囊性包块或盆腔内有触痛性结节，每于经前小腹冷痛，经血色暗、有块，形寒肢冷，面色苍白，舌紫暗，苔薄白，脉沉紧。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 艾附暖宫丸

91. 患者，女，62岁。近2年劳动、行走或咳嗽时阴道内有物脱出，小腹坠痛，四肢无力，少气懒言，面色无华，小便频数，舌淡，苔薄，脉虚细。诊断为轻度子宫脱垂，治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 大补元煎
- D. 八珍汤
- E. 举元煎

92. 患者，女，31岁。结婚3年未孕，月经50~60天一行，量少色淡，腰痛如折，小便频数，舌淡，苔白滑，脉沉迟无力。首先应考虑的诊断是

- A. 肾阳虚型无子
- B. 肾气虚型无子
- C. 肾阴虚型无子
- D. 肾阳虚型断续
- E. 肾气虚型断续

93. 患者，女，29岁。结婚4年未孕，月经周期不规律，经来腹痛，月经量少，色暗有小血块，经前乳胀，烦躁易怒，舌红，苔白，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 启宫丸
- B. 养精种玉汤
- C. 开郁种玉汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 逍遥散

94. 患者，女，27岁。人工流产术后4天，出血量多，或淋漓不净，色淡红或稍暗，小腹坠胀，或伴腰痛，腰酸下坠，神疲乏力，纳食欠佳，夜寐欠佳；舌淡红，脉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 五味消毒饮合失笑散
- B. 当归黄芪汤
- C. 清经散
- D. 八珍汤
- E. 补中益气汤

95. 足月男婴，出生后 6 小时即出现身黄、目黄，颜色鲜明，哭闹不安、呕吐、尿黄，舌质红，苔黄，指纹紫滞。

治疗首选方剂是

- A. 茵陈理中汤加减
- B. 茵陈蒿汤加减
- C. 黄连解毒汤加减
- D. 羚角钩藤汤加减
- E. 膈下逐瘀汤加减

96. 患儿，1 岁。发热 4 天，咳嗽气急，心率增快，双肺底部湿啰音固定。症见频咳不已，喉间痰鸣，声如拽锯，气急鼻扇，面赤口渴，苔薄黄，脉滑数。其诊断是

- A. 支气管肺炎，痰热闭肺证
- B. 支气管肺炎，风热闭肺证
- C. 支气管肺炎，心阳虚衰证
- D. 大叶性肺炎，风热闭肺证
- E. 支气管肺炎，阴虚肺热证

97. 患儿，3 岁。咳嗽 3 天，先为干咳，渐有黏痰，双肺听诊呼吸音粗，可闻干啰音，血象正常。其可能的诊断是

- A. 支气管肺炎
- B. 急性喉炎
- C. 急性支气管炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 支气管哮喘

98. 患儿，着凉后述胸闷气短，乏力，低热，恶心呕吐，心率快，心音低钝，心肌酶升高，心电图示 ST 段抬高，低电压，下列处置方法错误的是

- A. 加强体育锻炼，增加运动量
- B. 避免情绪波动
- C. 安静卧床
- D. 易消化富营养饮食
- E. 营养心肌，改善心肌代谢，稳定心功能

99. 患儿，9 个月。腹泻时曾服用抗生素 1 周，现症见满口白屑，状如雪花。应首先考虑的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 乳垢
- C. 正常
- D. 鹅口疮
- E. 麻疹

100. 患儿，1 岁半。发热腹泻半天就诊。泻下稀薄，水分较多，粪色深黄而臭，微见黏液，腹部时觉疼痛，食欲不振，伴泛恶，口渴，小便短黄，肛门灼热发红，舌苔黄腻，其治法是

- A. 消食化积
- B. 清热利湿
- C. 健脾益气
- D. 疏风散寒
- E. 补脾温肾

101. 患儿，3 岁，口腔溃疡 2 天，疼痛拒食、烦躁，流口水，小便黄，大便干。查体：口腔口舌面及舌尖多处溃疡，周围红赤，口臭，舌尖红苔黄，脉滑数。其诊断是

- A. 口疮（心火上炎）
- B. 口疮（虚火上浮）
- C. 口疮（脾胃积热）
- D. 口疮（心肝火旺）
- E. 口疮（肝胃同病）

102. 患儿，6 岁。浮肿 4 天，小便量少色赤，烦热口渴，头身困重，尿蛋白（+），红细胞 20 个/高倍视野，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其首选方剂是

- A. 五苓散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 五味消毒饮
- D. 温胆汤
- E. 麻黄连翘赤小豆汤

103. 患儿，4 岁。反复浮肿 5 个月，面色萎黄，神疲乏力，畏寒肢冷，肢体浮肿，晚间腹胀，纳少便溏。查体：全身浮肿呈凹陷性，舌淡苔白滑，脉沉缓。实验室检查：尿蛋白明显增高，血浆蛋白降低，血清胆固醇

5. 97mmol/L。诊断为肾病综合征，其证型是

- A. 风水相搏
- B. 脾肾阳虚
- C. 肝肾阴虚
- D. 脾虚湿困
- E. 湿热内侵

104. 患儿，5岁。突然出现全身肢体抽搐，伴神志丧失，持续约5分钟，自行缓解。无发热，大便稀溏。查大便常规：未见异常。查脑电图：可见棘、尖慢波，呈爆发现象。有高热惊厥史3次。其诊断是

- A. 疫毒痢
- B. 癫痫
- C. 急惊风
- D. 暑温
- E. 慢惊风

105. 患儿，10岁。经常挤眉眨眼，耸肩摇头，口出秽语，肢体震颤，大便干结，五心烦热，两颧潮红，形体消瘦，舌质红绛，舌苔光剥，脉细数无力。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾散
- B. 大定风珠
- C. 川芎茶调散
- D. 礞石滚痰丸
- E. 千金龙胆汤

106. 患儿，7岁。多动多语，烦躁难宁，兴趣多变，注意力不集中，烦热口苦，舌质红，苔黄腻，脉滑数。其病机是

- A. 阴虚火旺
- B. 肝肾阴虚
- C. 气郁化火
- D. 心脾两虚
- E. 痰火内扰

107. 患儿，2岁。起病急骤，皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶见尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。其首选

方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 桃仁汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 大补阴丸合茜根散
- E. 归脾汤

108. 患儿，7个月。母乳喂养，未加辅食，食欲不振，皮肤黏膜渐苍白，肝肋下3cm，脾肋下1.5cm，血红蛋白70g/L，红细胞 $3.5 \times 10^9/L$ 。其诊断是

- A. 营养性大细胞性贫血
- B. 营养性缺铁性贫血
- C. 营养性感染性贫血
- D. 生理性贫血
- E. 先天性再生障碍性贫血

109. 患儿，女，9岁。口渴多饮，随饮随渴，舌燥咽干，尿频量多，舌尖红，苔薄黄少津，脉数。证属

- A. 肺热津伤
- B. 胃燥津伤
- C. 肾阴亏损
- D. 阴阳两虚
- E. 脾胃虚寒

110. 患儿，2岁。发热7天，壮热，体温 $40^{\circ}C$ ，昼轻夜重，唇干赤裂，烦躁不宁，肌肤斑疹鲜红，手足肿胀潮红，杨梅舌，指纹紫。诊断为皮肤黏膜淋巴结综合征，其病机是

- A. 邪在肺胃
- B. 卫气同病
- C. 气营两燔
- D. 邪在太阳
- E. 邪在少阴

111. 患儿，8岁。四肢关节游走性疼痛2周。现症见：膝及肘关节红肿疼痛，局部灼热，呈游走性，伴发热恶风，汗出不解，口渴欲饮，小便黄赤，大便秘结，舌质红，苔黄厚腻，脉滑数。其首选方剂是

- A. 独活寄生汤

- B. 乌头汤
- C. 大秦芫汤
- D. 宣痹汤
- E. 九味羌活汤

112. 患儿，1岁半。夜间烦吵，多汗半年余，查体：前囟2cm×2cm，方颅，肋串珠明显。血钙磷乘积下降，碱性磷酸酶升高。其诊断是

- A. 佝偻病活动初期
- B. 佝偻病激期
- C. 佝偻病恢复期
- D. 佝偻病后遗症期
- E. 健康儿童

113. 患儿，6岁。腹痛剧烈，以右上腹为主，疼痛时全身冷汗，恶心呕吐，并吐出蛔虫1条。其可能的诊断是

- A. 呕吐
- B. 腹痛
- C. 虫侵证
- D. 蛔厥证
- E. 肠虫证

114. 患儿，7岁。诊断为脓毒性休克。症见高热，烦躁，精神萎靡，神志昏迷，强直抽搐，喉中痰鸣，胸腹灼热，面色苍白，手足厥冷，口渴喜饮，小便短赤，大便秘结，色红，苔黄燥，脉细数。其中医证型是

- A. 阴竭阳脱
- B. 肝肾阴虚
- C. 热毒内闭
- D. 气阴亏竭
- E. 心阳虚衰

三、A₃型选择题（115～132题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设3道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案。

（115～117题共用题干）

患者，女，已婚，26岁。产后2周，症见：恶寒发热，肢体、关节疼痛，屈伸不利，恶风，舌淡，苔薄白，脉浮紧。

115. 根据患者症状，此病的中医证型为

- A. 脾肾阳虚证
- B. 湿热证
- C. 外感证
- D. 血瘀证
- E. 血虚证

116. 其治法宜首选

- A. 温肾健脾，养血润燥
- B. 养血祛风，散寒除湿
- C. 养血活络，行瘀止痛
- D. 养血益气，温经通络
- E. 补益肝肾，养血润燥

117. 治疗应首选的方剂是

- A. 四物汤
- B. 生化汤
- C. 独活寄生汤
- D. 人参养荣汤
- E. 黄芪桂枝五物汤

（118～120题共用题干）

患者，女，31岁，已婚。停经2月余，反复少量阴道流血18天，10天前曾下腹剧痛，现下腹坠胀。妇科盆腔及B超检查：子宫大小正常，右附件包块约7cm×6cm×5cm大小，尿妊娠试验可以(+)。头晕神疲，舌淡黯，苔薄白，脉细滑。

118. 首先考虑的诊断是

- A. 宫外孕为破损型
- B. 宫外孕不稳定型
- C. 宫外孕包块型
- D. 子宫内膜异位症
- E. 右附件炎性包块

119. 中医治法为

- A. 活血祛瘀，杀胚消癥
- B. 益气化瘀，消癥杀胚
- C. 回阳救逆，益气固脱
- D. 活血化瘀，消癥散结
- E. 益气养血，调固冲任

120. 治疗首选

- A. 宫外孕 I 号方加党参、黄芪、紫草、蜈蚣、天花粉
- B. 宫外孕 II 号方加紫草、蜈蚣、水蛭、天花粉
- C. 参附汤合生脉散加黄芪、柴胡、炒白术
- D. 理冲丸加土鳖虫、水蛭、炙鳖甲
- E. 泰山磐石散

(121~123 题共用题干)

患儿，男，3 岁。胃脘胀满，疼痛拒按，暖腐吞酸，呕吐，呕吐物为不消化食物。舌质红，苔厚腻，脉滑。

121. 其诊断是

- A. 胃炎
- B. 腹泻
- C. 消化性溃疡
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠蛔虫症

122. 其证型是

- A. 寒邪犯胃
- B. 乳食积滞
- C. 湿热中阻
- D. 肝气犯胃
- E. 脾胃虚寒

123. 治疗应首选

- A. 香苏散合良附丸加减
- B. 黄连温胆汤加减
- C. 保和丸加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 黄芪建中汤加减

(124~126 题共用题干)

患儿，5 岁。发热一天，颜面，躯干见丘疹及水疱疹。现低热恶寒，鼻塞流

涕，疹色红润，疮浆清亮，点粒稀疏，舌质红，苔薄白，脉浮数。

124. 其病证诊断是

- A. 风疹，邪郁肺卫证
- B. 麻疹，初热期
- C. 幼儿急疹，肺卫蕴热证
- D. 猩红热，毒在气营证
- E. 水痘，邪郁肺卫证

125. 其治法是

- A. 疏风清热，解毒利湿
- B. 清气凉营，化湿解毒
- C. 辛凉解表，清宣肺卫
- D. 疏风透疹，清热解毒
- E. 清气凉营，泻火解毒

126. 治疗应首选方剂是

- A. 解肌透痧汤
- B. 清营汤
- C. 银翘散
- D. 化斑解毒汤
- E. 凉营清气汤

(127~129 题共用题干)

患者，女，29 岁，已婚。孕 8 个月，头晕头痛，耳鸣作响，颜面潮红，心悸怔忡，夜寐多梦，舌红，少苔，脉弦细滑数，血压 150/90mmHg。诊断为妊娠期高血压。

127. 该疾病的基本病理变化为

- A. 过度水钠潴留
- B. 全身小动脉痉挛
- C. 血液浓缩
- D. 凝血功能障碍，慢性 DIC
- E. 染色体异常

128. 其中医治法为

- A. 健脾温肾，行水消肿
- B. 理气行滞，除湿消肿
- C. 滋阴清热，平肝息风
- D. 滋阴养血，平肝潜阳

E. 清热豁痰，息风开窍

129. 首选方药是

A. 杞菊地黄丸

B. 天仙藤散

C. 白术散合五苓散

D. 半夏白术天麻汤加钩藤

E. 牛黄清心丸

(130~132 题共用题干)

患儿，5岁，5天前受凉后出现发热，咳嗽、气促等症状，体温在38.5℃左右。今日病情加重，出现发热烦躁，呼吸困难，气急鼻扇，喉间痰鸣，口唇紫绀，面赤口渴，舌质红，舌苔黄腻，脉象弦滑。查体：肺部听诊闻及管状呼吸音。

130. 根据患儿情况西医初步诊断为

A. 急性上呼吸道感染

B. 支气管肺炎

C. 支原体肺炎

D. 反复呼吸道感染

E. 哮喘

131. 其中医证型为

A. 风热闭肺证

B. 痰热闭肺证

C. 毒热闭肺证

D. 阴虚肺热证

E. 肺脾气虚证

132. 其首选方剂为

A. 华盖散

B. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤

C. 银翘散合麻杏石甘汤

D. 沙参麦冬汤

E. 黄连解毒汤合麻杏石甘汤

四、B₁型选择题（133~150题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案，请从中选择

一个与问题最密切的答案。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(133~134 题共用备选答案)

A. 消化液的急性丢失，如大量呕吐、腹泻、肠痿等

B. 胃肠道消化液长期持续丧失，如反复呕吐、腹泻、胆胰痿、胃肠道长期吸引或慢性肠梗阻，钠随消化液大量丧失，补液不足或仅补充水分

C. 急、慢性肾衰竭伴少尿或无尿

D. 维生素D缺乏、甲状旁腺功能减退、慢性肾衰竭、肠痿、慢性腹泻和小肠吸收不良综合征

E. 甲状旁腺功能亢进

133. 属于高钾血症病因的是

134. 属于等渗性缺水病因的是

(135~136 题共用备选答案)

A. 鳞癌

B. 黏液癌

C. 小细胞癌

D. 腺癌

E. 大细胞癌

135. 中央型肺癌的病理类型多见

136. 周围型肺癌的病理类型多见

(137~138 题共用备选答案)

A. 桃仁承气汤

B. 复方大承气汤

C. 温脾汤

D. 甘遂通结汤

E. 驱蛔承气汤

137. 腹胀、腹痛，痞满拒按，恶心呕吐，无排气排便，发热口渴，小便黄赤，舌红苔黄燥，脉洪数。应首选

138. 腹痛阵作，胀满拒按，恶心呕吐，无排气排便，舌淡红，苔薄白，脉弦或涩。应首选

(139~140 题共用备选答案)

A. 龙胆泻肝汤

B. 滋阴除湿汤

- C. 八正散
- D. 暖肝煎
- E. 济生肾气丸

139. 治疗睾丸炎湿热下注证应首选
140. 治疗睾丸炎寒湿凝滞证应首选

(141~142 题共用备选答案)

- A. 使阴道上皮细胞增生角化
 - B. 使阴道上皮细胞脱落加快
 - C. 促进阴毛和腋毛的生长
 - D. 直接促进窦前卵泡及窦状卵泡的生长发育
 - E. 抑制垂体 FSH 分泌
141. 孕激素的作用是
142. 促卵泡素的作用是

(143~144 题共用备选答案)

- A. 肝肾阴虚型
 - B. 脾肾阳虚型
 - C. 湿热下注型
 - D. 湿虫滋生型
 - E. 津亏血少型
143. 阴部干涩，灼热瘙痒，五心烦热，舌红苔少，脉细数。其中医证型是
144. 阴部瘙痒，带下量多，色黄如脓，稠黏臭秽，舌苔黄腻，脉弦数。其中医证型是

(145~146 题共用备选答案)

- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7
 - E. 8
145. 正常小儿会爬行的月龄是
146. 正常小儿会独坐的月龄是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 智力及动作发育落后有倒退现象
- B. 兴奋、多动
- C. 注意力不集中，记忆力减退
- D. 腱反射减弱
- E. 感觉异常

(149~150 题共用备选答案)

- A. 清热泻脾汤
 - B. 清胃散
 - C. 参苓白术散
 - D. 黄连解毒汤
 - E. 知柏地黄丸
149. 鹅口疮心脾积热证，应首选的方剂是
150. 鹅口疮虚火上炎证，应首选的方剂是