

终极押题卷中西医助理第一单元

A1/A2 型选择题

0. 中医理论体系的主要特点是

- A. 整体观念和辨证论治
- B. 异病同治和同病异治
- C. 辨病与辨证相结合
- D. 急则治标、缓则治本
- E. 以上都不是

答案:A

解析:中医学具有完整的理论体系,在这一独特理论体系中,有两个主要特点:一是整体观念,二是辨证论治。

标签:

精华

简单

记忆

1. 六淫致病,具有动摇不定特点的邪气是()

- A. 热邪
- B. 暑邪
- C. 寒邪
- D. 燥邪
- E. 风邪

答案:E

解析:风善行而数变,动摇不定。

标签:

2. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是()

- A. 发热
- B. 伤津
- C. 纳少
- D. 动血
- E. 生风

答案:B

解析:暑、火、燥均可伤津。

标签:

3. 过度悲伤可以导致的是

- A. 气上
- B. 气下

- C. 气缓
- D. 气结
- E. 气消

答案:E

解析:《素问·举痛论》说:“百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下.....惊则气乱.....思则气结。”所以要选E。记忆题。

标签:

4. 寒邪的性质和致病特点是()

- A. 凝滞
- B. 数变
- C. 黏滞
- D. 重着
- E. 升散

答案:A

解析:寒性凝滞。

标签:

简单

5. “风性善行而数变”的“善行”,是指风邪致病

- A. 易行遍全身而致各脏腑同时发病
- B. 善于向上向外
- C. 善于迫血妄行
- D. 病位行无定处
- E. 善于运行气血

答案:D

解析:“善行”是指风邪具有易行而无定处的性质,故其致病有病位游移,行无定处的特性。

标签:

精华

简单

记忆

6. 决定病证虚实变化的主要病机是()

- A. 阴阳之气的盛衰
- B. 气血的盛衰
- C. 脏腑功能的盛衰
- D. 正邪的盛衰
- E. 邪气的有无

答案:D

解析:《素问 通评虚实论》中:“邪气盛则实,精气夺则虚”。邪正盛衰与虚

实变化有关。决定病证虚实变化的主要病机是正邪的盛衰，实是指邪气的亢盛，以邪气盛为主要病理变化，虚是指正气不足，以正气虚为主要病理变化，因此选则D。

标签:

精华

记忆

中等

7. 阴偏衰的主要病机是()

- A. 阳热盛极，格阴于外
- B. 阳气亢盛，耗伤精血津液
- C. 阳气亢盛，阴气相对不足
- D. 人体阴气不足，机能虚性亢奋
- E. 阴液亏损，阳气化生亦不足

答案:D

解析:阴偏衰，即阴虚，指机体阴气不足，精、血、津液等阴液亏少，以及由于阴虚不能制阳，导致阳气相对亢盛，机能虚性亢奋的病理状态。

标签:

精华

简单

记忆

8. 气逆最常发作的脏腑是()

- A. 心、胃、肝
- B. 肝、胃、肾
- C. 肺、胃、肾
- D. 肺、胃、肝
- E. 肝、肺、肾

答案:D

解析:气逆表现:(常见肺、胃、肝气逆)。(肺气上逆——咳逆上气。(胃气上逆——恶心、呕吐、呃逆、嗝气。(肝气逆上——头胀痛、面红、目赤、易怒。

标签:

精华

记忆

中等

9. 阴虚风动的常见病因是()

- A. 久病耗血或年老精亏
- B. 产后恶露日久不净
- C. 生血不足或失血过多

- D. 热病后期，阴津亏损
- E. 水不涵木，浮阳不潜

答案:D

解析:肝风四证:肝阳化风指因各种原因使肝肾阴亏,水不涵木,肝阳上亢而化风;热极生风多由高热至极,热灼津液、营血,筋脉失濡,阳热亢盛而化风;阴虚风动多由热病或久病耗伤阴液,筋脉失于濡养,则变生内风;血虚生风多由血化生不足、失血、耗血,使肝血不足,筋脉失濡,血不荣络而化风。

标签:

精华

简单

记忆

10.“虚则补之,实则泻之”所属的治法是

- A. 从治法
- B. 治标法
- C. 逆治法
- D. 反治法
- E. 三因制宜

答案:C

解析:记忆题。

标签:

11.肺癆咳嗽,咳嗽不甚时,应采取的主要治疗原则是()

- A. 治本
- B. 标本兼治
- C. 治标
- D. 先治本后治标
- E. 先治标后治本

答案:A

解析:缓则治本适用范围:多用在病情缓和、病势迁延,暂无急重病的情况下,着眼于疾病本质的治疗。举例:肺癆咳嗽,其本多为肺肾阴虚,故治疗应滋养肺肾之阴以治其本。又如在急性热病中后期,则应养胃滋肾等;气虚自汗,应补气以治其本。(临床治疗肺癆咳嗽患者,宜选用的治则是——缓则治本)。

标签:

精华

应用

中等

12.属于既病防变的是()

- A. 调摄精神
- B. 锻炼身体
- C. 起居有节
- D. 药物预防
- E. 早期诊治

答案:E

解析:治未病包括未病先防和既病防变两个方面的内容。未病先防旨在提高抗病能力,防止病邪侵袭。A、B、C、D 属未病先防。既病防变是指在疾病发生以后,应早期诊断、早期治疗,以防止疾病的发展与传变。

标签:

精华

简单

记忆

13. 逆证候性质而治的治疗法则是

- A. 正治法
- B. 反治法
- C. 从治法
- D. 反佐法
- E. 以上都不是

答案:A

解析:正治(治病求本)含义:是指治疗用药的性质、作用趋向逆病证表象而治的一种常用治则。如热证用寒药,故又称“逆治”。

标签:

简单

记忆

14. “见微知著”主要是指

- A. 从轻微的表现预测严重的病变
- B. 从局部的微小变化测知整体情况
- C. 从隐蔽的症状测知明显的症状
- D. 从易忽略的体征中求得病情
- E. 运用特殊诊法诊断出病证

答案:B

解析:略

标签:

15. 神昏谵语,躁扰不宁,循衣摸床,撮空理线,属于

- A. 精亏神衰
- B. 邪盛神乱
- C. 假神

D. 少神

E. 神乱

答案:B

解析:略

标签:

16. 小儿食指络脉紫黑的临床意义是

A. 实寒证

B. 实热证

C. 虚热证

D. 血虚证

E. 血络闭郁

答案:E

解析:略

标签:

17. 舌苔淡黄而湿润的临床意义是

A. 邪热盛

B. 湿热盛

C. 食积化热

D. 痰饮化热

E. 阳虚水湿

答案:D

解析:略

标签:

18. 苔少无津的临床意义是

A. 寒湿证

B. 里热证

C. 表寒证

D. 虚寒证

E. 阴虚证

答案:E

解析:略

标签:

19. 具有沉细无力特征的脉象是

A. 濡脉

B. 细脉

C. 弱脉

D. 微脉

E. 虚脉

答案:C

解析:略

标签:

20. 弱脉的脉象特征是

- A. 脉极软而沉细
- B. 脉来绷急
- C. 脉细如线
- D. 来盛去衰
- E. 迟缓无为

答案:A

解析:略

标签:

21. 患者善悲喜哭, 精神沮丧, 面色惨淡, 神疲乏力的临床意义是

- A. 忧伤证
- B. 怒伤证
- C. 思伤证
- D. 悲伤证
- E. 恐伤证

答案:D

解析:略

标签:

22. 下列各项, 不属于痰证临床表现的是

- A. 头晕目眩
- B. 某些部位出现圆滑柔韧的包块
- C. 肢体瘫痪、麻木, 结成癥瘕积聚时可触及肿块
- D. 神昏而喉中痰鸣
- E. 神志错乱而为癫、狂、痴、痫

答案:C

解析:略

标签:

23. 下列各项, 与痰生成有关的是

- A. 元气外脱
- B. 脾的运化功能失常
- C. 冲任不固
- D. 气不摄血
- E. 脏腑组织失养, 机能活动减退

答案:B

解析:略

标签:

24. 血分证的临床表现是

- A. 头痛, 全身不适, 口微渴
- B. 发热, 微恶风寒, 少汗
- C. 咳嗽, 咽喉肿痛
- D. 吐血衄血
- E. 舌边尖红

答案:D

解析:略

标签:

25. 五味是指药物的

- A. 全部味道
- B. 五类基本作用
- C. 最基本的滋味
- D. 五种不同的滋味
- E. 部分味道

答案:C

解析:“五味”就是辛、甘、酸、苦、咸五种味。有些药物具有淡味或涩味,实际上不止五种。但是,五味是最基本的五种滋味,所以仍称为五味。药味的确定,一方面是根据口尝身受的结果,另一方面是根据临床治疗中反映出来的效果。不同的味有不同的作用。味相同的药物,其作用也有相近或共同之处。

标签:

26. 药物寒热、温凉的依据是

- A. 神农氏尝百草的体会
- B. 《素问》:“寒者热之, 热者寒之”
- C. 《本经》:“疗寒以热药, 疗热以寒药”
- D. 药物作用于人体的反应
- E. 口尝的滋味

答案:D

解析:药性的寒、热、温、凉,是药物作用于人体发生的反应归纳出来的。

标签:

简单

记忆

27. 七情配伍中, 可以提高药效的是

- A. 相畏、相杀
- B. 相杀、相使
- C. 相须、相使

- D. 相须、相恶
- E. 相恶、相反

答案:C

解析:相须是指功用相类似的药物,配合应用后可以起到协同作用,加强了药物的疗效。相使是指用一种药物作为主药,配合其他药物来提高主药的功效。故选c。

标签:

简单

记忆

28. 下列各项,不属防风治疗的病证的是()

- A. 风寒湿痹,肢体疼痛
- B. 肝脾不和,腹痛泄泻
- C. 外感风寒,头身疼痛
- D. 湿热痹证,痲厥抽搐
- E. 破伤风症,角弓反张

答案:D

解析:

标签:

29. 荆芥的功效是()

- A. 祛风解表,透疹消疮,止血
- B. 发表止痉,消疮止泻
- C. 发表通窍,胜湿止痛,止血
- D. 发表止痛,利水消肿
- E. 消疮止泻,透疹止血

答案:A

解析:记忆题。

标签:

简单

30. 上以清肺,中以凉胃,下泻肾火的药物是()

- A. 栀子
- B. 知母
- C. 黄柏
- D. 地骨皮
- E. 生地黄

答案:B

解析:

标签:

31. 孕妇忌用的药物是()

- A. 川乌
- B. 淡竹叶
- C. 夏枯草
- D. 密蒙花
- E. 芦根

答案:A

解析:

标签:

记忆

中等

32. 具有软坚作用的泻下药是

- A. 芒硝
- B. 巴豆
- C. 大黄
- D. 牵牛子
- E. 火麻仁

答案:A

解析:大黄功能泻下攻积, 清热泻火, 凉血解毒。芒硝功能泻下, 软坚, 清热。巴豆功能泻下冷积, 逐水退肿, 祛痰利咽。牵牛子功能泻下, 逐水, 去积, 杀虫。火麻仁可润肠通便。

标签:

简单

记忆

33. 关于芳香化湿药的论述, 以下哪项是错的()

- A. 多辛温, 归脾胃经
- B. 入汤剂多宜后下
- C. 多具利小便作用
- D. 多用治湿阻中焦
- E. 易耗气伤阴

答案:C

解析:凡是气味芳香, 具有化湿运脾作用的药物, 称为芳香化湿药。芳香化湿药具有舒畅气机. 宣化湿浊. 健脾醒胃等功效, 主要用于湿阻中焦证, 此外, 湿温. 暑湿等证, 并无利小便作用。

标签:

精华

记忆

应用

中等

34. 下述各类药物中不属于佐药范畴的是()

- A. 配合君臣药加强治疗作用的药物
- B. 引导诸药至病所的药物
- C. 用以消除或减低君臣药毒性的药物
- D. 用以制约君臣药峻烈之性的药物
- E. 针对次要兼证、兼病或某一症状发挥治疗作用的药物

答案:B

解析:佐药分为:佐助药、佐制药、反佐药;引经药为使药

标签:

35. 归脾汤和补中益气汤两方均具有的作用是()

- A. 养心安神
- B. 补脾养心
- C. 升阳举陷
- D. 益气养血
- E. 益气退热

答案:D

解析:本题考查归脾汤和补中益气汤的主治。归脾汤的主治为益气补血,健脾养心;补中益气汤补中益气,升阳举陷,又兼补血。所以两方共有的用作用是养气益血。

标签:

精华

记忆

中等

36. 咳血方主治证候的病机是

- A. 痰阻肺络
- B. 虚火犯肺
- C. 肝火犯肺
- D. 肺络瘀阻
- E. 风热袭肺

答案:C

解析:略

标签:

37. 败毒散中配伍少量人参的主要用意是()

- A. 补脾益肺,培土生金
- B. 大补肺脾,以复正气
- C. 益气生津,以资汗源
- D. 扶助正气,鼓邪外出
- E. 补益中气,以扶正气

答案:D

解析:本题考查败毒散的方解。败毒散中人参扶助正气,鼓邪外出,不可过用人参,以防恋邪深入。

标签:

理解

精华

中等

38. 能宣畅气机,清利湿热的方剂是

- A. 五苓散
- B. 八正散
- C. 三仁汤
- D. 平胃散
- E. 二妙散

答案:C

解析:略

标签:

39. 四逆汤和理中丸两方组成中均含有的药物是()

- A. 人参
- B. 桂枝
- C. 附子
- D. 干姜
- E. 白术

答案:D

解析:本题考查四逆汤和理中丸的方剂组成。四逆汤包含附子(制)、干姜、炙甘草;理中丸包含人参、干姜、炙甘草、白术。

标签:

简单

记忆

40. 大黄在大黄牡丹汤中的配伍意义是()

- A. 清泻瘀热,分利二便
- B. 荡涤肠胃,泄热泻结
- C. 清热泻火,导热下行
- D. 泻热逐瘀,涤肠除湿
- E. 通肠泄热,以下代清

答案:D

解析:本题考查大黄牡丹汤的方解。大黄牡丹汤中大黄泻火逐瘀,通便解毒。

标签:

记忆

中等

41. 大承气汤用治热结旁流，体现的治法是

- A. 热因热用
- B. 寒因寒用
- C. 通因通用
- D. 塞因塞用
- E. 寒因热用

答案:C

解析:热结旁流治以大承气汤，是因“旁流”为现象，燥屎坚结才是本质，故用峻下，使热结得去，“旁流”可止，乃属“通因通用”之法。

标签:

精华

记忆

中等

42. 以轻宣凉燥，理肺化痰为主要功用的方剂是

- A. 养阴清肺汤
- B. 桑杏汤
- C. 杏苏散
- D. 增液汤
- E. 清燥救肺汤

答案:C

解析:本题考查杏苏散的功用。杏苏散的功用是轻宣凉燥，理肺化痰。

标签:

记忆

中等

43. 用俞募配穴法治疗胃病，应选下列哪组穴位

- A. 脾俞、胃俞
- B. 胃俞、太白
- C. 胃俞、足三里
- D. 脾俞、中脘
- E. 胃俞、中脘

答案:E

解析:募穴与背俞穴配合使用为“俞募配穴法”。胃俞为胃经背俞穴，中脘为胃经腹募穴，故选 E。此题考点为俞募配穴法的概念和应用。十二募穴歌：天枢大肠中府肺，关元小肠巨阙心，中脘膀胱京门肾，日月胆肝期门寻，脾募章门胃中院，气化三焦石门针，心包募穴何处取，胸前腹中觅浅深。

标签:

44. 按十二经脉的流注次序，肝经向下流注的经脉是

- A. 膀胱经
- B. 胆经
- C. 三焦经
- D. 心经
- E. 肺经

答案:E

解析:十二经脉的流注次序:起于手太阴肺经,接手阳明大肠经,接足阳明胃经,接足太阴脾经,接手少阴心经,接手太阳小肠经,接足太阳膀胱经,接足少阴肾经,接手厥阴心包经,接手少阳三焦经,接足少阳胆经,接足厥阴肝经终止,再流注于手太阴肺经。

标签:

45. 足三阴经在内踝上 8 寸以下的分布规律是()

- A. 少阴在前, 厥阴在中, 太阴在后
- B. 厥阴在前, 少阴在中, 太阴在后
- C. 厥阴在前, 太阴在中, 少阴在后
- D. 太阴在前, 厥阴在中, 少阴在后
- E. 太阴在前, 少阴在中, 厥阴在后

答案:C

解析:记忆题。

标签:

简单

记忆

46. 照海穴在特定穴中属

- A. 八会穴
- B. 俞穴
- C. 络穴
- D. 八脉交会穴
- E. 原穴

答案:D

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

47. 长期咳嗽, 咯白色泡沫痰, 可能是

- A. 支气管哮喘
- B. 肺炎
- C. 支气管扩张

- D. 慢性支气管炎
- E. 肺结核

答案:A

解析:慢性支气管炎,可见白色黏液痰。支气管哮喘,干咳或可见白色泡沫痰。

标签:

48. 下列不属于急腹症的是

- A. 消化性溃疡病
- B. 急性胰腺炎伴黄疸
- C. 胃肠穿孔
- D. 肠梗阻
- E. 实质脏器破裂

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

49. 下列哪项不是干啰音的特征

- A. 吸气和呼气均可闻及,但常吸气最明显
- B. 性质、数量、部位易变
- C. 音调较高
- D. 可以同时有几种不同的干啰音存在
- E. 有时不用听诊器也能听到

答案:A

解析:干啰音:由气流通过狭窄的支气管时发生旋涡,或气流通过有黏稠分泌物的管腔时冲击黏稠分泌物引起的振动所致。可分为鼾音、哨笛音、哮鸣音。干啰音为一种持续时间较长带乐性的呼吸附加音,音调较高。持续时间较长,吸气及呼气时均可闻及,但以呼气时为明显,干啰音的强度和性质易改变,部位易变换,在瞬间数量可明显增减。

标签:

50. 下列各项中,提示左心衰竭的是

- A. 脉搏绝对不齐
- B. 奇脉
- C. 脉搏强而大
- D. 脉搏过缓
- E. 舒张早期奔马律

答案:E

解析:左心衰竭严重者可出现交替脉,心尖区及其内侧可闻及舒张早期奔马律。

标签:

精华

困难

应用

51. 检测肾小球滤过功能最好的指标是

- A. 血清尿素氮测定
- B. 血清肌酐测定
- C. 内生肌酐清除率测定
- D. 酚红排泄率测定
- E. 二氧化碳结合力测定

答案:C

解析:内生肌酐清除率(Ccr)是判断肾小球损害的敏感指标,能较早地反映肾小球滤过功能,当Ccr降低到正常值80%以下时,大部分患者BUN、Cr仍在正常范围。

标签:

简单

记忆

52. 成人血清钠的正常值是

- A. 110~120mmol/L
- B. 121~130mmol/L
- C. 135~145mmol/L
- D. 150~155mmol/L
- E. 156~160mmol/L

答案:C

解析:成人血清钠的正常值是135~145mmol/L。

标签:

简单

记忆

53. 中央型肺癌早期常出现的X线征象是

- A. 局限性肺气肿
- B. 阻塞性肺炎
- C. 黏液嵌塞征
- D. 段或叶的肺不张
- E. 肺门阴影增浓

答案:B

解析:中央型肺癌早期管腔狭窄引起阻塞性肺气肿,但很难发现,多数X线

表现为阻塞性肺炎。肺门阴影增浓为晚期征象。

标签:

应用

中等

54. 哪一项不是 MR1 的优点与特点

- A. 无电离辐射
- B. 多切层多参数成像
- C. 软组织分辨率高
- D. 可显示钙化灶
- E. 无须血管造影剂即可显示血管

答案:D

解析:MR1 优点:①无辐射损伤;②软组织分辨力高;③多参数成像提供更多信息,有利于病变的显示及定性;④无骨伪影,不易漏诊;⑤无需对比剂可进行心脏和大血管成像,可测量流速和流量;⑥多方位直接成像,有利于解剖结构和病变的显示。

标签:

精华

简单

记忆

55. 甲类传染病的法定传染病报告时间,在城镇应于发现后

- A. 2 小时内
- B. 4 小时内
- C. 8 小时内
- D. 10 小时内
- E. 12 小时内

答案:A

解析:甲类传染病的法定传染病报告时间,在城镇发现后 2 小时内报告。

标签:

56. 对于传播途径的描述,下列哪项是错误的

- A. 传播传染病的节肢动物是中间宿主
- B. 传染途径既可是单一因素,也可是外界多种因素组成
- C. 手、玩具既可传播消化道传染病,也可传播呼吸道传染病
- D. 血液、血制品是乙型肝炎、丙型肝炎等的最主要传播途径
- E. 破伤风通过未经严格消毒的刀、剪传播,而污染土壤时不会造成传播

答案:E

解析:实记题。

标签:

精华

应用

中等

57. 有关乙脑临床分型，下列正确的是

- A. 轻型、普通型、危重型
- B. 不典型、典型、重型
- C. 轻型、中型、重型
- D. 不典型、典型、暴发型
- E. 轻型、普通型、重型、暴发型

答案:E

解析:乙脑临床分型:轻型, 普通型, 重型, 极重型(暴发型)

标签:

58. 流行性出血热刚进入低血压休克期的主要处理措施是

- A. 补充血容量
- B. 纠正酸中毒
- C. 使用血管活性药
- D. 使用强心利尿剂或激素
- E. 纠正 DIC

答案:A

解析:进入低血压休克期后宜早期、快速和适量补充血容量, 争取 4 小时内血压稳定。

标签:

精华

应用

中等

59. 霍乱弧菌的主要致病物质是

- A. 霍乱内毒素
- B. 霍乱肠毒素
- C. 腺苷酸环化酶
- D. 透明质酸酶
- E. 蛋白水解酶

答案:B

解析:略

标签:

记忆

60. 地方性斑疹伤寒和流行性斑疹伤寒最重要的鉴别诊断为

- A. 临床表现轻重不同
- B. 发病季节不同
- C. 病死率不一

D. 外斐反应

E. 豚鼠阴囊肿胀试验

答案:E

解析:解析: 流行性斑疹伤寒多见于冬春季, 地方性斑疹伤寒多见夏秋季。一般起病较急, 脉搏快, 多有明显头痛。第 5~6 病日出现皮疹, 数量多, 且可有出血性皮疹。外斐反应阳性。治疗后退热快。豚鼠阴囊肿胀试验为主要鉴别要点。

标签:

记忆

中等

61. 下列不适合皮肤消毒的是

A. 乙醇

B. 戊二醛

C. 碘伏

D. 氯己定

E. 过氧化氢

答案:B

解析:戊二醛对皮肤有刺激性。

标签:

简单

应用

62. 下列哪项不属医院感染

A. 无明显潜伏期的感染, 在入院 48 小时后发生的感染

B. 本次感染直接与上次住院有关

C. 有明确潜伏期的感染, 自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染

D. 新生儿经产道时获得的感染

E. 肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹

答案:C

解析:下列情况属于医院感染: ①无明显潜伏期的感染, 规定在 48 小时后发生的感染为医院感染; 有明确潜伏期者, 则以自入院时起超过该平均(或常见)潜伏期的感染; ②本次感染直接与上次住院有关; ③在原有感染基础上出现其他部位新的感染(除外脓毒血症迁徙灶), 或在原感染已知病原体基础上又分离出新的病原体(排除污染和原来的混合感染)的感染; ④新生儿经产道时获得的感染; ⑤由于诊疗措施激活的潜在性感染, 如疱疹病毒、结核杆菌等的感染。

标签:

精华

简单

记忆

63. 卫生行政法规是指

- A. 国务院卫生行政部门依法制定的行政法规文件
- B. 国务院依据法律制定颁布卫生工作规范性文件
- C. 国务院各部委制定的解决卫生问题的行政法规文件
- D. 国家中医药管理局依法制定的行政法规文件
- E. 省级卫生部门颁布的卫生行政规范性文件

答案:B

解析:实记题。

标签:

精华

简单

记忆

64. 已通过执业医师考试但未经注册取得执业证书的

- A. 不得从事医师执业活动
- B. 可在预防机构从事医师执业活动
- C. 可在保健机构从事医师执业活动
- D. 可在执业医师指导下, 在预防、保健机构, 从事医师执业活动
- E. 可在执业医师指导下从事医师执业活动

答案:A

解析:《中华人民共和国执业医师法》第十四条规定, 医师经注册后, 可以在医疗、预防、保健机构中按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业, 从事相应的医疗、预防、保健业务。未经医师注册取得执业证书, 不得从事医师执业活动。

标签:

简单

记忆

65. 影响医患关系的因素不包括

- A. 医师的道德修养
- B. 患者对医院的过分依赖
- C. 医师的服务态度和责任
- D. 患者对医务人员的不信任
- E. 医院管理的缺陷

答案:B

解析:影响医患关系的因素包括:(1)医方因素:①医务人员对医患沟通的重要性认识不够;②医务人员人文素养、沟通技巧的缺乏;③医务人员的业务知识水平不高;④不良医德医风、医疗机构形象的影响;⑤医学的特殊性;⑥医疗机构管理层缺乏职业化:(2)患方因素:①患方的健康意识与维权

意识不断增强；②患方对医疗工作的特殊性缺乏应有的认同。

标签：

66. 下列哪项不属于全国突发事件应急预案的主要内容

- A. 突发事件的监测与预警
- B. 突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度
- C. 突发事件应急处理技术和监测机构及其任务
- D. 突发事件应急知识的专门教育
- E. 突发事件应急处理专业队伍的建设和培训

答案:D

解析:全国突发事件应急预案的主要内容包括:①突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责;②突发事件的监测与预警;③突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度;④突发事件应急处理技术和监测机构及其任务;⑤突发事件的分级和应急处理工作方案;⑥突发事件预防、现场控制,应急设施、设备、救治药品和医疗器械以及其他物资和技术的储备与调度;⑦突发事件应急处理专业队伍的建设和培训。

标签:

精华

简单

记忆

67. 医师在执业活动中除正当治疗外,不得使用

- A. 保健药品
- B. 消毒药剂
- C. 有禁忌证的药品
- D. 副作用大的药品
- E. 麻醉药品

答案:E

解析:使用麻醉药品的医务人员须有医师以上专业技术职务并经考核能正确使用麻醉药品。进行计划生育手术的医务人员经考核能正确使用麻醉药品的,在进行手术期间有麻醉药品处方权。

标签:

精华

简单

记忆

68. 未经以下哪项程序,不得对患者实行实验性临床医疗

- A. 经医院批准
- B. 征得本人同意
- C. 征得患者本人或者其家属同意
- D. 经医院批准并征得患者本人或者其家属同意

E. 经医院批准或者征得患者本人及家属同意

答案:D

解析:《中华人民共和国执业医师法》第二十六条规定,医师进行实验性临床医疗,应当经医院批准并征得患者本人或者其家属同意。

标签:

简单

记忆

69. 副作用是指

A. 与治疗目的无关的作用

B. 用药量过大或用药时间过久引起的

C. 用药后给患者带来的不舒适的反应

D. 停药后,残存药物引起的反应

E. 在治疗剂量出现与治疗目的无关的作用

答案:E

解析:知识点记忆。

标签:

70. 代表药物安全性的指标是

A. 治疗指数

B. 半数有效量

C. 半数致死量

D. 最小致死量

E. 极量

答案:A

解析:知识点记忆。

标签:

71. 常用的吗啡和海洛因所致的药物依赖脱毒治疗时重要的替代药是

A. 哌替啶

B. 美沙酮

C. 二氢埃托啡

D. 安那度

E. 强痛定

答案:B

解析:美沙酮现在临床上用于阿片类物质成瘾的脱毒治疗和维持治疗。

标签:

精华

简单

记忆

72. 长期大剂量应用氯丙嗪引起的主要不良反应是

- A. 心悸、口干
- B. 直立性低血压
- C. 锥体外系反应
- D. 肝功能损害
- E. 粒细胞减少

答案:C

解析:长期大剂量应用氯丙嗪引起的主要不良反应是锥体外系反应。

标签:

精华

简单

记忆

73. 受体激动剂的特点是

- A. 与受体有亲和力, 有较强内在活性
- B. 与受体无亲和力, 有内在活性
- C. 与受体有亲和力, 无内在活性
- D. 与受体无亲和力, 有较强内在活性
- E. 与受体有亲和力, 有弱的内在活性

答案:A

解析:【考点】受体激动剂的概念。(药物与受体结合引起生理效应要具备两个条件:一是药物与受体相结合的能力即亲和力,二是药物能产生效应的能力即内在活性。受体激动剂表现为药物与受体有较强的亲和力,也有较强的内在活性,因此能兴奋受体,产生明显效应如吗啡兴奋阿片受体,引起镇痛和欣快作用。

标签:

精华

简单

记忆

74. 术后腹气胀应选用以下哪种药?

- A. 东莨菪碱
- B. 毒扁豆碱
- C. 阿托品
- D. 新斯的明
- E. 毛果芸香碱

答案:D

解析:【考点】新斯的明的临床应用。(新斯的明是可逆性胆碱酯酶抑制药,可用于骨骼肌进行性肌无力的重症肌无力,可改善肌无力症状。本品还能兴奋胃肠道平滑肌和膀胱逼尿肌促进排气和排尿,可用于手术后腹气胀和尿潴留。此外通过拟胆碱作用使心率减慢,用于阵发性室上性心动过速并可解救

非除极化型肌松药如筒箭毒碱过量中毒。

标签:

精华

简单

应用

75. 广谱抗心律失常药是

- A. 利多卡因
- B. 普萘洛尔
- C. 胺碘酮
- D. 奎尼丁
- E. 普鲁帕酮

答案:C

解析:【考点】抗心律失常药的选择。(抗心律失常药作用复杂,利多卡因只对室性心律失常有效,是心肌梗死引起的室性心律失常的首选药。普萘洛尔主要用于室上性快速型心律失常。胺碘酮延长APD,阻滞 Na^{+} 内流,为广谱抗心律失常药,用于各种室上性和室性心律失常。

标签:

精华

简单

应用

76. 硫脲类治疗甲状腺功能亢进的机制

- A. 抑制甲状腺摄取碘
- B. 抑制甲状腺素的释放
- C. 抑制甲状腺激素的生物合成
- D. 抑制TSH分泌
- E. 抑制TG水解

答案:C

解析:【考点】硫脲类药物的作用机制。(硫脲类可用于治疗甲状腺功能亢进,可分为硫氧嘧啶类如丙基硫氧嘧啶,咪唑类如甲巯咪唑(他巴唑)、卡比马唑(甲亢平)。这些药物抑制甲状腺过氧化物酶所中介的酪氨酸的碘化及偶联,而药物本身作为过氧化物酶的底物而被碘化,使氧化碘不能结合到甲状腺蛋白上,从而抑制 T_3 、 T_4 的合成,即抑制甲状腺激素的生物合成。

标签:

精华

简单

记忆

77. 氨苄西林主要用于治疗

- A. 钩端螺旋体病
- B. 支原体感染
- C. 伤寒、副伤寒
- D. 衣原体感染
- E. 真菌

答案:C

解析:【考点】氨苄西林的临床应用。(氨苄西林为广谱青霉素,对革兰阴性菌有较强的作用,对肠球菌的作用优于青霉素。主要用于伤寒、副伤寒和革兰阴性杆菌败血症,肺部、尿路及胆道感染等。

标签:

精华

简单

记忆

78. 能引起儿童软骨发育不良的药物是

- A. 甲氧苄啶
- B. 氧氟沙星
- C. 呋喃唑酮
- D. 磺胺嘧啶
- E. 甲硝唑

答案:B

解析:氟喹诺酮类抗菌药物的不良反应有胃肠道反应、中枢神经系统毒性、光敏反应、心脏毒性、软骨损害等。

标签:

精华

简单

记忆

79. 在抗肿瘤药中,不属于破坏DNA结构与功能的药物是

- A. 丝裂霉素
- B. 氟尿嘧啶
- C. 博来霉素
- D. 环磷酰胺
- E. 顺铂

答案:B

解析:破坏DNA结构或抑制拓扑异构酶活性,影响DNA复制和修复功能的抗肿瘤药物包括烷化剂,如环磷酰胺等;铂类配合物,如顺铂等;丝裂霉素、博来霉素、喜树碱类。氟尿嘧啶是胸腺嘧啶核苷酸合成酶抑制药,干扰核酸生物合成。

标签:

精华

记忆

中等

80. 阿托品禁用于

- A. 膀胱刺激征
- B. 中毒性休克
- C. 青光眼
- D. 房室传导阻滞
- E. 麻醉前给药

答案:C

解析:知识点记忆。

标签:

81. 布洛芬主要用于治疗

- A. 肌肉痛、神经痛
- B. 痛经
- C. 头痛、牙痛
- D. 感冒发烧
- E. 风湿、类风湿关节炎

答案:E

解析:【考点】布洛芬的临床应用。(布洛芬具有抗炎、解热及镇痛作用,主要用于治疗风湿性及类风湿性关节炎,也可用于一般解热镇痛,主要特点是胃肠反应较轻,患者易耐受。

标签:

精华

简单

应用

82. 糖皮质激素隔日清晨一次给药法可避免()

- A. 反跳现象
- B. 诱发和加重感染
- C. 对胃酸胃蛋白酶分泌的刺激作用
- D. 类肾上腺皮质功能亢进综合征
- E. 反馈性抑制垂体-肾上腺皮质轴机能

答案:E

解析:实践证明,糖皮质激素类药物对垂体-肾上腺皮质轴的抑制性影响,在早晨最小,午夜抑制最大,隔日服药以用泼尼松、泼尼松龙等中效制剂较好。

标签:

精华

简单

记忆

83. 甲氧苄啶的抗菌机制是

- A. 抑制细菌细胞壁合成
- B. 抑制 DNA 螺旋酶
- C. 抑制二氢叶酸还原酶
- D. 改变细菌细胞膜通透性
- E. 抑制二氢叶酸合成酶

答案:C

解析:甲氧苄啶的抗菌机制为抑制二氢叶酸还原酶,使二氢叶酸不能还原成四氢叶酸,因而阻止细菌核合成。

标签:

精华

简单

记忆

84. 下列哪种降血糖药对尿崩症有效

- A. 降糖灵
- B. 优降糖
- C. 胰岛素
- D. 氯磺丙脲
- E. 降糖片

答案:D

解析:氯磺丙脲能促进抗利尿激素的分泌,可治疗尿崩症。

标签:

精华

简单

应用

超纲

85. 患者,男,20岁。5天前受凉后出现恶寒发热,无汗,咳嗽,夜间加剧,咳痰稀薄色白,舌苔薄白,脉浮紧的临床意义是

- A. 风寒束肺证
- B. 寒邪客肺证
- C. 痰湿阻肺证
- D. 燥邪犯肺证
- E. 饮停于肺证

答案:A

解析:略

标签:

86. 患者,女,26岁,已婚。胃脘隐痛,饥不欲食,口燥咽干,大便干结,

舌红少津，脉细数的临床意义是

- A. 脾阴不足
- B. 胃阴不足
- C. 胃燥津亏
- D. 胃热炽盛
- E. 肝胃不和

答案:B

解析:略

标签:

87. 患者，男，40岁。平时性情急躁易怒，近2周失眠多梦，头晕，口舌溃瘍肿痛，尿黄，大便干结，舌红苔黄，脉数的临床意义是

- A. 胃火上冲证
- B. 心火亢盛证
- C. 肝火上炎证
- D. 脾胃湿热证
- E. 肾火上炎证

答案:B

解析:略

标签:

88. 患者，女，40岁。脘腹冷痛，恶心欲吐，大便溏泻，舌淡苔白，舌体胖大，边有齿痕，脉象沉细。用药应首选的药物是()

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 吴茱萸
- E. 小茴香

答案:B

解析:干姜:温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。应用:为温暖中焦之主药,脾胃寒证,腹痛,呕吐,泄泻。本品辛热燥烈,主人脾胃而长于温中散寒、健运脾阳。多与党参、白术等同用,治脾胃虚寒,脘腹冷痛等,如理中丸;单用本品研末服,治寒邪直中脏腑所致腹痛;常配高良姜,治胃寒呕吐,如二姜丸;可与黄芩、黄连、人参等同用,治上热下寒,寒热格拒,食入即吐者,如干姜黄芩黄连人参汤;治中寒水泻,可单用为末服,亦可与党参、白术、甘草等同用。(吴茱萸:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻,应用:虚寒泄泻。本品性味辛热,能温脾益肾,助阳止泻,为治脾肾阳虚、五更泄泻之常用药,多与补骨脂、肉豆蔻、五味子同用,如四神丸。(肉桂:补火助阳,散寒止痛,温经通脉,引火归原(干姜:温中散寒,回阳通脉,温肺化饮(附子:回阳救逆,补火助阳,散寒止痛(吴茱萸:散寒止痛,降逆止呕,

助阳止泻（小茴香：散寒止痛，理气和胃

标签：

简单

应用

89. 患者，男，76 岁。久病卧床，近日来冷汗自出，四肢厥逆，面色苍白。西医检查：血压降低，听诊心音微弱。舌淡苔白，脉微欲绝。最佳选药是

- A. 肉桂
- B. 干姜
- C. 附子
- D. 细辛
- E. 吴茱萸

答案:C

解析:附子用于厥逆亡阳、脉微欲绝等症。附子辛烈而热，主要用于冷汗自出、四肢厥逆、脉微弱，或因大汗、大吐、大泻所致的亡阳证。

标签：

精华

简单

应用

90. 患者，女，50 岁。胸闷憋气，痰多黄黏，大便秘结，舌体胖大。用药宜首选（ ）

- A. 枳实
- B. 瓜蒌
- C. 桂枝
- D. 郁金
- E. 川芎

答案:B

解析:根据胸闷憋气，痰多黄黏，大便秘结，舌体胖大。辨证为痰热闭阻，治疗当清热化痰，理气宽胸，只有瓜蒌最为合适。

标签：

精华

应用

中等

91. 患者，女，30 岁。干咳少痰 1 周，伴有咽干音哑，口干喜饮，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。用药宜首选。（ ）

- A. 杏仁、桃仁、薏苡仁
- B. 荆芥、白前、陈皮
- C. 杏仁、麻黄、石膏
- D. 杏仁、川贝母、桑叶

E. 杏仁、麦冬、生地黄

答案:D

解析:舌边尖红是心肺热盛的表现,脉浮数是风热袭表的表热证。该患者应该为风燥伤肺的证候。应采用桑杏汤治疗。

标签:

精华

应用

中等

92. 患者,女,27岁。平素畏寒肢冷,脘腹胀满,带下色白量多,少腹冷痛。治疗时可以选用一下哪种药物?

A. 煅龙骨

B. 酸枣仁

C. 煅磁石

D. 柏子仁

E. 合欢皮

答案:A

解析:煅龙骨有收敛固涩的功效,可以通过不同配伍治疗遗精、滑精、尿频、遗尿、崩漏、带下、自汗、盗汗等正虚滑脱之证。

标签:

精华

应用

中等

93. 患者,女,23岁。症见身热,微恶风寒,汗出,头痛,咳嗽,咽燥,口渴,舌苔薄黄,脉浮数,治疗应选用

A. 银翘散

B. 麻黄汤

C. 藿香正气散

D. 桑菊饮

E. 荆防败毒散

答案:A

解析:银翘散辛凉透表,清热解毒。主治温病初起。发热,微恶风寒,无汗或有汗不畅,头痛口渴,咳嗽咽痛,舌尖红,苔薄白或薄黄,脉浮数。

标签:

精华

困难

应用

94. 患者,女,心下痞,满而不痛,干呕,肠鸣下利,舌苔薄黄而腻,脉弦数。治宜选用

- A. 小陷胸汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 枳实薤白桂枝汤
- E. 复元活血汤

答案:B

解析:半夏泻心汤主治寒热互结之痞证。心下痞，但满而不痛，或呕吐，肠鸣不利，舌苔腻而微黄。

标签:

困难

应用

95. 患者，男，40岁。寒热如疟，寒轻热重，口苦胸闷，干呕呃逆，胸胁胀痛，舌红苔白，脉数而右滑左弦。治疗应首选

- A. 左金丸
- B. 小柴胡汤
- C. 逍遥散
- D. 蒿芩清胆汤
- E. 龙胆泻肝汤

答案:D

解析:实记题。

标签:

记忆

中等

96. 患者，女，28岁。恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸
- B. 肾气丸
- C. 四逆散
- D. 当归四逆汤
- E. 回阳救急汤

答案:E

解析:寒邪深入少阴，症见恶寒蜷卧，神疲欲寐，吐泻腹痛，肢厥脉微者，不仅肾阳衰微，心脾之阳亦衰，其阴寒独盛之危候。此际，非大剂辛热不足以破阴回阳而救逆。回阳救急汤以大剂辛热与甘温益气之品同用，脾肾同健，破阴回阳，有回阳救急、益气生脉之功，于阴寒极盛、阳欲脱之证最宜。

标签:

应用

中等

97. 患者，女，70 岁。咳嗽反复发作十余年，咳声重浊，晨起加重，痰多色白，胸闷，脘痞，体倦，舌苔白腻，脉象濡滑，治疗应选用

- A. 二陈汤
- B. 桑菊饮
- C. 沙参麦冬汤
- D. 桑杏汤
- E. 止嗽散

答案:A

解析:实记题。

标签:

记忆

困难

98. 患者，男，59 岁。大便秘结不通，排便艰涩难解，兼见腹胀腹痛，身热，口干口臭，舌红苔黄。针灸时选

- A. 足阳明、手阳明经穴为主
- B. 足阳明、足厥阴经穴为主
- C. 足阳明、足太阴经穴为主
- D. 手阳明、足太阴经穴为主
- E. 足阳明、手少阳经穴为主

答案:E

解析:实秘主证:便次减少，常须三、五日量次或更长时间。便则努争，坚涩难下。如属热邪壅结，则身热、烦渴、口臭、喜凉、脉滑实、苔黄燥。治法:调理肠胃，行滞通便。以足阳明、手少阳经穴为主。处方:①主穴:天枢、支沟、水道、归来、丰隆。②配穴:热秘者，加合谷、内庭。

标签:

99. 患者，女，19 岁。患“慢性鼻窦炎”多年，涕黄浊量多，鼻塞重而持续，头晕头重，以前额为重，神倦纳呆，苔腻，脉滑数。针灸治疗除局部穴外，可取

- A. 合谷、太冲、少商
- B. 合谷、昆仑、行间
- C. 合谷、列缺、阴陵泉
- D. 中渚、列缺、足三里
- E. 外关、列缺、商阳

答案:C

解析:实记题。

标签:

100. 患者，男，30 岁。右上齿痛两天，伴龈肿口渴，口臭，便秘，脉滑数。某医师予针灸治疗，取合谷、颊车、下关，还可取

- A. 行间
- B. 内庭
- C. 外关
- D. 太溪
- E. 太冲

答案:B

解析:胃火牙痛者,加内庭、二间。

标签:

精华

简单

应用

101. 患者,男,44岁。头晕2个月,加重3天,伴有心烦,胸脘满闷,恶心呕吐,食欲不振,舌苔厚腻,脉滑。治疗应首选

- A. 风池、肝俞、行间、内庭
- B. 丰隆、中脘、内关、头维
- C. 脾俞、足三里、气海、太冲
- D. 肝俞、血海、三阴交、合谷
- E. 脾俞、肝俞、风池、行间

答案:B

解析:患者头晕、胸脘满闷、心烦、恶心呕吐,为痰湿中阻,气机不畅所致,痰湿上蒙清阳可见头晕。此病证主要与痰湿有关,治疗应以健脾化痰为主。丰隆穴可健脾化痰和胃降逆,内关穴有益心安神、宽胸理气镇静作用,头维穴主要清头目。故正确答案选为丰隆、中脘、内关、头维。

标签:

精华

简单

应用

102. 患者,女,25岁。诉精神抑郁,情绪不宁,胸闷胀痛,大便不调,脉弦。针灸时选

- A. 百会、神门、行间、三阴交
- B. 上星、神门、合谷、阿是穴
- C. 水沟、内关、神门、太冲、曲泉
- D. 率谷、神门、侠溪、阿是穴
- E. 合谷、神门、行间、三阴交

答案:C

解析:根据题干,诊断为郁证。胸闷胀痛,大便不调,脉弦为肝气郁结。针灸时主穴为水沟、内关、神门、太冲。肝气郁结者,加曲泉、膻中、期门。

标签:

精华
简单
应用

103. 患者，男，慢性腹泻 2 年，每于黎明之前腹中微痛，泻后痛减，舌淡，苔白，脉沉细。针灸时选

- A. 脾俞、章门、天枢、肾俞、关元
- B. 神阙、公孙、天枢、肾俞、足三里
- C. 足三里、三阴交、天枢、上巨虚、下巨虚
- D. 关元、太冲、天枢、曲池、中渚
- E. 气海、肝俞、天枢、阴陵泉、曲池

答案:B

解析:根据题干，诊断为慢性泄泻之肾虚证。治宜健脾温肾，固本止泻。针灸时以任脉及足阳明、足太阴经穴为主。主穴为神阙、天枢、足三里、公孙。肾虚者，加肾俞、命门。

标签:

简单

应用

104. 患者，女，33 岁。每次行经血量少色淡，少腹柔软喜按，绵绵作痛，面色苍白，心悸，舌淡，脉细弱。针灸时选

- A. 三阴交、隐白、内关、太溪
- B. 三阴交、隐白、血海、水泉
- C. 三阴交、气海、脾俞、足三里
- D. 三阴交、隐白、百会、气海
- E. 三阴交、中极、关元、血海

答案:C

解析:根据题干，诊断为痛经虚证气血不足。治宜调补气血，温养冲任。针灸时以足太阴、足阳明经穴为主。主穴:三阴交、足三里、气海。气血亏虚证者，加脾俞、胃俞。

标签:

精华

简单

应用

105. 患者，26 岁。近 1 个月来，以夜间咳嗽为主，痰中带血丝，伴低热，盗汗。应首先考虑的是

- A. 肺结核
- B. 支气管扩张
- C. 肺癌
- D. 风湿性心脏病(二尖瓣狭窄)

E. 急性肺水肿

答案:A

解析:肺结核咳嗽以夜间较重,常可出现低热、盗汗和咯血的表现。而肺癌多见于40岁以上嗜烟男性,多出现刺激性咳嗽;支气管扩张有慢性咳嗽、咳痰和反复咯血史;二尖瓣狭窄引起的夜间咯血(或粉红色泡沫痰)多出现阵发性夜间呼吸困难等,而一般不伴盗汗、低热;急性肺水肿的表现与二尖瓣狭窄引起夜间咯血相似,但不会持续1个月夜间咳嗽。

标签:

精华

简单

应用

106. 患者,女,33岁。淋雨后寒战,发热,咳嗽,咳铁锈色痰,胸痛。查体:口唇周围有单纯疱疹,叩诊右下肺轻度浊音,听诊呼吸音减低。应首先考虑的是

- A. 急性支气管炎
- B. 肺结核
- C. 急性肺脓肿
- D. 肺炎球菌肺炎
- E. 病毒性肺炎

答案:D

解析:肺炎球菌肺炎时,由于渗出到肺泡内的红细胞破坏后释放出含铁血黄素,混在痰中,故出现铁锈色痰。

标签:

精华

简单

应用

107. 患者,女,37岁。多食,大便每日2~3次。查体:血压140/60mmHg(18.62/7.98kPa),双眼突出,心律不齐,脉搏短绌。应首先考虑的是

- A. 糖尿病合并缺血性心脏病
- B. 风心病伴心房纤颤
- C. 高血压性心脏病伴心房纤颤
- D. 肺心病伴心房纤颤
- E. 甲状腺功能亢进症伴心房纤颤

答案:E

解析:甲状腺功能亢进症可出现排便次数增加,心房纤颤(心律不齐、脉搏短绌等),收缩压上升、舒张压下降而脉压增大,突眼等。故选E。

标签:

108. 患者，男，25 岁。现咳嗽已久。查体：气管向左偏移，右侧胸廓较左侧饱满，叩诊出现鼓音。应首先考虑的是

- A. 右侧气胸
- B. 左侧肺不张
- C. 右下肺炎
- D. 肺气肿
- E. 右侧胸腔积液

答案:A

解析:由气管移位可考虑患者存有胸腔、肺、纵隔及单侧甲状腺的病变。气管左移、右侧胸腔较左侧饱满，提示该侧气胸或胸腔积液病变；叩诊为鼓音，应考虑诊断为右侧气胸。左侧肺不张时，左胸可出现凹陷，叩诊呈浊音；右下肺炎时，气管无移位，右下肺叩诊呈浊音或实音；肺气肿气管无移位，叩出过清音。

标签:

与专业和章节不符

109. 患者，男，61 岁。劳累及情绪激动后，多次出现短时间胸骨后疼痛，下列哪项血清检查对明确诊断最有参考意义

- A. 钾
- B. 钠
- C. 氯化物
- D. 钙
- E. 胆固醇及甘油三酯

答案:E

解析:知识点记忆。

标签:

110. 患者，男，59 岁。劳累及情绪激动后，多次出现短时间胸骨后疼痛，下列哪项血清检查对明确诊断最有参考意义

- A. 钾
- B. 钠
- C. 氯化物
- D. 钙
- E. 胆固醇及甘油三酯

答案:E

解析:血脂是人体中一种重要物质，有许多非常重要的功能，但是不可超过一定的范围。如果血脂过多，容易造成“血稠”，在血管壁上沉积，逐渐形成小斑块，这就是人们常说的动脉粥样硬化。这些斑块增多、增大，逐渐堵塞血管，使血流变慢，严重时血流可中断。这种情况如果发生在心脏，就易引起冠心病。

标签:

精华

应用

中等

111. 患者，女，66岁。今日胸痛发作频繁，2小时前胸痛再次发作，含化硝酸甘油不能缓解。检查：血压 90 / 60mmHg，心律不齐。心电图 II、III、aVF 导联 ST 段抬高呈弓背向上的单向曲线。应首先考虑的是

- A. 心绞痛
- B. 急性心包炎
- C. 急性前间壁心肌梗死
- D. 急性下壁心肌梗死
- E. 急性广泛前壁心肌梗死

答案:D

解析:急性下壁心肌梗死的症状。

标签:

精华

与专业和章节不符

112. 患者，男，60岁。脑出血后长期卧床，2天前出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状，胸透见两肺下叶有少数散在边缘不清小灶阴影。应首先考虑的是

- A. 大叶性肺炎
- B. 干酪样肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 转移性肿瘤
- E. 小叶性肺炎

答案:E

解析:小叶性肺炎的症状。

标签:

精华

与专业和章节不符

113. 患者，男，20岁。急性上腹部剧烈疼痛，临床诊断为“急性胃痉挛”。其解痉药物应选用

- A. β 受体阻断剂
- B. H₂受体阻断剂
- C. α 受体阻断剂
- D. M 受体阻断剂
- E. N 受体阻断剂

答案:D

解析:阻断 M 受体，使平滑肌舒张，可以解除平滑肌痉挛，对胃肠绞痛、膀

膀胱刺激症状如尿频、尿急等疗效较好。

标签:

114. 患者，男，48岁。十二指肠溃疡病史20年，近感头痛、眩晕而就诊。

检查：血压160/100mmHg（21/13kPa）。下列降压药应慎用的是

- A. 利血平
- B. 胍苯哒嗪
- C. 可乐定
- D. 氢氯噻嗪
- E. 卡托普利

答案:A

解析:利血平属于肾上腺能神经阻断剂，用药后交感神经系统的功能受到遏制，副交感神经系统的功能相对占优势，导致消化功能亢进而致大便次数增多、腹痛、腹泻、胃酸分泌增加、溃疡病恶变，引发消化道出血，甚至导致新的溃疡。所以，伴有胃及十二指肠溃疡的高血压患者禁用利血平。

标签:

115. 患者，男，49岁。因肝硬化门静脉高压症而引起食管静脉曲张破裂出血，经垂体后叶素等缩血管药物治疗后缓解。但患者出现雷诺现象及致下肢缺血等垂体后叶素的副作用。该患者应选用下列何种药物对抗

- A. 阿托品
- B. 间羟胺
- C. 普萘洛尔
- D. 肾上腺素
- E. 酚妥拉明

答案:E

解析:酚妥拉明可阻断血管平滑肌的 α 受体，使痉挛收缩状态的血管扩张，缓解患者出现雷诺现象及增加下肢供血。

标签:

116. 某男，5岁。突发高热、呕吐、惊厥，数小时后出现面色苍白、四肢厥冷、脉搏细速、血压下降至休克水平。经实验室检查诊断为暴发型流脑所致感染中毒性休克，应采取的抗休克药物为

- A. 肾上腺素
- B. 右旋糖酐
- C. 阿托品
- D. 酚妥拉明
- E. 糖皮质激素

答案:E

解析:细菌感染导致中毒性休克——激素的适应证。

标签:

117. 患者，男，60 岁。因糖尿病合并皮肤感染，长期服用四环素、磺胺药后咽部出现白色薄膜，不曾在意，近来消化不良，腹泻而就诊，怀疑为白色念珠菌病，宜用

- A. 制霉菌素
- B. 灰黄霉素
- C. 两性霉素 B
- D. 阿昔洛韦
- E. 利巴韦林

答案:A

解析:制霉菌素口服用于防治消化道念珠菌病，局部用药对口腔、皮肤、阴道念珠菌病有效。

标签:

精华

应用

中等

B1 型选择题

(118-1~118-2 题共用备选答案)

- A. 气能生津
- B. 气能行津
- C. 气能摄血
- D. 血能载气
- E. 津血同源

118. “衄家不可发汗”的机制是

答案:E

解析:津血同源，发汗加重津伤。

标签:

119. “气随血脱”的理论基础是

答案:D

解析:略

标签:

(120-1~120-2 题共用备选答案)

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

120. “主治节”的脏是

答案:B

解析:肺主治节。

标签:

121. “主行水”的脏是

答案:B

解析:肺主行水。

标签:

(122-1~122-2 题共用备选答案)

A. 热因热用

B. 实则泻之

C. 热者寒之

D. 寒者热之

E. 虚则补之

122. 属于反治的是()

答案:A

解析:反治及“从治”，是指顺从病证的外在假象而治的一种治疗原则。适用于疾病的征象预期本质不相符的病证，即病有假象者。如热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。

标签:

精华

简单

记忆

123. 属于从治的是()

答案:A

解析:从治包含的是热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用

标签:

精华

简单

记忆

(124-1~124-2 题共用备选答案)

A. 上焦病证

B. 中焦病证

C. 下焦病证

D. 阳明经证

E. 阳明腑证

124. 身热气粗，面红目赤，腹满便秘，渴欲饮冷，小便短赤，大便干结，苔黄燥或焦黑，脉沉实有力，证属

答案:B

解析:略

标签:

125. 日晡潮热，手足濇然汗出，脐腹胀满硬痛而拒按，大便秘结不通，舌苔黄厚干燥，脉沉迟而实或滑数，证属

答案:E

解析:略

标签:

(126-1~126-2 题共用备选答案)

- A. 发热，微恶风寒，舌边尖红，脉浮数
- B. 发热，神昏谵语，斑疹紫暗，出血动风，舌质深绛
- C. 身热夜甚，心烦，舌红绛，脉细数
- D. 壮热，汗出，口渴，脉洪大
- E. 发热，汗出，口渴，舌红苔黄，脉数

126. 血分证的辨证要点是

答案:B

解析:略

标签:

127. 营分证的辨证要点是

答案:C

解析:略

标签:

(128-1~128-2 题共用备选答案)

- A. 恶寒、无汗、头身疼痛、脉浮紧
- B. 少腹急硬、小便自利、便黑
- C. 壮热、汗出、口渴、脉洪大
- D. 腹满时痛、自利、口不渴
- E. 潮热汗出、腹满硬痛、大便秘结、苔黄燥、脉沉实

128. 阳明经证的辨证要点是

答案:C

解析:略

标签:

129. 阳明腑证的辨证要点是

答案:E

解析:略

标签:

(130-1~130-2 题共用备选答案)

- A. 硫黄
- B. 白鲜皮
- C. 秦皮

D. 土茯苓

E. 乌梅

130. 治疗阳痿，疥癣湿疹，应选用的药物是()

答案:A

解析:略

标签:

应用

中等

131. 治疗梅毒，湿热疮毒，应选用的药物是()

答案:D

解析:略

标签:

精华

简单

应用

(132-1~132-2 题共用备选答案)

A. 石斛

B. 沙参

C. 玉竹

D. 百合

E. 麦冬

132. 能养阴生津，润肺清心的药物是

答案:E

解析:石斛: 益胃生津, 滋阴清热; (北沙参: 养阴清肺, 益胃生津; 南沙参: 养阴清肺, 益胃生津, 化痰, 益气; (玉竹: 养阴润燥, 生津止渴; (百合: 养阴润肺, 清心安神; (麦冬: 养阴生津, 润肺清心。主治病症为津伤口渴, 内热消渴, 肠燥便秘; 肺燥干咳, 阴虚劳嗽, 喉痹咽痛; 心烦失眠。

标签:

精华

简单

记忆

133. 主养胃肾之阴，而生津除热的药物是()

答案:A

解析:石斛: 养胃生津, 滋阴清热, 主治热病津伤, 口干烦渴, 胃阴不足, 食少干呕, 病后虚热不退, 阴虚火旺, 骨蒸劳热, 目暗不明, 筋骨萎软。归胃、肾经。主治胃阴虚证, 热病伤津证, 肾阴虚证。

标签:

简单

记忆

(134-1~134-2 题共用备选答案)

- A. 半夏
- B. 天南星
- C. 天麻
- D. 羚羊角
- E. 地龙

134. 治疗肺热哮喘，半身不遂，应选用的药物是()

答案:E

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

135. 治疗惊痫抽搐，热毒发斑，应选用的药物是()

答案:D

解析:略

标签:

简单

记忆

(136-1~136-2 题共用备选答案)

- A. 麦门冬汤
- B. 百合固金汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 玉液汤
- E. 大补阴丸

136. 既滋肺胃，又降逆气的方剂是

答案:A

解析:实记题。

标签:

精华

记忆

困难

137. 既滋肺肾，又解疫毒的方剂是

答案:C

解析:实记题。

标签:

精华
记忆
中等

(138-1~138-2 题共用备选答案)

- A. 二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 清气化痰丸
- D. 小陷胸汤
- E. 滚痰丸

138. 理气化痰，清胆和胃的方剂是

答案:B

解析:实记题。

标签:

记忆

中等

139. 清热化痰，宽胸散结的方剂是

答案:D

解析:实记题。

标签:

精华

记忆

中等

(140-1~140-2 题共用备选答案)

- A. 君药
- B. 臣药
- C. 佐助药
- D. 佐制药
- E. 反佐药

140. 银翘散中的薄荷、牛蒡子属于

答案:B

解析:薄荷、牛蒡子辛凉，疏散风热，清利头目，且可解毒利咽；荆芥穗、淡豆豉辛而微温，解表散邪，此二者虽属辛温，但辛而不烈，温而不燥，配入辛凉解表方中，增强辛散透表之力，是为去性取用之法，以上四药俱为臣药。

标签:

理解

中等

141. 桑菊饮中的杏仁、桔梗属于

答案:B

解析:薄荷辛凉,疏散风热,以助君药解表之力;杏仁苦降,肃降肺气;桔梗辛散,开宣肺气,与杏仁相合,一宣一降,以复肺脏宣降而能止咳,是宣降肺气的常用组合,三者共为臣药。

标签:

记忆

中等

(142-1~142-2 题共用备选答案)

- A. 手阳明、足太阳、足少阳经
- B. 手太阴、手阳明、足少阳经
- C. 手少阴、足厥阴、足少阴经
- D. 手太阴、足厥阴、手太阳经
- E. 手太阳、足少阳、手少阳经

142. 以上经脉皆通于耳的是

答案:E

解析:手太阳小肠经“却入耳中”;足少阳胆经“其支者,从耳后入耳中,出走耳前”;手少阳经“其支者……系耳后,直上出耳上角”。

标签:

143. 以上经脉皆与肺相联系的是

答案:C

解析:手少阴心经“其支者,复从心系却上肺”;足厥阴肝经“其支者,复从肝别贯膈,上注肺”;足少阴肾经“其支者……入肺中,循喉咙”。

标签:

(144-1~144-2 题共用备选答案)

- A. 一般成人应用药物能产生治疗作用的一次平均用量
- B. 应用药物能引起药理效应的最小剂量
- C. 介于最小有效量和极量之间的量
- D. 指治疗量的最大限度
- E. 超过极量,产生中毒症状的剂量

144. 治疗量是指

答案:C

解析:解析见下题。

标签:

145. 阈剂量是指

答案:B

解析:A 指的是剂量,一次平均用量。D 极量,E 最小中毒量。刚引起药理效应的剂量,最小有效量或阈剂量。治疗量/常用量,是一个范围。

标签:

(146-1~146-2 题共用备选答案)

- A. 增加血糖去路，减少血糖来源
- B. 直接作用于胰岛 β 细胞，刺激内源性胰岛素释放
- C. 抑制 α -葡萄糖苷酶，延缓淀粉水解，降低餐后血糖峰值
- D. 增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性
- E. 增加糖的无氧酵解、增加去路、减少来源和降低胰高血糖素水平

146. 格列喹酮(糖适平)降血糖的作用机制是()

答案:B

解析:略

标签:

精华

简单

记忆

147. 罗格列酮降血糖的作用机制是()

答案:D

解析:略

标签:

精华

记忆

中等

(148-1~148-2 题共用备选答案)

- A. 硝普钠
- B. 维拉帕米
- C. 哌唑嗪
- D. 普萘洛尔
- E. 氢氯噻嗪

148. 适用于高血压危象的药物是

答案:A

解析:硝普钠可直接松弛小动脉和静脉平滑肌，主要用于高血压急症的治疗。哌唑嗪对肾血流量及肾小球滤过率均无明显影响，可用于高血压合并肾功能不良患者。

标签:

149. 适用于轻中度高血压伴肾功能不良的药物是

答案:C

解析:硝普钠可直接松弛小动脉和静脉平滑肌，主要用于高血压急症的治疗。哌唑嗪对肾血流量及肾小球滤过率均无明显影响，可用于高血压合并肾功能不良患者。

标签: