

7月份护士万人模考

1.下列疾病中，可导致右心室后负荷过重的是

- A.房间隔缺损
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.动脉导管未闭
- D.慢性阻塞性肺气肿
- E.肺动脉瓣关闭不全

答案：D

解析：右心室后负荷过重提示慢性阻塞性肺气肿。



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

2.左心衰竭的重要体征是

- A.交替脉
- B.心尖区收缩期奔马律
- C.颈静脉怒张
- D.水冲脉
- E.体循环淤血

答案：A

解析：交替脉是脉搏一强一弱交替出现但节律正常，这是由于心室收缩力强弱不均所致，交替脉是左心衰竭的重要体征。

3.下列不是窦性心动过速诱因的是

- A.剧烈运动或情绪激动
- B.缺氧
- C.失血性贫血
- D.高血钾
- E.甲状腺功能亢进

答案：D

解析：高血钾引起致命性心律失常致心搏骤停。

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

4.窦性心动过速心电图特征为：窦性P波规律出现，频率为

- A.60-80 次/分
- B.60-90 次/分
- C.80-100 次/分
- D.100~150 次/分
- E.180-200 次/分

答案：D

解析：成人窦性心率在100~150次/分，偶有高达200次/分称窦性心动过速。

5.关于室性期前收缩的心电图表现，叙述正确的是

- A.提前出现的 QRS 波形态与窦性相同
- B.T 波与 QRS 主波方向相同
- C.代偿间歇不完全
- D.QRS 波群前出现倒 P 波
- E.有提前出现的宽大畸形的 QRS 波

答案：E

解析：室性期前收缩：QRS 波群提前出现，形态宽大畸形，QRS 时限>0.12 秒，其前无相关的 P 波；T 波常与 QRS 波群的主波方向相反；期前收缩后有完全代偿间歇。

6.房间隔缺损患儿如需外科手术，手术时机一般选择在

- A.出现持续青紫后
- B.3~5 岁
- C.1~5 岁
- D.1~3 岁
- E.<1 岁

答案：B

解析：

提示：房间隔缺损的治疗原则：手术治疗。直径<3mm 的房间隔缺损多在 3 个月内自然闭合，缺损较大影响生长发育者宜 3~5 岁做房间隔缺损修补术。

7.主动脉瓣狭窄最重要的体征是

- A.细迟脉
- B.主动脉瓣区舒张早期叹气样杂音
- C.主动脉瓣第二听诊区舒张早期叹气样杂音
- D.主动脉瓣区响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音
- E.主动脉瓣第二听诊区响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音

答案：D

解析：

主动脉瓣区可闻及响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音是主动脉瓣狭窄最主要的体征，可向颈部传导。

8.患者，男性，40 岁。患急性心包炎，心包积液 2 月余，近几日出现咳嗽、活动后气促，有心绞痛样胸痛。体检：有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿、心率增快，可见 Kussmaul 征。考虑诊断为

- A.亚急性心包炎
- B.急性心包炎

- C.缩窄性心包炎
- D.纤维蛋白性心包炎
- E.渗出性心包炎

答案：C

解析：

缩窄性心包炎的临床表现:体征有颈静脉怒张、肝大、腹水、下肢水肿和心率增快等;可见Kussmaul征,即吸气时颈静脉怒张更明显。心浊音界正常或稍大;心尖搏动减弱或消失,心音减低。出现奇脉和心包叩击音。

9.慢性肺心病长期氧疗,每日持续吸氧时间应超过

- A.7小时
- B.9小时
- C.19小时
- D.12小时
- E.15小时

答案：E

10.患儿,7岁。腮腺明显肿大,局部皮肤紧张发亮,张口、咀嚼时胀痛加剧,诊断为流行性腮腺炎,则对其腺肿的护理不正确的是

- A.可进食水果、果汁和补充维生素C片
- B.腺肿处可冷敷
- C.腺肿处可用醋调青黛散外敷
- D.用温盐水漱口,保持口腔清洁
- E.宜进易消化和清淡的软食

答案：A

解析：

对于流行性腮腺炎的病人应给予富含营养、易消化的半流食或软食。忌食酸、辣、硬而干燥的食物,以免引起唾液分泌增多,肿痛加剧。


11.患者,男,35岁。既往体健,近1年来发现HBsAg阳性,但无任何症状,肝功能正常。该患者目前病情所处状态是

- A.轻度慢性乙型肝炎
- B.中度慢性乙型肝炎
- C.重度慢性乙型肝炎
- D.无症状性HBsAg携带者
- E.急性无黄疸型乙型肝炎

答案：D

解析：

患者近一年来发现 HBsAg 阳性，但无肝功能异常表现，且无既往病史，所以患者属于 HBsAg 携带者。



12. 子宫峡部的上端较狭窄，我们称之为

- A.解剖学内口
- B.组织学外口
- C.解剖学外口
- D.组织学内口
- E.以上都不是

答案：A

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

13. 妊娠早期“黑加征”是指

- A.子宫增大变软
- B.子宫成前倾前屈位
- C.子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连
- D.宫颈充血变软，呈紫蓝色
- E.乳头及乳晕着色加深，乳头周围有褐色小结节

答案：C

14. 关于先兆流产不妥的护理措施是

- A.指导卧床休息
- B.禁止性生活
- C.必要时按医嘱给予对胎儿危害小的镇定剂
- D.黄体功能不足的孕妇，每日肌注黄体酮保胎
- E.便秘者可行肥皂水灌肠

答案：E

15. 引起输卵管妊娠的常见原因是

- A.输卵管发育不良
- B.内分泌失调
- C.输卵管炎
- D.输卵管功能异常
- E.畸形

答案：C

解析：

无

16. 分娩期产妇一旦发现子宫先兆破裂，首选的护理措施是

- A. 抗休克，静脉输液、输血
- B. 停止一切操作，抑制宫缩
- C. 行阴道助产，尽快结束分娩
- D. 大量抗生素预防感染
- E. 安置产妇头高脚低



答案：B

解析：

无

17. 产褥感染中最常见的是

- A. 急性输卵管炎
- B. 急性外阴、阴道炎
- C. 急性盆腔结缔组织炎
- D. 急性子宫内膜炎
- E. 急性腹膜炎

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：D

解析：

无

18. 新生儿记录中属于非生理性改变的是

- A. 出生后 2 天出现黄疸
- B. 出生后 2 ~ 3 天无尿
- C. 出生后 5 ~ 7 天有阴道出血
- D. 出生后 1 周有乳腺肿大
- E. 出生后 9 天体重下降 8%

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：B

解析：无

19. 对于臀位出生的新生儿应防止其发生

- A. 新生儿肝炎
- B. 新生儿败血症
- C. 新生儿破伤风
- D. 新生儿颅内出血

E.新生儿肺炎

答案：D

解析：无

20.尿液检查正确的说法是

- A.镜下血尿>3个红细胞 / 高倍视野
- B.镜下脓尿>1~3个白细胞 / 高倍视野
- C.管型：不含有细胞
- D.大量上皮细胞属于正常
- E.进素食者尿液呈中性或弱酸性

答案：A

解析：无

21.原发性肾病综合征的临床特征，应除外

- A.大量蛋白尿
- B.低蛋白血症
- C.高脂血症
- D.血尿
- E.高度水肿

答案：D

解析：无

22.下列关于幻觉的概念正确的是

- A.对客观事物的错误感受
- B.对客观事物的妄想
- C.缺乏相应的客观刺激时的感知体验
- D.客观刺激作用于感觉器官的感知体验
- E.缺乏客观刺激时的正确的体验

答案：C

解析：幻觉是指没有相应的客观刺激时所出现的知觉体验，通俗地说就是感知到了客观上并不存在的事物，常见于精神分裂症等重型心理障碍的患者。

23.患者，女性，27岁，1年多来为“唱歌的敲门声困扰。一听到有人敲门的声响，就同时听到有人在唱歌，而敲门声停，同时歌声也停了。该病人最可能的症状是

- A.错觉
- B.功能性幻听
- C.被害妄想
- D.内脏性幻觉


E. 联想障碍

答案：B

解析：功能性幻觉是一种伴随现实刺激而出现的幻觉，最常见的是功能性幻听。

24. 对抑郁症患者特别要注意的问题是

- A. 因拒食导致营养不良
- B. 因运动少而引起的合并感染
- C. 因自责而产生的自伤自杀观念
- D. 症状波动昼重夜轻
- E. 因身体不适而产生的疑病观念



答案：C

解析：抑郁症的患者应重点注意患者的自杀自伤观念。

25. 基础代谢率(BMR)公式正确的是

- A. $BMR = \text{脉率} + \text{收缩压} - 105$
- B. $BMR = \text{脉率} + \text{舒张压} - 111$
- C. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压}$
- D. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压} - 111$
- E. $BMR = \text{脉率} + \text{收缩压} - 110$

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：D

解析：无

26. 患者，女性，21岁，双侧甲状腺肿大，清晨起床前测得血压140/70mmHg，

脉搏为100次/分，该病人的甲状腺功能应属于

- A. 先天性功能低下
- B. 功能正常
- C. 轻度甲状腺功能亢进
- D. 中度甲状腺功能亢进
- E. 重度甲状腺功能亢进

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：D

解析：无

27. 甲状腺功能减退症患者终末期的主要表现是

- A. 黏液水肿，昏迷
- B. 痴呆，昏睡
- C. 木僵，惊厥
- D. 智力低下，反应迟钝
- E. 生理功能低下，心动过缓

答案：A

解析：无

28.下列对于皮质醇增多症的特征性表现描述正确的是

- A.多血脂面容
- B.生长发育障碍
- C.免疫力下降
- D.向心性肥胖
- E.皮肤黏膜色素沉着



答案：D

解析：无

29.磺脲类降糖药物中最易并发严重低血糖的是

- A.甲苯磺丁脲
- B.格列本脲
- C.格列吡嗪
- D.格列美脲
- E.格列齐特

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：B

解析：无

30.对于胰岛素使用的注意事项，不正确的是

- A.注射胰岛素易引起低血糖
- B.0~4°C冰箱保存，禁止冷冻
- C.根据血糖监测结果，及时调整胰岛素剂量
- D.胰岛素宜在餐前注射
- E.在抽取时先抽中、长胰岛素，再抽普通胰岛素

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：E

解析：无

31.痛风患者不需要加以限制的食物有

- A.豆腐
- B.鸡蛋
- C.红酒
- D.蘑菇
- E.虾蟹

答案：B

解析：无

32.脑震荡的主要临床表现是

- A.脑脊液无明显改变
- B.有头痛、头晕、呕吐
- C.血压下降
- D.脸色苍白出冷汗
- E.短暂的意识丧失



答案：E

解析：无

33.三叉神经痛治疗首先选择

- A.布洛芬
- B.卡马西平
- C.地西洋
- D.吗啡
- E.阿司匹林

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：B

解析：无

34.关于急性脱髓鞘性多发性神经炎脑脊液检查的特征，正确的是

- A.细胞数增高，糖降低
- B.蛋白增高，细胞数正常
- C.蛋白降低，细胞数增高
- D.细胞数增高，糖含量正常
- E.红细胞数减少，细菌培养阴性

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：B

解析：无

35.帕金森病患者的体征除外

- A.静止性震颤
- B.肢体肌张力减低
- C.面部表情刻板
- D.行走时慌张步态
- E.随意运动减少

答案：B

解析：无

- 36.患者，女性，36岁。癫痫大发作。预防发生窒息，护士应采取的护理措施是
- A.卧床休息，减少探视
 - B.移走身边危险物体
 - C.将患者头位放低，偏向一侧
 - D.禁止喂食丸状食物
 - E.快速利尿和吸氧



答案：C

解析：无

- 37.患者，男性，60岁，因高血压入院，护士收集到以下资料，属于患者客观资料的是
- A.咽喉部充血
 - B.头晕头痛
 - C.不想吃饭
 - D.感到恶心
 - E.全身无力

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：A

解析：客观资料是通过观察或者体格检查得出的，对于头晕头痛、不想吃饭，感到恶心、全身无力都是主观资料。咽喉部充血是客观资料。

- 38.护士小张，在给病人进行肌内注射时不慎将自己刺伤，此时首要的处理措施是
- A.查看病人病例
 - B.0.5%碘伏或75%乙醇消毒伤口
 - C.肥皂水彻底清洗伤口
 - D.立即用手从伤口的近心端向远心端挤压
 - E.进行伤口局部挤压

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：D

解析：

紧急处理方法：发生针刺伤时，受伤护士要保持冷静，立即用手从伤口的近心端向远心端挤压，挤出伤口的血液，禁止进行伤口局部挤压或按压，以免产生虹吸现象，将污染血液吸入血管，增加感染机会。

- 39.患者，男性，37岁，因车祸致右下肢外伤，伤口大量出血，被送入急诊室，在医生未到之前，值班护士首先应
- A.通知病房，准备暂空床
 - B.详细询问发生车祸的原因
 - C.向保卫部门报告车祸的情况

- D.注射镇痛剂，减轻伤口疼痛
- E.止血，测血压，配血、建立静脉通道

答案：E

解析：在医生到来之前护士可以给患者进行止血、测血压、配血、建立静脉通道。

40.女性，70岁，因上呼吸道感染住院，今日上午去放射科拍X光片。病人离床后，护士应将病床铺成

- A.备用床
- B.暂空床，加橡胶中单、中单
- C.暂空床
- D.麻醉床，加橡胶中单、中单
- E.备用床，加橡胶中单、中单

答案：C

解析：患者暂时离开，护士将床单位铺成暂空床

41.男性，26岁，腿部外伤后发展为气性坏疽，为其换药后的剪刀的最佳消毒方法为

- A.消毒液擦拭
- B.燃烧法
- C.微波消毒灭菌法
- D.高压蒸汽灭菌
- E.煮沸法

答案：D

解析：气性坏疽是特异性感染，对于气性坏疽使用过的敷料可以直接焚烧，对于有用的器械剪刀最佳的消毒方法是高压蒸汽灭菌法。

42.患儿刘某因被确诊为流脑转入传染病房，其原住的病房需要用食醋空气消毒，病房高4m，宽4m，长5m，食醋用量是


- A.50ml
- B.100ml
- C.200ml
- D.300ml
- E.400ml

答案：E

解析：无

43.患者，女，28岁。体重50kg，因车祸致T3-T4骨折，呼吸困难，对自己的病情非常担心。导致呼吸困难的最主要原因是

- A.腹胀导致膈肌上移
- B.肺栓塞
- C.呼吸肌麻痹
- D.痰液分泌过多堵塞气道
- E.血块压迫气道



答案：C

解析：

44.患者，女，28岁。体重50kg，因车祸致T3-T4骨折，呼吸困难，对自己的病情非常担心。搬运该患者的方法是

- A.单人背起患者搬运
- B.单人抱起患者搬运
- C.二人搬运，其中一人抬上身，一人抬脚
- D.三人搬运，其中二人平托患者躯干，一人抬脚
- E.四人搬运，其中三人将患者平托到平板上

金英杰医学
JINGJIE.COM

答案：E

解析：

45.患者女性，40岁。颅脑术后第3天，需更换卧位，下列表述错误的是

- A.先将导管安置妥当再翻身
- B.两人协助患者翻身
- C.先换药，再翻身
- D.注意节力原则
- E.卧于患侧

金英杰医学
JINGJIE.COM

答案：E

解析：

颅脑术后患者，头部转动过于剧烈可引起脑疝，导致突然死亡，因此，一般只卧于健侧或平卧。

46.患者，女性，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。术后第二天患者体温38.2℃，并诉切口疼痛，此时护士应为患者安置的体位是

- A.头高足低位
- B.仰卧屈膝位
- C.右侧卧位
- D.半坐卧位
- E.端坐位

答案：D

解析：

- 47.患者，女性，急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。安置该体位的目的是
- A.可减少局部出血，利于切口愈合
 - B.有利于增进食欲，为进食作准备
 - C.有利于减少回心血量，减轻心脏负担
 - D.有利于减轻肺部淤血，减少肺部并发症
 - E.可使感染局限，减轻切口缝合处的张力，缓解疼痛

答案：E

解析：

- 48.患者，女性，43岁。因头晕头痛原因待查入院，医嘱测血压每日3次。为其测血压时，应该
- A.定血压计、定部位、定时间、定护士
 - B.定血压计、定部位、定时间、定听诊器
 - C.定听诊器、定部位、定时间、定体位
 - D.定血压计、定部位、定时间、定体位
 - E.定护士、定部位、定时间、定体位

答案：D

解析：无

- 49.患者，女性，30岁。胃溃疡出血入院，经治疗病情缓解，现需做潜血试验，适宜的食谱是
- A.洋葱炒猪肝、青菜、榨菜肉丝汤
 - B.鱼、菠菜、豆腐汤
 - C.芹菜炒肉丝、青椒豆腐干、蛋汤
 - D.鲶鱼烧豆腐、土豆丝、豆腐汤
 - E.红烧肉、西红柿鸡蛋、蛋汤

答案：D

解析：无

- 50.李先生，60岁，因脑血管意外长期卧床，近日出现肠胀气。病人自觉腹胀，有痉挛性疼痛。肛管保留时间不超过
- A.20min
 - B.25min
 - C.30min
 - D.35min

E.40min

答案：A

解析：

51.患儿，女，4岁。室间隔缺损。一周前患儿因上感诱发急性心力衰竭，按医嘱用西地兰。今日患儿出现恶心，呕吐，视力模糊。此临床表现的原因是

- A.急性心力衰竭加重
- B.强心甙中毒的反应
- C.室间隔缺损的表现
- D.胃肠感染
- E.上感加重

答案：B

解析：西地兰属于强心甙类，治疗量接近中毒量，易出现问题应该在用药期间密切观察。

52.患者，女性，65岁。有高血压病史10年。最近骑车上班时感胸闷、乏力、气急，休息后缓解。该患者的心功能为

- A. V级
- B.IV级
- C.III级
- D.II级
- E.I级

答案：D

解析：I级 体力活动不受限制 此时要注意休息，避免体力劳动。II级体力活动轻度受限，日常活动可引起乏力、气急、心悸，此时应注意劳动时增加休息。III级，体力活动明显受限，稍事活动即引起乏力、气急、心悸此时应限制活动。IV级体力活动重度受限，休息时亦乏力、气急、心悸此时需严格卧床，一切活动由他人完成。

53.患者，男性，62岁。诊断为急性心肌梗死而收入院治疗，发生室性期前收缩应首选的药物

- A.胺碘酮
- B.利多卡因
- C.普鲁卡因
- D.吗啡
- E.阿托品

答案：B

解析：

治疗心律失常：对无脉室性心动过速或心室颤动，治疗同心肺复苏，室性心律失常首选利多卡因，发生心室颤动时立即实施电复律。

54.患者，女性，50岁。因胸闷、咳嗽、咳痰、呼吸困难、尿少就诊，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄。考虑患者出现了心力衰竭，在饮食护理上患者要低盐饮食，其原因是

- A.避免肝脏受损
- B.减少液体潴留
- C.减轻肾脏负担
- D.减轻肺水肿
- E.提高心肌收缩力

答案：B

解析：心衰导致机体潴留过多的钠盐，从而引起水分的潴留，增加心脏的负担，引起相关的症状，如踝部、四肢水肿、气急和体重增加。

55.患者，男性，40岁。一月前诊断为急性心包炎，近两周呼吸困难严重，心率加快。查体发现患者有奇脉，奇脉的表现是

- A.脉搏搏动呈呼气性显著减弱或消失，吸气时减弱或有停顿
- B.脉搏搏动呈吸气性显著减弱或消失，呼气时又复原
- C.脉搏搏动呈呼气性显著减弱或消失，吸气时又复原
- D.脉搏搏动呈吸气性显著消失，呼气时减弱
- E.脉搏搏动呈吸气性显著减弱，呼气时消失

答案：B

解析：奇脉指吸气时脉搏明显减弱甚至消失，呼气时又出现或恢复原状的现象。

56.患者，男，27岁，自去年冬季以来每日发生空腹痛，进食后疼痛缓解。平时伴有恶心、呃逆、反酸，查体在剑突右侧有局限压痛，无反跳痛。该患者可能的诊断为

- A.急性胃炎
- B.慢性胃窦炎
- C.胃溃疡
- D.十二指肠溃疡
- E.食管憩室

答案：D

解析：本题重点考察消化性溃疡的临床表现，该病人空腹疼痛进食后缓解。与进食有关的规律性上腹痛，是消化性溃疡的典型特征，胃溃疡腹痛规律是：进食→腹痛→缓解；十二指肠溃疡腹痛规律是：腹痛→进食→缓解。

57.患者，男，45岁。十二指肠球部溃疡并发幽门梗阻。医嘱中出现下列哪种药物

时，护士应提出质疑

- A.氢氧化铝凝胶
- B.口服补盐液
- C.奥美拉唑
- D.枸橼酸铋钾
- E.克拉霉素



答案：B

解析：无

58.患者，女，48岁。毕Ⅱ式胃大部切除术后6天，突发右上腹剧烈疼痛伴腹膜刺激征。外科护士应首先考虑

- A.术后胃出血
- B.输入段梗阻
- C.低血糖综合征
- D.碱性反流性胃炎
- E.十二指肠残端破裂



答案：E

解析：

十二指肠残端破裂是毕Ⅱ式胃大部切除术后近期的严重并发症，表现为右上腹突发剧痛和局部明显压痛、腹肌紧张等急性弥漫性腹膜炎症状。

59.患儿，女，10个月。因腹泻4天入院。患病期间进食少，呕吐频繁，精神萎靡，前囟凹陷，尿量明显减少，皮肤弹性差，腹胀，肠鸣音减弱，心率快，心音低钝，有奔马律。护士根据查体的情况考虑该患儿可能并发

- A.重度脱水伴低钠血症
- B.中度脱水伴低钾血症
- C.轻度脱水伴低钾血症
- D.中度脱水伴高钾血症
- E.轻度脱水伴高钾血症



答案：B

解析：无

60.患儿，女，3岁。近日腹泻，1小时前突然剧烈腹痛，哭闹、呕吐、腹胀，10分钟前有少量果酱样粪便，右侧腹可触及腊肠样肿物，长约7cm。为明确诊断，首选下列哪项检查

- A.空气灌肠
- B.口服钡剂造影
- C.腹部B超

- D.腹腔穿刺
- E.肛门指诊

答案：A

解析：

61.患儿，女，3岁。近日腹泻，1小时前突然剧烈腹痛，哭闹、呕吐、腹胀，10分钟前有少量果酱样粪便，右侧腹可触及腊肠样肿物，长约7cm。现患儿仍为患病早期，首选的治疗是

- A.腹部按摩，手法复位
- B.胃肠减压
- C.镇痛
- D.空气灌肠复位
- E.补液



答案：D

解析：

62.男，48岁，3年前化脓性阑尾炎手术后，常有腹痛。近两天来腹痛加重，频繁呕吐，呕吐物有粪臭味，无肛门排气排便，查体明显腹胀，腹部压痛，拟诊为肠梗阻。应禁止使用哪种药物

- A.抗菌素
- B.阿托品、654-2
- C.吗啡、杜冷丁
- D.生理盐水
- E.葡萄糖注射液

答案：C

解析：

63.某病人急性阑尾炎穿孔致腹膜炎。手术后第5天体温升高达39℃，伴大便次数增多，里急后重，黏液便，伤口不痛，无咳嗽。考虑哪项可能性最大

- A.切口感染
- B.菌痢
- C.肠炎
- D.盆腔脓肿
- E.肺炎、肺不张

答案：D

解析：

腹腔脓肿常发生于术后5~7天，表现为体温升高或下降后反复升高，伴有腹痛、

腹胀、腹部包块及直肠膀胱刺激征。

64.患者，男，40岁。剧烈咳嗽时，右侧腹股沟斜疝被嵌顿。下列哪项说明疝发生绞窄，应做好紧急手术准备

- A.疝块增大，不能回纳
- B.腹胀明显，恶心、呕吐
- C.疝块紧张发硬，有触痛
- D.阵发性腹痛伴停止排气排便
- E.局部有压痛，肌紧张



答案：E

解析：

腹壁“局部有压痛，肌紧张”是局限性腹膜炎的重要表现，说明疝内容物已有缺血、坏死和渗出。

65.患者，男，38岁，肛周皮下有一深部脓肿，一端向体表穿破，另一端向直肠穿孔，不断有脓、粪液流出，此管道应称为

- A.空洞
- B.溃疡
- C.蜂窝织炎
- D.窦道
- E.瘘管



答案：E

解析：无

66.肝硬化合并上消化道出血最主要的原因是

- A.缺乏维生素K
- B.急性胃黏膜糜烂
- C.血小板减少
- D.食管胃底静脉曲张破裂
- E.反流性食管炎



答案：D

解析：无

67.肝硬化最严重的并发症是

- A.肝性脑病
- B.原发性肝癌
- C.肝肾综合征
- D.自发性腹膜炎

E.上消化道大出血

答案：A

解析：无

68.患者，女，43岁。患胆石症6年，2天前因腹痛、寒战、高热和黄疸发作，门诊用抗生素输液治疗无效入院，来院时发现患者神志不清，血压75/50mmHg，考虑

- A.急性坏疽性胆囊炎
- B.急性梗阻性化脓性胆管炎
- C.慢性胆囊炎急性发作
- D.胆道蛔虫伴感染
- E.胆囊穿孔

答案：B

解析：

①肝外胆管结石/急性胆管炎(轻型)：夏克三联征——腹痛、寒战高热、黄疸。②急性梗阻性化脓性胆管炎：雷诺儿五联征——夏克三联征+休克+意识障碍。(注意：胆管炎的黄疸为梗阻性黄疸，休克类型为感染性休克)。

69.患儿，女，2岁。2天前因受凉出现发热，咳嗽，轻度喘憋，食欲减退，查体：T39.5°C，心率160次/分，呼吸70次/分，口周发绀，鼻翼扇动，腹胀明显，腹部听诊肠鸣音消失。该患儿最可能发生的并发症为

- A.低钾血症
- B.低钠血症
- C.坏死性小肠炎
- D.消化功能紊乱
- E.中毒性肠麻痹

答案：E

解析：患者腹胀明显，腹部听诊肠鸣音消失。中毒性肠麻痹主要是由细菌和病毒及其毒素引起胃肠功能紊乱，致肠蠕动减弱或消失，肠腔积气，压力增加，胃肠道血液循环障碍，供血供氧不足，形成恶性循环，严重腹胀可影响心肺功能，出现或加重呼吸困难。

70.患者，男性，25岁。因受凉后突然畏寒、高热伴右胸部疼痛1天入院。胸部透视，见右中肺有大片浅淡的阴影。诊断为“右下肺炎”入院治疗，给予抗生素治疗。疗程一般为

- A.3天
- B.退热后就停药
- C.4天

D.7 天

E.1 天

答案：D

解析：抗生素疗程一般为 7 天，热退后 3 天即可停药。

71.患者，男性，62 岁。因肺炎用抗生素连续治疗，近日发现口腔黏膜有白色附着物，用棉签拭去附着物可见出血。考虑口腔病变为

- A.维生素缺乏
- B.凝血功能障碍
- C.铜绿假单胞菌感染
- D.病毒感染
- E.真菌感染

答案：E

解析：患者大量使用抗生素，口腔黏膜有白色附着物，提示真菌感染。

72.患者，女性，36 岁。诊断为支气管扩张，咳嗽，咳痰，痰量 60ml/d，最应采取的护理措施是

- A.提供通风良好的病室环境
- B.指导患者大量饮水
- C.采取体位引流
- D.机械吸痰
- E.鼓励患者使用祛痰药

答案：C

解析：支气管扩张，有痰应采取体位引流，进行头低脚高位引流时，应密切观察病人身体状况，以免发生意外。

73.患者，女性，26 岁。妊娠 5 个月，支气管扩张 5 年。今晨突然鲜血从口鼻涌出，随即烦躁不安，极度呼吸困难，唇指发绀。不宜选用的止血药为

- A.参三七
- B.卡巴克洛
- C.垂体后叶素
- D.6-氨基己酸
- E.抗血纤溶芳酸

答案：C

解析：妊娠的患者禁止用垂体后叶素止血。

74.患者，男性，80 岁。慢支肺气肿病史 30 年，近 1 周来出现咳嗽，咳大量黏液脓痰，伴心悸、气喘，查体呼吸急促、发绀明显，颈静脉怒张、下肢水肿。该

患者氧疗时，给氧浓度和氧流量应为

- A.29%, 2L/min
- B.33%,3L/min
- C.37%,4L/min
- D.41%,5L/min
- E.45%,6L/min



答案：A

解析：提示：大量黏液脓痰呼吸急促、发绀明显，颈静脉怒张、下肢水肿，证明在急性期，氧浓度和氧流量应为 29%，2L/min。

75.患者，女性，25岁。因春游赏花，出现咳嗽、咳痰伴喘息，呼气性呼吸困难。查体：喘息貌，口唇发绀，在肺部可闻及广泛哮鸣音。医疗诊断为支气管哮喘。

下面哪种是控制症状的首选药

- A.氨茶碱
- B. β_2 受体激动剂
- C.色甘酸钠
- D.氯苯那敏
- E.沙丁胺醇



答案：B

解析：

β 受体激动药：沙丁胺醇为哮喘急性发作的首选药。



76.某肺心病患者，血气分析：动脉血氧分压 6.0kPa(45mmHg)，动脉血二氧化碳分压 10.0kPa(75mmHg)。应给予哪种氧疗法

- A.持续低流量、低浓度给氧
- B.持续高流量、高浓度给氧
- C.间歇低流量、低浓度给氧
- D.间歇高流量、高浓度给氧
- E.间歇高流量、乙醇湿化给氧



答案：A

解析：

维持呼吸道通畅，纠正缺氧和二氧化碳潴留：纠正缺氧通常采用低浓度、低流量持续给氧，流量 1~2 L/min，24 小时持续吸氧。

77.患者，男性，75岁。诊断为Ⅱ型呼吸衰竭，表现为呼吸困难，发绀明显，血气分析结果为 PaO₂50mmHg、PaCO₂76mmHg。该患者的氧疗方式应为

- A.2~4L/min 鼻导管吸氧

- B.2~4L/min 间歇吸氧
- C.1~2L/min 持续鼻导管吸氧
- D.低流量间歇吸氧
- E.4~6L/min 酒精湿化吸氧

答案：C

解析：

慢性Ⅱ型呼吸衰竭以低流量(1~2 L/min)、低浓度(25% ~29%)持续吸氧。

- 78.患者，男性，82岁。肺心病，近半个月来咳嗽、咳痰，今晨呼吸困难加重，神志恍惚，烦躁不安。查体：体温36.4℃，脉搏120次/分，血压130/80mmHg，呼吸38次/分，口唇发绀，两肺底闻及湿啰音。患者最可能出现的并发症是
- A.心力衰竭
 - B.上消化道出血
 - C.急性肾衰竭
 - D.呼吸衰竭
 - E.DIC

答案：D

解析：呼吸困难加重，神志恍惚，烦躁不安两肺底闻及湿啰音提示病情加重出现了呼吸衰竭。慢性呼吸衰竭是在原有肺部疾病基础上发生的，最常见病因为COPD，早期可表现为Ⅰ型呼吸衰竭，随着病情逐渐加重，肺功能愈来愈差，可表现为Ⅱ型呼吸衰竭。慢性呼吸衰竭稳定期，虽PaO₂降低和PaCO₂升高，但患者通过代偿和治疗，可稳定在一定范围内，患者仍能从事一般的工作或日常生活活动。一旦由于呼吸道感染加重或其他诱因，可表现为PaO₂明显下降，PaCO₂显著升高，此时可称为慢性呼吸衰竭的急性发作，这是我国临床上最常见的慢性呼吸衰竭类型。

- 79.患者，男性，72岁。慢性阻塞性肺气肿病史20多年，今日傍晚进餐时一米粒呛入气管引起剧烈咳嗽，突然呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重。最可能是发生了
- A.自发性气胸
 - B.心肌梗死
 - C.胸腔积液
 - D.支气管阻塞
 - E.肺栓塞

答案：A

解析：突然呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重，患者可能出现了自发性气胸。

80.3岁幼儿，未患过水痘。现该幼儿班级里出现水痘患儿，该幼儿应在家隔离观

察的时间是

- A.1周
- B.2周
- C.3周
- D.4周
- E.5周



答案：C

解析：易感人群接触水痘病人后应隔离三周。

81.患者，女，29岁。因发热2天，伴乏力、尿黄，查谷丙转氨酶1120U/L，总胆红素70nmol/L，抗-HAVIgM(+)，诊断为“急性黄疸型肝炎”。该患者目前最主要的治疗措施是

- A.卧床休息
- B.保肝药物治疗
- C.抗病毒治疗
- D.补充维生素
- E.免疫治疗



答案：A

解析：

甲型肝炎以卧床休息和对症治疗为主。



82.患者，男，24岁。8年前发现HIV抗体(+)，40天前无明显诱因出现发热，体温波动在38.0~38.5°C，伴咳嗽、咳痰，入院诊断为“肺孢子菌肺炎”。目前该患者的艾滋病分期最可能的是

- A.潜伏期
- B.急性感染期
- C.无症状感染期
- D.持续性全身淋巴结肿大综合征
- E.典型艾滋病期



答案：E

解析：E

83.患儿3岁。发热后出现针尖大小的丘疹，全身皮肤弥漫性充血，疹间皮肤不正常，入院后诊断为猩红热，则应警惕患儿出现的并发症是

- A.肺炎
- B.睾丸炎
- C.脑炎
- D.急性肾小球肾炎

E.急性胰腺炎

答案：D

解析：少数起病后 1~5 周可发生变态反应性风湿病及急性肾小球肾炎。

84.某学校班级中出现一名猩红热患儿，为保护班内其他易感人群，应当对其进行医学观察多少天

- A.14 天
- B.10 天
- C.7 天
- D.5 天
- E.3 天

答案：C

解析：接触者密切观察 7 天，对病人的分泌物及排泄物用含氯消毒液消毒，接触过的物品，应浸泡、熏蒸或日晒消毒。

85.患儿，女，2岁，PPD试验硬结直径21mm，未接种过卡介苗，护士考虑该患儿可能是

- A.免疫功能低下
- B.体内有新近感染的活动性病灶
- C.原发免疫缺陷病
- D.曾有结核感染
- E.非典型结核分枝杆菌感染

答案：B

解析：B

86.足月儿，女，生后5天。母乳喂养。第4天食奶量明显减少，第5天皮肤出现黄染而就诊。体检：体温37℃，脐部周围皮肤红肿，诊断为新生儿脐炎。局部皮肤常用的消毒药物是

- A.0.5%碘伏
- B.0.1%苯扎溴铵
- C.3%双氧水
- D.30%酒精
- E.95%酒精

答案：A

解析：无

87.患者，男性，52岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷中毒症状，头晕、头痛、乏力，支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出

现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。有机磷农药对人体的毒性主要在于

- A.抑制中枢神经系统
- B.增加乙酰胆碱酯的产生
- C.抑制乙酰胆碱酯酶活力
- D.使血液凝固发生障碍
- E.引起急性肾衰竭




答案：C

解析：有机磷农药对人体的毒性主要在于抑制乙酰胆碱酯酶活力。

88.患者，男性，52岁。特殊职业，在生产有机磷农药工作中违反操作规定，出现有机磷中毒症状，头晕、头痛、乏力，支气管分泌物增多、呼吸困难，逐渐出现烦躁不安、谵妄、抽搐及昏迷。有机磷农药中毒最常用的抗胆碱药阿托品，其作用是

- A.使瞳孔缩小
- B.缓解肌肉抽搐
- C.缓解肌肉震颤
- D.抑制腺体分泌
- E.促使昏迷患者苏醒

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：D

解析：阿托品抑制腺体。但一出现阿托品化，即瞳孔较前扩大，颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿啰音减少或消失、心率加快，则应减少阿托品剂量或停药。

89.患者，男性，28岁，因煤气中毒1天后送医院。患者进入深昏迷、抽搐、呼吸困难、呼吸浅而快、面色苍白、四肢湿冷、周身大汗，有大小便失禁、血压下降。目前患者处于

- A.迟发性脑病
- B.重度中毒
- C.中度中毒
- D.轻度中毒
- E.慢性中毒

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：B

解析：

CO 中毒程度。临床表现 COHb 浓度抢救措施轻度中毒剧烈头痛、头晕、恶心、呕吐、无力、嗜睡、心悸、意识模糊等 10%~20% 及时脱离中毒环境，吸入新鲜空气，症状可较快消失中度中毒神志不清、浅昏迷、面色潮红、口唇呈樱桃红色、脉快、多汗 30%~40% 及时脱离中毒环境，积极抢救，可在数小时后清醒，一般无明显并发症重度中毒深昏迷抽搐、呼吸困难、面色苍白、四肢湿冷、全身大汗、

血压下降高于 50% 最后因脑水肿，呼吸、循环衰竭而死亡。

90. 患者，男性，35岁，体重58kg。不慎被开水烫伤，自觉剧痛，头面部、颈部及双上肢均有水疱。伤后3小时，患者诉口渴。体检：脉搏100次/分，血压80/60mmHg，尿量15ml/h。患者血容量减少的原因中，以下哪项错误

- A. 输液量不足
- B. 心排出量减少
- C. 末梢血管扩张
- D. 血浆自创面渗出
- E. 血浆渗出到组织间隙

答案：A

解析：毛细血管通透性增高血浆成分丢失到组织间（第三间隙）、水泡内或体表外（水泡破裂后），故血容量减少，严重烧伤后，除损伤处渗出处，其他部位因受体液炎症介质的作用也可有血管通透性增高，故血容量更加减少。除了渗出，烧伤区因失去皮肤功能而蒸发水分加速，加重了脱水。故A错误。

91. 患者，男性，35岁，体重58kg。不慎被开水烫伤，自觉剧痛，头面部、颈部及双上肢均有水疱。若对该患者实施补液治疗，伤后第一个8小时应输入的电解质溶液量为

- A. 8100ml
- B. 1620ml
- C. 1215ml
- D. 910ml
- E. 810ml

答案：E

解析：伤后第1个24小时补液量 (ml) = II、III度烧伤面积 (%) × 体重 (kg) × 1.5 (胶体液和电解质液) + 2000 (基础水分)

即为补液总量，输液总量的一半，应在伤后8小时内输完，另一半在其后约16小时输完。代入公式可得810ml。

92. 患者，男性，36岁。在树丛行走时被蛇咬伤后，局部皮肤留下一对大而深的齿痕，伤口出血不止，周围皮肤迅速出现瘀斑、血疱。为降解伤口内蛇毒，可用于伤口外周封闭的是


- A. 地塞米松
- B. 糜蛋白酶
- C. 胰蛋白酶
- D. 淀粉酶
- E. 脂肪酶

答案：C

解析：胰蛋白酶有直接分解蛇毒作用，可取 2000 U 加入 0.05% 普鲁卡因或注射用水 20ml，在伤口四周做局部浸润 或环状封闭。

93.患者，男性，27岁，被撞倒后右肘部着地，出现上臂剧烈疼痛而就诊。检查发现伤侧上臂肿胀、畸形和假关节活动。右上肢长度比左上肢缩短 2 cm。请问该患者可能的诊断是

- A.锁骨骨折
- B.桡神经损伤
- C.肱动脉损伤
- D.尺骨鹰嘴骨折
- E.肱骨干骨折



答案：E

解析：患者伤侧上臂肿胀、畸形和假关节活动。右上肢长度比左上肢缩短 2 cm。
提示肱骨干骨折

94.患者，男性，23岁，自高处坠下，额部着地，双眼眶青紫淤血，鼻腔有血性液体流出，主诉视力有所下降。可考虑

- A.脑损伤
- B.鼻出血
- C.眼球损伤
- D.颅中窝骨折
- E.颅前窝骨折



答案：E

解析：颅前窝骨折：可出现一侧或两侧黑眼征（眼镜征，熊猫眼），骨折线经过额筛窦时，常产生鼻出血 脑脊液鼻漏及嗅觉减退或丧失，或因气体进入颅腔内产生外伤性颅内积气； 其他征象 前额有皮肤损伤；结膜下淤血；单侧或双侧视神经损伤症状；x 线检查骨折线经过框上壁 筛板 额窦和视神经管 颅脑 ct 发现前额脑挫裂伤或血肿等病变 额叶损伤症状；以及可能伴随的眼 鼻部 颞弓附近损伤，眼球突出和活动受限。

95.患者，女，48岁。患慢性肾衰竭，现有头晕、定向力障碍，内生肌酐清除率 25ml/min,伴有消化道等各系统症状。应指导患者不宜摄入

- A.糖
- B.鸡肉
- C.牛奶
- D.植物油
- E.动物内脏

答案：E

解析：慢性肾衰竭：优质低蛋白饮食，如鸡蛋、牛奶及动物蛋白等，并保证供给足够的热量，并补充多种维生素。限制钠盐的摄入。患者内生肌酐清除率 $25\text{ml}/\text{min}$,伴有消化道等各系统症状应该限制动物内脏。

96.患者，男，32岁。右肾下极巨大结石行体外震波碎石，下列术后护理措施不正确的是

- A.多饮水
- B.取患侧卧位
- C.指导患者早期行跳跃运动
- D.观察疼痛和血尿情况
- E.观察排石情况



答案：C

解析：提示：术后患侧卧位 $4\sim 7.2$ 小时并大量饮水。

97.患者，男，60岁，行前列腺肥大摘除术。术后进行膀胱冲洗时，应选择的溶液是

- A.0.02%呋喃西林
- B.3%硼酸
- C.0.9%氯化钠溶液
- D.0.1%新霉素
- E.5%葡萄糖溶液

JINYINGJIE.COM



答案：C

解析：常规用生理盐水持续膀胱冲洗 $1\sim 2$ 天，以防血块堵塞尿管。

98.患者，女性，65岁。诊断为脊髓型颈椎病。下列陈述中不适当的是

- A.可引起截瘫
- B.早期应积极手术治疗
- C.MRI可见脊髓受压
- D.早期可行按摩、牵引治疗
- E.可导致大小便失禁

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：D

解析：病例中，没有描述病情的轻重，故不可判断早期可行按摩、牵引治疗。

99.患者，女性，42岁。腕、掌指关节疼痛7年，诊断为类风湿关节炎。该患者最先受损的关节组织是

- A.韧带
- B.关节囊
- C.骨组织
- D.软骨组织
- E.滑膜组织

答案：E

解析：最先受损的关节组织滑膜组织。

100.患儿，7岁。因发热、头痛、呕吐、腹泻2天入院。患儿精神萎靡，抽搐2次。查体嗜睡，颈强直（+），凯尔尼格征（+），血常规示白细胞 $14\times10^9/L$ ，脑脊液检查脑脊液无色透明，白细胞数 $110\times10^9/L$ ，中性0.82。护士发现患儿出现反复抽搐，意识不清，伴高热不退，呼吸节律不规整。该护士首选的抢救措施是

- A.脱水药
- B.呼吸兴奋药
- C.糖皮质激素
- D.退热药
- E.抗生素

答案：A

解析：患儿意识不清反复抽搐应输入甘露醇减缓症状。

101.在脊柱骨折中，下列哪个叙述不正确

- A.绝大多数是由间接暴力引起
- B.胸腰段交界处脊柱活动较多，最不易受损伤
- C.脊柱骨折可导致脊髓损伤
- D.伸直型脊柱骨折极少见
- E.屈曲型脊柱骨折最常见

答案：B

解析：

胸腰段交界处位于脊柱的稳定部分与活动部位交界处，活动较多，最易受损伤。

102.患者，女性，33岁。计算机工作者。颈肩疼痛2年余，近半年来疼痛向左上肢放射，左前臂桡侧及手背桡侧麻木。左上肢牵拉试验和压头试验阳性。X线片及MRI示颈椎4~6退行性病变，其他检查未见异常。该患者目前治疗方法宜首先选择

- A.经前路手术治疗
- B.经后路手术治疗
- C.高压氧治疗
- D.颌枕带颈椎牵引
- E.围领或颈托制动

答案：D

解析：

脊髓型颈椎病确诊后应及时手术。非手术治疗半年以上无效，或症状重影响生活、工作者，均考虑手术。神经根型、椎动脉型、交感神经型颈椎病治疗原则是去除压迫因素，消炎止痛，恢复颈椎稳定性，首选非手术治疗，方法：领枕带颈椎牵引、理疗、围领或颈托制动、推拿按摩、药物对症治疗等。

103.患者，女性，29岁。工人。因腕及掌指关节肿痛，伴双膝关节疼痛、行走困难入院。入院血液检查：血红蛋白110g/L，血沉70mm/h，红细胞计数 $3.6\times1012/L$ ，白细胞总数 $4.10\times109/L$ 。免疫学检查：RF(+)，尿蛋白(-)。伴晨僵。该患者最可能的疾病诊断是

- A.骨性关节炎
- B.风湿热
- C.类风湿性关节炎
- D.风湿性关节炎
- E.系统性红斑狼疮

答案：C

解析：根据患者腕及掌指关节伴晨僵，血沉明显增快，RF(+)，可诊断类风湿性关节炎。

104.

关于甲状腺乳头状癌，下列叙述不正确的是

- A.为甲状腺癌最常见的类型
- B.青少年女性多见
- C.本癌发现时约50%已有颈淋巴结转移，因此预后很差
- D.生长较慢，恶性程度较低
- E.有时原发灶很小，临幊上首先发现转移病灶

答案：C

解析：乳头状癌是甲状腺癌中最常见的类型，青少年女性多见，肿瘤生长慢，恶性程度较低，预后较好。肿瘤大小及是否有远处转移与患者生存率有关，而是否有局部淋巴结转移与生存率无关。但局部淋巴结转移较早，有时原发灶很小，临幊上首先发现转移病灶。

105.食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是

- A.术前禁食
- B.营养支持
- C.纠正水、电解质、酸碱失衡
- D.加强口腔卫生
- E.术前三天温盐水洗胃

答案：E

解析：

术前三天温盐水洗胃可减轻食管黏膜水肿，预防术后感染和吻合口瘘。



106.肝癌术前护理不正确的是

- A.给予维生素 K
- B.术前 3 天口服肠道不吸收抗生素
- C.适量输血和白蛋白
- D.术前晚用肥皂水灌肠
- E.全面检查肝功能和凝血功能

答案：D

解析：肝癌肝硬化肝性脑病禁止肥皂水灌肠。

107.晚期肾癌患者常伴营养不良，其最主要原因是

- A.发热和继发感染
- B.恶心、呕吐和消化不良
- C.血尿和肿瘤消耗
- D.尿频和尿急
- E.高血压和低蛋白血症



答案：C

解析：

肾癌的临床表现包括肾癌三联征（血尿、腰痛和肿块）、副瘤综合征和转移症状，其中癌肿的消耗和长期的血尿会导致机体营养不良。

108.膀胱癌最有意义的临床症状是

- A.排尿困难
- B.贫血、血肿
- C.无痛性肉眼血尿
- D.活动后血尿
- E.尿急、尿频、尿痛



答案：C

解析：

膀胱癌表现为无痛性、间歇性全程肉眼血尿，有时可伴有血块，终末加重，间歇出现，可自行停止或减轻。血尿程度与肿瘤大小、数目、恶性程度并不一定成正比。膀胱刺激症状常发生于血尿之后，多为晚期表现，表示肿瘤有坏死破溃或浸润膀胱壁或合并感染。

109. 绒毛膜癌的治疗原则是

- A. 化疗为主，手术为辅
- B. 放疗为主，化疗为辅
- C. 放疗为主，手术为辅
- D. 手术为主，化疗为辅
- E. 手术为主，放疗为辅



答案：A

解析：

【解析】滋养细胞疾病是所有肿瘤中对化疗最敏感的一类。

110. 绒毛膜癌最常见的转移部位是

- A. 脑
- B. 肝
- C. 阴道
- D. 肺
- E. 胃肠道

金英杰医学
JINYINGJIE.COM



答案：D

解析：

绒癌常见的转移部位依次是：肺、阴道、盆腔、肝和脑。

111. 与白血病发病无关的是

- A. 物理因素
- B. 免疫功能亢进
- C. 遗传因素
- D. 药物化学因素
- E. 病毒因素

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

答案：B

解析：

目前在白血病的发病原因方面，认为与感染、放射因素、化学因素、遗传因素等有关。

112. 患者女，55岁。宫颈癌术后2天，患者询问护士其尿管何时可以拔出，护士回答是

- A. 7~14天
- B. 4天
- C. 6天

D.3 天

E.5 天

答案：A

解析：

宫颈癌术后留置尿管的时间一般是 1~2 周，因此 E 是正确答案。其余选项错误。

解题关键：老年患者、术后必须长期卧床者都应留置导尿管，时间 1~2 周，注意防止感染。

113.患者女，52 岁。子宫肌瘤手术后，护士为其做出院指导时告知患者术后按时随访。首次随访的时间是

A.术后 1 年

B.术后 1 个月

C.术后 2 个月

D.术后 3 个月

E.术后 6 个月

答案：B

解析：

114.一子宫肌瘤患者，行子宫全切术后，护士对其进行术后指导，告知患者术后阴道残端肠线吸收，会导致阴道少量出血，大约在术后

A.14~15 天出现

B.21~22 天出现

C.3~4 天出现

D.28~29 天出现

E.7~8 天出现

答案：E

解析：

子宫全切术后可有少量暗红色阴道流血，血量逐渐减少，若术后 7~8 天出现阴道流血，多为阴道残端肠线吸收所致。

115.患者，女，28 岁。乳腺扩大根治术后咨询护士可以妊娠的时间是术后

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

答案：E

解析：

乳腺癌病人术后 5 年应避免妊娠，以防肿瘤复发。



116. 卡介苗接种的时间是

- A. 出生时
- B. 出生后 1 个月
- C. 1、6 月龄
- D. 2、3、4 月龄
- E. 1 月龄

答案：A

解析：无

117.

医嘱：复方新诺明 1.0g, po.bid, 护士指导患者服药时间，正确的是

- A. 8am
- B. 8pm
- C. 8am-12n-4pm
- D. 8am-12n-4pm-8pm
- E. 8am-4pm

金英杰医学

JINYINGJIE.COM



答案：E

解析：解析：bid 每日两次。

118. 乳癌根治术后，为预防皮下积液及皮瓣坏死的主要措施是

- A. 半卧位
- B. 抬高同侧上肢
- C. 局部砂袋压迫
- D. 加压包扎伤口
- E. 引流管持续负压吸引

金英杰医学

JINYINGJIE.COM

答案：E

解析：乳癌根治术后，引流管持续负压吸引，以预防皮下积液及皮瓣坏死。

119. 乳腺癌患者乳房皮肤出现局部凹陷，提示癌肿已经侵犯了

- A. 大乳管
- B. 皮下脂肪组织
- C. Cooper 韧带
- D. 胸小肌

E.皮下淋巴管

答案：C

解析：无

120.患者，5岁。高热5小时、反复抽搐，意识不清，急查白细胞 $14\times10^9/L$ ，肛拭子取粪便见脓细胞8个/HP，红细胞12个/HP，最可能发生的情况是

- A.脑膜炎
- B.高热惊厥
- C.重症肺炎
- D.中毒型菌痢
- E.电解质紊乱

答案：D

解析：

痢疾杆菌致病性很强，可产生内毒素和外毒素。内毒素可形成内毒素血症，引起全身和（或）脑的急性微循环障碍，产生休克和（或）脑病；外毒素的神经毒性可引起神经系统表现。