
目录

全国护士执业资格考试精准模拟卷（一）	1
专业实务	2
实践能力	18
 全国护士执业资格考试精准模拟卷（二）	34
专业实务	35
实践能力	51
 全国护士执业资格考试精准模拟卷（三）	67
专业实务	68
实践能力	83
 全国护士执业资格考试精准模拟卷（四）	99
专业实务	100
实践能力	115
 全国护士执业资格考试精准模拟卷（五）	131
专业实务	132
实践能力	147
 答案及解析	163

全国护士执业资格考试
精准模拟卷（一）

全国护士执业资格考试精准模拟卷（一）专业实务

【A1/A2型题】

1. 股静脉穿刺部位为

- A. 股动脉外侧 0.5cm
- C. 股神经内侧 0.5cm
- D. 股神经外侧 0.5cm
- E. 股动脉和股神经之间

2. 血培养标本一般的取血量为

- A. 2ml
- B. 4ml
- C. 5ml
- D. 8ml
- E. 10ml

3. 做真菌培养时取分泌物的位置是

- A. 双侧腭弓
- B. 溃疡面
- C. 咽部
- D. 扁桃体
- E. 舌面

4. 不符合无痛注射原则的是

- A. 分散病人注意力
- B. 进针后注射前禁忌抽动活塞
- C. 体位舒适放松肌肉
- D. 注射时两快一慢
- E. 注射刺激性强的药物进针要深

5. 皮内注射错误的是叙述错误的是

- A. 不用碘酒消毒
- B. 部位可在前臂掌侧、三角肌下缘
- C. 拔针不按压
- D. 进针角度为 5 度
- E. 仅适于药物过敏试验

6. 患者男，56岁，肝硬化3年，因肝性脑病入院。为防止患者病情加重，应给与

- A. 低脂肪饮食
- B. 低蛋白饮食
- C. 低嘌呤饮食
- D. 低胆固醇饮食
- E. 低盐饮食

7. 引起病毒性心肌炎最常见的病毒是

- A. 疱疹病毒
- B. 柯萨奇病毒
- C. 肝炎病毒
- D. 流感病毒
- E. 轮状病毒

8. 患者男，30岁，被利器刺伤胸部引起开放性气胸，为预防感染可使用

- A. 激素
- B. 维生素
- C. 止痛药
- D. 止血药
- E. 抗生素

9. 利多卡因治疗心律失常的主要机制是

- A. 阻滞钾通道
- B. 阻滞β受体
- C. 阻滞钙通道
- D. 阻滞α受体
- E. 阻滞钠通道

10. 根据人体器官移植相关规定，下列不属于植体器官接受者的是

- A. 配偶
- B. 儿子
- C. 姑姑
- D. 姐姐
- E. 朋友

11. 患者男，流浪人员，因车祸致右下肢开放性骨折被路人送入院，医生和护士及时给予之止血，建立静脉通路并做好急救准备，护士保护了患者

- A. 人格受到尊重的权利
- B. 参与治疗的权利
- C. 选择诊疗方式的权利
- D. 知情同意权
- E. 享有平等的医疗服务的权利

12. 患者男，33岁，炼钢工人，工作中不慎被烧伤，3度烧伤面积60%，应采用隔离方式是
A. 接触隔离
B. 消化道隔离
C. 呼吸道隔离
D. 保护性隔离
E. 严密隔离
13. 护士给某乙肝患者拔针时不小心被粘有该患者血液的针头刺伤，伤口的即刻处理方法不妥的是
A. 按压止血
B. 用肥皂液和流动水冲洗
C. 尽可能挤出损伤处的血液
D. 消毒后包扎伤口
E. 用75%乙醇或0.5%碘伏消毒
14. 某血站违反有关操作规程和制度采集血液，责令其
A. 县级以上的地方人民政府卫生计生行政部门
B. 县级以上的职业协会
C. 县级以上卫生防御机构
D. 县级以上医疗保健机构
E. 县级以上地税机构
15. 患者女，26岁，下肢急性淋巴管炎，查体见肢体肿胀明显，局部应擦拭药液是
A. 0.1%碘伏
B. 50%硫酸镁
C. 外用生理盐水
D. 3%过氧化氢
E. 75%酒精
16. 患者沟通提问过程中，如果护士采用的是封闭式提问，其主要的优点是
A. 患者就可以更好的阐述自己的观点
B. 护士可以在短时间内获得需要的信息
C. 护士可以获得更多资料
D. 护士可以获得更加真实全面的资料
E. 患者可以更加全面的介绍自己的情况
17. 患儿男，3岁，因进食花生时突然剧咳，面色发绀，内镜检查取出异物后，护士告诉家长该患儿可以进食的时间是
A. 24小时后
B. 即刻
C. 12小时后
D. 1小时后
E. 4小时后
18. 关于焦虑症的叙述，正确的是
A. 焦虑发作是先天对可怕情景的条件反射
B. 焦虑是害怕某些环境刺激所形成的的条件反射
C. 女性患病率明显低于男性
D. 发作时紧张程度与现实环境相符
E. 焦虑人格特质与遗传物都应焚烧
19. 患儿男，14个月，因“发热、流涕2天”就诊，查体T：39.7℃，P135次/分，神志清，咽部充血，心肺检查无异常，查体时患儿突然双眼上翻，四肢强直阵挛性抽搐，引起患儿病情变化的原因，最可能是
A. 癫痫
B. 低血糖
C. 高热惊厥
D. 病毒性脑炎
E. 化脓性脑膜炎
20. 某新生儿出生时全身青紫，四肢伸展，无呼吸，心率80次/分，用洗耳球插鼻有皱眉反应，该新生儿Apgar评分是
A. 0分
B. 1分
C. 2分
D. 3分
E. 4分
21. 某早产儿，胎龄34周，生后2小时出现呼吸困难、呻吟，X线胸片提示肺透明膜病变早期，应首选的给予处理措施是
A. 地塞米松
B. 氧气枕吸氧
C. 纠正酸中毒
D. 气管插管，机械通气

E. 持续气道正压通气

22. 患儿女，6个月，细菌性肺炎入院，目前患儿烦躁不安、呼吸困难。医嘱：吸氧，适宜患儿的吸氧方式为

- A. 单侧鼻导管吸氧
- B. 面罩法
- C. 鼻塞法
- D. 漏斗法
- E. 头罩法

23. 戊二醛浸泡消毒各种内镜的浓度是

- A. 0.5%
- B. 0.2%
- C. 1%
- D. 2%
- E. 5%

24. 发生空气栓塞时，应防止空气阻塞

- A. 肺静脉入口
- B. 主动脉入口
- C. 肺动脉入口
- D. 腹主动脉入口
- E. 上腔静脉入口

25. 产前检查健康史的内容不包括

- A. 个人资料
- B. 过去病史
- C. 月经史
- D. 家族史
- E. 配偶的家族史

26. 使用过氧乙酸消毒时应注意

- A. 消毒物品需悬挂或抖散
- B. 放于阴凉处避免高温引起爆炸
- C. 浸泡金属类物品浓度为0.2%
- D. 2%过氧乙酸溶液用于手的消毒
- E. 不能用于体温表的消毒

27. 冷疗可以选择的部位是

- A. 枕后
- B. 心前区
- C. 颈部
- D. 腹部

E. 足底

28. 消化性溃疡发生的基本原理是

- A. 幽门螺旋杆菌感染
- B. 胃酸分泌过多
- C. 胃黏膜保护作用减弱
- D. 胃黏膜和胃蛋白酶的消化作用
- E. 黏膜损害因素和保护因素之间失去平衡

29. 烧伤后发生休克的最主要原因是

- A. 精神刺激
- B. 创面剧烈疼痛
- C. 大量水分蒸发
- D. 大量血浆自创面外渗
- E. 大量组织坏死分解产物吸收

30. 关于女性外生殖器的叙述，正确的是

- A. 外阴的范围包括大阴唇，小阴唇，阴蒂，阴道前庭和子宫附件
- B. 小阴唇损伤后易形成血肿
- C. 阴道前庭位于两侧大阴唇之间
- D. 前庭大腺又称巴多林腺
- E. 大阴唇富含神经末梢，很敏感

31. 先天性心脏病右向左分流型最明显的外观特征是

- A. 心脏杂音
- B. 发育迟缓
- C. 持续发绀(青紫)
- D. 心前区隆起
- E. 活动耐力下降

32. 病人，女，34岁，胸部外伤后呼吸困难，发绀，脉快。提示张力性气胸的是

- A. X线示胸腔大量积液
- B. X线示纵隔移位
- C. 胸膜腔穿刺有高压气体冲出
- D. 伤口处发出嘶嘶声响
- E. 局部叩诊呈鼓音

33. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因

- A. 发热
- B. 大量呕吐
- C. 剧烈疼痛

- D. 血容量减少及毒素吸收
E. 细菌毒力强
34. 最常见的骨关节结核是
A. 脊柱结核
B. 肩关节结核
C. 肘关节结核
D. 髋关节结核
E. 膝关节结核
35. 在为患儿治疗时，最容易让患儿接受治疗的言语技巧是
A. 问候式语言
B. 夸赞式语言
C. 言语式语言
D. 关心式语言
E. 安慰性谎言
36. 护士在巡回过程中发现某患者静脉输液突然发生溶液不滴，该护士首先应采取的措施为
A. 调整针头斜面
B. 抬高输液瓶
C. 穿刺部位热敷
D. 挤压输液管
E. 观察穿刺部位有无红肿及疼痛
37. 不属于卡介苗接种的禁忌证的是
A. 早产儿
B. 发热
C. 新生儿腹泻
D. 结核菌素试验阴性
E. 有湿疹
38. “湿温”的好发季节是
A. 春、夏、秋
B. 春、秋
C. 夏、冬
D. 夏、秋
E. 冬、春
39. 胎盘滞留是指胎儿娩出后胎盘多长时间尚未娩出
A. 15min
B. 20min
- C. 30min
D. 1min
E. 2min
40. 下列属于濒死患者的临床表现的是
A. 室息
B. 心搏停止
C. 深反射消失
D. 呼吸衰竭
E. 各系统功能紊乱
41. 患者入院后行尿常规检查，留取尿标本的最佳时间是
A. 晨起第一次尿
B. 收集 12 小时尿液
C. 饭前半小时
D. 随时收集尿液
E. 睡前收集尿液
42. 临床治疗心力衰竭时，应用洋地黄的主要目的是
A. 增强心肌收缩力
B. 减慢心室率
C. 调节心肌耗氧量
D. 抑制心脏传导系统
E. 提高异位起搏点的自律性
43. 护士在执行医嘱时不能
A. 根据需要自行调整医嘱
B. 严格遵守医嘱执行制度
C. 有疑问时重新核对医嘱
D. 患者有不良反应时复核医嘱
E. 抢救时执行医生的口头医嘱
44. 与消化性溃疡发生关系密切的细菌是
A. 链球菌
B. 霍乱弧菌
C. 幽门螺杆菌
D. 痢疾杆菌
E. 大肠杆菌
45. 关于医疗机构临床用血的规定，正确的是
A. 可自行采集
B. 可将临床多余用血出售给血液制品生产单

- 位
- C. 必须进行配型核查
D. 必须先行缴费后使用
E. 主要动员家庭、亲友为患者献血
46. 进行尸体护理时，头下垫一软枕的目的是
- A. 防止面部淤血变色
B. 用于安慰家属
C. 便于家属识别
D. 保持尸体整洁
E. 保持尸体位置良好
47. 发生细菌性肝脓肿时，细菌侵入肝脏最主要的途径是
- A. 肝动脉
B. 门静脉
C. 肝静脉
D. 胆道系统
E. 十二指肠
48. 肺炎患者出现高热，其饮食原则不包括
- A. 高热量
B. 高蛋白
C. 高脂肪
D. 高维生素
E. 多饮水
49. 直接输新鲜血 100ml 需要加入 3.8% 枸橼酸钠溶液的量是
- A. 5ml
B. 10ml
C. 15ml
D. 20ml
E. 25ml
50. 病人住院期间，病案中排列在最前面的是
- A. 医嘱单
B. 体温单
C. 入院记录
D. 门诊病历
E. 住院病案首页
51. 心包腔内液体的生理作用是
- A. 维持心包腔内压力
B. 润滑作用
C. 营养心肌
D. 免疫作用
E. 维持心肌张力
52. 在我国医院护理组织结构中，只设立总护士长-护士长二级管理结构的医院床位数的要求是
- A. 100 张以下
B. 200 张以下
C. 300 张以下
D. 400 张以下
E. 500 张以下
53. 铺无菌盘时下列哪项错误
- A. 用无菌持物钳夹取治疗巾
B. 注意使治疗巾边缘对齐
C. 治疗巾开口部分及两侧反折
D. 有效期不超过 6 小时
E. 避免潮湿和暴露过久
54. 下列哪项不属于非语言交流
- A. 倾听
B. 专业性皮肤接触
C. 倾诉
D. 面部表情
E. 沉默
55. 光照消毒法的原理是
- A. 抑制细菌代谢和生长
B. 使菌体蛋白发生光解变性
C. 使微生物的蛋白质及酶变性凝固
D. 破坏细菌膜的结构
E. 干扰细菌酶的活性
56. 在护患交往中，护士微笑的作用不包括
- A. 改善护患关系
B. 化解护患矛盾
C. 优化护士形象
D. 缩短护患之间的空间距离
E. 缓解患者不安心理

57. 患者女性，23岁。使用青霉素10天后出现发热、关节肿痛、荨麻疹、全身淋巴结肿大、腹痛等症状，该患者可能出现
A. 过敏性休克
B. 血清病型反应
C. 皮肤过敏反应
D. 呼吸道过敏反应
E. 消化系统过敏反应
58. 患者女性，62岁，肝性脑病前期，意识思维错乱，行为失常，为患者灌肠忌用
A. 生理盐水
B. 高渗盐水
C. 开塞露
D. 0.1%肥皂液
E. 1、2、3灌肠液
59. 患者男性，56岁，患尿毒症，精神萎靡，下腹无胀满，24小时尿量为88ml。患者的排尿状况属于
A. 正常
B. 无尿
C. 少尿
D. 尿失禁
E. 尿潴留
60. 患者女性，35岁，职员。主因双肘、腕、手指近端指间关节肿痛2年，加重2周，以类风湿关节炎收入院。对诊断最有价值的检查是
A. 手指和腕关节的X片
B. 免疫学检查
C. 血象检查
D. 血液系统检查
E. 关节穿刺
61. 患者女性，65岁，患高血压15年，近日病情加重入院，查体：血压190/110mmHg，全身水肿，患者的饮食应采用
A. 要素饮食
B. 少渣饮食
C. 低蛋白饮食
D. 无盐低钠饮食
E. 低胆固醇饮食
62. 患者男性，25岁，因全身不适，前来就诊，候诊时，突然感到腹痛难忍，出冷汗，面色苍白，两手冰冷。呼吸急促，门诊护士应该
A. 让患者平卧休息
B. 给病人测量体温
C. 安排患者提前就诊
D. 与病人沟通给以安慰
E. 请医生加速诊治的速度
63. 患儿男，母乳喂养，体重8Kg，身长72cm，坐稳并能左右转身，能发简单的“爸爸”、“妈妈”的音节，刚开始爬行，其月龄可能是
A. 3~5个月
B. 6~7个月
C. 8~9个月
D. 10~11个月
E. 12个月
64. 按照药物保管要求，应该放在2~10℃冰箱内的药品是
A. 白蛋白
B. 氨茶碱
C. 维生素C
D. 酵母片
E. 苯巴比妥钠
65. 患者女性，68岁，风湿性心脏病，下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗，自诉心慌、胸闷，但卧床休息时无此不适。最恰当的指导是
A. 绝对卧床休息，取半卧位
B. 可打太极拳，忌剧烈运动
C. 不限活动，但需劳逸结合
D. 以卧床休息为主，限制运动
E. 每天爬一层楼梯，需增加睡眠
66. 患者男性，25岁，因受凉后突然畏寒、高热伴右胸部疼痛1天入院。胸部透视，见右中叶有大片浅淡的阴影。住院后经青霉素肌注，3天后体温接近正常，病人尚有轻度咳嗽，咳痰，稍感憋气。目前对该病人的主要护理措施是
A. 遵医嘱应用解热镇痛药
B. 卧床休息为主，适当下床活动，必要时给

- 予氧气吸入
C. 绝对卧床休息
D. 体位引流
E. 遵医嘱应用止痛药
67. 患者男性，46岁突发心肌梗死急诊入院，抢救无效死亡，患者妹妹指责接诊护士没有及时联系医生，从而延误抢救导致患者死亡。护士坚持自己已尽职尽责。为此，双方发生争执，其主要原因为
A. 理解差异
B. 角色期望冲突
C. 经济压力过重
D. 角色责任模糊
E. 角色权利争议
68. 成人，男性，患者小腿骨折行石膏管型固定，诉小腿外侧疼痛，足背麻木，可能压迫了
A. 腓总神经
B. 胫神经
C. 坐骨神经
D. 动脉
E. 静脉
69. 患者女性，80岁，肝癌晚期，肝区疼痛剧烈、腹水，患者感到痛苦、悲哀，欲轻生。该患者的心理反应处于
A. 协议期
B. 愤怒期
C. 忧郁期
D. 接受期
E. 否认期
70. 患者男性，68岁，脑出血，现患者处于持续睡眠状态，但能被语言或轻度刺激唤醒，刺激去除后又很快入睡，此时患者处于
A.嗜睡
B.昏睡
C.浅昏迷
D.深昏迷
E.意识模糊
71. 患儿女，10个月，多汗，睡眠不安。查体：可见枕秃、方颅、肋缘外翻，被诊断为维生素D缺乏性佝偻病，护士要采取的措施不正确的是
A. 护理动作轻柔
B. 勤洗澡勤换内衣
C. 多带患儿到户外晒太阳
D. 添加含维生素D的食物
E. 积极进行站立行走、锻炼
72. 患者女性，绒毛膜癌，出现剧烈头痛、喷射性呕吐、偏瘫。家属询问护士可能的原因，护士的正确回答是
A. 肺转移
B. 脑转移
C. 阴道转移
D. 肝转移
E. 肾转移
73. 患者女性，20岁，农民，为系统性红斑狼疮患者，患者的两颧及鼻梁部有散在的蝶形红斑错误的护理指导是
A. 避免在烈日下活动
B. 避免使用化妆品
C. 避免接触化学药品
D. 可用碱性皂液清洁面部
E. 可用清水冲洗面部
74. 患者男性，25岁，因受凉后突然畏寒、高热伴右胸部疼痛1天入院。胸部透视，见右中叶有大片浅淡的阴影。住院后经青霉素肌注，3天后体温接近正常，病人尚有轻度咳嗽，咳痰，稍感憋气。该病人最可能的诊断是
A. 肺炎球菌肺炎
B. 肺炎支原体肺炎
C. 肺炎克雷伯肺炎
D. 葡萄球菌肺炎
E. 肺结核
75. 患者女性，50岁，患风湿性心脏病，2日来出现一侧下肢剧痛，不能活动，局部皮肤苍白、发凉，动脉搏动消失。应首先考虑
A. 风湿活动致关节肌肉疼痛
B. 下肢动脉血栓
C. 下肢静脉血栓形成
D. 化脓性关节炎

E. 骨髓炎

76. 患者女性，39岁，因头部受伤入院。体检发现：BP18/12kPa，鼻腔有脑脊液流出。以下护理措施不正确的是

- A. 床头抬高15~30cm卧位
- B. 清洁鼻前庭
- C. 无菌棉球填塞鼻腔
- D. 避免经鼻腔吸痰
- E. 避免经鼻置胃管

77. 患者女，30岁，汽车撞伤左侧大腿，致股骨中段闭合性骨折，行骨牵引复位术，牵引术后，下列护理能防止牵引过度的是

- A. 将床尾抬高15~30cm
- B. 每天用70%的酒精滴牵引针孔
- C. 定时测定肢体长度
- D. 保持有效的牵引作用
- E. 鼓励功能锻炼

78. 患者女性，23岁，因库欣综合症入院，查体：面部皮肤红而薄，头发稀疏，血压180/100mmHg，肥胖，护士应指导病人饮食的注意点是

- A. 鼓励病人食用柑橘、枇杷、香蕉、南瓜等含钾高的水果
- B. 使用低蛋白饮食
- C. 给予高热量饮食
- D. 食物中添加辛辣品，刺激食欲
- E. 低钙饮食

79. 患者，男性，40岁，患有痛风3年，近日工作繁忙，应酬多。今日清晨突然右脚第一跖趾关节剧痛，局部出现红、肿、热、活动困难。患者意识到是通风急性发作，为缓解局部症状，采取正确护理方式是

- A. 加强局部活动促进血液循环
- B. 患肢下垂避免影响其他关节
- C. 进行局部冷敷减少渗出
- D. 进行局部热敷促进吸收
- E. 早期局部冷敷24小时后进行热敷

80. 患者男性，38岁，车祸伤及头部，当即出现右侧鼻唇沟变浅，右外耳道流出淡血性液

体，右耳听力下降，CT示颅内少量积气。目前病人适宜的体位是

- A. 头低位
- B. 仰卧中凹位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 平卧位

81. 患者女性，45岁，经期延长，月经量增大，妇科检查：可触及增大的子宫，表面不规则，呈结节状。医生诊断为子宫肌瘤。患者非常紧张，护士告知子宫肌瘤是女性生殖系统最常见的是

- A. 良性肿瘤
- B. 脂肪瘤
- C. 恶性肿瘤
- D. 纤维瘤
- E. 黄体囊肿

82. 男，50岁，在县医院被诊断为肝癌后，神情呆滞，多次要求家人带其到省城大医院检查确认。此时患者所处的心理反应阶段是

- A. 震惊否认期
- B. 愤怒期
- C. 磋商期
- D. 抑郁期
- E. 接受期

83. 急性白血病引起出血的最主要原因是

- A. 血小板减少
- B. 小血管破裂
- C. 血管内凝血
- D. 纤溶功能亢进
- E. 毛细血管通透性增加

84. 护士误给某青霉素过敏患者注射青霉素，造成患者死亡，此事故属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 严重护理差错

85. 某肺心病患者，血气分析：动脉血氧分压

6kPa(45mmHg)，动脉血二氧化碳分压10kPa(75mmHg)。应给予哪种氧疗法

- A. 持续低流量、低浓度给氧
- B. 持续高流量、高浓度给氧
- C. 间歇低流量、低浓度给氧
- D. 间歇高流量、高浓度给氧
- E. 间歇高流量、乙醇湿化给氧

86.男，6岁，阵发性剑突下钻顶样疼痛8小时，伴恶心呕吐，既往有类似发作史。查体：剑突下深压痛，无腹肌紧张。拟诊为

- A. 肝内胆管结石
- B. 胆道蛔虫病
- C. 胆总管结石
- D. 急性胆管炎
- E. 胆囊结石

87.患者，男性，40岁。近几年来怕热，多汗，心率110次/分，食量大，但逐渐消瘦，检查发现FT₄及FT₃增高，昨天突然体温达40℃，心率150次/分，恶心、呕吐、腹泻，大汗淋漓而昏睡，诊为甲状腺功能亢进症伴甲状腺危象。考虑甲状腺危象发生的原因是

- A. 甲状腺素大量破坏
- B. 机体消耗大量甲状腺素
- C. 腺垂体功能亢进
- D. 大量甲状腺素释放入血
- E. 下丘脑功能亢进

88.病人因站立时久，突感眼花，头晕，意识丧失，摔倒在地，须臾清醒，可能为

- A. 休克
- B. 晕厥
- C. 浅昏迷
- D. 意识模糊
- E. 虚脱

89.病毒性心肌炎的体征错误的是

- A. 交替脉
- B. 颈静脉怒张
- C. 第一心音低钝
- D. 心尖部闻及奔马律
- E. 血清心肌酶明显下降

90.患者，女性，38岁，既往体健，2小时前在提取重物后突然剧烈头痛，伴喷射状呕吐，呼吸减慢，血压升高，这种现象是

- A. 急性颅脑感染
- B. 脑神经受刺激
- C. 牵涉性头痛
- D. 颅内压增高
- E. 神经官能症

91.患者，女性，69岁。高血压，间断服用降压药物，血压控制在(120~150)/(70~90)mmHg。今晨测血压120/80mmHg。其健康教育的说法不正确的是

- A. 适当运动
- B. 血压控制理想，可暂时停药
- C. 服药后卧床片刻，防止直立性低血压
- D. 低盐、低脂、低胆固醇饮食
- E. 避免情绪激动

92.男，62岁，患肺源性心脏病3年，近5日因受凉后痰多、黏稠、不易咳出，诉全身乏力，已卧床5日未解大便。该患者的首要问题是

- A. 便秘
- B. 活动无耐力
- C. 语言沟通障碍
- D. 清理呼吸道无效
- E. 皮肤完整性受损

93.引起消化性溃疡的主要因素是

- A. 胃酸、胃蛋白酶分泌增多
- B. 遗传因素
- C. 黏液—黏膜屏障削弱
- D. 非甾体抗炎药
- E. 吸烟

94.患者，女性，29岁，白天总是竭力维持觉醒状态，但无能为力，在进餐、走路时也能入睡，该患者的症状是

- A. 猝倒症
- B.嗜睡症
- C. 睡眠瘫痪
- D. 发作性睡病
- E. 睡眠中呼吸停止

95.引起再障最常见药物是

- A.保泰松
- B.氯霉素
- C.四环素
- D.红霉素
- E.青霉素

96.镜下脓尿是指每高倍视野下白细胞至少为

- A.1个
- B.3个
- C.5个
- D.7个
- E.10个

97.中医的“六淫”指的是

- A.喜、怒、忧、思、悲、恐
- B.胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦
- C.表、里、寒、热、虚、实
- D.风邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、火邪
- E.青、黄、赤、紫、白、黑

98.评估肢体是否瘫痪主要检查

- A.腱反射
- B.肌张力
- C.随意运动
- D.共济运动
- E.病理反射

99.初孕妇，自诉已孕40周，希望终止妊娠，为了解胎儿发育情况，需做胎儿成熟度检查。

不需要的检查是

- A.测定羊水中胆红素的含量
- B.测定羊水中染色体核型
- C.测定羊水中肌酐的含量
- D.测定羊水中脂肪细胞
- E.B超测定胎头双顶径

100.某患者因车祸造成脑损伤，整天处于睡眠状态已2天，不易唤醒，醒后答非所问，很快又入睡，判断该患者的意识障碍程度为

- A.嗜睡
- B.意识模糊
- C.昏睡
- D.谵妄

E.昏迷

101.患者，男，6岁，患轻度房间隔缺损，尚未治疗。现因龋齿需拔牙，医生在拔牙前给予抗生素，其目的是预防

- A.上呼吸道感染
- B.牙龈炎
- C.支气管炎
- D.充血性心力衰竭
- E.感染性心内膜炎

102.女，28岁，慢性风湿性心脏病史5年，近2月来日常活动即可引起心悸、气急，病人属心功能

- A.I级
- B.II级
- C.III级
- D.代偿期
- E.IV级

103.服用铁剂排黑便的原因是

- A.引起上消化道出血
- B.引起肠黏膜溃烂
- C.腐蚀肠壁血管
- D.引起下消化道出血
- E.生成硫化铁所致

104.患者，女性，入院不久即发生昏迷。体检：呼吸困难、脉搏加快、瞳孔缩小、流涎、呕吐。为尽快明确昏迷原因，首先应做的辅助检查是

- A.脑电图
- B.心电图
- C.脑脊液测定
- D.颅脑超声检查
- E.呕吐物鉴定

105.一氧化碳中毒的病人口唇呈

- A.青紫色
- B.苍白色
- C.黄绿色
- D.暗红色
- E.樱桃红色

106.儿童，5岁，吃饭时常把饭碗打破，屡受

家长斥责。一次吃饭时，其母发觉小孩眼睛发直，随即饭碗坠地，数秒后正常，最有可能的诊断是

- A. 癫痫小发作
- B. 晕厥
- C. 癫痫
- D. 精神病
- E. 精神运动性发作

107. 男，30岁，胸背部疼痛伴低热、乏力、盗汗3月余。查体：胸段脊柱棘突间叩击痛明显。

CT示胸椎多椎体骨破坏，椎旁广泛脓肿，有死骨形成。对该患者进行健康评估时应重点询问

- A. 吸烟史
- B. 过敏史
- C. 结核病史
- D. 脊柱外伤史
- E. 风湿及类风湿病史

108. 引起急性肾盂肾炎最常见的致病菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 变形杆菌
- C. 葡萄球菌
- D. 产碱杆菌
- E. 鼠链球菌

109. 在白细胞分类计数中，正常中性粒细胞的比例为

- A. 0.5%~1%
- B. 50%~70%
- C. 3%~8%
- D. 80%~85%
- E. 20%~40%

110. 腹膜炎引起的肠梗阻属于

- A. 机械性绞窄性肠梗阻
- B. 机械性单纯性肠梗阻
- C. 麻痹性肠梗阻
- D. 血运性肠梗阻
- E. 机械性粘连性肠梗阻

【A3/A4型题】

(111~113共用题干)

患者男性，68岁，既往有慢性支气管炎病史

10年。近日因咳嗽、咳黄脓痰且不易咳出就诊。体温36.7℃，胸部听诊可闻及湿罗音，X线胸片示右侧肺有絮状阴影。

111. 该病人目前最主要的护理诊断是

- A. 气体交换受阻
- B. 有感染的危险
- C. 清理呼吸道无效
- D. 体温过高
- E. 体液过多

112. 护士对该病人应采取的护理措施不包括

- A. 指导病人有效咳嗽
- B. 咳嗽时可配合胸部叩击
- C. 用超声雾化吸入湿化气道
- D. 进行体位引流
- E. 督促病人每日饮水1500ml以上

113. 病人咳嗽时，护士应予以纠正的动作是

- A. 病人取坐位，两腿上置一枕顶住腹部
- B. 咳嗽前先深呼吸数次
- C. 连续咳嗽数次使痰到咽部附近，再用力咳出
- D. 病人为省力每次连续轻咳数次
- E. 排痰后用清水充分漱口

(114~116题共用题干)

患者男性，65岁，因慢性支气管炎、肺部感染、呼吸衰竭入院。体检：气促，不能平卧，黏痰呈黄色，不易咳出。测血气分析氧分压40mmHg，血二氧化碳分压80mmHg。

114. 给其氧疗时，氧流量应为

- A. 2L/min
- B. 4L/min
- C. 6L/min
- D. 8L/min
- E. 10L/min

115. 帮助患者排痰哪种措施比较好

- A. 加大氧流量
- B. 定时翻身拍背
- C. 鼓励用力咳嗽
- D. 鼻导管吸痰
- E. 体位引流

116. 护士巡视时，发现患者躁动不安，呼吸频率及心率加快，球结膜充血，应该

- A. 使用镇静剂
- B. 加大氧流量
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 降低氧浓度
- E. 作气管切开准备

(117~119题共用题干)

某足月新生儿，出生后1分钟，心率70次/分，呼吸弱而不规则，全身皮肤青紫，四肢肌张力松弛，刺激咽喉无反应。

117. 该新生儿Apgar评分为

- A. 1分
- B. 2分
- C. 3分
- D. 4分
- E. 5分

118. 抢救该新生儿时，宜将抢救台温度调至

- A. 24~26℃
- B. 26~28℃
- C. 28~30℃
- D. 30~32℃
- E. 32~34℃

119. 首要的抢救措施是

- A. 保暖
- B. 清理呼吸道
- C. 给氧
- D. 人工呼吸
- E. 心外按压

(120~121题共用题干)

患儿女，生后10天。因阵发性惊跳1天入院。患儿为足月儿顺产，牛奶喂养。体检：发育营养可，精神反应好，易激惹，四肢肌张力增高，腱反射增强，血钙1.71mmol/L。

120. 最可能的诊断是

- A. 新生儿低血糖
- B. 新生儿颅内出血
- C. 新生儿低钙血症

- D. 新生儿败血症
- E. 新生儿缺血缺氧性脑病

121. 首先应采取哪项治疗措施

- A. 静脉推注葡萄糖
- B. 静脉补充钙剂
- C. 吸氧
- D. 止血药物
- E. 给予VitD

(122~123题共用题干)

患儿11个月，因睡眠不安、多汗、易惊来院就诊，体检可见明显方颅，肋骨串珠，诊断为佝偻病活动期。

122. 该患儿最合适的治疗方法是

- A. 大剂量维生素D
- B. 大剂量钙剂
- C. 先用维生素D后用钙剂
- D. 先用钙剂后用维生素D
- E. 在使用维生素D的同时适当补充钙剂

123. 对患儿母亲进行护理指导时，下列方法哪项不正确

- A. 合理喂养，及时添加辅食
- B. 多带患儿到户外晒太阳
- C. 按医嘱给予鱼肝油
- D. 多让患儿进行站立等运动锻炼
- E. 密切观察病情变化

(124~129题共用题干)

赵先生，40岁，于饱餐、饮酒后突然发生中上腹持久剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐出胆汁，体检：上腹部压痛、腹壁轻度紧张，测血清淀粉酶明显增高。

124. 对赵先生的首选处理措施是

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 适当补钾、补钙
- C. 外科手术准备
- D. 屈膝侧卧位
- E. 应用抗生素

125. 若考虑为水肿型胰腺炎不应有的表现是

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 休克
- D. 呕吐
- E. 发热

126. 经治疗后腹痛、呕吐基本缓解。赵先生的饮食宜为

- A. 高脂、高糖
- B. 高脂、低糖
- C. 低脂、低糖
- D. 低脂、低蛋白
- E. 低脂、高纤维素

127. 急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压的主要目的是

- A. 防止感染扩散
- B. 减少胃酸分泌
- C. 减少胰液分泌
- D. 避免胃扩张
- E. 减轻腹痛

128. 最能提示急性出血坏死型胰腺炎的化验结果是

- A. 低血磷
- B. 低血糖
- C. 低血钙
- D. 血清淀粉酶显著增高
- E. 白细胞计数明显增高

129. 在我国引起急性胰腺炎的最常见病因为

- A. 大量饮酒和暴饮暴食
- B. 手术创伤
- C. 胆道疾病
- D. 流行性腮腺炎
- E. 高钙血症

(130~133题共用题干)

男性，28岁，胸部外伤致右侧第5肋骨骨折并发气胸，呼吸极度困难，发绀、出冷汗。检查：血压：80/60mmHg，气管向左侧移位，右胸廓饱满，叩诊呈鼓音，呼吸音消失，颈胸部有广泛皮下气肿等。医生采用闭式胸膜腔引流治疗。

130. 造成病人极度呼吸困难、发绀的主要原因是

- A. 健侧肺受压迫
- B. 纵隔向健侧移位
- C. 静脉血液回流受阻
- D. 伤侧胸腔压力不断升高
- E. 广泛皮下气肿

131. 护士在巡视病房时，发现引流管衔接处脱节，应立即

- A. 更换胸腔引流管
- B. 重新连接引流管
- C. 钳闭引流管近端
- D. 拔除胸腔引流管
- E. 通知医生，等待处理

132. 判断胸腔引流管是否通畅的最简单的方法是

- A. 检查病人的呼吸音是否正常
- B. 检查引流管是否扭曲
- C. 检查引流瓶中是否有液体流出
- D. 引流管是否有液体溢出
- E. 观察水封瓶中长管内水柱的波动

133. 搬动此病人时应

- A. 保持引流通畅
- B. 保持引流瓶直立
- C. 用两把止血钳夹闭引流管
- D. 嘱病人屏住呼吸
- E. 注意观察引流液排出情况

全国护士执业资格考试精准模拟卷（一）实践能力

【A1/A2型题】

1. 肺癌最常见的早期症状是

- A. 刺激性呛咳
- B. 胸闷、气急
- C. 胸痛
- D. 血痰
- E. 发热

2. 有余、抗胜、停聚特征的各种证候为

- A. 热症概念
- B. 寒症概念
- C. 虚实症概念
- D. 实症概念
- E. 虚症概念

3. 护士被吊销执业证书的，自执业证书被吊销之日起多少年内不得申请执业注册

- A. 一年
- B. 两年
- C. 三年
- D. 五年
- E. 永久

4. 急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的表现是

- A. 消化道症状
- B. 呼吸道症状
- C. 泌尿道症状
- D. 神经系统症状
- E. 血液系统症状

5. 与白血病发病无关的是

- A. 免疫功能低下
- B. 遗传性凝血因子缺乏
- C. 血液不能正常凝固
- D. 免疫功能亢进
- E. 遗传性疾病

6. 对儿童生长发育描述错误的是

- A. 小儿年龄越小，生长越快
- B. 生长发育是连续性过程
- C. 环境因素和遗传因素是影响小儿生长发育

的基本因素

- D. 各系统器官发育的速度一样
- E. 小儿生长发育由低级到高级、由简单到复杂

7. 夏柯三联征是指

- A. 腹痛、寒战高热、呕吐
- B. 寒战高热、呕吐、胸痛
- C. 寒战高热、黄疸、腹泻
- D. 寒战高热、腹痛、腹泻
- E. 腹痛、寒战高热、黄疸

8. 甲亢突眼的眼部护理内容错误的是

- A. 常点眼药
- B. 外出带茶色眼镜
- C. 避免强光与灰尘的刺激
- D. 多食碘盐
- E. 睡前涂眼药膏

9. 阿尔茨默病改善认知功能的药物为

- A. 西酞普兰
- B. 安理申
- C. 奥沙西泮
- D. 舍曲林
- E. 丁螺环酮

10. 急性宫颈炎症的主要症状是

- A. 多尿
- B. 外阴瘙痒
- C. 大量脓性白带
- D. 血尿
- E. 尿痛

11. 流行性脑脊髓炎典型皮肤特征

- A. 斑点斑斑
- B. 高热
- C. 剧烈头痛
- D. 频繁呕吐
- E. 呈灰白色

12. 用于测量儿童皮下脂肪厚度是

- A. 胸围
- B. 上臂围

- C. 大腿围
D. 腹围
E. 小腿围
13. 对心肌疾病患者进行长期用药指导的内容不包括
A. 药物的名称、剂量、用法
B. 教会病人或家属观察药物的不良反应
C. 教会病人或家属观察药物的疗效
D. 根据药物疗效调整药物剂量
E. 指导患者时间药效的观点
14. 对急性心肌梗死患者给予吸氧的主要目的是
A. 改善心肌缺氧，减轻疼痛
B. 预防心源性休克
C. 减少心律失常
D. 防止心力衰竭
E. 促进坏死组织吸收
15. 不属于新生儿常见的正常生理状态的是
A. “马牙”
B. 生理性黄疸
C. 臀红
D. 假月经
E. 乳腺肿大
16. 呼吸衰竭发生时，最早因缺氧发生损害的组织器官是
A. 大脑
B. 心脏
C. 肝脏
D. 肾脏
E. 肺脏
17. 原发性肝癌肝区疼痛的特点是
A. 间歇性隐痛
B. 持续性钝痛
C. 阵发性绞痛
D. 刀割样疼痛
E. 烧灼样疼痛
18. 关于宫颈癌患者临床表现的描述中错误的是
A. 早期宫颈癌患者可无自觉症状
B. 患者一旦患病，则出现阴道大量出血
C. 晚期患者可出现大量脓性或米汤样恶臭白带
D. 宫颈癌的癌前病变称为宫颈上皮内瘤样病变
E. 多发生于育龄期和老年女性
19. 急性肾小球肾炎最重要的临床表现是
A. 水肿、少尿、高血压、蛋白尿
B. 水肿、蛋白尿、血尿、高血压
C. 水肿、少尿、蛋白尿、血尿
D. 蛋白尿、氮质血症、高血压
E. 血尿、少尿、高血压、氮质血症
20. 预防破伤风的健康教育重点是
A. 避免不洁生产
B. 保证营养
C. 控制痉挛
D. 对症治疗
E. 预防感染
21. 细菌性肝脓肿常见护理问题不包括
A. 体温过高
B. 营养失调：低于机体需要量
C. 体液过多
D. 疼痛
E. 潜在并发症：腹膜炎、膈下脓肿、胸腔内感染、休克
22. 肾病综合征临床四大特点是
A. 大量蛋白尿、高脂血症、水肿、高血压
B. 大量蛋白尿、高脂血症、水肿、易感染
C. 低蛋白血症、高脂血症、高血压、易栓塞
D. 大量蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症、水肿
E. 大量蛋白尿、低蛋白血症、低血脂症、恶液质
23. 腹膜炎引起的肠梗阻属于
A. 机械性绞窄性肠梗阻
B. 机械性单纯性肠梗阻
C. 麻痹性肠梗阻
D. 血运性肠梗阻
E. 痉挛性肠梗阻

24. 约束带只能短期使用，一般定期松解时间是
- A. 每 2 小时松解一次
 - B. 每 4 小时松解一次
 - C. 每 8 小时松解一次
 - D. 每 12 小时松解一次
 - E. 每 23 小时松解一次
25. 护士在临床中预防患者发生氧中毒的有效措施是
- A. 避免患者长时间高浓度吸氧
 - B. 经常改变患者体位
 - C. 鼓励患者做深呼吸
 - D. 给予一定的氧气湿化
 - E. 指导患者有效咳嗽
26. 促使血管紧张素 I 转换为 II 的物质是
- A. 醛固酮
 - B. 内皮素
 - C. 胰岛素
 - D. 肾素
 - E. 血管紧张素转换酶
27. 引起人类结核病的主要结核菌是
- A. 大肠杆菌
 - B. 螺杆菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 分枝杆菌
 - E. 芽单胞菌
28. 子宫脱垂Ⅲ度是指
- A. 宫颈外口距处女膜缘<4cm，未达处女膜缘
 - B. 宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈
 - C. 宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内
 - D. 部分宫体脱出阴道口
 - E. 宫颈及宫体全部脱出阴道口外
29. 主动-被动型护患关系适用于
- A. 高血压患者
 - B. 剖宫术后产妇
 - C. 股骨头坏死患者
 - D. 上呼吸道感染患者
 - E. 出血性休克患者
30. 护理伦理学基本原则不包含
- A. 不伤害原则
 - B. 行善原则
 - C. 自主原则
 - D. 照顾原则
 - E. 公正原则
31. 溃疡性结肠炎的腹痛特点是
- A. 疼痛-便意-便后缓解
 - B. 疼痛-便意-便后加重
 - C. 疼痛-进餐-餐后缓解
 - D. 疼痛-进餐-餐后加重
 - E. 疼痛-空腹-空腹缓解
32. 心功能Ⅱ级患者的表现是
- A. 体力活动明显受限，稍事活动后出现疲乏、心悸、呼吸困难
 - B. 日常活动后出现疲乏、心悸、呼吸困难，休息后缓解
 - C. 轻微活动后出现呼吸困难，休息后不易缓解
 - D. 体力活动不受限制
 - E. 休息时即有疲乏、心悸、呼吸困难，活动后更加严重
33. 为缺铁性贫血患者制定的最恰当的食物组合是
- A. 大虾、豆浆
 - B. 猪排、雪碧
 - C. 鸡丁、酸奶
 - D. 羊肝、橙汁
 - E. 豆腐、绿茶
34. 幽门梗阻的临床表现不包括
- A. 腹痛、反复呕吐
 - B. 多有隔宿食物残留
 - C. 消瘦
 - D. 呕吐物呈粪臭味
 - E. 皮肤干燥、弹性差
35. 患者严重心功能不全时，最典型的呼吸困难是
- A. 心源性哮喘
 - B. 吸气性呼吸困难
 - C. 劳力性呼吸困难
 - D. 急性肺水肿

- E. 阵发性夜间呼吸困难
36. 溃疡性结肠炎最常见的发病部位是
A. 乙状结肠
B. 升结肠
C. 横结肠
D. 直肠
E. 降结肠
37. 正常成人 1 天尿的尿比重是
A. 1.010~1.012
B. 1.015~1.025
C. 1.020~1.030
D. 1.030~1.035
E. 1.035~1.045
38. 肾病综合征最常见的症状是
A. 呼吸道感染
B. 水肿
C. 高血压
D. 面色苍白
E. 血栓形成
39. 静脉注射垂体后叶素治疗肺结核合并大咯血，可能出现的不良反应不包括
A. 头痛
B. 心悸
C. 便意
D. 恶心
E. 面色潮红
40. 第一产程适宜肥皂水灌肠的情况是
A. 经产妇宫口扩张 $<2\text{cm}$
B. 前置胎盘有少量阴道流血
C. 有剖宫产史
D. 见红
E. 胎头未衔接
41. 患者，女性，60岁，绝经10年后出现阴道出血。妇科检查：宫颈表面光滑，子宫质软。最先考虑的是
A. 宫颈癌
B. 卵巢癌
C. 绒毛膜癌
- D. 葡萄胎
E. 子宫内膜癌
42. 患者，男性，20岁。头晕、乏力、恶心、呕吐，血清钠 129mmol/L，血清钾 4.6mmol/L。尿比重 1.010。根据情况，考虑患者出现的电解质失调为
A. 原发性缺水
B. 低渗性缺水
C. 急性缺水
D. 低钾血症
E. 稀释性低血钠
43. 患儿，1岁。睡眠时哭闹不安、多汗，下肢弯曲呈“o”形腿，诊断为维生素D缺乏性佝偻病。对患儿最佳的护理是
A. 让患儿住单间
B. 多吃红萝卜
C. 多喂鲜牛奶
D. 多到户外运动
E. 避免久站久行
44. 小儿，15个月，因发热、咳嗽、食欲减退、呕吐2天后出现惊厥入院。体检：体温39.8℃，咽部充血明显，前囟平坦。分诊护士考虑该患儿惊厥的原因首先可能是
A. 脑炎
B. 血糖
C. 癫痫发作
D. 缺血缺氧性脑病
E. 高热惊厥
45. 女性，32岁，已婚，停经56天，阴道少量出血2天。4小时前突感下腹撕裂样剧痛，伴明显肛门坠胀感，血压64/42mmHg。妇科检查：宫颈抬举痛明显，子宫稍大而软，右附件有明显触痛。考虑该患者发生了
A. 早期流产
B. 功血
C. 异位妊娠
D. 卵巢囊肿扭转
E. 子宫肌瘤红色变性
46. 早产儿，女，产后第2天发生了新生儿溶

血，现出现精神差、拒乳、肌张力减退。该患儿最可能发生了

- A. 细菌性脑膜炎
- B. 寒冷综合征
- C. 胆红素脑病
- D. 颅内出血
- E. 败血症

47. 患儿，7岁。排尿时突然尿流中断，哭喊疼痛，搓拉阴茎后症状消失。考虑可能的疾病是

- A. 肾肿瘤
- B. 肾盂结石
- C. 输尿管结石
- D. 膀胱结石
- E. 前尿道结石

48. 孕妇，25岁，妊娠31周，臀先露，护士指导其矫正胎位正确的体位是

- A. 膝胸卧位
- B. 自由体位
- C. 右侧卧位
- D. 膀胱截石位
- E. 头低脚高位

49. 患者，女性，60岁。因贲门癌入院拟行手术治疗。患者出现进食后梗噎感、轻微的胸骨后疼痛。护士进行饮食护理时给予的饮食指导，错误的是

- A. 不吃霉变的食物
- B. 戒烟酒
- C. 不吃烫食和粗硬的食物
- D. 高热量饮食
- E. 低蛋白饮食

50. 患者，男性，62岁。左侧腹股沟斜疝嵌顿1小时，经手法复位成功。护士应观察的重点是

- A. 疝块有无再次出现
- B. 恶心、呕吐
- C. 腹痛、腹膜刺激征
- D. 感染中毒症状
- E. 疝块部位红、肿、痛

51. 孕妇，27岁，停经48天，恶心、呕吐1

周。每天呕吐2~3次，进食量减少，尿酮体阴性。护士采取的正确措施是

- A. 输液
- B. 高糖饮食
- C. 口服止吐药
- D. 绝对卧床休息
- E. 鼓励患者少量多次进食

52. 患者的呕吐物内除了消化液和食物外，还混有大量的胆汁，护士将其呕吐物的特点归纳为

- A. 黄绿色
- B. 褐色
- C. 腥臭味
- D. 咖啡色
- E. 暗红的

53. 患者，男性，46岁，尿毒症。患者精神萎靡，食欲差，24小时尿量70ml，下腹部无胀满，尿常规检查项目中最能反映肾功能状况的是

- A. 尿比重
- B. 尿管型数量
- C. 尿蛋白定性
- D. 尿酸
- E. 尿糖

54. 患者，女性，40岁。因门静脉高压症入院，准备近期手术，对患者护理除外

- A. 充分休息
- B. 避免便秘
- C. 输入新鲜血液
- D. 少量多餐
- E. 手术当日放置胃管

55. 患者，女性，65岁。不明原因反复出现肉眼血尿3个月，无尿急、尿痛，抗感染治疗无明显效果。可能的疾病是

- A. 泌尿系结核
- B. 膀胱结石
- C. 泌尿系肿瘤
- D. 膀胱炎
- E. 盆腔炎

56. 不属于急救室急救器械的物品是
A. 纤维胃镜
B. 简易呼吸器
C. 人工气胸器
D. 心电图机
E. 电动洗胃机
57. 用电动吸引器吸痰时，每次吸痰的时间通常是
A. 3~8秒
B. 8~10秒
C. 10~15秒
D. 20~25秒
E. 25~30秒
58. 下列哪项医疗文件书写规则是错误的
A. 眉栏、页码必须填写完整
B. 有错误应用红笔写“注销”二字，并签名
C. 记录及时、准确
D. 医学术语运用确切
E. 内容简明扼要
59. 下列不属于重症记录单内容的是
A. 危重病人标志
B. 饮食排泄
C. 生命体征
D. 病情变化
E. 护理治疗
60. 下列病区工作中不须要护士配合的是
A. 危重病人的抢救
B. 患者的管理
C. 医生交接班
D. 医生查房
E. 医疗技术的实施
61. 输液后引起静脉炎的原因是
A. 输入致热物质
B. 输入致敏物质
C. 输入药液浓度过高
D. 输入药液量大，速度过快
E. 输液滴管中空气未排尽
62. 护理学是
A. 研究人文的科学
B. 研究医学的科学
C. 研究护理技术的科学
D. 研究社会的科学
E. 与社会、自然、人文科学相互渗透的一门综合应用
63. 除下列哪项外都是护士必须具备的素质
A. 反应敏捷
B. 关怀体贴
C. 勇于实践
D. 情绪始终愉快
E. 遇烦心事要忍耐
64. 护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是
A. 健康教育
B. 卫生指导
C. 预检分诊
D. 查阅病案
E. 心理安慰
65. 对肝炎病人用过的票证最好的消毒方法是
A. 氯胺喷雾
B. 紫外线照射
C. 高压蒸汽灭菌
D. 甲醛小柜熏蒸
E. 过氧乙酸浸泡
66. 护士将长期医嘱进行转抄后，须将红钩划在
A. 医嘱内容之后
B. 护士签名之后
C. 开始日期之前
D. 时间与医嘱之间
E. 医生签名之后
67. 下列关于重整医嘱的作法中，错误的是
A. 将需要继续执行的长期医嘱按原日期顺序抄录
B. 如有空格应给予保留
C. 重整医嘱由护士书写
D. 在最后项医嘱下面用红笔划线，以示前面医嘱一律作废

E、在红线下用红笔写上“重整医嘱”

68. 关于病案书写错误的是

- A. 记录要及时、准确、真实、完善
- B. 内容简明扼要
- C. 字体清楚端正、不得涂改
- D. 用红、蓝钢笔书写，记录者签名
- E. 应通俗易懂

69. 不属于疾病诊断性检查报告的是

- A. 病理检查
- B. 内窥镜检查
- C. 护理体检记录
- D. 同位素检查
- E. 摄片检查

70. 对死亡患者家属的解释与护理不包括

- A. 说明病人的病情及抢救过程
- B. 对病人遗物的整理与移交
- C. 态度真诚，表现同情、理解
- D. 有条件者，做好对死者家属的随访
- E. 尸体护理时，请家属在旁以便安慰

71. HIV 侵入人体后主要侵犯和破坏

- A. 肥大细胞
- B. T 淋巴细胞
- C. B 淋巴细胞
- D. K 淋巴细胞
- E. NK 淋巴细胞

72. 临幊上最常见的脑血管病为

- A. 脑血栓形成
- B. 短暂性脑缺血发作
- C. 脑栓塞
- D. 脑出血
- E. 蛛网膜下隙出血

73. 肾结核最早出现的症状是

- A. 消瘦、贫血
- B. 血尿、脓尿
- C. 低热、盗汗
- D. 肾区疼痛、肿块
- E. 尿频、尿急

74. 溃疡性结肠炎病人主要的症状是

- A. 高热
- B. 腹泻
- C. 关节痛
- D. 呕吐
- E. 腹胀

75. 患者，男性，35岁。近2个月来右腰部有隐痛、钝痛。今晨7时突然发作阵发性刀割样疼痛，向下腹及会阴部放射。患者辗转不安，呻吟呼痛，面色苍白，伴镜下血尿。此疼痛为

- A. 心绞痛
- B. 肠绞痛
- C. 胆绞痛
- D. 肾绞痛
- E. 坐骨神经痛

76. 风湿性心脏病患者并发哪种心律失常时，易引起栓塞

- A. 窦性心动过缓
- B. 窦性心动过速
- C. 过早搏动
- D. 心房颤动
- E. III度房室传导阻滞

77. 正常情况下，产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是

- A. 1小时
- B. 2小时
- C. 3小时
- D. 4小时
- E. 5小时

78. 根据乳腺癌淋巴转移的主要途径，护理评估应重点关注的部位是

- A. 腹股沟
- B. 颌下
- C. 颈后
- D. 颈前
- E. 腋窝

79. 表示肺癌已有全身转移的表现是

- A. 痰中带血
- B. 持续性胸痛

- C. 股骨局部破坏
D. 间歇性高热
E. 持续性胸水
80. 关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育，正确的叙述是
A. 关闭门窗
B. 煤气淋浴器安装在浴室里
C. 定期检查管道安全
D. 使用不带有自动熄火装置的煤灶
E. 通气开关可长期开放
81. 肝硬化失代偿期患者最常见的并发症是
A. 电解质紊乱
B. 肝性脑病
C. 原发性肝癌
D. 肝肾综合征
E. 上消化道出血
82. 为减少支气管扩张患者肺部继发感染和全身中毒症状，最关键的措施是
A. 加强痰液引流
B. 选择广谱抗生素
C. 使用呼吸兴奋剂
D. 使用支气管扩张剂
E. 注射流感疫苗
83. 慢性便秘患者最主要的临床表现是
A. 排便频率减少、排便艰难
B. 腹痛
C. 里急后重感
D. 恶心、呕吐
E. 腹部下坠感
84. 急性上呼吸道感染最常见的病原体是
A. 细菌
B. 病毒
C. 支原体
D. 衣原体
E. 幽门螺杆菌
85. 心室颤动患者的脉搏特征是
A. 快而规则
B. 慢而规则
- C. 快而不规则
D. 慢而不规则
E. 摸不到
86. 老年患者随着年龄的增加，记忆能力逐步减退。在询问病史时最容易出现的是
A. 表述不清
B. 症状隐瞒
C. 记忆不确切
D. 反应迟钝
E. 答非所问
87. 心脏压塞时易出现的异常脉搏是
A. 洪脉
B. 交替脉
C. 奇脉
D. 细脉
E. 间歇脉
88. 判断成人排便异常应为
A. 每天超过2次，或每周少于2次
B. 每天超过3次，或每周少于3次
C. 每天超过1次，或每周少于1次
D. 每天没有大便或每周少于5次
E. 每天大便1次
89. 患者男，3岁，因“寒战，高热伴咳嗽，声音嘶哑”入院，查体：咽部明显充血，扁桃体肿大，急性上呼吸道感染（急性扁桃体炎）。正确的护理措施是
A. 进温度适宜饮食或流质饮食，多饮水
B. 每小时测量体温1次
C. 并发细菌感染时只给予对症治疗即可
D. 允许经常探视
E. 可以吃辛辣刺激的食物
90. 男性导尿时，应将阴茎提起，使之与腹壁成的角度为
A. 40°
B. 50°
C. 55°
D. 60°
E. 30°

- 91.“每日一次”的外文缩写是
A.qd
B.bid
C.tid
D.pm
E.qid
- 92.局部用冷1小时可出现
A.肌肉、肌腱、韧带组织松弛
B.局部组织细胞代谢缓慢
C.皮肤软弱、抵抗力降低
D.反射性地引起局部血管扩张
E.病人体温下降过低
- 93.心肺复苏的有效指征不包括
A.恢复心跳和呼吸
B.大动脉可扪及搏动
C.面色、口唇、甲床色泽转为红润
D.瞳孔散大
E.意识恢复
- 94.发现病人脑死亡后，应反复观察多长时间即可做出诊断
A.4小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时
E.36小时
- 95.解除尿潴留的措施哪项是错误的
A.嘱病人坐起排尿
B.让其听流水声
C.口服利尿剂
D.轻轻按摩下腹部
E.用温水冲洗会阴
- 96.温水擦浴水的温度是
A.24—26℃
B.28—30℃
C.32—34℃
D.34—36℃
E.38—40℃
- 97.不属于护理理论四个基本概念的是
- A.人
B.健康
C.保健
D.环境
E.护理
- 98.当病人出院时使用下列哪种语言不妥
A.请按时服药
B.请多保重
C.请定期检查
D.慢走，注意安全
E.欢迎再来
- 99.在护患关系建立初期，护患关系发展的主要任务是
A.对病人收集资料
B.确定病人的健康问题
C.为病人制定护理计划
D.与病人建立信任关系
E.为病人解决健康问题
- 100.下列哪种沟通形式不属于非语言性沟通
A.面部表情
B.手势
C.身体运动
D.身体姿势
E.健康宣教资料
- 101.属于主观方面的健康资料是
A.血压16.3/10.6Kpa
B.头昏脑胀
C.骶尾部皮肤破损1×2cm
D.膝关节红肿、压痛
E.肌张力三级
- 102.关于护理程序的论述，正确的概念是
A.是一种护理工作的分工类型
B.是一种护理工作的简化形式
C.是一种系统地解决护理问题的方法
D.是一种技术操作的程序
E.是一种护理活动的循环过程
- 103.自我照顾模式是由谁提出的
A.纽曼

- B.佩普劳
C.汉斯·席尔
D.马斯洛
E.奥瑞姆
104. 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是
A.体格检查
B.交谈和观察
C.心理社会测试
D.阅读相关资料
E.使用疼痛评估工具
105. 门诊发现传染病人时应立即采取的措施是
A.安排病人提前就诊
B.进行卫生宣教与候诊教育
C.将病人隔离诊治
D.转急诊室处理
E.消毒候诊环境
106. 当个体发生疾病时采取的第三线防卫是
A.正确对待问题
B.正确对待情感
C.向朋友寻求帮助
D.减少压力的生理性影响
E.寻求医护人员的帮助
107. 抢救巴比妥中毒所致呼吸衰竭的首要措施是
A.呼吸兴奋剂的应用
B.洗胃
C.保持呼吸道通畅，机械通气
D.激素
E.利尿药物
108. 患儿男，5岁。因“高热/头疼伴烦躁不安3天，时有抽搐发生”收入院。查体：体温41℃，呼吸32次/分，神志清，颈项强直。实验室检查：血白细胞 $15\times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.82；脑脊液：有核细胞数 $100\times 10^5/L$ ，蛋白400mg/L，糖和氯化物正常。临床诊断流行性乙型脑炎。目前首要的护理措施是
A.使用脱水剂预防抽搐
- B.给养以改善呼吸困难
C.应用抗病毒药物
D.静脉补液维持水和电解质平衡
E.采用退热药降低体温
109. 患者男，50岁。食管癌。食管胃吻合术后第5日，突然出现高热、寒颤、呼吸困难、胸痛，血白细胞计数 $20\times 10^9/L$ ，该患者最可能发生了
A.糜烂胸
B.吻合口狭窄
C.吻合口瘘
D.肺不张
E.出血
110. 初产妇，29岁。自然分娩后第2天。诉下腹部阵痛。检查：子宫硬，宫底腹膜2横指，血性恶露，量小。护士对产妇的指导正确的是
A.产时应用缩宫素所致
B.产后宫缩痛
C.不可应用止痛药物
D.减少新生儿吸吮，以缓解疼痛
E.通常一周后消失
111. 女，40岁，急性胰腺炎住院，经保守治疗后好转，出院时护士饮食建议，不妥的是
A.禁止暴饮暴食
B.热量充足、禁酒类饮料
C.清淡饮食
D.清淡饮食，允许少量饮酒
E.适量蛋白，禁酒类饮料
112. 患者男，56岁。肝硬化病史12年，一周前因症状加重入院，诊断为肝性脑病，医嘱给予硫酸镁溶液导泻，以下不属于应用此药观察重点的是
A.血压
B.大便
C.体温
D.尿量
E.呼吸
113. 对流行性腮腺炎腮肿的护理，以下哪项不合适

- A. 肿胀处可冷敷
B. 肿胀处可用醋调青黛散外敷
C. 宜进食清淡易消化的食物
D. 保持口腔清洁，餐后漱口
E. 可进食水果、果汁和补充维生素 C 片
114. 患者女，30岁。因淋雨受凉2日后，出现咽痛，畏寒。体温38~39.0℃，伴头痛，乏力。食欲减退，体重下降。近两日来体重减少2公斤。根据以上资料判断，该患者目前不存在的护理问题是
A. 疼痛：头痛、咽痛、与鼻、咽、喉感染有关
B. 体液过多，与体循环瘀血有关
C. 营养失调，低于机体需要量，与食欲减退有关
D. 体温过高，与病毒或细菌感染有关
E. 潜在并发症，气管支气管炎，肾小球肾炎
115. 患者女，45岁。患风湿关节炎，自诉最近晨僵较严重，下列缓解晨僵的护理措施正确的是
A. 早晨起床后先用冷水经浸泡僵硬关节然后按摩
B. 夜间睡眠时戴弹力手套保暖
C. 尽量不要活动僵硬的关节
D. 关节内可注射透明质酸
E. 禁用止痛药
116. 患者男，65岁，慢性阻塞性肺气肿10余年，为改善通气状况，患者坚持做腹式呼吸锻炼，正确的方法是
A. 每次进行30~60分钟
B. 每分钟18~20次
C. 吸气时间短，呼吸时间长
D. 吸气时收腹，呼气时挺腹
E. 用鼻吸气，用鼻呼气
117. 胆道蛔虫病患者临床表现最重要的特点是
A. 发作时伴恶心、呕吐
B. 症状与体征不符
C. 症状可自行缓解
D. 多不伴黄疸
E. 疼痛呈反复、间歇发作
118. 以下哪项是晚期乳癌的特征
A. 乳头溢液
B. 酒窝征
C. 腋窝淋巴结融合固定
D. 肿块3cm左右
E. 肿块表面高低不平
119. 患儿女，2岁。出生时青紫，初步诊断为法洛四联症，近日家长带小儿就诊，准备手术，下列护理措施错误的是
A. 进一步诊断检查
B. 预防感染
C. 保证睡眠与休息
D. 增加活动量
E. 吸氧
120. 患者女，22岁，与家人吵架后倒地翻滚，嚎啕大哭，之后肢体抽动。随机四肢瘫痪，无法站立行走。下列护理评估中关于情感评估内容的是
A. 有无幻听、幻视
B. 有无冲动，易激惹
C. 有无自知力
D. 婚姻状况
E. 家庭关系
- ### 【A3/A4型题】
- (121~123题共用题干)
某护士医学院校毕业，体检合格后被某综合医院聘用，在内科病房工作已2年。在为某乙肝患者治疗护理时，不慎被患者用过的污染器具刺伤。该护士非常担心自己是否会被感染。
121. 该护士发生血源性传播疾病危险性高的一项操作是
A. 做口腔护理
B. 协助患者进餐
C. 擦拭患者床单位
D. 进行侵袭性操作
E. 协助患者更换体位
122. 被污染器具损伤后，该护士首先应采取的措施是
A. 填写锐器伤登记表

- B. 上报医院管理部门负责人
C. 立即用无菌纱布按压伤口
D. 立即取伤口处血液做血清病毒学检查
E. 立即从伤口近心端向远心端挤出伤口血液
123. 该护士暴露后进行 HBV 感染的监测，应
A. 定期查肝功和乙肝二对半
B. 做血培养以确定毒菌类别
C. 检测变异冠状病毒
D. 进行支原体的检查
E. 定期监测 CD4 数量
- (124~125 题共用题干)
某患者被人搀扶着步入医院，接诊护士看见其面色发绀，口唇呈黑紫色，呼吸困难，询问病史得知其有慢性阻塞性肺病史。
124. 护士需立即对其采取的措施是
A. 分诊协助其就医
B. 不作处理，静候医生
C. 鼻塞法吸氧
D. 电击除颤
E. CPR
125. 护士采取相应措施时应特别注意
A. 对患者实施呼吸道隔离
B. 让患者保持镇静
C. 氧流量 1~2L/min
D. 只能除颤 1 次
E. 人工呼吸与胸外心脏按压比例为 2: 30
- (126~128 题共用题干)
患者，男性，30 岁。诊断为“肺结核”。
126. 护士对其病室空气消毒时，正确的方法是
A. 2% 过氧乙酸喷洒
B. 食醋熏蒸
C. 臭氧灭菌灯消毒
D. 开窗通风
E. 甲醛熏蒸
127. 患者使用的体温计应每日消毒，正确的方法是
A. 煮沸消毒
- B. 2% 碘酊擦拭
C. 70% 乙醇浸泡
D. 0.1% 氯己定浸泡
E. 微波消毒
128. 入院指导时告知患者，病区的清洁区是
A. 医护办公室
B. 配膳室
C. 病区走廊
D. 化验室
E. 患者浴室
- (129~130 题共用题干)
患者，女性，55 岁。截瘫，生活不能自理。护士协助床上擦浴。
129. 擦洗顺序正确的是
A. 脸、颈部，上肢、胸腹部，颈、背、臀部，会阴部，双下肢、踝部、双足
B. 会阴部、脸、颈部，上肢、胸腹部，颈、背、臀部，双下肢、踝部、双足
C. 脸、颈部，上肢、胸腹部，会阴部，颈、背、臀部，双下肢、踝部、双足
D. 脸、颈部，上肢、胸腹部，颈、背、臀部，双下肢、踝部、双足，会阴部
E. 脸、颈部，会阴部，上肢、胸腹部，颈、背、臀部，双下肢、踝部、双足
130. 以下注意事项正确的是
A. 严禁擦洗腹股沟
B. 严格消毒隔离原则
C. 操作过程中，两腿并拢
D. 水盆远离身体，防止污水溅到身上
E. 如患者出现寒战、面色苍白等变化，立即停止擦洗
- (131~132 题共用题干)
患者，男性，43 岁。因腹痛伴发热、恶心呕吐，以“急性胃肠炎”收住院。入院时患者呈急性面容，精神萎靡，查体：体温 38.1℃，粪便呈水样。
131. 属于主观资料的是
A. 水样粪便

- B. 恶心呕吐
- C. 体温 38.1℃
- D. 腹痛
- E. 急性面容

132. 对该患者首先应解决的护理问题是
- A. 精神萎靡
 - B. 疼痛
 - C. 焦虑
 - D. 发热：体温 38.1℃
 - E. 体液不足

(133~134 题共用题干)

患者，男性，25岁。诊断为“甲型肝炎”收住院。

133. 消毒患者的餐具、便器常用的方法是
- A. 臭氧灭菌灯消毒
 - B. 消毒剂擦拭
 - C. 冷灭菌
 - D. 消毒液浸泡
 - E. 日光暴晒

134. 护理患者时穿过的隔离衣，被视为清洁部位的是
- A. 衣领
 - B. 袖口

- C. 腰部以上
- D. 腰部以下
- E. 胸部以上

(135~136 题共用题干)

患者，女性，68岁。2型糖尿病15年，皮下注射胰岛素控制血糖。入院时大汗淋漓、高热、呼出气体呈烂苹果味。住院治疗1周，血糖控制在正常范围。

135. 患者“呼出气体呈烂苹果味”，收集此资料的方法属于
- A. 视觉观察法
 - B. 触觉观察法
 - C. 听觉观察法
 - D. 嗅觉观察法
 - E. 味觉观察法

136. 患者认为出院后不需监测血糖，此时患者的主要护理问题是
- A. 潜在的血糖升高
 - B. 感染的危险
 - C. 知识缺乏
 - D. 食欲下降
 - E. 不合作

全国护士执业资格考试
精准模拟卷（二）

全国护士执业资格考试精准模拟卷（二）专业实务

【A1/A2型题】

1. 慢性腹泻指病程至少超过
A. 2周
B. 1个月
C. 2个月
D. 6个月
E. 1年
2. 大便呈白陶土色常见于
A. 肉类饮食过多
B. 上消化道出血
C. 肝细胞性黄疸
D. 胆汁淤积性黄疸
E. 溶血性黄疸
3. 慢性胃炎最主要的病因是
A. Hp感染
B. 理化因素
C. 自身免疫
D. 老年胃黏膜退行性变
E. 胃黏膜营养因子缺乏
4. 引起上消化道出血最常见的疾病是
A. 食管癌
B. 胰腺炎
C. 急性胃炎
D. 胃黏膜脱垂
E. 消化性溃疡
5. 能引起急性胰腺炎的药物是
A. 青霉素
B. 肾上腺素
C. 葡萄糖酸钙
D. 去甲肾上腺素
E. 糖皮质激素
6. 肺结核最主要的传播途径是
A. 呼吸道传播
B. 消化道传播
C. 皮肤黏膜传播
D. 泌尿道传播
E. 生殖道传播
7. 病人出现呕血提示胃内积血至少超
A. 100ml
B. 200ml
C. 250ml
D. 300ml
E. 350ml
8. 呕吐物为隔宿食物多见于
A. 胃癌
B. 幽门梗阻
C. 肠梗阻
D. 食物中毒
E. 急性胃炎
9. 壁细胞主要分泌
A. 盐酸、内因子
B. 胃蛋白酶原
C. 胃蛋白酶
D. 胃泌素
E. 双糖酶
10. 引起心前区疼痛最常见的原因是
A. 冠心病
B. 心包炎
C. 胸膜炎
D. 食管炎
E. 心血管神经官能症
11. 最常见的继发性肺结核是
A. I型肺结核
B. II型肺结核
C. III型肺结核
D. IV型肺结核
E. V型肺结核
12. 肺气肿的发生与遗传因素有关是指人体
缺乏
A. 肌酸磷酸激酶
B. α -糜蛋白酶
C. 乳酸脱氢酶
D. 葡萄糖醛酸转移酶
E. α -抗胰蛋白酶

13. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹的原因是
- A. 胃肠功能紊乱
 - B. 内脏神经反射
 - C. 躯体神经反射
 - D. 阑尾位置不固定
 - E. 阑尾管壁痉挛
14. 特发性血小板减少性紫癜患者体内产生血小板特异性 IgG 的部位主要是
- A. 脾
 - B. 肠
 - C. 肾
 - D. 骨髓
 - E. 胸腺
15. 在我国引起肝硬化的最主要病因是
- A. 病毒性肝炎
 - B. 乙醇中毒
 - C. 药物中毒
 - D. 日本血吸虫病
 - E. 慢性肠道炎症
16. 有关心源性水肿发生机制错误的是
- A. 肾血流量减少
 - B. 继发性醛固酮增多
 - C. 毛细血管静水压增高
 - D. 组织液生成增多
 - E. 血浆胶体渗透压增高
17. 肠结核的好发部位是
- A. 空肠
 - B. 回肠上端
 - C. 回盲部
 - D. 升结肠
 - E. 乙状结肠
18. 特发性血小板减少性紫癜患者体内血小板的寿命约为
- A. 1~3天
 - B. 3~5天
 - C. 5~7天
 - D. 7~11天
 - E. 9~11天
19. 在原发性高血压的发病机制中占主导地位的是
- A. 胰岛素抵抗
 - B. 内分泌异常
 - C. 血管内皮功能异常
 - D. 高级神经中枢功能失调
 - E. 肾素—血管紧张素系统异常
20. 已被肯定可致白血病的化学物质是
- A. 氯霉素
 - B. 保泰松
 - C. 烷化剂
 - D. 细胞毒药物
 - E. 苯及其衍生物
21. II型呼吸衰竭的血气变化是
- A. PaO₂下降, PaCO₂正常
 - B. PaO₂正常, PaCO₂增高
 - C. PaO₂下降, PaCO₂增高
 - D. PaO₂增高, PaCO₂下降
 - E. PaO₂、PaCO₂均下降
22. 炎症性病变所致的急腹症一般不会出现
- A. 持续性腹痛
 - B. 体温升高、白细胞计数升高
 - C. 恶心、呕吐
 - D. 固定压痛点
 - E. 肠鸣音亢进
23. 慢性肺心病引起的心脏肥厚、扩大主要发生在
- A. 左心房
 - B. 左心室
 - C. 右心房
 - D. 右心室
 - E. 整个心脏
24. 甲胎蛋白阳性可初步诊断
- A. 早期肝硬化
 - B. 肝肾综合征
 - C. 原发性肝癌
 - D. 肝转移癌
 - E. 淤胆性肝炎

25. 胃黏膜保护剂不包括
- A. 前列腺素
 - B. 丙谷胺
 - C. 硫糖铝
 - D. 罗沙替丁
 - E. 胶体铋
26. 观察铁剂治疗效果最早的化验指标是
- A. 红细胞数上升
 - B. 血清铁含量上升
 - C. 血红蛋白量上升
 - D. 红细胞体积增大
 - E. 网织红细胞数上升
27. 肺结核空洞和肺脓肿空洞最可靠的鉴别诊断方法是
- A. 痰的性状
 - B. 肺部体征
 - C. 胸部X线检查
 - D. 痰细菌学检查
 - E. 外周血细胞检查
28. 风湿性心脏病患者并发哪种心律失常时易引起栓塞
- A. 窦性心动过缓
 - B. 窦性心动过速
 - C. 过早搏动
 - D. 心房颤动
 - E. III度房室传导阻滞
29. 肺结核最可靠的诊断依据是
- A. 胸部X线摄片发现病灶
 - B. 测红细胞沉降率加速
 - C. 结核菌素试验阳性
 - D. 痰菌检查阳性
 - E. 典型的症状、体征
30. 正常人尿中可出现的管型是
- A. 透明管型
 - B. 颗粒管型
 - C. 脂肪管型
 - D. 红细胞管型
 - E. 白细胞管型
31. 阻止组胺与H₂受体结合，使胃酸分泌减少的药物是
- A. 硫糖铝
 - B. 雷尼替丁
 - C. 氢氧化铝
 - D. 洛赛克
 - E. 前列腺素
32. 急性胰腺炎起病后升高最早的酶是
- A. 血清淀粉酶
 - B. 尿淀粉酶
 - C. 血清脂肪酶
 - D. 单胺氧化酶
 - E. 碱性磷酸酶
33. 极化液用于心肌梗死的主要目的是
- A. 增加心肌营养
 - B. 改善心肌缺血
 - C. 减少心律失常的发生
 - D. 增加心肌收缩力
 - E. 增加心肌兴奋性
34. 小脑疾患步态呈
- A. 蹒跚步态
 - B. 慌张步态
 - C. 跨阈步态
 - D. 酒醉步态
 - E. 共济失调步态
35. 肝硬化失代偿期最突出的表现是
- A. 脾大
 - B. 腹水
 - C. 肝掌
 - D. 贫血
 - E. 出血
36. 长期应用泼尼松面容呈
- A. 满月面容
 - B. 甲亢面容
 - C. 慢性病面容
 - D. 二尖瓣面容
 - E. 肢端肥大面容
37. 肝性脑病最具有特征性的体征是

- A. 腱反射亢进
B. 肌张力增加
C. 扑翼样震颤
D. 踝阵挛
E. 巴宾斯基征阳性
38. 甲亢病人最常见的心律失常类型是
A. 室性期前收缩
B. 室颤
C. 室上性心动过速
D. 室性心动过速
E. 心房纤颤
39. 最能提示出血坏死型胰腺炎的表现是
A. 上腹痛向腰背部放射
B. 两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色淤斑
C. 上腹部压痛、反跳痛
D. 频繁呕吐
E. 黄疸
40. 肺气肿胸部叩诊音为
A. 清音
B. 鼓音
C. 实音
D. 浊音
E. 过清音
41. 风湿性疾病最常见的症状是
A. 关节痛
B. 肌肉痛
C. 软组织痛
D. 神经痛
E. 关节致残
42. 系统性红斑狼疮典型的皮损是
A. 盘形红斑
B. 蝶形红斑
C. 斑丘疹
D. 紫斑
E. 荨麻疹
43. 类风湿性关节炎的手指畸形表现为
A. 匙状指
B. 杵状指
- C. 梭状指
D. 锤状指
E. 蜘蛛指
44. 一氧化碳中毒的病人口唇呈
A. 青紫色
B. 苍白色
C. 黄绿色
D. 暗红色
E. 樱桃红色
45. 重度一氧化碳中毒患者，脑水肿发展到高峰时间是在病后
A. 6~8 小时
B. 12~24 小时
C. 24~48 小时
D. 48~36 小时
E. 36~72 小时
46. 热痉挛发生时，痉挛肌肉最常见的是
A. 腹肌
B. 肠道平滑肌
C. 膈肌
D. 胫肠肌
E. 面肌
47. 移动性浊音阳性提示腹腔内游离的液体的量至少应超过
A. 100ml
B. 1000ml
C. 1500ml
D. 2000ml
E. 2500ml
48. 急腹症在未明确诊断时可对没有休克的病人进行
A. 流质饮食
B. 给予镇痛药
C. 实施胃肠减压
D. 便秘者行低压灌肠
E. 可服用少量石蜡油
49. 绞窄性肠梗阻疼痛的性质是
A. 锐痛

- B. 钝痛
C. 胀痛
D. 持续性腹痛，阵发性加剧
E. 阵发性绞痛
50. 骨折与脱位共有的特征性表现是
A. 疼痛
B. 肿胀
C. 畸形
D. 异常活动
E. 骨擦音
51. 判断口对口人工呼吸效果正确的依据是
A. 口唇红润
B. 胸廓起伏
C. 自主呼吸恢复
D. 大动脉出现搏动
E. 散大的瞳孔缩小
52. 中医的“四诊”是指
A. 望诊、触诊、叩诊、听诊
B. 望诊、闻诊、问诊、切诊
C. 视诊、触诊、叩诊、切诊
D. 视诊、触诊、叩诊、听诊
E. 望诊、闻诊、叩诊、听诊
53. 可导致经络气血壅塞的致病因素是
A. 过饱
B. 过劳
C. 六淫
D. 痰饮
E. 痘伤
54. 溃疡性结肠炎病人主要的症状是
A. 高热
B. 腹泻
C. 关节痛
D. 呕吐
E. 腹胀
55. 男，37岁，反复晨起眼睑水肿一年余。测血压 $170/110\text{mmHg}$ ，尿常规：红细胞5~8个/ HP ，白细胞0~3个/ HP ，尿蛋白(++)，尿糖(-)。患者血压升高的原因首先考虑
A. 多囊肾
B. 肾盂肾炎
C. 肾小球肾炎
D. 糖尿病肾病
E. 肾动脉狭窄
56. 男，42岁，因“急性梗阻性化脓性胆管炎”急诊入院。寒战，体温骤升至 41°C ，脉搏112次/分，血压 $85/65\text{mmHg}$ ，其休克类型为
A. 感染性休克
B. 低血容量性休克
C. 心源性休克
D. 神经源性休克
E. 过敏性休克
57. 女，28岁，妊娠41周，为防止“过期妊娠”入院引产。病人遵医嘱口服己烯雌酚3天，其作用是
A. 促进子宫发育，使子宫肌层增厚
B. 提高子宫平滑肌对缩宫素的敏感性
C. 促进子宫内膜增生
D. 促进输卵管蠕动
E. 对下丘脑、垂体产生正负反馈作用
58. 女，30岁，孕1产0。孕40周，规律宫缩4小时，破膜5小时入院，腹部检查：胎头高浮，应首先测量的骨盆径线是
A. 入口径线
B. 中骨盆径线
C. 坐骨棘间径
D. 出口横径
E. 出口前后径
59. 女，30岁，风心病病史8年。晨起右侧肢体重活动不便，不能下床，口角歪斜，言语不清。应首先考虑
A. 脑出血
B. 脑栓塞
C. 脑血栓形成
D. 蛛网膜下腔出血
E. 严重心力衰竭
60. 男，33岁，腹部撞伤后1小时，烦躁不安，面色苍白，血压 $80/60\text{mmHg}$ ，脉率120次/分，

腹部叩诊有移动性浊音，为明确诊断简单而可靠的检查是

- A. 血常规
- B. 腹部B超
- C. 腹腔穿刺
- D. 血尿淀粉酶
- E. X线胸腹联合透视

61. 男，30岁，饱餐后突发上腹持续性疼痛4小时，体检全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失。对其诊断最有价值的检查是

- A. 血常规检查
- B. 腹部CT检查
- C. 立位腹部平片
- D. 血淀粉酶测定
- E. 纤维胃镜检查

62. 男，50岁，1个月来大便带少量鲜血和黏液，排便习惯改变。对该患者简单而重要的检查是

- A. 直肠镜
- B. 肛门镜
- C. 直肠指检
- D. 纤维结肠镜
- E. X线钡灌肠造影

63. 3岁腹泻患儿，补液中出现低血钾，现剩余液体500ml，最多可加入10%氯化钾

- A. 0.3ml
- B. 0.6ml
- C. 1.5ml
- D. 3ml
- E. 15ml

64. 女，50岁，因患尿毒症而入院。病人精神萎靡，食欲差，24小时尿量80ml，下腹部空虚，无腹痛。病人目前的排尿状况是

- A. 尿潴留
- B. 尿失禁
- C. 少尿
- D. 尿闭
- E. 尿崩

65. 尿毒症患者，自诉极度疲乏、胸闷、心慌、

尿少，体检心律不齐，期前收缩8~10次/分，测血钾8.8mmol/L。若不紧急处理，会突然发生

- A. 心脏停搏
- B. 休克
- C. 昏迷
- D. 肾衰竭
- E. 呼吸衰竭

66. 男，30岁，大面积烧伤合并血红蛋白尿，输液时每小时尿量至少应在

- A. 10ml以上
- B. 20ml以上
- C. 30ml以上
- D. 40ml以上
- E. 50ml以上

67. 女，42岁，右侧乳腺发现一无痛性肿块，生长速度快，质硬，周围分界不清，同侧腋窝淋巴结肿大。应首先考虑

- A. 急性乳腺炎
- B. 乳腺癌
- C. 乳腺囊性增生病
- D. 乳腺纤维腺瘤
- E. 乳管内乳头状瘤

68. 女，25岁，停经45天，尿妊娠试验阳性，出现的早孕反应不包括

- A. 腹痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 嗜睡、流涎
- D. 喜食酸物
- E. 头晕、乏力

69. 男，62岁，患肺源性心脏病3年，近5日因受凉后痰多、黏稠、不易咳出，诉全身乏力，已卧床5日未解大便。该患者的首要问题是

- A. 便秘
- B. 活动无耐力
- C. 语言沟通障碍
- D. 清理呼吸道无效
- E. 皮肤完整性受损

70. 初产妇，23岁，足月分娩过程中痛苦不安，此时护士宜采用的沟通是
- A. 沉默
 - B. 亲切抚摸
 - C. 任其宣泄
 - D. 对患者微笑
 - E. 与其他护士谈笑以分散其注意力
71. 不属于肺炎球菌肺炎的病理分期的是
- A. 消散期
 - B. 红色肝变期
 - C. 溃疡期
 - D. 灰色肝变期
 - E. 充血期
72. 女，27岁，因尿频、尿急、尿痛来院急诊，有助于诊断的尿液检查是
- A. 尿量
 - B. 尿蛋白
 - C. 尿比重
 - D. 尿液酸碱度
 - E. 尿镜检细胞数
73. 新生儿，女，日龄5天，食欲及精神较好，母亲在给其换尿布时发现其会阴部有血性分泌物。属于
- A. 生理现象
 - B. 肉眼血尿
 - C. 尿道出血
 - D. 回肠出血
 - E. 直肠出血
74. 某孕妇，第1胎，妊娠39周来院检查，医生告之临产先兆，收住院，最可靠的依据是
- A. 宫缩强度增加
 - B. 见红
 - C. 尿频
 - D. 胎儿下降感
 - E. 上腹部舒适感
75. 患者，男性，69岁，高血压性心脏病10年。近1年来病人明显感觉体力活力活动受限，洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸。此病人目前的心功能处于
- A. 代偿期
 - B. I级
 - C. II级
 - D. III级
 - E. IV级
76. 患儿，6岁，双下肢烫伤，其烫伤面积为
- A. 25%
 - B. 30%
 - C. 35%
 - D. 40%
 - E. 45%
77. 1岁，小儿，男，因畏食来院求医，护士应首先为其检查
- A. 前囟
 - B. 体重
 - C. 坐高
 - D. 牙齿
 - E. 骨骼发育
78. 2岁，男孩，进食时哭闹不止，突然出现剧烈呛咳、喉鸣、呼吸困难。该患儿可能是
- A. 高热惊厥
 - B. 急性脑炎
 - C. 气管异物
 - D. 肺炎
 - E. 支气管炎
79. 患者，男，40岁，近日来常口渴喜冷饮、烦躁不安、大便干结，现舌红苔黄而干、脉数。该患者属于
- A. 虚证
 - B. 阴证
 - C. 寒证
 - D. 热证
 - E. 表证
80. 患者，男性，25岁。因结核性胸膜炎入院，患者诉下午有低热，夜间有盗汗，咳嗽后左侧胸痛明显加重，听诊可闻及胸膜摩擦音。根据以上情况，可提示病变累及
- A. 胸壁层胸膜
 - B. 脏层胸膜
 - C. 膈肌

- D. 胃
E. 肝脏

81. 35岁，女性，看医生时拒绝执行任何吩咐，医生叫他张开嘴时，反而咬紧牙关，要他睁眼，反而紧闭，要他伸出手来，反而放到身后去。此种现象属于

- A. 模仿症状
B. 违拗症状
C. 重复与刻板动作
D. 强迫动作
E. 被动现象

82. 早产儿，生后3天，反应差，喂养困难，哭声异常，肌张力低，经补充葡萄糖后上述症状消失。该患儿最可能的诊断是

- A. 新生儿窒息
B. 新生儿缺氧缺血性脑病
C. 新生儿颅内出血
D. 新生儿低血糖
E. 新生儿寒冷损伤综合征

83. 患儿，2岁。自1岁时出现活动后气促、乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左缘2~4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，可见杵状指。首先考虑

- A. 右心室肥厚
B. 动脉导管未闭
C. 法洛四联症
D. 室间隔缺损
E. 房间隔缺损

84. 患儿，男，1岁，患化脓性脑膜炎。入院后出现意识不清，呼吸不规则，两侧瞳孔不等大，对光反射迟钝。该患儿可能出现的并发症是

- A. 脑疝
B. 脑脓肿
C. 脑积水
D. 脑室管膜炎
E. 颅神经损伤

85. 患儿，男，6个月。冬季出生，人工喂养，平时睡眠不安、多汗，今晒太阳后突发全身抽

搐5~6次，每次1分钟左右，惊止后活泼如常，体温37℃。你认为该患儿发生

- A. 手足抽搐症
B. 化脓性脑膜炎
C. 低血糖症
D. 高热惊厥
E. 癫痫

86. 女，30岁，已婚。近几日感觉白带增多呈稀薄泡沫状，伴外阴瘙痒。首先应做的检查是

- A. 阴道分泌物悬滴检查
B. 宫颈涂片检查
C. 阴道镜检
D. 窥器检查
E. 双合诊检查

87. 林女士，足月自然产后4天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上1指，子宫体软，应考虑为

- A. 子宫肌炎
B. 盆腔结缔组织炎
C. 子宫内膜炎
D. 急性输卵管炎
E. 腹膜炎

88. 患者，男性，69岁。高血压病史6年，糖尿病史2年，血压曾为170/105mmHg，吸烟，不饮酒。根据以上情况，该患者的预后判断是

- A. 高血压，多极低危组
B. 高血压，低危组
C. 高血压，中危组
D. 高血压，高危组
E. 高血压，很高危组

89. 某风湿性心脏病病人，卧床4个月余，每天需做下肢被动活动和按摩，其目的是

- A. 促进末梢循环，减少回心血量
B. 防止肢体肌肉萎缩
C. 防止下肢静脉血栓形成
D. 防止足部发生压疮
E. 使病人舒适，促进睡眠

90. 患者男性，65岁，身体素质良好，运动后该老人最适宜的心率应在

- A. 100 次／分
- B. 105 次／分
- C. 110 次／分
- D. 120 次／分
- E. 125 次／分

91. 男，34岁。血压持续增高1年以上，中度浮肿，尿蛋白常(++)~(+++)，管型(+)，最大可能诊断为

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 输尿管结石
- E. 肾结核

92. 女，24岁，身材矮小，匀称，骨盆测量数值如下：髂前上棘间径22cm，髂嵴间径24cm，骶耻外径17cm，出口横径7.5cm，对角径11.5cm。此孕妇骨盆为

- A. 扁平骨盆
- B. 畸形骨盆
- C. 漏斗骨盆
- D. 横径狭小骨盆
- E. 均小骨盆

93. 患者，男性，35岁，小时候曾患过麻疹、肺炎，被诊断为支气管扩张症10余年，近1周来咳嗽、咳痰加重，痰呈脓性，每日约500ml，伴低热。患者所患支气管扩张症的发病机制是

- A. 全身免疫功能低下
- B. 支气管防御功能退化
- C. 支气管平滑肌痉挛
- D. 支气管感染和阻塞
- E. 支气管变态反应性炎症

94. 患者，男性，68岁，因近日咳嗽、咳痰、气急明显，又出现神志不清、发绀而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析pH7.31，PaO₂52mmHg，PaCO₂61mmHg，给予低浓度氧疗的依据是

- A. 便于应用呼吸兴奋剂
- B. 慢性呼吸衰竭时，呼吸中枢对CO₂的刺激仍很敏感
- C. 缺O₂是维持病人呼吸的重要刺激因子

- D. 氧浓度大于30%易引起氧中毒
- E. 高浓度氧疗容易使病人呼吸兴奋

95. 某慢性支气管炎肺气肿患者，因近两日咳嗽、咳痰、气促明显就诊，查体：嗜睡，口唇轻度发绀，球结膜充血水肿，多汗，血气分析PaO₂50mmHg，PaCO₂68mmHg，病人目前最可能出现的是

- A. 肺心病
- B. 肺炎
- C. 左心衰竭
- D. 呼吸衰竭
- E. 肺癌

96. 男性，56岁，晨起时觉上、下肢麻木，但可自行去厕所，回卧室时因左下肢无力而跌倒。护理体检：神志清，左侧上、下肢瘫痪，口眼不歪斜。应首先考虑

- A. 内囊出血
- B. 脑栓塞
- C. 脑血栓形成
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑外伤

97. 患者，男性，发热，体温38.5℃，全身有小出血点，头晕、乏力，经医院查血红蛋白80g/L，红细胞3×10¹²/L，白细胞3×10⁹/L，血小板70×10⁹/L，确诊为再生障碍性贫血。其发热的主要原因是

- A. 营养不良
- B. 缺乏成熟中性粒细胞
- C. 缺氧
- D. 出血
- E. 新陈代谢旺盛

98. 男，30岁。因车祸导致心跳、呼吸骤停。护士进行单人心肺复苏时人工呼吸与心脏按压的比例是

- A. 1:3
- B. 1:5
- C. 2:10
- D. 2:15
- E. 2:30

99. 女性，34岁，胸外伤后呼吸困难，发绀，脉快，体检时见胸壁有一约3cm长开放性伤口，呼吸时伤口处出发嘶嘶声音，伤侧呼吸音消失，叩诊呈鼓音。首先考虑为

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 损伤性血胸
- E. 机化性血胸

【A3/A4型题】

(100~103题共用题干)

女性，28岁。近日来发热，腰痛伴尿急、尿频、尿痛，查尿白细胞25个/HP。

100. 该患者考虑可能是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 泌尿系感染
- D. 急进性肾炎
- E. 肾病综合征

101. 引起该患者发病的原因是

- A. 免疫缺陷
- B. 细菌感染
- C. 遗传因素
- D. 过敏
- E. 营养过剩

102. 护士告知该患者多饮水，其主要目的是

- A. 降低体温
- B. 缓解尿频
- C. 营养需要
- D. 冲洗尿路
- E. 治疗腰痛

103. 针对该疾病的预防，应重点告知病人

- A. 保持会阴部卫生
- B. 长期锻炼
- C. 加强营养
- D. 常服抗生素
- E. 戒烟酒

(104~106题共用题干)

患者，男性，34岁，近一年来晨起双侧眼睑水肿，血压一直维持在150/90mmHg左右。近一周工作较劳累，自觉眼睑水肿加重，就诊后查尿蛋白(++)，尿红细胞偶见。

104. 该患者应考虑为

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 慢性肾小球肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 肾盂肾炎
- E. 急进性肾炎

105. 该患者发病的原因是

- A. 免疫性炎症
- B. 细菌性炎症
- C. 病毒感染
- D. 过敏性因素
- E. 遗传因素

106. 该患者本次病情加重的诱因是

- A. 高血压
- B. 蛋白尿
- C. 感染
- D. 劳累
- E. 营养不良

(107~108题共用题干)

赵先生，49岁，患风湿性心瓣膜病，因发生感染，心功能Ⅲ级而入院。给予抗感染和抗心衰治疗。今日出现乏力、腹胀、心悸，心电图出现U波增高。

107. 目前赵先生出现的并发症是

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 高钠血症
- D. 低钠血症
- E. 代谢性酸中毒

108. 赵先生出院后，预防链球菌感染的措施应该是

- A. 坚持锻炼，防止呼吸道感染
- B. 减少运动，多休息
- C. 坚持限制钠盐饮食

- D. 减轻心理压力，增强康复信心
E. 定期复查，必要时做血细菌培养

(109~110题共用题干)

男，42岁，食欲不振，尿色深两周。查体：皮肤、巩膜均黄染，肝大，肋下2cm，轻度触痛，脾肋下未触及；实验室检查：总胆红素12μmol/L，直接胆红素60μmol/L，ALT200U/L，ALP100U/L，GGT100U/L，尿胆红素及尿胆原均呈阳性，彩超检查未见胆囊肿大及胆总管扩大。

109. 考虑其黄疸属于

- A. 肝细胞性黄疸
B. 溶血性黄疸
C. 多吃胡萝卜引起
D. 胰头癌肝外胆管受压所致
E. 肝总管结石所致

110. 该患者可能出现异常的检查是

- A. AFP
B. 凝血酶原时间
C. 网织红细胞计数
D. 游离血红蛋白
E. 骨髓涂片检查

(111~112题共用题干)

男，40岁，烈日下从事重体力劳动，突发头痛、头晕，四肢无力伴多汗，后抽搐昏迷。查体：皮肤干热无汗，体温40℃，呼吸26次/分，脉搏120次/分，血压70/50mmHg。

111. 应考虑该患者发生了

- A. 热衰竭 B. 热痉挛
C. 热射病 D. 先兆中暑
E. 日射病

112. 此时最适宜的降温措施是

- A. 快速补充生理盐水
B. 头部及大血管处放置冰袋
C. 应用人工冬眠
D. 10%水合氯醛保留灌肠
E. 动脉快速推注4℃5%葡萄糖盐水

(113~114题共用题干)

胎龄32周，日龄2天的新生儿。出生体重2300g。心率120次/分，呼吸佳，四肢能活动，全身皮肤红润，其余均正常。

113. 根据体重分类，该患儿属于

- A. 巨大儿
B. 低出生体重儿
C. 极低出生体重儿
D. 正常出生体重儿
E. 超低出生体重儿

114. 与该患儿外观特征不相符的是

- A. 耳廓清楚
B. 乳房无结节
C. 足底纹络少
D. 发细如绒毛
E. 皮肤薄嫩，胎毛多

(115~116题共用题干)

患者女性，46岁，由于下岗，对生活失去信心，同时不能照顾家庭，伴失眠，被诊断为“抑郁症”。

115. 不可能出现的症状是

- A. 兴趣缺乏 B. 睡眠障碍
C. 思维贫乏 D. 自责和厌世感
E. 言语动作迟缓

116. 护士在接诊患者时应

- A. 介绍医院专长
B. 护士自我介绍
C. 直截了当的询问
D. 让患者放松情绪
E. 直接给出明确诊断

(117~119题共用题干)

患儿，男，8岁，因“发热伴腮腺肿痛”就诊。体检：体温39℃，左侧腮腺肿大，局部皮肤紧张、发亮，患儿诉说灼热、疼痛。实验室检查：血白细胞计数正常。

117. 为减轻腮肿部位的疼痛，采用

- A. 口服止痛药 B. 口含抗炎药

- C. 咬紧牙关 D. 热敷局部
E. 冷敷局部

118. 如果该患儿出现中上腹剧痛，有压痛和肌紧张，伴呕吐、腹胀、腹泻等，最可能的诊断是

- A. 胰腺炎 B. 脑膜脑炎
C. 肾炎 D. 腹膜炎
E. 腹泻

119. 1周内，对患儿观察的重点不包括

- A. 体温
B. 体重
C. 有无剧烈头痛
D. 有无腹痛
E. 有无睾丸肿痛情况

(120~121题共用题干)

男，45岁，肝炎病史10年，近2个月来感腹胀明显，心慌、气促、呼吸困难。查体：腹部膨隆，状如蛙腹，B超示大量腹水。

120. 其腹水发生的原因不包括

- A. 肾小球滤过率下降
B. 血清清蛋白减少
C. 门脉内压力增高
D. 抗利尿激素减少
E. 肝淋巴失衡

121. 正确的护理措施是

- A. 食盐每天摄入不超过6g
B. 应取平卧位休息
C. 尽量不更换利尿剂种类
D. 观察病人腹水消长情况
E. 每日液体摄入量不超过1500ml

(122~123题共用题干)

患者，女，25岁。工人。发热、腹部不适、疲乏、恶心、食欲不振、尿色变黄6天。体检发现巩膜中度黄染，肝肋下2cm可扪及，质软，无明显触痛。外周血红细胞 $4.0 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $6.3 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 $138g/L$ ，ALT $2300U/L$ ，总胆红素 $84\mu mol/L$ 。

122. 应首先考虑该患者为

- A. 败血症
B. 钩体病
C. 疟虫病
D. 病毒性肝炎
E. 急性胆道感染

123. 对明确诊断最有意义的检查项目是

- A. 血培养
B. 外斐反应
C. 钩体凝溶试验
D. 肝炎病毒标志物检测
E. B型超声波检查

(124~127题共用题干)

初产妇，妊娠40周，临产6小时，宫口开大3cm；临产11小时，宫口开全，头先露，先露“0”，胎心正常。

124. 此产程属于

- A. 正常产程
B. 潜伏期延长
C. 活跃期延长
D. 活跃期停滞
E. 第二产程延长

125. 宫口开全已2小时，胎儿尚未娩出，产妇仍在屏气用力，此时，产程属于

- A. 正常
B. 潜伏期延长
C. 活跃期延长
D. 活跃期停滞
E. 第二产程延长

126. 阴道检查后记录为：头先露，先露“+1”，枕部在母体骨盆左侧，其胎方位为

- A. 枕左前 B. 枕右前
C. 枕左横 D. 枕右横
E. 枕左后

127. 阴道检查后，听胎心，胎心率为164次/分，应立即

- A. 吸氧
B. 准备产钳手术

- C. 剖宫产术前准备
D. 输液补充营养、体力
E. 滴注缩宫素加强宫缩

(128~129题共用题干)

男,59岁,开放性骨折合并感染,体温在39℃以上,有时高低不一,24小时温差不超过1℃,连续5天不退,脉搏93次/分,呼吸23次/分,查体:口腔黏膜干燥,左颊黏膜有一0.2cm×0.2cm溃疡面,基底潮红。

128. 该患者的体温热型是

- A. 回归热
B. 间歇热
C. 弛张热
D. 稽留热
E. 不规则热

129. 该患者测量体温、脉搏、呼吸的频率应为

- A. 每1小时1次
B. 每4小时1次
C. 每6小时1次
D. 每8小时1次
E. 每12小时1次

(130~131题共用题干)

男,28岁,体温38.9℃,在静脉滴注青霉素时,突然胸闷、面色苍白、四肢厥冷、血压下降。

130. 该患者可能是

- A. 发热反应
B. 心脏病复发
C. 发热引起脑缺氧
D. 输液循环负荷过重
E. 青霉素过敏性休克

131. 抢救该病人的首选药物是

- A. 去甲肾上腺素
B. 异丙肾上腺素
C. 0.1%盐酸肾上腺素
D. 呼吸兴奋剂
E. 氢化可的松

(132~133题共用题干)

男,50岁,车祸致骨盆骨折,现患者神志淡漠,肢体湿冷、呼吸浅速,血压80/60mmHg,脉搏123次/分,尿量减少。

132. 此时患者的病理生理改变主要是

- A. 呼吸功能障碍
B. 凝血功能障碍
C. 心功能障碍
D. 肾功能障碍
E. 微循环功能障碍

133. 对该患者首要的护理措施是

- A. 卧床休息
B. 石膏固定
C. 手术复位
D. 应用抗生素
E. 补充血容量

(134~135题共用题干)

男,24岁,反复上腹痛4年,常于秋冬换季时加重,饥饿时加重,餐后可缓解。

134. 应首先考虑该患者为

- A. 胃癌
B. 胃溃疡
C. 十二指肠溃疡
D. 慢性浅表性胃炎
E. 慢性萎缩性胃炎

135. 为明确诊断应首先选择的检查是

- A. 纤维胃镜 B. 腹部超声
C. 胃肠钡餐 D. 立位腹平片
E. 胃液胃酸分析

全国护士执业资格考试精准模拟卷（二）实践能力

【A1/A2型题】

1. 原发性肝癌的疼痛特点是

- A. 钻顶样剧痛
- B. 持续性胀痛
- C. 阵发性绞痛
- D. 上腹部钝痛
- E. 刀割样剧痛

2. 自发性气胸的典型表现是

- A. 刺激性咳嗽
- B. 呼吸困难
- C. 胸闷、气促
- D. 胸痛
- E. 血压下降

3. 呼吸衰竭最先受损的部位是

- A. 大脑
- B. 肺
- C. 肝
- D. 心脏
- E. 肾

4. 护士在发给心力衰竭病人地高辛之前，应先数心率，若心率少于多少次则不能给药

- A. 100 次/分
- B. 80 次/分
- C. 70 次/分
- D. 60 次/分
- E. 50 次/分

5. 肺心病并发二氧化碳潴留的典型表现是

- A. 呼吸困难
- B. 发绀
- C. 肺功能下降
- D. 意识障碍
- E. 球结膜水肿

6. 对青少年痤疮的护理措施，不正确的是

- A. 多吃清淡的食物
- B. 不吸烟、不饮酒
- C. 保持乐观情绪
- D. 保持皮肤清洁

E. 挤净痤疮内容物

7. 良性前列腺增生的典型症状是

- A. 尿频
- B. 尿痛
- C. 进行性排尿困难
- D. 尿潴留
- E. 血尿

8. 头皮血肿患者，在抽吸出积血后应给予

- A. 热敷
- B. 红外照射
- C. 用力揉搓
- D. 切开引流
- E. 加压包扎

9. 符合慢性胃炎临床表现的是

- A. 上腹饱胀不适，餐后加重
- B. 长期上腹痛，餐后缓解
- C. 反酸、呕吐、腹泻
- D. 上腹部疼痛，向肩背部放射
- E. 贫血、消瘦

10. 确诊二尖瓣狭窄最可靠的辅助检查是

- A. 心电图
- B. 胸部 X 线片
- C. 超声心动图
- D. 心导管检查
- E. CT

11. 为了减轻伤口疼痛，子宫内膜异位症患者术后卧位应为

- A. 半卧位
- C. 头低脚高位
- E. 头高脚低位
- B. 去枕平卧位
- D. 侧卧位

12. 软组织化脓性感染中应予以隔离有接触传染性的是

- A. 疖
- B. 痈

- C. 急性蜂窝织炎
D. 丹毒
E. 急性淋巴管炎
13. 闭合性单处肋骨骨折的处理重点是
A. 骨折对线
B. 骨折对位
C. 应用抗生素
D. 功能锻炼
E. 固定胸廓
14. 精神分裂症的临床症状一般没有
A. 意识障碍
B. 情感障碍
C. 感知障碍
D. 思维障碍
E. 行为障碍
15. 急性病毒性肝炎早期最主要的治疗措施是
A. 应用抗脂肪肝药物
B. 高热量饮食，可以活动
C. 卧床休息
D. 抗病毒药物
E. 保肝药物
16. 挤压面部“危险三角区”未成熟的疖，最严重的后果是
A. 鼻部感染
B. 化脓性海绵状静脉窦炎
C. 面部肿胀
D. 形成痈
E. 留瘢痕
17. 新生儿出生时存在，以后逐渐消失的神经反射是
A. 角膜反射
B. 拥抱反射
C. 结膜反射
D. 瞳孔反射
E. 平衡反射
18. 最危急的心律失常是
A. 窦性心动过速
B. 心房颤动
- C. 室上性心动过速
D. 房室传导阻滞
E. 心室颤动
19. 影响传染病流行过程的两个重要因素是
A. 气温、雨量
B. 社会制度、经济状况
C. 地理位置、气候变化
D. 生活习惯、文化传统
E. 社会因素、自然因素
20. 在第三产程中，对产妇的评估最重要的是
A. 乳汁分泌的情况
B. 宫缩情况，阴道流血的量及颜色
C. 生命体征
D. 疼痛
E. 会阴伤口情况
21. 子宫颈炎症的主要症状是
A. 外阴皮肤瘙痒
B. 阴道分泌物稀薄
C. 白带增多
D. 泡沫状白带
E. 腹痛
22. 十二指肠溃疡患者腹痛的节律特点是
A. 空腹时腹痛明显
B. 餐后即刻腹痛明显
C. 餐后0.5~1小时腹痛明显
D. 进餐时腹痛明显
E. 餐后2小时腹痛明显
23. 以下不符合急性胰腺炎腹痛特点的是
A. 刀割痛或绞痛
B. 进食后疼痛缓解
C. 向腰背部呈带状放射
D. 位于中上腹
E. 可阵发性加剧
24. 在护理阿尔茨海默病患者时，做法错误的是
A. 促进病人多料理自己的生活，积极维持自理能力
B. 反复强化训练病人用脑，维持大脑活力

- C. 多鼓励病人回忆往事，锻炼记忆力
D. 患者回忆出现错误并坚持己见时，要坚持说服其接受正确的观点
E. 保证夜间休息，保证充足的睡眠
25. 对瘫痪患者的护理哪项是错误的
A. 观察呼吸肌有无麻痹
B. 预防泌尿道感染
C. 鼓励咳嗽排痰
D. 勿搬动瘫痪肢体
E. 鼓励多饮水
26. 新生儿时期应预防接种的疫苗是
A. 乙肝疫苗、乙脑疫苗
B. 麻疹疫苗、卡介苗
C. 卡介苗、乙肝疫苗
D. 百白破疫苗、脊髓灰质炎疫苗
E. 脊髓灰质炎疫苗、乙脑疫苗
27. 甲亢突眼的眼部护理内容不正确的是
A. 佩戴有色眼镜
B. 睡前涂抗生素眼膏
C. 睡觉或休息时，抬高头部
D. 多食碘盐
E. 加盖眼罩防止角膜损伤
28. 外伤后急性硬脑膜外血肿患者典型的意识障碍形式是
A. 清醒与朦胧状态交替出现
B. 持续性昏迷加重
C. 早期清醒，随后逐渐昏迷
D. 清醒，随后昏迷，再次清醒
E. 昏迷，随后清醒，再次昏迷
29. 食管癌患者最典型的临床表现是
A. 疼痛
B. 异物感
C. 呕血
D. 进行性吞咽困难
E. 声嘶
30. 患者男性 35 岁。低热 3 周入院，诊断为急性细菌性心内膜炎。最重要的常规检查方法是
A. 血常规
B. 尿常规
C. 血培养
D. X 线检查
E. 超声心动图
31. 患儿女，8 个月。因“发热、咳嗽伴气促”来诊，诊断为肺炎入院。为防止患儿发生并发症，护士应重点观察
A. 睡眠状况
B. 进食量
C. 大小便次数
D. 心率、呼吸的变化
E. 咳嗽频率及轻重
32. 孕妇，26 岁。孕 39 周，上午家务劳动时突然胎动频繁，至傍晚胎动逐渐减弱、消失，急诊入院，听诊胎心音 90 次/分，下列护理措施不妥的是
A. 左侧卧位，间断吸氧
B. 行胎心监护
C. 嘱孕妇增加营养和休息即可，继续观察病情
D. 协助做好手术产的准备
E. 做好新生儿抢救和复苏的准备
33. 患者男，46 岁。患尿毒症 2 年，血常规提示 $RBC 2.35 \times 10^12/L$, $Hb 70g/L$ 。导致该患者贫血的最主要原因是
A. 出血
B. 低蛋白
C. 促红细胞生成素缺乏
D. 缺铁
E. 叶酸缺乏
34. 患者男，60 岁。来院咨询减肥方法，查体：身高 170cm，体重 82kg。膝关节有陈旧疾患，无法负重。护士建议其最好的运动方式是
A. 举重
B. 跳绳
C. 游泳
D. 爬山
E. 慢跑
35. 患者男，76 岁。饮用红酒 600ml 后出现言

语含糊不清、视力模糊、步态不稳，下列处理措施错误的是

- A. 纳洛酮缓慢静脉注射
- B. 肌注维生素B1
- C. 静脉注射5%葡萄糖盐水
- D. 静滴抗生素
- E. 维持正常体温

36. 患者男，60岁。患高血压10余年。2小时前与人争吵后出现剧烈头痛、呕吐。入院后患者出现昏迷，瞳孔先缩小后散大，对光反射消失，应考虑为

- A. 脑疝形成
- B. 高血压危象
- C. 呼吸衰竭
- D. 脑梗死
- E. 蛛网膜下腔出血

37. 患者男，36岁。因转移性右下腹疼痛入院，入院后诊断为急性阑尾炎。查体：麦氏点压痛，体温升高、脉搏增快。现患者突然出现腹痛加剧，全腹压痛、反跳痛、肌紧张。应考虑为

- A. 急性肠梗阻
- B. 腹腔脓肿
- C. 阑尾周围脓肿
- D. 阑尾穿孔
- E. 急性腹膜炎

38. 25岁女，第一胎，孕24周，诊断为妊娠期高血压疾病，基本病理变化是

- A. 全身小动脉痉挛
- B. 全身动脉痉挛
- C. 胎盘血管痉挛
- D. 子宫血管痉挛
- E. 螺旋小动脉痉挛

39. 患者男，64岁。患2型糖尿病5年，现出现在糖尿病足，护士对其进行足部护理的指导，错误的是

- A. 尽量不用热水袋保暖
- B. 足部出现破损可自擦药物
- C. 外出时不可穿拖鞋
- D. 由足端向上按摩足部
- E. 洗脚水温与体温相近即可

40. 患者男，71岁。患者高血压6年，体重75kg，身高165cm。护士对其进行健康指导，错误的是

- A. 坚持适当的体育运动
- B. 低盐饮食
- C. 吃减肥药
- D. 不得随意增减和中断药物
- E. 监测血压和服药的关系

41. 慢性阻塞性肺疾病急性发作期患者，长期卧床，咳痰无力，为促进排痰，护士给予胸部叩击，叩击方法中，错误的是

- A. 患者取侧卧位
- B. 叩击顺序由外向内
- C. 叩击顺序由下向上
- D. 叩击者的手扇形张开
- E. 叩击者手指向掌心微曲

42. 患者男，43岁。因左下肢静脉曲张行大隐静脉高位结扎剥脱术。术后该患者的患肢应

- A. 平放
- B. 内收
- C. 外展
- D. 抬高
- E. 垂落床边

43. 患者男，60岁。烈日下从事田间劳动约1小时后，感觉口渴、头晕、胸闷、恶心、四肢无力，紧急送往医院治疗。查体温37.8℃，脉搏100次/分，未发现其他异常，休息约半小时后症状消失。该患者出现上述症状，应首先考虑的原因是

- A. 过度劳累
- B. 睡眠不足
- C. 高温环境
- D. 身体虚弱
- E. 饮食过饱

44. 患者男，65岁。1年前诊断为“阿尔茨海默病”，由其老伴照顾，前几日患者独自外出后未归，后被家人找到。社区护士家庭访视时，注意到其老伴照料患者的过程中采取以下做法，其中不正确的是

- A. 为防止患者走失，老伴不让其外出，把他整

日关在家里

- B. 为防止患者走失，老伴在他衣服上写名字和家中电话
- C. 老伴尽量让患者自己刷牙、洗脸、穿衣吃饭
- D. 老伴时常会让患者帮忙做一些家务
- E. 为帮助患者恢复记忆老伴会常和他一起看过去的生活照片

45. 下列不属于大量不保留灌肠适应证的是

- A. 为便秘者软化、清除粪便
- B. 为急腹症病人做肠道准备
- C. 腹腔手术前的准备
- D. 为分娩者做肠道准备
- E. 为高热病人降温

46. 患者男，53岁。患急性化脓性阑尾炎行阑尾切除术后1天，护士要求患者下床活动，其最主要目的是

- A. 有利于伤口愈合
- B. 预防血栓性静脉炎
- C. 预防肺不张
- D. 防止肠粘连
- E. 预防压疮

47. 患者男，53岁。因贲门癌收治入院。患者近期梗阻感加重，体重明显下降。护士对其饮食的指导要点中，错误的是

- A. 少食多餐
- B. 半流质饮食
- C. 低蛋白饮食
- D. 高热量饮食
- E. 高维生素饮食

48. 患者男，30岁。农民，患病毒性心肌炎经治疗康复后出院。出院医嘱要求患者出院后限制活动6个月。患者认为现无不适现象，询问为何不能下地干农活。护士向患者说明此时合理休息的主要原因是

- A. 减少疲劳感
- B. 减轻精神压力
- C. 减少心肌耗氧量
- D. 恢复体力，增强体质
- E. 增加战胜疾病的信心

49. 患者男，46岁。因“急性脑出血”入院，护士在巡视时发现，患者出现一侧瞳孔散大，呼吸不规则，此时患者有可能会出现的并发症是

- A. 动眼神经损害
- B. 消化道出血
- C. 癫痫发作
- D. 脑疝
- E. 呼吸衰竭

50. 患者男，75岁。慢性阻塞性肺疾病急性发作期患者。痰多黏稠，翻身时突然出现面色发绀，烦躁不安，护士首先应采取的措施是

- A. 给患者吸氧
- B. 给患者吸痰
- C. 协助患者取坐位
- D. 指导患者有效咳嗽
- E. 湿化气道

51. 初产妇，顺产后第4天，新生儿采用母乳喂养，产妇诉乳房胀，乳汁排出不畅。首先应采取的措施是

- A. 冷敷乳房
- B. 生麦芽煎服
- C. 新生儿多吸吮
- D. 芒硝外敷乳房
- E. 口服己烯雌酚

52. 患者男，20岁。自述“在天桥上看到火车开过来，就出现想跳下去自杀的念头”。虽不伴有相应的行动，但却因此感到焦虑、紧张。护士评估时考虑为

- A. 强迫怀疑
- B. 强迫性穷思竭虑
- C. 强迫情绪
- D. 强迫意向
- E. 强迫行为

53. 肝性脑病最具有特征性的体征是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增加
- C. 扑翼样震颤
- D. 踝阵挛
- E. 巴宾斯基征阳性

54. 患儿男，10岁。患急性淋巴细胞白血病人院。治疗方案中有环磷酰胺。在化疗期间要特别加强监测的项目是

- A. 体温
- B. 血压
- C. 脱发
- D. 血常规
- E. 食欲

55. 患者女，在商场突然倒地，随后出现四肢痉挛性抽搐，牙关紧闭，疑为癫痫发作急诊，以下检查对帮助诊断最有意义的是

- A. 头部CT
- B. 脑血管造影
- C. 脑电图
- D. 脑磁共振
- E. 脑多普勒彩色超声

56. 患者男，60岁。患右肺中叶支气管扩张。现患者痰多不易咳出，该患者可能存在的体征是

- A. 消瘦、贫血
- B. 呼吸运动减弱
- C. 局限性哮鸣音
- D. 固定而持久的局限性湿罗音
- E. 两肺底布满湿音

57. 患者男，41岁。有消化道溃疡病史4年，1天来胃痛明显，无恶心呕吐，今晨觉头昏、乏力、黑嗜，排尿排便一次。对于该患者，除腹痛外，护士还应重点询问

- A. 排便习惯
- B. 粪便颜色
- C. 尿液颜色
- D. 尿量
- E. 有无眩晕

58. 患者男，68岁。因颈部蜂窝组织炎入院，医嘱予气管切开。操作前，护士向其解释该措施的目的是预防

- A. 窒息
- B. 肺不张
- C. 全身感染
- D. 吞咽困难

E. 化脓性海绵状静脉窦炎

59. 患者男，32岁。反复发热、腹泻2个月。经实验室检查“抗HIV阳性”，初步诊断为“艾滋病”。护士对患者进行健康史评估时，下列内容中最不重要的是

- A. 有无输血史
- B. 有无静脉吸毒史
- C. 有无吸食大麻史
- D. 性伴侣情况
- E. 有无不洁性行为史

60. 患者男，65岁。因焦虑紧张，伴2型糖尿病入院治疗。晨起注射胰岛素后进食油条，突然出现噎食，应立即采取的护理措施是

- A. 建立静脉通道
- B. 抢出患者嘴里食物
- C. 口对口人工呼吸
- D. 环甲膜穿刺
- E. 准备行气管切

61. 男性38岁，反复肛门周围肿痛、流脓血。诊断为肛瘘。行瘘管切开术。此肛瘘应是

- A. 低位肛瘘
- B. 单纯性肛瘘
- C. 高位肛瘘
- D. 复杂性肛瘘
- E. 外瘘

62. 患者女，60岁。诊断为“有机磷农药中毒”，已经给予洗胃等处理，遵医嘱给予阿托品药物治疗。当患者出现下列情况时应及时通知医师给予停药的是

- A. 颜面潮红
- B. 皮肤干燥、口干
- C. 体温37.2℃
- D. 心率110次/分
- E. 烦躁不安、抽搐

63. 护士在为社区人群进行健康宣教，在下列人群中，可以指导其应用口服避孕药进行避孕的是

- A. 患有严重心血管疾病者
- B. 乳腺有肿块者

- C. 甲状腺功能亢进者
D. 患有慢性肝炎者
E. 子宫畸形者
64. 患者男，40岁。行血栓闭塞性脉管炎术后，为了解反映肢体远端血运情况，护士应观察的体征不包括
A. 双侧足背动脉搏动
B. 皮肤温度
C. 皮肤颜色
D. 皮肤出血
E. 皮肤感觉
65. 患者女，15岁。担心肥胖节食1年余，近半年来患儿食欲差，厌食，考虑为神经性厌食症。对该患儿处理最适合的是
A. 顺应患儿心理
B. 培养健康的性心理
C. 长期服用促消化药物
D. 安排丰富的业余生活
E. 引导其树立正确的审美观
66. 患者男，45岁。因车祸致伤急诊入院。初步检查拟诊骨盆骨折合并内脏损伤，有休克征象。护士应首先给予
A. 建立静脉通道
B. 准备骨盆兜，行悬吊牵引
C. 准备腹腔手术止血
D. 准备髓部石膏固定
E. 准备骨牵引器材
67. 孕38周孕妇，因先兆子痫入院。目前患者轻微头痛，血压140/90mmHg，尿蛋白(++)，呼吸、脉搏正常。在应用硫酸镁治疗过程中，护士应报告医师停药的情况是
A. 呼吸18次/分
B. 膝反射消失
C. 头痛缓解
D. 血压130/90mmHg
E. 尿量800ml/24h
68. 患者男，40岁。患酒精性肝硬化入院，护士对其生活方式和行为的指导中，最重要的是
A. 避免过度劳累
- B. 适量饮酒
C. 戒酒
D. 服用解酒护肝药
E. 低脂饮食
69. 患者女，55岁。因发作性胸闷、咳嗽就诊，诊为支气管哮喘，医嘱予糖皮质激素吸入治疗，下列用药指导中正确的是
A. “吸入激素的主要作用是快速缓解症状”
B. “如果哮喘症状缓解，即可停止用药”
C. “吸入激素不会有任何副作用”
D. “吸入激素后要漱口”
E. “如果您要进行运动可在此前预防性吸入激素”
70. 患者男，66岁。患慢性阻塞性肺疾病多年，护士在指导进行呼吸训练时，吸气与呼气时间比最好为
A. 吸气：呼气=1:2
B. 吸气：呼气=1:1
C. 吸气：呼气=1.5:1
D. 吸气：呼气=2:1
E. 吸气：呼气=2.5:1
71. 患者女，69岁。慢性肺心病急性发作，患者出现头痛、昼眠夜醒、神志恍惚时应考虑
A. 窒息先兆
B. 呼吸性酸中毒
C. 休克早期
D. 肺性脑病
E. DIC
72. 患者男，68岁。以“肺心病”而入院治疗。护士对患者进行身体评估发现下列症状，其中提示其右心功能不全的是
A. 口唇发绀
B. 呼吸急促
C. 表情痛苦
D. 肝颈回流征阳性
E. 双肺底可闻及散在湿音
73. 患儿男，6个月。因间歇发热、咳嗽半个月，拟诊“支气管炎”，给予口服“头孢拉定”治疗。近2天发现口腔有白色点片乳凝块样物，

- 不易拭去。护士在为患儿进行口腔护理时，宜选择的溶液是
- A. 来苏水
 - B. 生理盐水
 - C. 0.1% 依沙吖啶
 - D. 2% 碳酸氢钠
 - E. 3% 过氧化氢
74. 患者女，43岁。以广泛性焦虑障碍入院，广泛性焦虑障碍的症状不正确的是
- A. 坐卧不安
 - B. 出汗、心跳加快
 - C. 尿频、尿急
 - D. 莫名恐惧
 - E. 濒死感
75. 患者男，49岁。因突发左侧肢体活动不利伴恶心、呕吐及头痛来诊，以“脑栓塞”收入院。今晨护士进行肌力评估时其左侧肢体可轻微收缩，但不能产生动作，按6级肌力记录法，该患者的肌力为
- A. 0级
 - B. 1级
 - C. 2级
 - D. 4级
 - E. 5级
76. 某患者因胃癌行胃大部切除术。术后第1天除生命体征外，护士最应重点观察的是
- A. 神志
 - B. 尿量
 - C. 肠鸣音
 - D. 腹胀
 - E. 胃管引流液
77. 患儿男，2岁。因上呼吸道感染出现咳嗽、发热入院，现体温39.3℃，半小时前突发抽搐，持续约1分钟后停止呈嗜睡状。为避免再发抽搐，护理的重点是
- A. 多晒太阳
 - B. 按时预防接种
 - C. 加强体格锻炼
 - D. 居室定期食醋熏蒸
 - E. 体温过高时应及时降温
78. 患者女，19岁。肛管直肠手术后医嘱高锰酸钾坐浴。不正确的坐浴方法是
- A. 坐浴盆用前应消毒
 - B. 高锰酸钾溶液浓度为1:5000
 - C. 坐浴时间20分钟
 - D. 水温30~32℃
 - E. 感觉头晕不适时立即停止坐浴
79. 患者男，58岁。糖尿病史30余年，目前使用胰岛素治疗，但血糖未规律监测。近3个月出现眼睑及下肢水肿来诊。尿常规检查：尿糖(++)，WBC 0~4/HP，尿蛋白(+++)。应优先考虑的是
- A. 胰岛素性水肿
 - B. 肾动脉硬化
 - C. 肾盂肾炎
 - D. 急性肾炎
 - E. 糖尿病肾病
80. 8个月女婴，提示其发育正常的运动特征是
- A. 会抬头
 - B. 会爬行
 - C. 独自行走
 - D. 会翻身
 - E. 用手握玩具
81. 原发性肝癌患者突然出现腹部剧痛，腹膜刺激征，表明
- A. 肝癌腹膜转移
 - B. 肝癌结节破裂
 - C. 急性胃穿孔
 - D. 急性胆囊炎
 - E. 急性胰腺炎
82. 患者男，70岁。2天前因急性阑尾炎行阑尾切除术，现诉腹胀，未排气、排便，下列护理措施错误的是
- A. 评估患者腹胀情况
 - B. 给予阿托品肌注
 - C. 鼓励患者床上多翻身
 - D. 必要时给予肛管排气
 - E. 鼓励患者下地活动
83. 患者男，62岁。诊断为“COPD，Ⅱ型呼衰，

肺性脑病”。护理人员应避免

- A. 持续低流量给氧
- B. 静脉滴注抗生素
- C. 肌注呋塞米
- D. 烦躁时使用镇静剂
- E. 口服解痉平喘类药物

84. 休克型肺炎的患者应用抗生素和补液治疗。提示患者病情好转、血容量已补足的体征不包括

- A. 口唇红润
- B. 肢端温暖
- C. 尿量>30ml/h
- D. 收缩压>90mmHg
- E. 心率 120 次/分

85. 患者男，25岁。肋骨骨折后合并血气胸，急诊行胸腔闭式引流术。对胸腔闭式引流护理，错误的是

- A. 嘱患者勿折叠、扭曲、压迫管道
- B. 嘱患者翻身时勿牵拉引流管
- C. 保持水封瓶长管没入水中 6~8cm
- D. 指导患者多做深呼吸运动
- E. 更换引流瓶时应双重夹闭引流管

86. 患者男，48岁。诊断为颅内肿瘤入院。患者有颅内压增高症状。护士给予病人床头抬高 15° ~ 30°，其主要目的是

- A. 有利于改善心脏功能
- B. 有利于改善呼吸功能
- C. 有利于颅内静脉回流
- D. 有利于鼻饲
- E. 防止呕吐物误入呼吸道

87. 患者男，55岁。因心力衰竭使用洋地黄进行治疗。治疗期间的下列医嘱中，护士应提出质疑和核对的是

- A. 氯化钾溶液静滴
- B. 生理盐水静滴
- C. 5%葡萄糖溶液静滴
- D. 葡萄糖酸钙溶液静滴
- E. 乳酸钠溶液静滴

88. 患者女，43岁。患肺结核 2 年。现使用链

霉素抗结核治疗，用药期间应注意监测

- A. 肝功能
- B. 心功能
- C. 肾功能
- D. 肺功能
- E. 胃肠功能

89. 患者男，27岁。肛瘘切除术后。护士的健康教育不正确的是

- A. 多饮水
- B. 保持大便通畅
- C. 可以适当进食辛辣饮食
- D. 保持肛门清洁
- E. 适当加强体育锻炼

90. 某 68 岁社区居民诉经常发生便秘。社区护士对其进行的健康指导中，不恰当的是

- A. “您应该给自己订一个有规律的活动计划，增加活动量”
- B. “每天应当多吃一点粗纤维食物，像麦片、芹菜等”
- C. “每天排便要有规律，在一段固定时间内排便”
- D. “经常做腹部环形按摩，促进肠蠕动”
- E. “您应当常备开塞露，排便不畅时随时使用”

91. 患者男，60岁。患风心病房颤已 4 年，住院中心律突然转为窦性，并出现偏瘫、头痛，首先考虑

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 并发颅内感染

92. 患者男，45岁。患十二指肠球部溃疡 5 年，近日原疼痛节律消失，变为持续上腹痛，伴频繁呕吐隔宿发酵酸性食物。最可能的并发症是

- A. 上消化道出血
- B. 溃疡穿孔
- C. 幽门梗阻
- D. 溃疡癌变
- E. 复合性溃疡

93. 某妊娠合并糖尿病产妇孕期无其他并发症。于妊娠 39 周剖宫产一健康男婴，对于该新生儿应重点监测的内容是

- A. 大小便
- B. 体重
- C. 黄疸
- D. 血糖
- E. 体温

94. 患儿，9 个月龄。单纯牛乳喂养，未添加辅食，因抽搐 2 次入院，血钙 0.8 mmol/L 。诊断维生素 D 缺乏性手足搐搦症，对该患儿护理措施不正确的是

- A. 惊厥时及时清除口鼻分泌物
- B. 遵医嘱应用镇静剂和钙剂
- C. 补充钙剂时应快速静脉推注
- D. 惊厥发作时保护患儿安全
- E. 保持安静，减少刺激

95. 患者女，35 岁。双手深 II 度烧伤康复期，护士指导其用双手时正确的放置位置是

- A. 握拳位
- B. 半握拳位
- C. 伸直位
- D. 半伸直位
- E. 双手互握

96. 患者男，48 岁。肝硬化病史 5 年，查体：腹部膨隆，腹壁皮肤紧张发亮，脐周可见静脉迂曲，患者腹部膨隆的最可能原因是

- A. 肝大
- B. 脾大
- C. 大量腹水
- D. 腹腔积气
- E. 腹腔肿瘤

97. 骨盆骨折最易损伤的部位是

- A. 坐骨神经
- B. 膀胱
- C. 直肠
- D. 后尿道
- E. 输尿管

98. 患儿男，13 岁。以“胆道蛔虫病”入院治

疗，经解痉止痛后病情缓解给予驱虫药哌嗪治疗，指导患儿正确服用驱虫药的时间为

- A. 清晨空腹或晚上临睡前
- B. 进餐时服用
- C. 餐前半小时
- D. 餐后半小时
- E. 腹痛时

99. 患儿女，1 岁。诊断为“急性支气管炎”3 天，咳嗽、咳痰加重，评估患儿痰液黏稠，患儿自己难以咳出。清理患儿呼吸道首先应选用的方法是

- A. 继续鼓励患儿咳嗽排痰
- B. 少量多次饮水
- C. 体位引流
- D. 超声雾化吸入
- E. 负压吸痰

100. 患儿男，3 岁。诊断为法洛四联症。患儿缺氧发作时宜采取的体位时

- A. 去枕平卧位
- B. 取半坐位
- C. 膝胸卧位
- D. 患儿头肩抬高 $15^\circ \sim 30^\circ$
- E. 侧卧位

101. 急性胃穿孔呈

- A. 板状腹
- B. 蛙状腹
- C. 舟状腹
- D. 柔韧感腹
- E. 松软腹

102. 重症哮喘患者可出现

- A. 奇脉
- B. 洪脉
- C. 水冲脉
- D. 不规则脉
- E. 脉搏短绌

103. 对胎盘早剥病人的健康教育，不正确的是

- A. 妊娠晚期避免长时间侧卧位
- B. 防治妊娠期高血压疾病
- C. 防止宫腔内压骤降

- D. 严密监测胎儿情况
E. 随时做好手术和抢救母儿准备
104. 闭合性多根、多处肋骨骨折易引起的改变为
A. 反常呼吸运动
B. 胸腔负压消失
C. 缺氧及二氧化碳蓄积
D. 纵隔摆动
E. 回心血量下降
105. 脊髓型颈椎病的治疗禁忌
A. 手术治疗
B. 持续牵引
C. 推拿按摩
D. 硬脊膜外封闭
E. 绝对卧床休息
106. 患者女，50岁，有风湿性心脏病二尖瓣狭窄，与此病发病有密切关系的细菌是
A. 乙型溶血性链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 表皮葡萄球菌
D. 革兰阴性杆菌
E. 大肠埃希菌
107. 对昏迷病人的护理措施欠妥的是
A. 密切观察生命体征、瞳孔等变化
B. 取平卧位头偏向一侧以防止误吸
C. 对尿失禁者持续留置导尿
D. 保持大便通畅以防用力排便致颅压增高
E. 配备吸痰器、气管切开等抢救用物
108. 腹股沟直疝与斜疝的最主要的鉴别之处是
A. 疝块的形状
B. 发病的年龄
C. 嵌顿的程度
D. 回纳疝块压迫内环，增加腹压疝块是否出现
E. 包块的位置
109. 基底节区脑出血患者典型的临床表现“三偏征”是指
A. 对侧偏瘫、同侧偏身感觉障碍、双眼对侧同向性偏盲
- B. 对侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、双眼对侧同向性偏盲
C. 对侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、左眼对侧同向性偏盲
D. 同侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、双眼对侧同向性偏盲
E. 对侧偏瘫、对侧偏身感觉障碍、右眼对侧同向性偏盲
110. 对高血压脑出血病人急性期处理的最重要的环节是
A. 用抗生素，防止继发感染
B. 立即使用止血药
C. 立即使血压下降至正常以下，防再出血
D. 脱水，降低颅内压
E. 用镇静药，防止癫痫发作
111. 不符合脑疝前驱改变的表现
A. 喷射呕吐
B. 意识障碍加剧
C. 脉搏呼吸加快
D. 血压进行性增高
E. 瞳孔等大
112. 患者，男性，55岁，今晨突发脑出血，预防脑出血措施不妥的是
A. 饮食清淡
B. 运动适宜
C. 戒烟
D. 充足睡眠
E. 少量饮酒
113. 手套/袜子型感觉减退可见于
A. 癫痫
B. 急性脱髓鞘性多发性神经炎
C. 脑出血
D. 脑血栓形成
E. 以上都正确
114. 产后出血指胎儿娩出后24小时内阴道出血量超过
A. 300ml
B. 400ml

- C. 500ml
- D. 600ml
- E. 700ml

115. 帕金森病的典型临床表现不包括（）

- A. 肌强直
- B. 震颤
- C. 运动减少
- D. 体位不稳
- E. 表情丰富

116. 治疗癫痫持续状态的首选药物是（）

- A. 苯巴比妥钠
- B. 地西泮
- C. 卡马西平
- D. 苯妥英钠
- E. 10%水合氯醛

117. 患者女性，系统性红斑狼疮 6 年，请问该患者预后较差成为病人死亡原因的常见原因是下列哪项病变

- A. 尿毒症
- B. 心包炎
- C. 神经系统损害
- D. 肝硬化
- E. 肺间质纤维化

118. 测定人体是否感染过结核菌，最有效的方法是

- A. 纤维支气管镜
- B. PPD 试验
- C. X 线检查
- D. CT 检查
- E. 痰结核菌检查

119. 下列哪项是截瘫的并发症

- A. 泌尿系感染
- B. 骨化性肌炎
- C. 脂肪栓塞综合症
- D. 肢体痉挛
- E. 关节僵硬

120. 长期服用可引起胫前水肿的药物是

- B. 卡托普利
- C. 硝苯地平
- D. 阿替洛尔
- E. 氢氯噻嗪

【A3/A4型题】

(121~122 题共用题干)

患者，女性，82 岁。截瘫，长期卧床。近期发现其骶尾部皮肤呈紫色，皮下有硬结，表皮出现水疱。

121. 该压疮处于

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期
- D. 深度溃疡期
- E. 坏死期

122. 此期的正确护理措施是

- A. 无菌纱布包裹，减少摩擦，促进其自行吸收
- B. 生理盐水冲洗受损皮肤
- C. 剪破表皮，引流
- D. 清除坏死组织
- E. 外敷抗生素

(123~125 题共用题干)

患者，女性。急性阑尾炎合并穿孔，急诊在硬膜外麻醉下行阑尾切除术，术中顺利，术后血压稳定，病情平稳，随即将患者送回病房。

123. 病房护士应为患者安置的体位是

- A. 仰卧屈膝位 6 小时
- B. 去枕平卧 6 小时
- C. 侧卧位 6 小时
- D. 中凹卧位 6 小时
- E. 头高足低位 6 小时

124. 术后第二天患者体温 38.2℃，并诉切口疼痛，此时护士应为患者安置的体位是

- A. 头高足低位
- B. 仰卧屈膝位
- C. 右侧卧位
- D. 半坐卧位
- E. 端坐位

125. 安置该体位的目的是

- A. 可减少局部出血，利于切口愈合
- B. 有利于增进食欲，为进食作准备
- C. 有利于减少回心血量，减轻心脏负担
- D. 有利于减轻肺部淤血，减少肺部并发症
- E. 可使感染局限，减轻切口缝合处的张力，缓解疼痛

(126~127题共用题干)

患者，女性，55岁。因哮喘发作在医院急诊就医，医嘱“氨茶碱0.25加入25%葡萄糖20ml，iv”。

126. 护士为患者行静脉注射时穿刺的角度为

- A. 紧贴皮肤
- B. 5° ~10°
- C. 15° ~30°
- D. 35° ~38°
- E. 40° ~45°

127. 注射过程中发现局部肿胀，抽有回血，患者主诉疼痛明显，可能的原因是

- A. 针头堵塞
- B. 针头穿透血管壁
- C. 针头斜面紧贴血管壁
- D. 针头斜面一半在血管外

E. 针头穿刺过深致药物进入组织间隙

(128~130题共用题干)

患者，男性，67岁。1年前诊断为心绞痛，今日午后无明显诱因出现心前区疼痛，服硝酸甘油不能缓解，急诊入院，医嘱要求检查CPK。

128. 适宜的采血时间为

- A. 即刻
- B. 睡前
- C. 晚饭前
- D. 服药后2小时
- E. 次日晨起空腹

129. 采集血标本时，正确的措施是

- A. 取血1ml
- B. 采血后避免振荡，防止溶血
- C. 采血后更换针头再注入试管内
- D. 可在静脉留置针处取血
- E. 快速将血液注入试管内

130. 试管外标签注明的内容不包括

- A. 科室
- B. 床号
- C. 姓名
- D. 取血量
- E. 送检目的

全国护士执业资格考试
精准模拟卷（三）

全国护士执业资格考试精准模拟卷（三）专业实务

【A1/A2型题】

1. 癌症病人抽搐发作时，紧急处理常用的药物是

- A. 地西洋
- B. 氯丙嗪
- C. 奋乃静
- D. 百忧解
- E. 丙咪嗪

2. 胎儿在子宫内急性缺氧初期，主要表现为胎动

- A. 减弱
- B. 消失
- C. 增强
- D. 频繁
- E. 次数减少

3. 易导致早产的高危因素是

- A. 妊娠晚期性交
- B. 脐带绕颈一周
- C. 慢性输卵管炎
- D. 骨盆狭窄
- E. 瘢痕子宫

4. 三岁小儿向妈妈执意表达自己的需要，其心理发展特性是

- A. 明显自主性
- B. 有集体意识
- C. 客观看问题
- D. 克服自卑感
- E. 有抽象思维

5. 患者男，30岁。7小时前行阑尾切除术，现患者主诉下腹胀痛，护士观察其下腹膀胱区隆起，该患者最主要护理问题是

- A. 便秘
- B. 有感染的危险
- C. 疼痛
- D. 尿潴留
- E. 体液过多

6. 肾结核的原发病灶大多在

- A. 骨

B. 肺

- C. 肠
- D. 肝
- E. 脑

7. 患儿女，生后6天。已完成乙肝疫苗接种，准备下次乙肝疫苗的接种时间是

- A. 2个月
- B. 3个月
- C. 1个月
- D. 4个月
- E. 5个月

8. 一位护士正在为一位刚入院的患者做入院介绍，此时护患关系处于

- A. 初始期
- B. 结束期
- C. 工作期
- D. 准备期
- E. 熟悉期

9. 某女士正在服用口服避孕药进行避孕，服药期间出现哪种情况应该停药

- A. 体重增加
- B. 闭经
- C. 色素沉着
- D. 头晕乏力
- E. 经量减轻

10. 患者男，58岁。食管癌拟进行结肠代食管手术，术前口服甲硝唑的最佳时间为

- A. 术前3天
- B. 术前1天
- C. 术前2天
- D. 术前14天
- E. 术前7天

11. 由责任护士和其辅助护士负责一定数量患者从入院到出院期间各种治疗、基础护理、专科护理、护理病例书写、病情观察、用药治疗及健康教育的护理方式属于

- A. 临床路径
B. 功能制护理
C. 个案护理
D. 小组护理
E. 责任制护理
12. 颅前窝骨折皮下瘀斑的典型体征是
A. 三主征
B. “熊猫眼”征
C. 三凹征
D. Murphy 征
E. 五联征
13. 产后血性恶露持续的时间一般是
A. 1~2 天
B. 3~4 天
C. 8~10 天
D. 10~15 天
E. 15~20 天
14. 患者男，26岁。因上呼吸道感染，遵医嘱服用碘胺类药物，护士嘱其多饮水的主要目的是
A. 降低药物毒性
B. 减少对胃的刺激
C. 减少对肾脏损害
D. 提高疗效
E. 较少对肝脏损害
15. 预防小儿麻疹最有效的措施是
A. 注射干扰素
B. 输注丙种球蛋白
C. 输注血浆
D. 输注全血
E. 接种疫苗
16. 患者男，56岁，主诉活动后心前区疼痛一个月余。患者平时活动后即出现心前区压榨样疼痛，持续3~5分钟，休息后可以缓解，入院以后治疗5天后出院，遵医嘱继续服用硝苯地平，该药物属于
A. 血管紧张素转化酶抑制剂
B. 利尿剂
C. 钙通道阻滞剂
- D. β 受体拮抗剂
E. 硝酸酯类
17. 对于献血者的叙述，错误的是
A. 献血者年龄 18~55 岁
B. 献血一次不超过 400ml
C. 献血两次间隔要大于 3 个月
D. 献血者要身体健康，符合献血的条件
E. 血站对献血者必须免费进行必要的健康检查
18. 某护士使用臭氧灭菌灯对空气进行消毒，消毒结束后，间隔时间多久人员方可进入
A. 30min
B. 60min
C. 45min
D. 90min
E. 20min
19. 患者女，56岁。既有糖尿病史10余年，突发糖尿病酮症酸中毒。此时患者的呼吸气味是
A. 芳香味
B. 肝腥味
C. 大蒜味
D. 烂苹果味
E. 氨臭味
20. 急性上呼吸道感染最常见的病原体是
A. 细菌
B. 病毒
C. 真菌
D. 支原体
E. 葡萄球菌
21. 患者男，30岁，身高170厘米，体重56千克，双下肢瘫痪，护士于6时40分为其翻身，检查见全身皮肤状况良好。该患者下一次翻身时间是
A. 8时 40 分
B. 10时 40 分
C. 9时 40 分
D. 10时 10 分
E. 9时 10 分

22. 腹外疝患者因担心疝块反复突出影响工作和生活，最常产生的主要心理问题是
- A. 自卑
 - B. 忧郁
 - C. 焦虑
 - D. 恐惧
 - E. 愤怒
23. 轻型急性胰腺炎患者开始进食无脂低蛋白饮食的时间为患者病后
- A. 3~5天
 - B. 不超过12小时
 - C. 5~7天
 - D. 7天以上
 - E. 1~3天
24. 患者女，60岁。因午饭时食用了发芽的马铃薯导致食物中毒，到急诊就诊后医生要为进行洗胃，首选的洗胃液是
- A. 5%醋酸
 - B. 1%~3%鞣酸
 - C. 高锰酸钾溶液
 - D. 1%活性炭悬浮液
 - E. 硫酸镁
25. 患者女，48岁。因胆石症出现右上腹阵发性绞痛、寒战、高热，医嘱：哌替啶50mg，肌内注射；阿托品0.5mg，肌内注射。该患者使用阿托品的主要作用
- A. 扩散瞳孔
 - B. 兴奋呼吸中枢
 - C. 解除迷走神经的抑制
 - D. 解除平滑肌痉挛
 - E. 抑制腺体分泌
26. 关于二甲双胍治疗糖尿病的叙述，错误的是
- A. 每天最大剂量不应超过2g
 - B. 服用时应与第一口饭同时咀嚼
 - C. 可改善胰岛素敏感性，减轻胰岛素抵抗
 - D. 可导致腹部不适、恶心、腹泻等不良反应
 - E. 治疗肥胖或超重的2型糖尿病的首选药
27. 患者女，28岁孕27周。因胎儿畸形行引产
- 术后2周，感自责、自罪，并有自伤行为，该患者最可能产生的心理障碍是
- A. 产后自残
 - B. 产后抑郁
 - C. 产后沮丧
 - D. 产后焦虑
 - E. 产后紧张
28. 患儿男，8岁，来院时表情痛苦、呼吸急促、面颊潮红、鼻翼煽动。这种面容表现之为
- A. 甲状腺面容
 - B. 急性面容
 - C. 慢性面容
 - D. 脱水面容
 - E. 贫血面容
29. 患儿女，6岁，患有先天性心脏病，需采用地高辛进行治疗，护士在给药前，应特别监护
- A. 血压
 - B. 呼吸
 - C. 心律
 - D. 体温
 - E. 瞳孔
30. 患者女，42岁，肝硬化腹水、重度高血压，但水肿较轻因此给予低盐饮食，每日食盐量不超过
- A. 3g
 - B. 0.5g
 - C. 1g
 - D. 2g
 - E. 5g
31. 胸部外伤后出现胸廓软化是由于
- A. 一根肋骨多处骨折
 - B. 胸骨骨折
 - C. 锁骨骨折
 - D. 多根多段肋骨骨折
 - E. 胸肌大面积损伤
32. 患者女，29岁。全身躯干、会阴、下肢深Ⅱ度烧伤入院，为防止休克，可输入
- A. 甘露醇
 - B. 白蛋白

- C. 葡萄糖
D. 维生素
E. 脂肪乳
33. 为乙肝患者更换伤口敷料时，患者血液溅入护士眼睛，这种损伤属于
A. 物理性损伤
B. 机械性损伤
C. 心理性损伤
D. 生物性损伤
E. 化学性损伤
34. 某初孕妇，28岁。妊娠30周，胎儿臀位，为减轻孕妇的焦虑情绪，护士对孕妇的指导，不正确的是
A. 可采用膝卧位矫正
B. 纠正无效时，刻提前住院待产
C. 膝胸卧位须排空膀胱
D. 可行外转胎位术矫正
E. 胎位可自行转为头先露
35. 导致COPD最常见的因素是
A. 吸烟
B. 职业粉尘
C. 大气污染
D. 感染
E. 蛋白酶-抗蛋白酶失调
36. 高热时酒精擦浴其散热方式为
A. 辐射
B. 对流
C. 蒸发
D. 传导
E. 接触
37. 全身麻醉患者清醒前最危险的并发症是
A. 窒息
B. 体温过低
C. 坠床
D. 引流管脱落
E. 意外损伤
38. 高热病人最适宜的饮食是
A. 低盐半流饮食
- B. 普通饮食
C. 软质饮食
D. 流质饮食
E. 低脂饮食
39. 有关应用热疗的目的正确的是
A. 促进浅表炎症消退和局限
B. 抑制炎症扩散
C. 减轻局部充血或出血
D. 传导发散体内的热
E. 提高痛觉神经的兴奋性
40. 使用红外线烤灯时，错误的操作是
A. 对病人的情况进行评估
B. 暴露治疗部位
C. 灯距为20~30cm
D. 时间为20~30min
E. 注意观察病人反应
41. 低分子右旋糖酐的主要作用为
A. 提高血浆胶体渗透压
B. 增加血容量，改善微循环
C. 补充蛋白质
D. 补充营养和水份
E. 保持酸碱平衡
42. 少尿是指24小时尿量少于
A. 50ml
B. 100ml
C. 200ml
D. 300ml
E. 400ml
43. 休克病人留置导尿最主要的目的是
A. 保持床单位清洁干燥
B. 引流尿液，促进有毒物质的排泄
C. 收集尿标本，作细菌培养
D. 测尿量及比重，了解肾血流灌注情况
E. 避免尿潴留
44. 下列哪种情况可实施大量不保留灌肠
A. 高热病人降温
B. 心肌梗死病人
C. 急腹症

- D. 消化道出血
E. 妊娠早期
45. 纤维内窥镜的消毒灭菌宜用
A. 酒精浸泡法
B. 戊二醛浸泡法
C. 紫外线照射法
D. 高压蒸汽灭菌法
E. 煮沸法
46. 不属于生殖器的邻近器官的是
A. 膀胱
B. 尿道
C. 输尿管
D. 结肠
E. 直肠
47. 对手术器械最有效的灭菌法是
A. 燃烧法
B. 高压蒸汽灭菌法
C. 煮沸消毒法
D. 烤箱干热灭菌法
E. 微波消毒灭菌法
48. 营养不良的最初表现是
A. 体重减轻
B. 体重不增
C. 皮下脂肪减少
D. 精神不振
E. 毛发枯黄
49. 35岁已婚妇女。近年来，月经周期30~32天，月经持续10~15天，经量时多时少。基础体温呈双相，为明确诊断需行刮宫术，时间应在
A. 月经来潮前一周
B. 月经来潮2小时内
C. 月经第3天
D. 月经第5天
E. 月经来潮24小时内
50. 做超声雾化吸入时，一般不选择下列哪种药物
A. 舒喘灵
- B. 庆大霉素
C. α-糜蛋白酶
D. 地塞米松
E. 青霉素
51. 股静脉穿刺后按压不当，最容易发生
A. 血栓
B. 局部血肿
C. 空气栓塞
D. 静脉炎
E. 蜂窝组织炎
52. 注射青霉素引起血清病型反应，常发生在注射后
A. 1~4天
B. 4~7天
C. 7~12天
D. 12~17天
E. 14~21天
53. 痰液呈黄色，静置后分三层常见于
A. 细菌性肺炎
B. 肺结核
C. 慢性支气管炎
D. 支气管扩张症
E. 肺癌
54. 尿毒症心血管并发症中最常见的死亡原因是
A. 高血压
B. 心包炎
C. 心肌病
D. 心律失常
E. 心力衰竭
55. 当患者神志丧失，诊断心跳停止的指标是
A. 呼吸停止
B. 瞳孔散大
C. 大动脉搏动消失
D. 血压测不到
E. 脉搏扪不清
56. 有关呕血与黑便的叙述，不正确的是
A. 有黑便不一定有呕血

- B. 有呕血常伴黑便
C. 呕血呈咖啡色是血液在胃内经胃酸作用形成正铁血红素所致
D. 黑便呈柏油样是由于血红蛋白中铁与肠内硫化物作用形成硫化铁所致
E. 幽门以上出血的表现为呕血，幽门以下出血的表现为黑便
57. 产后子宫逐渐降至盆腔在腹部不能扪及宫底的时间是
A. 2~3d
B. 1周左右
C. 2周
D. 3~5d
E. 10d左右
58. 法洛四联症对病理生理影响最大的是
A. 右位主动脉弓
B. 肺动脉狭窄
C. 室间隔缺损
D. 主动脉骑跨
E. 右心室肥厚
59. 在小儿年龄分期中，青春期是指
A. 从出生到满28d内
B. 从出生到满1周岁
C. 1周岁后到满3周岁之前
D. 3周岁后到满6周岁之前
E. 女孩从11~12岁开始至17~18岁，男孩从13~14岁开始至18~20岁
60. 患者从事每天日常活动即出现心悸、气短症状，休息后即缓解，其心功能分级应为
A. 心功能I级
B. 心功能II级
C. 心功能III级
D. 心功能IV级
E. 代偿期
61. 慢性肾衰竭患者突发抽搐、意识丧失、心脏骤停而死的原因可能是
A. 代谢性酸中毒
B. 低钙血症
C. 尿毒症脑病
- D. 高血钾症
E. 心功能不全
62. 妊娠早期“黑加征”是指
A. 子宫增大、变软
B. 子宫呈前倾前屈位
C. 子宫峡部软，子宫和宫颈似不相连
D. 宫颈充血变软，呈紫蓝色
E. 乳头及乳晕着色加深，乳头周围有褐色小结节
63. 全身麻醉患者意识完全清醒的标志是
A. 睫毛反射恢复
B. 能睁眼看人
C. 眼球转动
D. 呻吟翻身
E. 能准确回答问题
64. 尿毒症患者贫血的主要原因是
A. 失血
B. 促红细胞生成素减少
C. 缺铁
D. 低蛋白血症
E. 恶心、呕吐
65. 迁延不愈的营养不良患儿，可引起突然死亡的并发症是
A. 低血钙
B. 低血糖
C. 维生素A缺乏
D. 继发感染
E. 低蛋白血症
66. 水肿最早出现于颜面部，逐渐向全身发展。此种水肿最可能是
A. 药物性水肿
B. 心源性水肿
C. 营养相关性水肿
D. 肾源性水肿
E. 肝源性水肿
67. 白血病患者发生感染的最主要原因是
A. 贫血
B. 骨髓抑制

- C. 血小板减少
D. 成熟粒细胞缺乏
E. 白细胞过度增生
68. 甲硝唑用于治疗阿米巴性肝脓肿时，最常出现的不良反应是
A. 急性膀胱炎
B. 荨麻疹
C. 恶心、呕吐
D. 白细胞减少
E. 头痛眩晕
69. 腹股沟斜疝发生绞窄时，疝囊渗液的性质不包括
A. 棕褐色
B. 淡红色
C. 红褐色
D. 暗红色
E. 淡黄色
70. 患者女，32岁，医嘱行¹³¹I甲状腺功能测定，护士指导患者在试验期间应忌食的食物是
A. 芹菜
B. 紫菜
C. 花菜
D. 黄瓜
E. 西红柿
71. 急性呼吸窘迫综合征早期的病理变化不包括
A. 肺间质水肿
B. 肺泡萎陷
C. 肺泡内透明膜形成
D. 肺充血
E. 肺泡纤维化
72. 关于肝硬化门脉高压患者的临床表现，错误的叙述是
A. 早期可出现脾大，脾功能亢进
B. 全身无出血倾向
C. 可出现黄疸、蜘蛛痣、腹壁静脉曲张等
D. 腹部膨隆，可叩出腹部移动性浊音
E. 门静脉血液阻力增加是门脉高压的始动因素
73. 男，40岁，因劳累近2周自感头晕、头痛，连续3次测血压值为21.3/13.3kPa(160/100mmHg)，休息后血压可自行恢复正常，诊断首先考虑
A. 急进行高血压
B. 慢性肾炎
C. 甲亢
D. 原发性高血压
E. SLE
74. 男，60岁，农民，1995年诊断为2型糖尿病，坚持服用优降糖每日3次，每次1片。很少去医院查血、尿糖。近1个月来乏力明显，下肢出现水肿，血压120/95mmHg。为早期判断有无糖尿病肾病，下列哪项化验最有价值
A. 血尿素氮(BUN)
B. 血肌酐(Cr)
C. 24h尿蛋白定量
D. 尿微量白蛋白排泄率(UAER)
E. 尿肌酐清除率
75. 患者女69岁，癌症晚期，晨起空腹采血检查。护士第一次静脉穿刺失败，患者问：是看我要死了就拿我练手了是吗？此时护士恰当的做法是
A. 向患者道歉并争取谅解
B. 暂时离开患者，请其他护士前来处理
C. 向患者解释穿刺失败是患者自身原因造成的
D. 请患者给第二次机会，并保证这次穿刺一定成功
E. 不做解释，先执行其他患者的治疗
76. 护士处理医嘱时，应首先执行的医嘱是
A. 长期医嘱
B. 临时医嘱
C. 临时备用医嘱
D. 长期备用医嘱
E. 停止医嘱
77. 护士与患者家属的沟通中，错误的是
A. 尊重患者家属
B. 给予患者家属心理支持
C. 指导患者家属对患者进行生活照顾

- D. 指导患者家属参与患者的护理过程
E. 指导患者家属参与患者的治疗过程
78. 浅Ⅱ度烧伤的损伤范围是
A. 角质层
B. 生发层
C. 真皮浅层
D. 皮肤全层
E. 表皮的发生层及真皮乳头层
79. 下列药物中易引起再生障碍性贫血的是
A. 氯霉素
B. 氯丙嗪
C. 链霉素
D. 氨基糖苷类
E. 头孢呋辛酯
80. 某患者住院期间因输入不合格血液导致乙型肝炎，其索赔对象应
A. 当地疾病控制中心
B. 当地卫生计划行政部门
C. 血站和医院
D. 当地公安部门
E. 执行输血操作的护士
81. 患者男，72岁，因“急性左心衰、心房颤动”急诊收入院，输液过程中突然出现肺栓塞经抢救无效死亡。提出医疗事故鉴定申请。当地卫生行政部门应在当事人提出几日内移送上级主管部门
A. 21天
B. 14天
C. 3天
D. 7天
E. 10天
82. 某初产妇，26岁，正常分娩后，子宫复旧符合正常规律的是
A. 产后2周在腹部扪及宫底
B. 产后6周子宫如孕50天大小
C. 产后6周子宫内膜全部修复
D. 产后6周时宫颈恢复正常形态
E. 产后第2周为血性恶露
83. 关于宫颈癌的叙述正确的是
A. 多为鳞癌和腺癌，以腺癌为主
B. 转移途径已直接蔓延和淋巴转移为主，血性转移及少见
C. 病变多发生在子宫颈外口处
D. 宫颈原位癌不属于宫颈上皮内瘤样变
E. 可表现为菜花型、浸润型、溃疡型三种类型
84. 患者女，60岁。确诊为急性呼吸窘迫综合征，给予面罩吸氧。为了使吸入氧能够达到53%需将氧流量调制
A. 10L/min
B. 6L/min
C. 4L/min
D. 8L/min
E. 2L/min
85. 患者，女，40岁。因患子宫肌瘤入院，护士在采集病史时应重点追溯的内容是
A. 是否有早婚早育史
B. 高血压家庭史
C. 是否长期使用雌激素
D. 睡眠情况
E. 饮食习惯
86. 子宫肌瘤临床表现为月经过多时，与下列哪项关系特别密切
A. 肌瘤大小
B. 肌瘤生长部位
C. 肌瘤多少
D. 病人体质
E. 有无并发症
87. 一氧化碳中毒后出现频繁抽搐者，首选的药物是
A. 脱水剂
B. 利尿剂
C.冬眠药
D. 地西洋
E. 三磷酸腺苷
88. 女性，50岁，在家用煤气加热器淋浴时，出现头痛、头晕、无力、胸闷、心悸、恶心等症状，对其进行现场急救时首要的措施是

- A. 松解衣服
B. 给予止痛药
C. 保持呼吸道通畅
D. 吸氧
E. 立即将病人搬到室外空气新鲜处
89. 正常小儿前囟闭合的年龄是
A. 10~12个月
B. 12~18个月
C. 18~20个月
D. 2岁
E. 2岁半
90. 下列有关月经生理的描述错误的是
A. 月经周期为本次月经干净至下次月经来潮
B. 初潮年龄一般为13~14岁
C. 经血呈暗红色，含有子宫内膜碎片
D. 月经第一次来潮称初潮
E. 月经的出血多不凝固
91. 女性，16岁，平素要强，学习成绩好。一周前上课过程中，老师提问未能正确回答问题，受到老师批评，回家后即不能用语言交谈，常用手势或书写表达自己的思想，但病人可以正常咳嗽检查唇、舌、腭、声带均无异常，最可能的诊断为
A. 急性应激障碍
B. 癔症
C. 恐惧症
D. 精神分裂症
E. 脑器质性精神障碍
92. 关于护士在工作中坐姿的叙述，错误的是
A. 坐在椅子的后部1/2或1/3处
B. 两膝并拢，两脚并拢
C. 下颌微收，目视前方
D. 上身挺直，抬头
E. 双手交叉相握于腹前
93. 小脑幕切迹疝病人瞳孔变化及肢体瘫痪的特点是
A. 病变同侧瞳孔变化及同侧肢体瘫痪
B. 病变同侧瞳孔变化及对侧肢体瘫痪
C. 病变对侧瞳孔变化及同侧肢体瘫痪
- D. 病变对侧瞳孔变化及对侧肢体瘫痪
E. 双侧瞳孔变化及对侧肢体瘫痪
94. 某新生儿日零五天出生，体重3千克，目前体重2.8千克，妈妈很担心孩子的体重会继续下降，护士向妈妈解释，孩子的体重将恢复正常。下列解释正确的是
A. 一天内恢复正常
B. 七天内恢复正常
C. 十天左右恢复正常
D. 两周左右恢复正常
E. 三周左右恢复正常
95. 患者休养适宜的环境是
A. 气管切开患者，室内相对湿度为20%
B. 普通病史，室温以18~22℃为宜
C. 破伤风患者，室内应保持光线充足
D. 中暑患者，室温应保持在4℃左右
E. 产妇休养室，需保暖不易开窗
96. 患者，女，31岁，妊娠38周，因阴道持续性流液2小时入院，医生诊断为胎膜早破，三护士协助其采取的卧位应是
A. 平卧位
B. 截石位
C. 头低足高位
D. 膝胸卧位
E. 头高足低位
97. 使用约束带时应重点观察
A. 衬垫是否垫好
B. 局部皮肤颜色有无变化
C. 约束带的松紧程度
D. 神志是否清楚
E. 卧位是否舒适
98. 过氧乙酸不宜用于
A. 手的消毒
B. 浸泡金属器械
C. 浸泡搪瓷类物品
D. 空气消毒
E. 擦拭家具
99. 使用无菌持物钳，下面哪项是不正确的

- A. 取远处无菌物品，应将无菌持物钳放入容器内搬移
B. 液面浸没轴节以上 2-3 厘米
C. 干燥保存应每 4-6 小时更换一次
D. 取钳应将前端闭合
E. 可用于夹取消毒的油纱布
100. 护士在为病人张某静脉注射 25% 葡萄糖溶液中，病人自述疼痛，推注时稍有阻力，推注部位局部水肿，抽无回血，此情况应考虑是
A. 针头滑出血管外
B. 针头部分阻塞
C. 针头斜面紧贴血管壁
D. 静脉痉挛
E. 针尖斜面一部分穿透下面血管壁
101. 抢救青霉素过敏性休克病人时，首选的药物为
A. 盐酸异丙嗪
B. 苯肾上腺素
C. 盐酸肾上腺素
D. 异丙肾上腺素
E. 去甲肾上腺素
102. 对接受青霉素治疗的病人，如果停药几天以上，必须重新做过敏实验
A. 1 天
B. 2 天
C. 3 天
D. 4 天
E. 5 天
103. 青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是
A. 立即通知医生抢救
B. 静脉注射 0.1% 盐酸肾上腺素 1ml
C. 立即停药，平卧，皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素
D. 立即吸氧，胸外心脏按压
E. 氢化可的松静脉输液
104. 发挥药效最快的给药途径是
A. 口服
B. 皮下注射
- C. 吸入
D. 静脉注射
E. 外敷
105. 护士执行给药原则中，下列哪项是最重要的
A. 遵医嘱给药
B. 给药途径要准确
C. 给药时间要准确
D. 注意用药的不良反应
E. 给药中要经常观察疗效
106. 服磺胺药需多饮水的目的是
A. 避免损害造血系统
B. 减轻服药引起的恶心
C. 避免尿中结晶析出
D. 避免影响血液酸碱度
E. 增加药物疗效
107. 服用洋地黄类药物时，护士应重点观察
A. 胃肠道反应
B. 是否成瘾
C. 心率、心律
D. 体温
E. 有无皮疹
108. 生物制品类药物保存方法为
A. 密盖瓶保存
B. 放入有色瓶
C. 放入冰箱
D. 放在阴凉处
E. 远离明火
109. 超声雾化吸入器水温超过多少需要调换
A. 30℃
B. 40℃
C. 50℃
D. 60℃
E. 70℃
110. 为防止感染，注射时下列最重要的是
A. 不在硬结处进针
B. 注射器完整无裂痕
C. 针头无锈无钩锐利

- D. 注射前洗手带口罩
E. 皮肤消毒直径为5cm
111. 2岁以下的婴儿肌内注射时，最好选用
A. 臀大肌
B. 上臂三角肌
C. 臀中肌 臀小肌
D. 股外侧肌
E. 前臂外侧肌
112. 臀大肌注射时的体位为
A. 下腿伸直上腿弯曲
B. 下腿弯曲上腿伸直
C. 两腿伸直
D. 两腿弯曲
E. 双膝向腹部弯曲
113. 皮下注射时针头与皮肤成
A. 5~10°
B. 20~30°
C. 30~40°
D. 45~50°
E. 90°
114. 链霉素过敏病人首选的药物为
A. 乳酸钙
B. 溴化钙
C. 碳酸钙
D. 葡萄糖酸钙
E. 草酸钙
115. 破伤风抗毒素试验液的剂量是
A. 15U
B. 20U
C. 50U
D. 70U
E. 100U
116. 链霉素前需做过敏实验，其剂量为
A. 0.25U
B. 2.5U
C. 25U
D. 250U
E. 2500U
117. 过敏性休克病人出现中枢神经系统症状原因是
A. 肺水肿
B. 循环血量减少
C. 脑组织缺氧
D. 肾功能衰竭
E. 毛细血管扩张通透性增加
118. 采取生化检验的血标本宜在
A. 临睡前
B. 午后
C. 清晨空腹
D. 傍晚
E. 饭前
119. 最严重的输液反应是
A. 过敏反应
B. 心脏负荷过重的反应
C. 发热反应
D. 空气栓塞
E. 静脉炎
120. 静脉炎处置错误的是
A. 抬高患肢
B. 适当运动
C. 局部理疗
D. 酒精湿敷
E. 硫酸镁热湿敷
- 【A3/A4型题】**
(121~123题共用题干)
患者男67岁，因冠心病入院，在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰
121. 该患者发生了
A. 发热反应
B. 空气栓塞
C. 急性肺水肿
D. 过敏反应
E. 静脉炎
122. 此时，护士应为患者采取的体位是
A. 去枕仰卧位

- B. 休克卧位
- C. 左侧卧位
- D. 头低足高位
- E. 端坐位，两腿下垂

123. 给氧时，氧流量为
- A. 1~2L/min
 - B. 3~4L/min
 - C. 5~6L/min
 - D. 6~8L/min
 - E. 9~10L/min

(124~126题共用题干)

男性，33岁，左小腿被铁钉刺伤一段时间后出现乏力、头痛、打哈欠，继而有张口困难、蹙眉和苦笑面容等表现，全身肌肉阵发性痉挛，但神志一直清醒，诊断为破伤风。

124. 对于已经发生破伤风者，治疗的重要环节是
- A. 控制痉挛
 - B. 中和游离毒素
 - C. 彻底清创
 - D. 维持水电平衡
 - E. 应用抗生素

125. 痉挛严重发作时，应特别注意观察病人是否发生了
- A. 脱水
 - B. 窒息
 - C. 呼吸困难
 - D. 肌肉损伤
 - E. 呼吸性酸中毒

126. 对该病人的护理措施正确的是
- A. 让家属经常探视
 - B. 病室阳光充足，经常开窗通风
 - C. 伤口敷料使用后高压灭菌
 - D. 避免各种护理操作集中进行

- E. 各种操作在注射镇静剂后进行

(127~128共用题干)

患儿8岁，患上呼吸道感染，出现食欲减退、乏力、尿少、水肿。体温37.5℃、血压增高。尿蛋白、红细胞均(+)，补体C3。诊断为急性肾小球肾炎。

127. 其首选的护理诊断问题是

- A. 体温升高
- B. 排尿异常
- C. 体液过多
- D. 活动无耐力
- E. 营养不足

128. 该患儿的护理措施哪项正确

- A. 严格卧床休息
- B. 给予易消化的普食
- C. 血尿消失后可加强锻炼
- D. 每日留取晨尿送培养
- E. 严格控制蛋白质摄入量

(129~130共用题干)

男，27岁，右侧腰部摔伤2小时，局部疼痛、肿胀，有轻度血尿，诊断为右肾挫伤。

129. 能及时反映肾出血情况的是

- A. 面色、意识
- B. 肢体温度
- C. 腰部疼痛
- D. 血压、脉搏
- E. 尿量、尿色

130. 该病人的护理，错误的

- A. 绝对卧床
- B. 输液，使用止血药
- C. 按时使用抗生素
- D. 血尿消失即可下床活动
- E. 做好术前准备

全国护士执业资格考试精准模拟卷（三）实践能力

【A1/A2型题】

1. 再生障碍性贫血病人，高热伴抽搐，适宜的降温措施是
A. 温水擦浴
B. 冰水灌肠
C. 酒精擦浴
D. 口服退热药
E. 头部放冰袋
2. 预防急性胰腺炎的措施不包括
A. 戒酒
B. 避免暴饮暴食
C. 治疗胆道疾病
D. 常用抑制胰酶活性的药物
E. 避免服用引起胰腺炎的药物
3. 丹毒的学名为
A. 疔
B. 痈
C. 腋性指头炎
D. 网状淋巴管炎
E. 管状淋巴管炎
4. 精神分裂症与神经衰弱的重要区别是
A. 生活懒散
B. 睡眠不佳
C. 急躁易怒
D. 自知力是否存在
E. 工作学习效率下降
5. 属于杀菌药的抗结核治疗药物是
A. 吡嗪酰胺
B. 对氨基水杨酸钠
C. 氨硫脲
D. 卡那霉素
E. 乙胺丁醇
6. 腰椎单纯压缩性骨折，压缩程度在1/3以内采取的措施是
A. 牵引治疗
B. 俯卧硬板床
- C. 半卧硬板床
D. 手术复位
E. 平卧硬板床，腰背肌后伸锻炼
7. 食管癌首选的治疗方法是
A. 化学治疗
B. 放射治疗
C. 手术治疗
D. 免疫治疗
E. 基因治疗
8. 膀胱肿瘤最常见、最早出现的症状是
A. 尿频
B. 尿痛
C. 血尿
D. 排尿困难
E. 尿潴留
9. 预防成人哮喘急性发作最主要的是
A. 流质饮食
B. 避免剧烈运动
C. 预防感染
D. 充分休息
E. 吸烟者戒烟
10. 原发性颅内肿瘤共有的表现是
A. 颅内压增高
B. 视觉障碍
C. 感觉障碍
D. 运动障碍
E. 共济失调
11. 阴阳五行学说的“五行”是
A. 金、木、水、火、土
B. 风、寒、暑、湿、火
C. 喜、怒、忧、思、悲
D. 心、肝、脾、肺、肾
E. 酸、苦、甘、辛、咸
12. 颈椎骨折进行颅骨牵引时，采取的卧位是
A. 端坐位
B. 半坐卧位

- c. 头低足高位
d. 头高足低位
e. 俯卧位
13. 对到门诊就诊的患者首先应采取的措施是
a. 挂号
b. 预检分诊
c. 测量生命体征
d. 安排候诊
e. 健康教育
14. 服用后须多饮水的药物种类是
a. 铁剂
b. 止咳糖浆
c. 助消化药
d. 健胃药
e. 磺胺类药
15. 在下列分级护理中只属于特级护理内容的是
a. 严密观察病情及生命体征
b. 每1~2小时巡视病人1次
c. 给予卫生保健指导
d. 按护理常规进行护理
e. 每15~30分钟巡视患者1次
16. 压疮淤血红润期的典型表现是
a. 受压皮肤呈紫红色
b. 局部皮肤出现红、肿、热、痛
c. 局部皮下产生硬结
d. 皮肤上出现水疱
e. 皮肤破损，有渗出液
17. 排列出院病历时体温单的上面是
a. 医嘱单
b. 检验报告单
c. 护理记录单
d. 住院病历封面
e. 住院病历续页
18. 轮椅运送患者时操作错误的是
a. 下坡时要减慢速度
b. 注意观察患者面色
c. 上坡时患者身体前倾
- d. 下坡时身体尽量向后靠
e. 上下轮椅时均须用车闸固定
19. 急性颅内压增高的早期表现为
a. 脉搏增快、呼吸急促、血压升高
b. 脉搏增快、呼吸急促、血压降低
c. 脉搏减慢、呼吸急促、血压降低
d. 脉搏减慢、呼吸减慢、血压降低
e. 脉搏减慢、呼吸深慢、血压升高
20. 支气管哮喘患者急性发作时应取的体位是
a. 端坐位
b. 俯卧位
c. 仰卧位
d. 膝胸位
e. 头低脚高位
21. 浸泡纤维胃镜宜用的消毒液是
a. 0.1%苯扎溴铵
b. 0.2%过氧乙酸
c. 70%乙醇
d. 2%戊二醛
e. 碘伏
22. 已去除铝盖的无菌溶液的有效期是
a. 2小时
b. 4小时
c. 14小时
d. 24小时
e. 48小时
23. 在无菌操作中发现手套破裂需采取的处理措施是
a. 立即更换
b. 再加套一副手套
c. 用乙醇棉球擦拭手套
d. 用胶布将破裂处包好
e. 用无菌纱布将破裂处缠好
24. 为左上肢骨折病人脱、穿衣服的正确方法
a. 先脱右肢，先穿右肢
b. 先脱左肢，先穿左肢
c. 先脱右肢，先穿左肢
d. 先脱左肢，先穿右肢

- E. 可随意脱、穿
25. 测量呼吸的方法错误的是
A. 测量前向病人解释取得合作
B. 观察病人胸腹起伏，一起一伏为一次
C. 注意呼吸的深度和节律
D. 观察病人胸腹起伏时，成人、儿童计数 30 秒，得数乘以 2
E. 呼吸异常者需测 1 分钟
26. 测量血压时不符合操作要求的是
A. 袖带缠在上臂中部
B. 重测时汞柱需降至 0 点
C. 测成人上肢血压，袖带宽 12cm
D. 被测者坐位时，肱动脉平第七肋间
E. 缠袖带的松紧以能放入一指为宜
27. 需用低脂肪饮食的患者是
A. 烧伤病人
B. 大手术后
C. 急性肾炎
D. 肝胆胰疾病
E. 甲状腺功能亢进
28. 留取血吸虫孵化检查的粪便标本应
A. 于进试验饮食 3~5 天后留取
B. 留全部粪便及时送检
C. 将便盆加热后留取全部粪便
D. 用竹签取脓血黏液粪便置培养管内
E. 取少量异常粪便置蜡纸盒内送检
29. 成人鼻饲时插胃管的长度为
A. 5~15cm
B. 25~35cm
C. 45~55cm
D. 65~75cm
E. 85~95cm
30. 做真菌培养时，取分泌物的部位是
A. 双侧腭弓
B. 咽部
C. 扁桃体
D. 溃疡面
E. 舌面
31. 导尿时戴无菌手套后首先应进行的操作是
A. 铺洞巾
B. 润滑导尿管
C. 按序排列用物
D. 用无菌持物钳夹出小药杯
E. 倒消毒液于小药杯内
32. 男患者导尿时应提起阴茎和腹壁呈的角度为
A. 30°
B. 40°
C. 50°
D. 60°
E. 70°
33. 在输血过程中病人发生了溶血反应，此时护士首要的护理是
A. 立即停止输血
B. 通知医生
C. 静脉滴注 4% 碳酸氢钠
D. 测量血压及尿量
E. 皮下注射肾上腺素
34. 在臀部实施无痛肌内注射时，不妥的做法是
A. 患者侧卧位时上腿弯曲
B. 患者俯卧位时足尖相对，足跟分开
C. 推注药液速度缓慢
D. 同时注射两种药液时，应后注射刺激性强的药液
E. 不在有硬结的部位进针
35. 口服给药时做法错误的是
A. 待病人服药后方可离开
B. 危重病人及不能自行服药者应喂服
C. 因特殊检查或行手术而禁食者暂不发药
D. 暂不能服药者应将药物收回保管并交班
E. 如病人提出疑问应服药后再给病人解释
36. 关于皮内注射正确的是
A. 皮肤试验一般在三角肌下缘
B. 常规消毒皮肤
C. 左手绷紧皮肤
D. 针尖斜面达真皮下

- E. 用干棉签按压拔针
37. 大量输库血时要防止出现
A. 酸中毒与高钾血症
B. 酸中毒与低钾血症
C. 碱中毒与高钾血症
D. 碱中毒与低钾血症
E. 低血钾与高血钙
38. 白血病病人最适宜输入的血液制品是
A. 新鲜血
B. 库存血
C. 红细胞
D. 冰冻血浆
E. 白蛋白液
39. 在血标本采集时，做法错误的是
A. 输液时在对侧肢体采血
B. 振荡血清标本，防止试管内凝血
C. 血生化标本应清晨空腹时采血
D. 血气分析应备干燥注射器和肝素
E. 需采集多项标本时计算总需血量
40. 做尿蛋白定量检查时尿标本中加入甲苯的作用是
A. 防止尿液变质
B. 防止尿液改变颜色
C. 固定尿中有机成分
D. 防止尿中激素被氧化
E. 保持尿液化学成分不变
41. 检查痰中癌细胞，固定标本的溶液宜选
A. 10%草酸钾
B. 5%石炭酸
C. 95%乙醇
D. 40%甲醛
E. 0.1%苯扎溴铵
42. 缺氧和二氧化碳潴留同时存在者给氧的原则是
A. 加压给氧
B. 高流量、高浓度间断给氧
C. 高流量、高浓度持续给氧
D. 低流量、低浓度持续给氧
E. 低流量、低浓度间断给氧
43. 简易呼吸器的使用方法错误的是
A. 清除口鼻分泌物及异物
B. 病人头后仰，托起下颌
C. 挤压呼吸囊 80~100 次/分
D. 挤压与放松时间比为 1:2
E. 送气量为 500~1000ml/次
44. 尸体护理时对义齿的处理正确的是
A. 取下丢弃
B. 代为死者装上
C. 取下进行消毒
D. 取下交家属保管
E. 取下泡冷水中保存
45. 护士交接班方法描述错误的是
A. 急救物品要查点交班
B. 毒、麻药品要查点交班
C. 按交班本逐项认真交班
D. 对危重抢救的病人必须做到口头、书面交班
E. 当天大手术病人必须做到口头、书面和床边交班
46. 属于临时医嘱的是
A. 二级护理
B. 阿托品 0.5mgimst
C. 青霉素 80 万单位 imq6h
D. 内科护理常规
E. 维生素 B120mg tid
47. 在体温符号外划红圈表示
A. 超高热
B. 物理降温
C. 病人拒测
D. 体温与病情不符
E. 体温与脉搏重叠
48. 女，12岁，短暂性意识障碍，突然发呆，失神，言语中断，停止一切活动，持物落地，但无跌倒。每次发作 20 多秒钟后即恢复，反复发作 5 年。最宜选用的药物是
A. 苯妥英钠
B. 卡马西平

- C. 乙琥胺
D. 苯巴比妥
E. 扑痫酮
49. 对水痘的临床症状描述正确的是
A. 口周苍白圈
B. 疱退留有色素沉着
C. 潜伏期为 1~12 天
D. 水痘为自限性，7 日左右自愈
E. 皮疹分批出现，同一部位可见不同性状皮疹
50. 男，27岁，右下腹持续性疼痛伴呕吐 5 小时，检查右腹股沟区包块，有明显压痛，腹肌紧张，肠鸣音亢进。此时最适宜的处理是
A. 佩戴疝带
B. 紧急手术
C. 试行手法还纳
D. 择期手术治疗
E. 应用抗生素，观察
51. 男，75岁。慢性阻塞性肺病急性发作期，患者痰多黏稠，翻身时突然出现面色发绀，烦躁不安。护士首先应采取的措施是
A. 给患者吸氧
B. 给患者吸痰
C. 协助患者取坐位
D. 指导患者有效咳嗽
E. 湿化气道
52. 男，30岁，腹部受伤后腹痛 1 小时，血压 80/60mmHg，脉率 120 次/分，腹腔穿刺抽出不凝固血液。最佳的处理措施是
A. 应用止血剂
B. 补充血容量
C. 应用抗生素
D. 抗休克同时剖腹探查
E. 输血输液至血压平稳后手术
53. 男，38岁，外伤后右前胸部疼痛，右胸有明显的反常呼吸运动，X 线示右胸第 4~8 肋均为多处骨折，无气胸。应首选的急救措施是
A. 吸氧
B. 镇静、止痛
C. 补充血容量
- D. 手术内固定
E. 局部加压固定
54. 男，15岁，左胸刺伤 1 小时，明显呼吸困难伴发绀，检查左胸壁有一伤口，可闻气体出入声。首要的急救措施是
A. 应用抗生素
B. 补充血容量
C. 胸腔闭式引流
D. 立即剖胸探查
E. 迅速封闭伤口
55. 女，25岁，第一胎足月临产，主诉宫缩强而密，入院后首先应进行
A. 心理护理
B. 测生命体征
C. 清洁灌肠
D. 指导屏气
E. 直肠指检
56. 男，46岁。因“急性脑出血”入院，护士在巡视时发现，患者出现一侧瞳孔散大，呼吸不规则，此时患者有可能出现的并发症是
A. 动眼神经损害
B. 消化道出血
C. 癫痫发作
D. 脑疝
E. 呼吸衰竭
57. 男，45岁。因下肢挤压伤致血清钾升高，出现心动过缓，心律不齐。应选用的药物
A. 利多卡因
B. 5% 碳酸氢钠
C. 毛花甙丙(西地兰)
D. 普萘洛尔(心得安)
E. 10% 葡萄糖酸钙
58. 女，30岁。被车撞伤 20 分钟后被送医院就诊。检查：意识模糊，面色苍白，口鼻出血，衣服上染有呕吐物，左上肢有假关节活动。护士在为病人清理口鼻、给氧、开放静脉通道、测量生命体征后，还必须
A. 做心电图检查
B. 留置尿管

- C. 给止痛剂
D. 给病人保暖
E. 临时左上肢固定
59. 女，18岁，下楼时不慎致踝关节扭伤，2小时后来医院就诊。处理正确的是
A. 局部用热水袋
B. 局部用冰袋
C. 用热水泡脚
D. 局部按摩
E. 冷热敷交替
60. 男，20岁，破伤风患者，抽搐频繁，引起肘关节脱臼，呼吸道分泌物多，有窒息的可能，此时应首先处理的是
A. 气管切开
B. 静脉点滴破伤风抗毒素
C. 脱臼复位
D. 鼻饲流质
E. 输液应用青霉素
61. 浅昏迷和深昏迷的主要区别为
A. 有无自主运动
B. 角膜反射及防御反射是否存在
C. 对声、光刺激的反应
D. 有无大、小便失禁
E. 能否被唤醒
62. 女，43岁，行胆总管切开取石。T形管引流术后12天，体温正常，无黄疸，每天引流量透明黄色胆汁50ml。病人下床活动时不慎将T形管脱出，正确的处理是
A. 做好术前准备
B. 从瘘口插入T形管或设置引流管支持
C. 半卧位，胃肠减压
D. 输液，应用抗生素
E. 观察病情，暂不做处理
63. 初孕妇，26岁，妊娠40周，阵发性腹痛4小时入院待产。检查：有规律宫缩，枕左前位，胎心140次/分，宫口开大2cm，胎膜未破，先露“0”。护理措施不恰当的是
A. 人院沐浴更衣
B. 适当下床活动
- C. 鼓励产妇少量多餐
D. 鼓励产妇2~4小时排尿一次
E. 指导产妇卧床休息，抬高臀部
64. 男，40岁，手指外伤后出现脓性指头炎，提示需进行切开引流的表现是
A. 高热
B. 白细胞增高
C. 局部红肿明显
D. 局部波动感
E. 搏动性疼痛
65. 男，43岁，因右下肢静脉曲张，行静脉剥脱手术，术后护理措施正确的是
A. 卧床2周
B. 抬高右腿30°
C. 右腿完全制动
D. 弹力绷带持续包扎2天
E. 若右腿深静脉血栓形成，则按摩患处
66. 女，49岁，风湿性心脏病二尖瓣狭窄10年，近半个月重体力劳动时出现呼吸困难而入院治疗。今晨患者睡眠中突然憋醒，被迫坐起，伴大汗，咳嗽，咳粉红色泡沫痰，心率118次/分，两肺满布湿啰音及哮鸣音。责任护士给予患者吸氧的正确方法是
A. 鼻导管吸氧1~2L/min
B. 鼻导管吸氧3~4L/min
C. 鼻导管吸氧1~2L/min并经30%乙醇湿化
D. 鼻导管吸氧3~4L/min并经30%乙醇湿化
E. 鼻导管吸氧5~6L/min并经30%乙醇湿化
67. 男，62岁，患风湿性心脏病十余年，近一年来活动后易发生心悸、气短，诊断为“风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心功能Ⅱ级”。责任护士指导患者正确的活动和休息原则是
A. 需严格卧床休息
B. 以卧床休息为主，间断起床活动
C. 以起床活动为主，休息为辅
D. 可起床轻微活动，增加午休时间
E. 可不限制活动，适当休息
68. 女，50岁，因肺癌行右上肺叶切除术。术后24小时内最常见的并发症是

- A. 肺炎
B. 肺不张
C. 出血
D. 支气管炎
E. 支气管—胸膜瘘
69. 女，50岁，尿失禁行导尿管留置，为预防泌尿系统感染首选的护理措施是
A. 定时更换卧位
B. 遵医嘱给抗生素
C. 及时拔出导尿管
D. 增加清洗尿道口
E. 鼓励患者多饮水，行膀胱冲洗
70. 男，78岁，因肺炎住院，据医嘱给予抗生素静脉输入，每分钟输入40滴，该患者每小时输入的液体量为
A. 130ml
B. 140ml
C. 150ml
D. 160ml
E. 170ml
71. 某小儿，5个月，牛乳喂养，家长来院咨询可添加的辅食是
A. 软饭
B. 碎肉
C. 蛋黄
D. 豆制品
E. 带馅食品
72. 患儿，出生后4天，护士喂奶时发现其口腔黏膜的上腭中线和齿龈切缘上有黄白色小斑点，此时应
A. 挑破
B. 手术切除
C. 积极抗炎治疗
D. 外擦制霉菌素
E. 无需处理
73. 患儿8个月，夜间常哭闹、多汗、睡眠不安。查体见方颅、肋骨串珠。下列护理措施中错误的是
A. 多抱患儿到户外晒太阳
- B. 操作轻柔以防骨折
C. 添加含维生素D的食物
D. 指导合理喂养
E. 提倡进行站立锻炼
74. 姜女士有习惯性痛经，护士指导她采用的最佳避孕方法是
A. 安全期避孕法
B. 口服避孕药
C. 输卵管结扎术
D. 避孕套
E. 阴道隔膜
75. 男性，70岁，因无痛性血尿考虑可能为膀胱癌，目前可确诊最可靠的检查方法是
A. 尿脱落细胞学检查
B. 膀胱镜检查+活检
C. 膀胱造影
D. B超检查
E. 直肠指诊
76. 患者，男性，67岁，咳嗽、咳痰2天，吸烟史30年，护士对其健康指导，不恰当的是
A. 多饮水
B. 戒烟
C. 病情好转可进行运动锻炼
D. 改善生活环境
E. 避免寒凉刺激，不宜使用冷水洗脸
77. 某哮喘发作病人，咳嗽、咳黏液痰，表明需要
A. 呼吸锻炼
B. 补充液体
C. 高蛋白饮食
D. 吸氧
E. 加强口腔护理
78. 传染病潜伏期最重要的临床意义是
A. 协助传染病诊断
B. 流行病学调查
C. 确定检疫期限
D. 确定隔离期限
E. 估计病情和预后

79. 张老先生因脑中风右侧肢体瘫痪，为预防压疮发生，最好的护理方法是
A. 给他用气圈
B. 每天让家属看他皮肤是否有破损
C. 每2小时为他翻身按摩一次
D. 鼓励他做肢体功能锻炼
E. 让其保持左侧卧位
80. 张先生，43岁，左前臂Ⅱ度烧伤5天，局部创面湿润、疼痛。可在局部进行的处理是
A. 冷湿敷，促进炎症吸收
B. 湿热敷，水温40%~60%
C. 放置热水袋，水温60℃~70℃
D. 红外线照射，每次20~30分钟
E. 放置冰袋，减轻疼痛
81. 郭某，糖尿病，医嘱皮下注射普通胰岛素8U，ac30分。ac的执行时间是
A. 饭前
B. 早上8:00
C. 晚上8:00
D. 临睡前
E. 必要时
82. 刘某，患十二指肠溃疡，突然呕血，面色苍白，脉搏120次/分，血压60/45mmHg。医嘱输血400ml。给患者输血的目的是补充
A. 血红蛋白
B. 血容量
C. 凝血因子
D. 血小板
E. 抗体
83. 患儿，2岁，呼吸困难，给予氧疗，合适的方法是
A. 氧气枕法
B. 头罩法
C. 鼻塞法
D. 鼻导管法
E. 面罩法
84. 女性，49岁，因胫腓骨干双骨折行跟骨牵引，护理措施正确的是
A. 指导病人自行增减牵引重量
- B. 牵引针孔的血痂应及时清除
C. 牵引钢针可左右滑动
D. 肢体纵轴应与牵引力线平行
E. 每周在针孔处滴75%乙醇1次
85. 患儿，1岁，惊厥持续发作3次入院，控制惊厥的首选药物是
A. 10%水合氯醛
B. 苯巴比妥钠
C. 地西洋
D. 氯丙嗪
E. 苯妥英钠
86. 男性，50岁，因直肠癌行Miles术，护士在护理患者伤口时应注意正确的换药顺序是
A. 会阴部切口、腹部切口、造瘘口
B. 会阴部切口、造瘘口、腹部切口
C. 腹部切口、会阴部切口、造瘘口
D. 腹部切口、造瘘口、会阴部切口
E. 造瘘口、腹部切口、会阴部切口
87. 一女性青年患慢性特发性血小板减少性紫癜，经常出血不止，经泼尼松治疗6个月后症状无好转，最近出血更为严重，应选择下列哪项治疗措施为妥
A. 改用地塞米松治疗
B. 大量血浆置换术
C. 输血小板悬液
D. 应用免疫抑制剂
E. 做脾切除
88. 孕妇李某，妊娠36周，因阴道持续性流液1小时来求诊。肛查时羊水不断从阴道流出，诊断为胎膜早破。应将其安置为
A. 平卧位
B. 截石位
C. 头高足低位
D. 膝胸卧位
E. 头低足高位
89. 患者刘某胸痛、咳嗽，低烧20余天。诊断为肺结核而住进传染病区，应执行
A. 保护性隔离
B. 消化道隔离

- C. 昆虫隔离
D. 接触隔离
E. 呼吸道隔离
90. 产妇张某，分娩时会阴部撕伤，局部红、肿、热、痛，现给予湿热敷，操作时应特别注意
A. 执行无菌操作
B. 每5分钟更换敷布1次
C. 水温调节适度
D. 床单上铺橡胶中单
E. 伤口周围涂凡士林
91. 王某，患2型糖尿病，需长期注射胰岛素，出院时护士对其进行健康指导，下列不恰当的是
A. 进针后不能有回血 医学全在线搜集整理
B. 应在上臂三角肌下缘处注射
C. 行皮下注射，进针角度为30°~60°
D. 注射区皮肤应消毒
E. 不可在发炎、有瘢痕、硬结处注射
92. 杨某，患白血病，今晨间输血10ml后，突然发生呼吸急促、寒战、高热、四肢麻木、腰背酸痛、黄疸，查血压80/50mmHg，心率120次/分。考虑病人可能出现以下哪种输血反应
A. 发热反应
B. 溶血反应
C. 过敏反应
D. 枸橼酸钠中毒
E. 循环负荷过重
93. 李某，患肺心病伴呼吸衰竭。临床表现：呼吸困难，并有精神、神经症状，给氧方法是
A. 加压给氧
B. 乙醇湿化给氧
C. 低流量间断给氧
D. 低流量、低浓度持续给氧
E. 高浓度、高流量持续给氧
- A3/A4型选择题(94~135题)
(94~96题共用题干)
57岁妇女，绝经10年出现阴道不规则流血。
- 妇检：宫颈光滑，阴道黏膜菲薄，宫体稍大，质软，活动良，附件(-)。
94. 初步诊断宫体癌，最支持诊断的依据为
A. 57岁
B. 绝经后阴道不规则流血
C. 宫体大
D. 阴道黏膜菲薄
E. 宫颈光滑
95. 为进一步确诊，需做的检查项目是
A. 双合诊
B. 三合诊
C. 宫颈刮片
D. 分段诊刮
E. 宫颈细胞学检查
96. 经检查确诊为宫体癌Ⅱ期，首选的治疗为
A. 化学疗法
B. 放射疗法
C. 子宫全切术
D. 中药治疗
E. 孕激素治疗
- 【A3/A4型题】**
(97~99题共用题干)
男性，55岁，头痛3个月，多见于清晨，常出现癫痫发作，经检查诊断为颅内占位性病变、颅内压增高，拟行开颅手术。
97. 颅内压正常值为
A. 0.2~0.6kPa
B. 0.7~2.0kPa
C. 2.1~3.0kPa
D. 3.1~3.6kPa
E. 3.7~4.6kPa
98. 颅内压增高的主要表现为
A. 头痛、抽搐、偏瘫
B. 头痛、呕吐、感觉障碍
C. 头痛、恶心、食欲下降
D. 头痛、抽搐、血压增高
E. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿

99. 术前病人出现便秘时，不正确的处理方法是

- A. 使用开塞露
- B. 腹部按摩
- C. 使用缓泻剂
- D. 用肥皂水灌肠
- E. 鼓励病人多食蔬菜水果

(100~101题共用题干)

男性，24岁，在田里劳作时被蛇咬伤，咬伤处压痛、红肿，并向肢体近端蔓延，病人烦躁不安、呼吸困难、语言不清、腱反射消失。

100. 急救处理措施不包括

- A. 温水冲洗伤口
- B. 尖刀在伤口周围多处切开促使毒液排出
- C. 胰蛋白酶近侧做封闭
- D. 抗蛇毒血清应用
- E. 输液

101. 预防并发症的措施不包括

- A. 多饮水
- B. 出现血红蛋白尿时静脉点滴5%碳酸氢钠
- C. 患肢抬高
- D. 加强营养
- E. 输液

(102~104题共用题干)

患者，女性，27岁。因分娩需要，会阴部进行侧切。现切口局部出现红、肿、热、痛，给予红外灯局部照射。

102. 采用红外灯进行局部照射时，照射时间宜控制在

- A. 15分钟以内
- B. 15~20分钟
- C. 20~30分钟
- D. 30~40分钟
- E. 40~50分钟

103. 在照射过程中，发现局部皮肤出现紫红色，应采取的措施是

- A. 局部纱布覆盖

B. 换用低功率灯头

- C. 抬高照射距离
- D. 改用湿热敷
- E. 立即停用，局部涂凡士林

104. 照射完，需嘱患者休息15分钟后再离开治疗室，目的是

- A. 减轻疼痛
- B. 观察疗效
- C. 防止晕倒
- D. 预防感冒
- E. 促进炎症局限

(105~107题共用题干)

李先生，自感全身不适前来就诊。门诊护士巡视时发现他面色苍白，出冷汗，呼吸急促，主诉腹痛剧烈。

105. 门诊护士应采取的措施是

- A. 安排李先生提前就诊
- B. 让医生加快诊治速度
- C. 安慰病人，仔细观察
- D. 为李先生测量脉搏血压
- E. 让李先生就地平卧休息

106. 医生检查后，建议立即将李先生送至急诊室，用轮椅运送病人，错误的做法是

- A. 推轮椅至诊察床旁
- B. 使椅背和床头平齐
- C. 翻起轮椅的脚踏板
- D. 站在轮椅背后固定轮椅
- E. 嘱病人靠后坐，手握扶手

107. 急诊医生处理后，李先生留住急诊观察室。在评估病人时，下述哪项是客观资料

- A. 腹痛难忍
- B. 感到恶心
- C. 睡眠不佳
- D. 心慌不适
- E. 面色苍白

(108~110题共用题干)

女，47岁，发现右侧乳房内无痛性肿块2个月。体检：右侧乳房外上象限可扪及一直径约为

4cm的肿块，表现不甚光滑，边界不清，质地硬；局部乳房皮肤凹陷呈“酒窝征”；同侧腋窝可扪及2个肿大的淋巴结，可被推动。经活组织病理学检查证实为乳癌，拟行乳癌改良根治术。

108. 乳癌根治术后，预防皮下积液的主要措施是

- A. 半卧位
- B. 高蛋白饮食
- C. 患肢制动
- D. 切口用沙袋压迫
- E. 皮瓣下置管引流

109. 若该病人为乳癌根治术后第2天，下列护理措施中不正确的是

- A. 患侧垫枕，抬高患肢
- B. 保持伤口引流管通畅
- C. 观察患侧肢端的血液循环
- D. 指导肩关节的活动
- E. 禁止在患侧手臂测血压、输液

110. 若该病人为乳房癌根治术后第3天，右侧手臂出现皮肤发绀，手指发麻，皮温下降，脉搏不能扪及。正确的处理是

- A. 继续观察，不需特殊处理
- B. 及时调整包扎胸带的松紧度
- C. 立即拆除患处包扎胸带
- D. 给予吸氧
- E. 患处用沙袋加压

(111~113题共用题干)

患者，男性，65岁，因慢性支气管炎、肺部感染、呼吸衰竭入院。护理体检：气促，不能平卧，黏痰呈黄色，不易咳出。测血气分析PaO₂40mmHg，PaCO₂80mmHg。

111. 给其氧疗时氧流量应为

- A. 2L/min
- B. 4L/min
- C. 6L/min
- D. 8L/min
- E. 10L/min

112. 帮助患者排痰，下列哪种措施较好

- A. 加大氧流量

- B. 定时翻身拍背
- C. 鼓励用力咳嗽
- D. 鼻导管吸痰
- E. 体位引流

113. 护士巡视时，发现患者烦躁不安，呼吸频率及心率加快，球结膜充血，应该

- A. 使用镇静剂
- B. 加大氧流量
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 降低氧浓度
- E. 做气管切开准备

(114~116题共用题干)

女性，67岁，肺心病史20年，此次患肺炎，两周来咳嗽、咳痰，今晨呼吸困难加重，烦躁不安，神志恍惚。查体：体温37.4℃，脉搏110次/分，呼吸36次/分，心律不齐，口唇发绀，两肺底闻及细湿啰音（+），血压正常。

114. 病人最可能出现了下述哪个并发症

- A. 呼吸衰竭
- B. 上消化道出血
- C. 急性脑出血
- D. 肾衰竭
- E. 急性心力衰竭

115. 何种卧位可减轻病人的呼吸困难

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 左侧卧位
- D. 半卧位
- E. 头低脚高位

116. 此时对病人的治疗哪项不宜

- A. 静脉滴注氯化钾
- B. 给予镇静剂
- C. 低流量吸氧
- D. 给予呼吸兴奋剂
- E. 使用人工呼吸器

(117~119题共用题干)

患儿，女，8个月，因进食饺子过量发生腹泻，大便6~10次/天，体温37.9℃，精神稍差，前囟平坦，尿量正常，大便镜检见少量脂肪球，血清钠140mmol/L。

117. 该患儿的脱水程度及性质是
A. 轻度等渗脱水 B. 轻度低渗脱水
C. 轻度高渗脱水 D. 中度低渗脱水
E. 中度等渗脱水

118. 患儿最主要的护理问题是
A. 体温过高
B. 腹泻
C. 有多尿的危险
D. 有皮肤完整性受损的危险
E. 营养不足

119. 该患儿首要护理措施是
A. 暂禁食 10 小时
B. 按医嘱给予抗生素口服
C. 按医嘱静脉输液
D. 停母乳改喂豆制品
E. 停止辅食继续母乳喂养

(120~121 题共用题干)
男, 58岁, 设计师, 因心前区压榨样疼痛 4 小时余, 伴冷汗、恐惧, 来院急诊。

120. 有利于评估病情的是
A. 家庭史
B. 饮食习惯
C. 吸烟史
D. 心绞痛病史
E. 职业

121. 护理措施不妥的是
A. 监测血压
B. 监测心电图
C. 拍 X 线胸片
D. 抽血送检
E. 简单护理体检

(122~123 题共用题干)
男, 35岁, 与他人抬举重物时, 不慎将重物滑脱, 碰于左半身, 患者意识清楚, 面色苍白, 左上肢明显肿胀、淤血、压痛、不能自主活动。左下肢活动性出血, 股骨干远 1/3 骨折远端向后移位。X 线示左肱骨、左股骨骨折。

122. 如果你是接诊的医护人员, 现场你会先
A. 立即把病人背到急诊车上
B. 实施现场骨折复位
C. 先抢救生命, 处理休克
D. 先包扎伤口, 必要时用止血带止血
E. 先初步固定, 紧急送往医院

123. 护理中应特别注意观察的并发症是
A. 缺血性骨坏死
B. 神经损伤
C. 骨髓炎
D. 骨筋膜室综合征
E. 休克

(124~125 题共用题干)
女, 27岁, 宫外孕破裂出血而急诊入院, 出现胸闷、气促、出冷汗、脉细速, 血压 9.1/6.7kPa(68.4/50.4mmHg)。

124. 该患者入院后护士首先要做的护理工作是
A. 询问病史, 了解健康问题
B. 测生命体征, 建立静脉通道
C. 准备急救物品, 等待医生到来
D. 备好手术器械, 争分夺秒抢救
E. 填写各种卡片, 做好护理记录

125. 应立即为其安置的体位是
A. 平卧位 B. 俯卧位
C. 侧卧位 D. 中凹卧位
E. 头高足低位

(126~128 题共用题干)
男, 60岁, 有慢性支气管炎病史, 近日来, 咳嗽剧烈, 痰多且黏稠不易咳出, 呼吸困难, 诊断为慢性阻塞性肺气肿。

126. 护士帮助其排痰时措施不妥的是
A. 体位引流
B. 轻叩胸背部
C. 超声雾化吸入
D. 必要时用吸引器吸痰
E. 缓慢滴入生理盐水或化痰药物

127. 若用吸引器吸痰做法错误的是

- A. 插管前先检查导管是否通畅
- B. 调节负压<40kPa
- C. 插吸痰管时先折叠导管末端
- D. 吸痰时上下移动导管，以吸净痰液
- E. 每次吸痰时间不超过 15 秒

128. 若病人病情进一步发展为慢性肺心病，为病人吸氧的原则为

- A. 间歇给氧
- B. 高浓度间歇给氧
- C. 低浓度间歇给氧
- D. 低浓度低流量持续给氧
- E. 高浓度高流量持续给氧

(129~130 题共用题干)

女，45 岁。诊断为血小板减少性紫癜，检查头面部及双下肢有散在淤血点，轻触牙龈可有出血，有一义齿。

129. 给该患者进行口腔护理时应特别注意

- A. 先取下假牙
- B. 夹紧棉球，每次一个
- C. 蘸水不可过湿以防呛咳
- D. 动作要轻，勿损黏膜
- E. 擦净口腔及牙齿各面

130. 对取下的义齿处理方法错误的是

- A. 用冷开水冲洗刷净
- B. 浸于开水中保存
- C. 浸于清水中保存
- D. 不可浸在乙醇中保存
- E. 浸义齿的水应每日更换

(131~132 题共用题干)

男，56 岁。在无明显诱因下，反复出现无痛性血尿 2 个月，以膀胱肿瘤收住入院，拟行膀胱全切肠道代膀胱术。

131. 术前最重要的护理是

- A. 心理护理
- B. 饮食护理
- C. 胃肠减压
- D. 留置导尿管
- E. 肠道准备

132. 术后应特别注意观察

- A. 体温的变化
- B. 外周血象的情况
- C. 引流管的情况
- D. 造瘘口的情况
- E. 尿量的情况、

(133~135 题共用题干)

患者，男性，58 岁，有高血压病史，某日，在与朋友共进晚餐时，饮白酒半斤，回家后突感头痛剧烈，头晕，呕吐，不能站立，左侧肢体活动障碍，行走不稳。

133. 你考虑病人可能患有

- A. 内囊出血
- B. 脑血栓形成
- C. 脑栓塞
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 高血压危象

134. 此时，首先要解决的主要问题是

- A. 纠正缺氧
- B. 止血
- C. 降低血压
- D. 纠正水、电解质平衡
- E. 降低颅内压

135. 若病人频繁呕吐，意识障碍突然加重，呼吸慢而不规则，瞳孔两侧大小不等。在通知医生的同时，应准备给予

- A. 吸氧
- B. 静脉滴注甘露醇
- C. 静脉滴注 5% 葡萄糖液
- D. 置于高枕位
- E. 辅助呼吸

全国护士执业资格考试
精准模拟卷（四）

全国护士执业资格考试精准模拟卷（四）专业实务

1. 骨关节结核最常见的发病部位是
A. 胳膊
B. 股骨
C. 脊柱
D. 膝关节
E. 髋关节
2. 患者，女性，35岁，诊断为系统性红斑狼疮，经住院治疗后症状基本缓解。下列对该患者的健康指导，不正确的是
A. 每日用肥皂水清洗皮损部位
B. 局部用温水湿敷，每日3次
C. 禁用化妆品
D. 外出时戴遮阳帽或撑遮阳伞
E. 远离紫外线，禁止进入紫外线消毒室
3. 鲁先生，64岁。车祸撞伤脑部，出血后出现深昏迷，脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，病人以上表现应属于
A. 脑死亡期
B. 生物学死亡期
C. 濒死期
D. 疾病晚期
E. 临床死亡期
4. 恶性肿瘤的TNM分期法中N表示
A. 预后情况
B. 淋巴结
C. 恶性程度
D. 原发肿瘤
E. 远处转移
5. 患者，男性，69岁，高血压性心脏病10年，近1年来病人明显感觉体力活力活动受限，洗脸、刷牙即可引起呼吸困难、心悸。此病人目前的心功能处于
A. 代偿期
B. I级
C. II级
D. III级
E. IV级
6. 女，26岁，妊娠36周末，常规进行产前检查，宫底高度应在
A. 平剑突
B. 脐上1横指
C. 脐上3横指
D. 脐与剑突之间
E. 剑突下2横指
7. 洗胃的目的不包括
A. 清除胃内刺激物
B. 减轻胃粘膜水肿
C. 用灌洗液中和毒物
D. 手术或检查前准备
E. 排出肠道积气
8. 患者行局部麻醉下肛周脓肿手术，进入手术室时，患者常出现的心理反应是
A. 兴奋
B. 恐惧
C. 烦躁
D. 忧郁
E. 愤怒
9. 壁细胞主要分泌
A. 盐酸、内因子
B. 胃蛋白酶原
C. 胃蛋白酶
D. 胃泌素
E. 双糖酶
10. 护士办理执业注册变更后，其执业许可期限是
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
E. 15年
11. 女，27岁，因尿频、尿急、尿痛来院急诊，有助于诊断的尿液检查是
A. 尿量
B. 尿蛋白

- C. 尿比重
D. 尿液酸碱度
E. 尿镜检细胞数
12. 腹外疝最常见的疝内容物是
A. 小肠
B. 阑尾
C. 盲肠
D. 大网膜
E. 乙状结肠
13. 患者，女性，33岁。既往体健，月经正常。2年前生育1胎。近半年经常转换工作地方，工作十分繁忙，现在“闭经”。闭经最可能的原因为
A. 子宫性
B. 卵巢性
C. 垂体性
D. 下丘脑性
E. 其他因素
14. 痰液呈黄色，静置后分三层常见于
A. 细菌性肺炎
B. 肺结核
C. 慢性支气管炎
D. 支气管扩张症
E. 肺癌
15. 急性肾盂肾炎病人多饮水的主要目的是
A. 加速退热
B. 保持口腔清洁
C. 维持体液平衡
D. 减少药物不良反应
E. 促进细菌、毒素排出
16. 临产后最主要的产力是
A. 子宫收缩力
B. 腹肌收缩力
C. 膈肌收缩力
D. 肛提肌收缩力
E. 骨骼肌收缩力
17. 胰腺癌好发的部位是
A. 胰体、尾部
- B. 胰颈、体部
C. 全胰腺
D. 胰头、颈部
E. 胰尾部
18. 患者，女性，35岁，婚后5年不孕，为其做卵巢功能检查，连续3个月每日清晨测得基础体温成一规则水平线，说明其卵巢
A. 有排卵
B. 无排卵
C. 黄体萎缩不全
D. 卵巢发育不良
E. 黄体功能不全
19. 白血病患者发生感染的最主要原因是
A. 贫血
B. 骨髓抑制
C. 血小板减少
D. 成熟粒细胞缺乏
E. 白细胞过度增生
20. 下列哪种药物中毒禁忌用碳酸氢钠溶液洗胃
A. 敌百虫
B. 敌敌畏
C. 乐果
D. 1605农药
E. 1059农药
21. 男，28岁，8小时前因暴饮暴食后出现上腹部绞痛，向肩背部放射，疑为急性胰腺炎，此时最具诊断意义的实验室检查为
A. 血清淀粉酶测定
B. 尿淀粉酶测定
C. 血钙测定
D. 血清脂肪酶测定
E. 血糖测定
22. 甲状腺功能亢进症的临床特点是
A. 腺体增大
B. 心律失常
C. 心脏杂音
D. 月经紊乱
E. 食欲亢进、消瘦

23. 急性阑尾炎最常见的病因是
A. 阑尾损伤
B. 阑尾畸形
C. 阑尾肿瘤
D. 阑尾管腔阻塞
E. 胃肠功能紊乱
24. 患者，男，58岁，因肝癌晚期入院。患者出现烦躁不安、躁动，为保证患者安全，最重要的护理措施是
A. 用牙垫放于上下臼齿之间
B. 加床档，用约束带保护患者
C. 室内光线宜暗
D. 护理动作要轻
E. 减少外界的刺激
25. 慢性肾功能衰竭晚期常出现的危急情况是
A. 头痛、呕吐
B. 贫血、出血
C. 呼吸困难
D. 少尿、高血钾
E. 高血压或低血压
26. 某风湿性心脏病病人，卧床4个月余，每天需做下肢被动活动和按摩，其目的是
A. 促进末梢循环，减少回心血量
B. 防止肢体肌肉萎缩
C. 防止下肢静脉血栓形成
D. 防止足部发生压疮
E. 使病人舒适，促进睡眠
27. 女，29岁，妊娠应用硫酸镁治疗，出现膝反射消失，呼吸浅而慢，每分钟10次，此患者除立即停药外应给予的药物是
A. 5%葡萄糖静脉滴注
B. 肌注山莨菪碱
C. 静注50%葡萄糖
D. 静注10%葡萄糖酸钙
E. 静注低分子右旋糖酐
28. 患者，男性，61岁，慢性咳嗽、咳痰10年，近两年来劳动时出现气短，近日感冒后病情加重，咳脓痰且不易咳出，查体：体温36.5℃，神志清，桶状胸，双肺叩诊过清音，呼吸音低，以慢性支气管炎合并慢性阻塞性肺气肿入院治疗，病人应给予的氧疗方式为
A. 间歇给氧
B. 酒精湿化给氧
C. 低浓度持续给氧
D. 高压给氧
E. 高浓度持续给氧
29. 女，25岁，产后第3天，出现寒战、高热、腰痛，尿白细胞30个/HP，尿蛋白(+)，并尿痛、肾区叩击痛，耻骨上压痛(+)，血象白细胞 $18 \times 10^9/L$ 。首先应考虑产后并发
A. 产褥热
B. 败血症
C. 上呼吸道感染
D. 急性肾盂肾炎
E. 急性膀胱炎
30. 小儿肠套叠粪便特点是
A. 鲜血便
B. 脓血便
C. 黏液脓血便
D. 血粪混合便
E. 果酱样黏液血便
31. 患者，男性，15岁，反复发作呼气性呼吸困难3年，考虑其呼吸困难的原因可能是
A. 支气管异物
B. 大支气管肿瘤
C. 大片肺组织实变
D. 大量胸腔积液
E. 小支气管痉挛
32. 洋地黄中毒最常见的心律失常是
A. 室性期前收缩二联律
B. 窦性心动过缓
C. 室性心动过速
D. 室上性心动过速
E. 房室传导阻滞
33. 患儿，6个月。冬季出生，人工喂养，睡眠不安、多汗。近日户外活动增多，突然出现惊厥，约10余秒，抽搐停止后，精神、食欲无异常。可能的诊断是

- A. 癫痫
B. 低血糖
C. 高热惊厥
D. 营养不良
E. 手足搐搦症
34. 初孕妇，孕 34 周，产前检查时发现子宫底部触到圆而硬的胎头，胎背位于母体腹部右前方。胎心音于脐上右侧听到，该孕妇胎方位是
A. 枕左前
B. 枕右前
C. 额左前
D. 额右前
E. 额左后
35. 男性，40 岁。多年吸烟，脉管炎已有 1 年余，现已发展成疼痛严重不能入睡。检查：局部苍白干冷，肌肉萎缩，足背动脉搏动消失，初步诊断
A. 血栓闭塞性脉管炎局部缺血期
B. 血栓闭塞性脉管炎营养障碍期
C. 血栓闭塞性脉管炎坏疽期
D. 深部静脉血栓形成
E. 大动脉栓塞
36. 护士在日常工作中使用口罩时，正确的是
A. 口罩用后应取下，将污染面向外对折
B. 一次性口罩使用时间不超过 8 小时
C. 纱布口罩应每 24 小时更换一次
D. 每次接触严密隔离的传染病患者后应立即更换
E. 不戴口罩的时候可以将口罩的污染面向内挂在胸前
37. 能分泌促胃液素的细胞是
A. A 细胞
B. B 细胞
C. D 细胞
D. G 细胞
E. K 细胞
38. 男，42 岁，因“急性梗阻性化脓性胆管炎”急诊入院。寒战，体温骤升至 41℃，脉搏 112 次/分，血压 85/65mmHg，其休克类型为
A. 感染性休克
B. 低血容量性休克
C. 心源性休克
D. 神经源性休克
E. 过敏性休克
39. 随时有猝死危险的心律失常是
A. 室性阵发性心动过速
B. 室上性阵发性心动过速
C. I 度房室传导阻滞
D. II 度房室传导阻滞
E. 室性期前收缩呈二联律
40. 能引起急性胰腺炎的药物是
A. 青霉素
B. 肾上腺素
C. 葡萄糖酸钙
D. 去甲肾上腺素
E. 糖皮质激素
41. 有关齿状线的特点，正确的是
A. 齿状线以上组织为皮肤所覆盖
B. 齿状线以上静脉回流至门静脉
C. 齿状线以上淋巴回流至腹股沟
D. 齿状线以下为自主神经支配
E. 齿状线以下由直肠上、下动脉供血
42. 采用肌内注射的疫苗是
A. 卡介苗
B. 乙肝疫苗
C. 风疹疫苗
D. 麻疹减毒活疫苗
E. 脊髓灰质炎减毒活疫苗
43. 患者，男，52 岁，确诊为肝性脑病，现给予乳果糖口服，目的是为了
A. 导泻
B. 酸化肠道
C. 消除诱因
D. 补充能量
E. 保护肝脏
44. 男，18 岁，从 3m 高处跌下，骑跨于木杆上，经检查会阴和下腹壁有青紫肿胀，排尿困难

难，尿道口滴血，应考虑为

- A. 会阴部挫伤
- B. 下腹部挫伤
- C. 前尿道损伤
- D. 后尿道损伤
- E. 膀胱损伤

45. 小儿支气管肺炎最主要的病理生理改变是

- A. 低氧血症
- B. 高碳酸血症
- C. 细菌毒血症
- D. 酸中毒
- E. 电解质紊乱

46. 患者，男性，68岁，因近日咳嗽、咳痰、气急明显，又出现神志不清、发绀而入院。既往有肺气肿病史。动脉血气分析 pH7.31， $\text{PaO}_2 52 \text{ mmHg}$, $\text{PaCO}_2 61 \text{ mmHg}$ ，给予低浓度氧疗的依据是

- A. 便于应用呼吸兴奋剂
- B. 慢性呼吸衰竭时，呼吸中枢对 CO_2 的刺激仍很敏感
- C. 缺 O_2 是维持病人呼吸的重要刺激因子
- D. 氧浓度大于 30% 易引起氧中毒
- E. 高浓度氧疗容易使病人呼吸兴奋

47. 肺炎球菌性肺炎典型的痰液是

- A. 白色黏痰
- B. 大量脓臭痰
- C. 白色泡沫痰
- D. 铁锈色痰
- E. 黄绿色痰

48. 成人男性血红蛋白正常参考值范围为

- A. 100~140 g/L
- B. 140~170 g/L
- C. 110~150 g/L
- D. 170~200 g/L
- E. 120~160 g/L

49. 诊断贫血及贫血程度最重要的指标是

- A. 红细胞数
- B. 血红蛋白计数
- C. 血沉

D. 网织红细胞

E. 白细胞计数

50. 2岁，患儿，“急性支气管炎”3天，咳嗽、咳痰加重，评估见患儿痰液黏稠，不易咳出，喉部有痰鸣音。清理患儿呼吸道首先应选用

- A. 鼓励患儿咳嗽排痰
- B. 少量多次饮水
- C. 体位引流
- D. 超声雾化吸入
- E. 负压吸痰

51. 属于甲类传染病的是

- A. 传染性非典型性肺炎
- B. 甲型 H1N1 流感
- C. 艾滋病
- D. 鼠疫
- E. 炭疽

52. 急性白血病患者化疗缓解期突然出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直等症状，该患者可能发生的是

- A. 颅内出血
- B. 败血症
- C. 中枢神经系统白血病
- D. 上消化道出血
- E. 脑栓塞

53. 2岁，男孩，进食时哭闹不止，突然出现剧烈呛咳、喉鸣、呼吸困难。该患儿可能是

- A. 高热惊厥
- B. 急性脑炎
- C. 气管异物
- D. 肺炎
- E. 支气管炎

54. 特发性血小板减少性紫癜患者体内产生血小板特异性 IgG 的部位主要是

- A. 脾
- B. 肠
- C. 肾
- D. 骨髓
- E. 胸腺

55.肾盂肾炎患者一般不出现

- A. 尿路刺激症状
- B. 腰酸、腰痛
- C. 全身感染症状
- D. 肾区叩击痛
- E. 发病前 2 周常有链球菌感染史

56.清洁中段尿培养，确诊尿道感染的标准是

- A. 菌落数 $\geq 10^2/ml$
- B. 菌落数 $\geq 10^3/ml$
- C. 菌落数 $\geq 10^4/ml$
- D. 菌落数 $\geq 10^5/ml$
- E. 菌落数 $\geq 10^6/ml$

57.患儿，2岁，惊厥反复发作入院，以下处理哪项错误

- A. 将纱布放在患儿的手中
- B. 床边设置防护栏
- C. 移开床上一切硬物
- D. 用约束带捆绑四肢
- E. 压舌板裹纱布置上下磨牙之间

58.不属于医院基本饮食的是

- A. 普通饮食
- B. 软质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 流质饮食
- E. 治疗饮食

59.患者，女性，27岁，近日晨起呕吐，月经停止，疑为妊娠前期，为确诊需采集尿标本。留取标本时间宜为

- A. 饭后 2 小时
- B. 晨起
- C. 饭前
- D. 即刻
- E. 睡前

60.临终患者通常最早出现的心理反应期是

- A. 否认期
- B. 协议期
- C. 愤怒期
- D. 接受期
- E. 忧郁期

61.女，60岁，慢性咳嗽、咳痰 10 年，近 2 日来出现活动后感心悸、呼吸困难。查体：颈静脉怒张，肝大有压痛，下肢水肿，呼吸 21 次/分，心率 120 次/分，应首先考虑

- A. 风湿性心脏病
- B. 贫血性心脏病
- C. 高血压性心脏病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 冠状动脉硬化性心脏病

62.患者，男性，48岁，确诊为支气管肺癌后，表现为沉默、食欲缺乏、夜间入睡困难、易怒。护理工作中最应重视的问题是

- A. 继续加强与患者的沟通交流
- B. 鼓励患者自我表达，宣泄情绪
- C. 可利用治疗效果好的患者现身说法，正面宣教
- D. 防自杀、防伤人、防出走
- E. 家属加强支持与安慰

63.极化液用于心肌梗死的主要目的是

- A. 增加心肌营养
- B. 改善心肌缺血
- C. 减少心律失常的发生
- D. 增加心肌收缩力
- E. 增加心肌兴奋性

64.男，38岁，十二指肠溃疡患者，突然呕血，面色苍白，心率 120 次/分，血压 60/45mmHg。医嘱输血 400ml。输血的主要目的是补充

- A. 凝血因子
- B. 血红蛋白
- C. 血小板
- D. 血容量
- E. 抗体

65.急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的梗阻因素是

- A. 胆道肿瘤
- B. 胆管结石
- C. 胆道蛔虫
- D. 胆管扭转
- E. 胆管狭窄

- 66.**在尿毒症患者的心血管并发症中，最常见的死亡原因是
A. 高血压
B. 心包炎
C. 心肌病
D. 心律失常
E. 心力衰竭
- 67.**男性，50岁，鼻咽癌，进行放疗。护士询问病人“你对放疗有什么想法？”这一问题属于
A. 客观问题
B. 间接问题
C. 开放式问题
D. 闭合性问题
E. 非指导型问题
- 68.**某患者因误服农药来急诊就诊，评估病人意识清楚，有合作能力，护士应采用的清除毒物方法是
A. 口服催吐法
B. 注射器洗胃
C. 漏斗胃管洗胃
D. 自动洗胃机洗胃
E. 电动吸引器洗胃
- 69.**尿毒症患者，自诉极度疲乏、胸闷、心慌、尿少，体检心律不齐，期前收缩8~10次/分，测血钾8.8mmol/L。若不紧急处理，会突然发生
A. 心脏停搏
B. 休克
C. 昏迷
D. 肾衰竭
E. 呼吸衰竭
- 70.**肝性脑病最具有特征性的体征是
A. 眼反射亢进
B. 肌张力增加
C. 扑翼样震颤
D. 踝阵挛
E. 巴宾斯基征阳性
- 71.**以下哪种药物抑制胃酸分泌最弱
A. 奥美拉唑
B. 法莫替丁
C. 兰索拉唑
D. 雷尼替丁
E. 硫糖铝
- 72.**诊断抑郁症的首要症状是
A. 精力明显减退、疲乏
B. 思维困难、联想缓慢
C. 情绪低落、兴趣下降
D. 自卑、自责、自杀观念
E. 失眠、早醒、体重减轻
- 73.**男性，60岁。行肺段切除术后2小时，病人自觉胸闷，呼吸急促，测血压、脉搏均正常，见水封瓶内有少量淡红色液体，水封瓶长玻璃管内的水柱不波动。考虑为
A. 呼吸中枢抑制
B. 肺水肿
C. 肺气肿
D. 引流管阻塞
E. 肺已复张
- 74.**女性，40岁。心悸气促已数年，近来症状加重，并伴双下肢浮肿，是风心病合并
A. 风湿活动
B. 肺部感染
C. 上呼吸道感染
D. 周围循环衰竭
E. 右心心力衰竭
- 75.**3岁小儿，体检有鸡胸及轻度“X”形腿，血钙及血磷正常，应诊断为
A. 营养不良
B. 佝偻病初期
C. 佝偻病激期
D. 佝偻病恢复期
E. 佝偻病后遗症期
- 76.**外源性哮喘发病时血清内显著升高的免疫球蛋白是
A. IgA
B. IgM
C. IgE
D. IgG

E. IgD

77. 尿毒症酸中毒病人，低钙抽搐易发生于

- A. 酸中毒加重时
- B. 厌食、剧烈呕吐时
- C. 大量利尿时
- D. 输葡萄糖液过程中
- E. 静脉注射碱性药物过程中

78. 患者，女性，23岁，近一个月一直觉得周围的任何东西都对她有特殊的暗示，例如她看见汽车牌照中含有4的汽车开过，就认为是让她死。此患者的症状属于

- A. 幻想
- B. 迷信
- C. 钟情妄想
- D. 关系妄想
- E. 特殊意义妄想

79. 患者，男性，65岁，左侧腹痛、腹泻半年，间断出现脓血便，经结肠镜检查确诊为溃疡性结肠炎。该患者的病变多位于

- A. 全结肠
- B. 回盲部
- C. 回肠下段及升结肠
- D. 横结肠
- E. 直肠及乙状结肠

80. 男，39岁。交通事故致复合创伤后1小时入院。病人呼吸由浅慢逐渐加深加快、又由深快逐渐变为浅慢，继之暂停30秒后再度出现上述状态的呼吸。该病人的呼吸是

- A. 潮式呼吸
- B. 毕奥呼吸
- C. 间断呼吸
- D. 鲜声呼吸
- E. 呼吸困难

81. 原发性支气管肺癌晚期病人最突出的症状是

- A. 咳嗽、咯血
- B. 咳嗽、胸痛
- C. 胸痛、呼吸困难
- D. 咯血、呼吸困难
- E. 咳嗽、呼吸困难

82. 关于瘫痪程度正确的是

- A. 1级完全瘫痪
- B. 2级可见肌肉收缩，但无肢体运动
- C. 3级肢体可在床面移动，但不能抬起
- D. 3级肢体可以抬起，但不能对抗阻力
- E. 4级完全瘫痪

83. 患者，男性，60岁。慢性支气管炎10年，慢性阻塞性肺气肿4年，3天来咳嗽、气促加重，皮肤潮红，多汗，球结膜水肿，根据病情应给予

- A. 高流量持续给氧
- B. 高流量间歇给氧
- C. 低流量持续给氧
- D. 低流量间歇给氧
- E. 面罩加压给氧

84. 早产儿，生后3天，反应差，喂养困难，哭声异常，肌张力低，经补充葡萄糖后上述症状消失。该患儿最可能的诊断是

- A. 新生儿窒息
- B. 新生儿缺氧缺血性脑病
- C. 新生儿颅内出血
- D. 新生儿低血糖
- E. 新生儿寒冷损伤综合征

85. 患者，因急性心肌梗死入院，医嘱要求查肌酸磷酸激酶(CPK)，适宜的取血时间是

- A. 饭前
- B. 即刻
- C. 饭后半小时
- D. 服药后2小时
- E. 明日晨起空腹时

86. 某肝癌患者病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，寄希望于治疗，病情进展和疼痛发作时，多次要求医生给予明确说法和治疗措施。此时，医生最佳的伦理选择应该是

- A. 正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
- B. 恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病死
- C. 遵循病人自主原则，全面满足病人要求

- D. 依据知情同意权，应该告知病人所有信息
E. 依据有利原则，劝导病人使用一些民间土方

87. 患儿，2岁。自1岁时出现活动后气促、乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左缘2~4肋间闻及III级收缩期杂音，可见杵状指。首先考虑

- A. 右心室肥厚
B. 动脉导管未闭
C. 法洛四联症
D. 室间隔缺损
E. 房间隔缺损

88. 与白血病发病无关的是

- A. 药物化学因素
B. 病毒因素
C. 物理因素
D. 免疫功能亢进
E. 遗传因素

89. 颅内出血的新生儿易采用的体位是

- A. 去枕平卧位
B. 头高侧卧位
C. 俯卧位
D. 头低卧位
E. 双凹卧位

90. 系统性红斑狼疮的诱因不包括

- A. 性激素
B. 药物因素
C. 阳光照射
D. 感染病毒
E. 高蛋白饮食

91. 患者，男性，73岁，慢性支气管炎，有长期吸烟史，1周前因感冒导致急性加重，护士对其进行健康指导，正确的是

- A. 尽量减少活动，防止劳累
B. 制定戒烟目标和计划
C. 预防性服用抗生素
D. 尽量控制咳嗽
E. 控制液体人量

92. 女性，22岁，未婚，宫外孕10周入院。护

士在收集资料时可促进有效沟通的措施是

- A. 在大病房内进行提问，不必回避任何人
B. 告诉病人自己对婚前性行为的看法
C. 当病人谈话离题时立即打断病人
D. 选择在没有其他人员的房间内进行交流
E. 采用亲密距离进行交流

93. 小儿惊厥中最常见的是

- A. 原发性癫痫
B. 婴儿痉挛综合征
C. 中毒性脑病
D. 高热惊厥
E. 脑水肿

94. 患者，男性，25岁。因结核性胸膜炎入院，患者诉下午有低热，夜间有盗汗，咳嗽后左侧胸痛明显加重，听诊可闻及胸膜摩擦音。根据以上情况，可提示病变累及

- A. 胸壁层胸膜
B. 肺层胸膜
C. 膈肌
D. 胃
E. 肝脏

95. 风湿性心内膜炎最好发于

- A. 心内膜
B. 二尖瓣
C. 三尖瓣
D. 肺动脉瓣
E. 主动脉瓣

96. 男，36岁，发热1周，体温高达40.2℃，最低39.4℃，可能的热型是

- A. 弛张热
B. 稽留热
C. 间歇热
D. 回归热
E. 不规则热

97. 心源性水肿常先发生于

- A. 眼睑
B. 颈部
C. 上胸部
D. 背骶部

E. 踝部

98. 皮质醇增多症的特征性表现为

- A. 脊柱变形
- B. 体重减轻
- C. 皮肤紫纹
- D. 向心性肥胖
- E. 皮肤黏膜色素沉着

99. 可判定类风湿关节炎病人处于活动期的主要表现是

- A. 关节疼痛
- B. 关节畸形
- C. 关节肿胀
- D. 类风湿结节
- E. 关节功能障碍

100. 鼓励下肢静脉曲张手术后的患者早期活动，其主要目的是预防

- A. 肺部并发症
- B. 皮肤压疮
- C. 泌尿系统感染
- D. 下肢肌肉萎缩
- E. 深静脉血栓形成

101. 腹部实质性脏器损伤破裂的主要表现是

- A. 感染性休克
- B. 急性腹膜炎
- C. 急性肠梗阻
- D. 膈下游离气体
- E. 低血容量性休克

102. 患者，男，35岁。右外踝软组织损伤半天，局部青紫、肿胀。目前应采取的措施是

- A. 热湿敷
- B. 冰袋冷敷
- C. 红外线灯照射
- D. 局部按摩
- E. 早期功能锻炼

103. 患者，40岁，突然剧烈头痛伴呕吐，立即昏迷，脑脊液为血性，首先考虑

- A. 脑血栓形成
- B. 脑出血
- C. 脑膜炎
- D. 腔隙性脑梗死
- E. 蛛网膜下腔出血

104. 一健康小儿体重14kg，身长96cm。其年龄约为

- A. 2岁
- B. 3岁
- C. 4岁
- D. 5岁
- E. 6岁

105. 患者，男，27岁，因上腹部不适、食欲减退等就诊，诊断为慢性胃炎，护士在对其进行宣教时，应告知其与慢性胃炎发病相关的细菌是

- A. 大肠杆菌(埃希)菌
- B. 沙门菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 空肠弯曲菌
- E. 嗜盐杆菌

106. 男，20岁，发热1天，伴有腰背酸痛入院，检查体温38.6℃，心率100次/分，巩膜呈浅柠檬色，皮肤苍白，血红蛋白90g/L，血清总胆红素70μmol/L，尿色如茶水，最可能的诊断是

- A. 急性溶血性黄疸
- B. 肝细胞性黄疸
- C. 肝内胆管阻塞性黄疸
- D. 肝外胆管阻塞性黄疸
- E. 先天性非溶血性黄疸

107. 患者，男性，69岁。高血压病史6年，糖尿病史2年，血压曾为170/105mmHg，吸烟，不饮酒。根据以上情况，该患者的预后判断是

- A. 高血压，多极低危组
- B. 高血压，低危组
- C. 高血压，中危组
- D. 高血压，高危组
- E. 高血压，很高危组

108. 尿液呈酱油色见于

- A. 阻塞性黄疸
- B. 急性溶血
- C. 肝细胞性黄疸
- D. 肾脏肿瘤
- E. 晚期丝虫病

109. 足月儿生理性黄疸的特点是

- A. 生后24小时内出现
- B. 血清胆红素浓度大于221μmol/L
- C. 2周内消退
- D. 胆红素每日上升达85μmol/L
- E. 血清结合胆红素浓度大于34μmol/L

110. 患者，男性，70岁，心肺复苏过程中，医

嘱给予肾上腺素静脉注射，其目的是

- A. 增加冠状动脉血流量
- B. 纠正心律失常
- C. 降低应激反应
- D. 改善通气量
- E. 纠正酸碱失衡

111.二尖瓣狭窄患者伴房颤时，左心房血栓脱落最常栓塞于

- A. 脑
- B. 主动脉
- C. 肝
- D. 肾
- E. 肺

112.患者，男，25岁。患肺炎入院治疗。患者进入病区后，护士的初步护理工作不包括

- A. 迎接新病人
- B. 通知病区医生
- C. 测量生命体征
- D. 准备急救物品
- E. 建立病人住院病历

113.支气管扩张症的主要症状是

- A. 反复咳嗽
- B. 大量脓痰
- C. 肌肉酸痛
- D. 反复咯血
- E. 营养不良

114.区分内痔与外痔的解剖结构

- A. 肛窦
- B. 齿状线
- C. 肛柱上端
- D. 肛管内括约肌
- E. 肛管外括约肌

115.组成护理程序框架的理论是

- A. 人的基本需要论
- B. 一般系统论
- C. 方法论
- D. 信息交流论
- E. 解决问题论

116.男，31岁。消化性溃疡病史8年，近1周来出现腹痛、腹胀逐渐加重，频繁呕吐，呕吐物有宿食。首先应考虑的是

- A. 溃疡活动期
- B. 溃疡合并出血
- C. 溃疡合并穿孔

- D. 溃疡合并癌变
- E. 溃疡合并幽门梗阻

117.引起小儿腹泻最常见的病原微生物是

- A. 葡萄球菌
- B. 侵袭性大肠埃希菌
- C. 轮状病毒
- D. 白色念珠菌
- E. 埃可病毒

118.对诊断心肌梗死特异性最高的酶是

- A. CK
- B. AST
- C. CK-MB
- D. LDH
- E. 肌红蛋白

119.引起老年心力衰竭患者症状加重的最常见的诱因是

- A. 过度劳累
- B. 心肌缺血
- C. 呼吸道感染
- D. 摄入液体过多
- E. 室性期前收缩

120.41岁患者，女性，75岁。高浓度吸氧2天，提示患者可能出现氧中毒的表现是

- A. 干咳、胸痛
- B. 轻度发绀
- C. 显著发绀
- D. 三凹征明显
- E. 动脉血二氧化碳分压大于12.0kPa

【A3/A4型题】

(121-122题共用题干)

患者，女性，56岁，主因消瘦、腹胀、纳差入院，病前曾有慢性肝病史，查体：皮肤、巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音阳性，脾肋下可触及。

121.该患者首先考虑的诊断是

- A. 原发性肝癌
- B. 肝硬化伴腹水
- C. 活动性肝病
- D. 肝脓肿
- E. 多囊肝

122.急诊胃镜显示：食管静脉曲张破裂出血，护士应估计患者最有可能出现

- A. 心力衰竭

- B.急性肾衰竭
- C.肝性脑病
- D.感染
- E.失血性休克

(123-124题共用题干)

患者，男，45岁，肝硬化病史7年，午饭后突然呕吐褐色胃内容物。量约500ml，来院急诊。

123.出血部位最可能在

- A.试管中上段
- B.食管下段及胃底
- C.直肠
- D.胃体
- E.十二指肠

124.最易出现的并发症是

- A.癌变
- B.肝肾综合征
- C.肝性脑病
- D.窒息
- E.感染

(125-127题共用题干)

赵先生，50岁，因肝硬化食管静脉曲张，腹水入院治疗，放腹水后出现精神错乱、幻觉，伴有扑翼样震颤、脑电图异常等肝性脑病症状。

125.此时病人可能处于肝性脑病的

- A.前驱期
- B.昏迷期
- C.昏睡期
- D.浅昏迷期
- E.深昏迷期

126.目前给病人安排哪种饮食为宜

- A.给予低蛋白饮食
- B.保证总热量和糖类摄入、

- C.补充大量维生素A
- D.给予富含粗纤维饮食
- E.限制含钠食物的摄入

127.给肝性脑病病人灌肠时应避免

- A.生理盐水
- B.小苏打
- C.液状石蜡
- D.弱酸溶液
- E.新霉素液

(128-130题共用题干)

李先生，因十二指肠溃疡并发瘢痕性幽门梗阻，反复呕吐宿食，消瘦，皮肤干燥，弹性消失，入院后经充分术前准备，在硬膜外麻醉下行胃大部切除术。

128.该病人入院时的护理诊断是

- A.心输出量减少
- B.体液不足
- C.组织灌注量改变
- D.活动无耐力
- E.知识缺乏

129.术前护理钟属于特殊准备的是

- A.心理护理
- B.皮肤护理
- C.每晚洗胃
- D.备血、皮试
- E.术前用药

130.术后若发生肠胃吻合口出血，最早出现的临床表现是

- A.脉搏细速、血压下降
- B.烦躁不安、面色苍白
- C.尿量减少、四肢湿冷
- D.头晕、心悸、出冷汗
- E.胃管内吸出大量血液

全国护士执业资格考试精准模拟卷（四）实践能力

[A1/A2型题]

1. 病室湿度过高时，病人会感到

- A. 头晕、疲倦、食欲减退
- B. 闷热、难受
- C. 呼吸道黏膜干燥、咽痛
- D. 机体散热不畅、皮肤干燥
- E. 消化不良、腹胀便秘

2. 病区白天理想的声音强度是

- A. 15dB~20dB
- B. 25dB~30dB
- C. 35dB~40dB
- D. 45dB~50dB
- E. 50dB~60dB

3. 慢性左心功能不全最出现的症状是

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 心源性哮喘
- C. 水肿
- D. 咳粉红色泡沫样痰
- E. 食欲降低

4. 确诊葡萄胎最重要的辅助检查

- A. 血/尿 HCG 测定
- B. B 超检查
- C. 多普勒胎心听诊检查
- D. 腹部 CT 检查
- E. 腹部 X 线检查

5. 预防化脓性脑膜炎的健康教育强调

- A. 限制饮水量
- B. 预防细菌引起的上呼吸道感染
- C. 预防性使用抗生素
- D. 监测基础体温
- E. 限制病人户外活动

6. 氧气雾化吸入时，正确的是

- A. 病人呼气时用手指堵住出气管
- B. 药液应稀释在 10ml 以内
- C. 湿化瓶内加冷开水 1/2 瓶
- D. 氧流量调节至 6~8L/min
- E. 嘱病人吸气时松开出气口

7. 我国缩窄性心包炎最常见的病因是

- A. 创伤
- B. 肿瘤
- C. 结核菌感染
- D. 化脓性细菌感染
- E. 非特异性感染

8. 主动脉瓣狭窄患者的突出临床表现是

- A. 胸痛伴眩晕
- B. 乏力、下肢水肿
- C. 呼吸困难、心绞痛和晕厥
- D. 乏力、水肿、黑蒙
- E. 咳血伴声音嘶哑

9. 胎动减少是指胎动 12 小时少

- A. 5 次
- B. 10 次
- C. 15 次
- D. 20 次
- E. 25 次

10. 林某，大量呕血，送入急诊室，在医生未到之前，值班护士首先应

- A. 注射镇痛剂
- B. 止血，测血压，配血、建立静脉通道
- C. 给氧
- D. 通知病房，准备床位
- E. 详细询问呕血的发生过程

11. 某急性发作重度的支气管哮喘患者，其首选药物是

- A. 氨茶碱
- B. 地塞米松
- C. 沙丁胺醇
- D. 色甘酸钠
- E. 异丙托溴铵

12. 重症哮喘患者可出现

- A. 奇脉
- B. 洪脉
- C. 水冲脉

- D.不规则脉
E.脉搏短绌
- 13.长期鼻饲饮食的病人应定期更换胃管,乳胶胃管更换的时间是
A.每天一次
B.每周一次
C.每月一次
D.每两个月一次
E.每半年一次
- 14.无菌包被无菌等渗盐水浸湿应
A.立即使用完
B.4小时用完
C.24小时用完
D.烘干后使用
E.重新灭菌
- 15.为全身麻醉做下肢手术的病人准备床单,下述哪项正确
A.将床上脏的被单无须更换
B.床头、床尾各铺一橡胶中单和中单
C.盖被三折于一侧床边,开口背门
D.枕头平放于床头,开口背门
E.椅子置于接受病人一侧的床尾
- 16.一级医院指的是
A.农村乡、镇卫生院和城市街道医院
B.诊治专科疾病而设置的医院
C.全国、省、市直属的市级大医院
D.医学院的附属医院
E.一般市、县医院及省辖市的区级医院
- 17.发生压疮的最主要原因是
A.局部组织受压过久
B.病原微生物侵入皮肤
C.机体营养不良
D.用夹板时衬垫不平
E.皮肤受潮湿、摩擦刺激
- 18.应执行接触隔离的疾病是
A.中毒性菌痢
B.暴发性肝炎
C.百日咳
- D.流行性乙型脑炎
E.破伤风
- 19.测量脉搏的首选部位是
A.颞动脉
B.桡动脉
C.肱动脉
D.足背动脉
E.颈动脉
- 20.呼吸增快常见于
A.高热
B.颅内疾病
C.安眠药中毒
D.呼吸中枢衰竭
E.老年人
- 21.可使血压值下降的因素是
A.睡眠不佳
B.营养不良
C.高热环境
D.兴奋
E.精神紧张
- 22.“您回到家要注意休息,按时服药并在规定的时间来复查,您慢走”,属于
A.招呼用语
B.介绍用语
C.电话用语
D.安慰用语
E.迎送用语
- 23.中毒后忌用脂肪类食物的毒物种类是
A.酸性物
B.碱性物
C.敌百虫
D.氰化物
E.灭鼠药
- 24.插入鼻饲管至会厌部时,托起病人头部,使其下颌靠近胸骨柄的目的是
A.使鼻道通畅
B.避免咽后壁刺激
C.加大咽喉部通道的弧度

- D.使喉肌放松便于鼻饲管通过
E.使食管第一狭窄消失

- 25.禁忌热水坐浴的情况是
A.肛门部充血
B.外阴部炎症
C.痔疮手术后
D.肛门周围感染
E.妊娠后期痔疮疼痛

- 26.艾瑞克森认为个体解决自我认同与角色紊乱危机的主要时期是
A.潜在期
B.青春期
C.成人早期
D.成人期
E.老年期

- 27.多尿指昼夜尿量至少超过
A. 2000ml
B. 2300ml
C. 2500ml
D. 2800ml
E. 3000ml

- 28.患者需吸人的氧气浓度为 45%，氧流量应调节为
A. 4L
B. 5L
C. 6L
D. 7L
E. 8L

- 29.小量不保留灌肠的目的不包括
A.解除便秘
B.软化粪便
C.排出肠腔积气
D.减轻腹胀
E.治疗肠道感染

- 30.对尿失禁病人的护理，错误的是
A.指导病人行盆底肌肉锻炼
B.可采用接尿器或尿壶接尿
C.对长期尿失禁病人可给予留置导尿管
D.注意皮肤护理

- E.嘱病人少饮水，以减少尿量

- 31.患者女，60岁。慢性咳嗽、咳痰30年，下肢水肿1年。近半个月咳嗽加重，痰量增多，为黄色脓痰。呼吸困难，腹胀明显，食欲下降。诊断为慢性肺源性心脏病，呼吸衰竭。对患者进行的健康教育，不妥的内容是
A.鼓励患者进行耐寒锻炼，如坚持冷水洗脸
B.避免吸入刺激性气体
C.尽量少去人群拥挤的公共场所，减少呼吸道感染的机会
D.可以长期应用抗生素预防呼吸道感染
E.积极改善膳食结构，加强营养

- 32.某13岁男孩，近期出现不听从父母安排，常用自己的标准衡量是非曲直。该男孩青春期心理特征属于
A.情绪两极化
B.独立性增强
C.心理“上锁”
D.心里想成熟过渡
E.行为易冲动

- 33.关于对重度抑郁症病人的健康教育，正确的叙述是
A.建议病人进行自我心理调整为主，用药为辅
B.鼓励安静休息，避免声光刺激
C.生活中回避压力，不要主动挑起对抗
D.尽量减少社会活动，避免受人关注
E.坚持服药治疗，不要漏服或随意停药

- 34.不符合破伤风抗毒素皮试结果阳性的表现是
A.局部皮丘红肿扩大
B.硬结直径为1cm
C.红晕>4cm
D.皮丘周围有伪足、痒感
E.病人出现气促、发绀、荨麻疹

- 35.输液的目的错误的是
A.纠正水、电解质失调
B.增加血容量
C.输入药物
D.供给各种凝血因子

E.利尿消肿

36.输液过程中导致静脉痉挛的原因是

- A.液体浓度过高或输入过快
- B.液体注入皮下组织
- C.针头阻塞
- D.患者肢体抬举过高
- E.输入的药液温度过低

37.预防溶血反应的措施不包括

- A.严格执行查对制度
- B.做好血液质量检查
- C.输血前肌内注射异丙嗪
- D.血液中勿随意加入药物
- E.血液不能加温、震荡

38.服磺胺药需多饮水的目的是

- A.减轻服药引起的消化道症状
- B.避免结晶析出堵塞肾小管
- C.避免头晕头痛等中枢神经系统反应
- D.增强药物疗效
- E.避免影响造血功能

39.留取血吸虫孵化检查的粪便标本应

- A.于试验饮食3~5天后留取
- B.留全部粪便及时送检
- C.将便盆加热后留取全部粪便
- D.用竹签取脓血黏液粪便置培养管内
- E.取少量异常粪便置蜡纸盒内送检

40.病人认为自己患病是一种惩罚，社会不能接受自己的病，此种心理反应是属于

- A.焦虑与震惊
- B.羞辱和罪恶
- C.退化和依赖
- D.恐慌和恐惧
- E.否认和怀疑

41.病区护理管理的核心是

- A.病人管理
- B.探视的管理
- C.护理质量管理
- D.病区环境管理
- E.陪护的指导与管理

42.发生溶血反应时，出现黄疸和血红蛋白尿的机制是

- A.红细胞凝集成团，阻塞部分小血管
- B.凝集的红细胞发生溶解，血红蛋白释放入血浆
- C.血红蛋白形成结晶体，阻塞肾小管
- D.肾小管内皮缺血、缺氧而坏死
- E.红细胞破坏，释放凝血物质而引起DIC

43.低分子右旋糖酐的主要作用是

- A.降低血液黏稠度
- B.提高血浆胶体渗透压
- C.补充蛋白质
- D.补充营养和水分
- E.供给热能

44.病因不明的急性中毒进行洗胃的溶液是

- A.冰水
- B.生理盐水
- C.1:5000高锰酸钾
- D.2%碳酸氢钠
- E.2%~4%鞣酸

45.对危重患者的护理，下列措施正确的是

- A.保持平卧，尽量少翻动患者
- B.保持病房安静，减少家属探视
- C.保持口腔清洁，口腔护理每日2次
- D.发现患者心脏骤停，首先通知医生
- E.为保护患者自尊，意识丧失者不应使用保护具

46.低盐饮食每日限用食盐

- A.2g
- B.4g
- C.6g
- D.8g
- E.10g

47.对伤口局部进行湿热敷时，应特别注意

- A.防止弄湿床单
- B.皮肤局部及周边涂抹凡士林
- C.水温要适度
- D.严格进行无菌操作
- E.及时更换敷料

48.成人肌内注射多次注射者最佳部位是

- A.股外侧肌
- B.臀大肌
- C.臀中肌、臀小肌
- D.上臂三角肌
- E.后背

49.患者，男，55岁。近来上腹部疼痛，消瘦，大便隐血阳性。作胃镜检查后得知患了胃癌，出现心理和行为异常。有利于患者应对的转机是

- A.出现迁怒行为不要将其个人化
- B.不必纠正患者抑郁和退缩行为
- C.出现愤怒时立即帮助分析结果
- D.满足患者提出治疗的所有要求
- E.告知患者全部病情真相

50.男，70岁，有冠心病史，可疑直肠癌，准备进行直肠指检，其采用的体位是

- A.仰卧位
- B.蹲位
- C.左侧卧位
- D.截石位
- E.俯卧位

51.发生青霉素过敏休克时，最早出现的症状是

- A.烦躁不安、血压下降
- B.四肢麻木、头晕眼花
- C.腹痛、腹泻
- D.意识丧失、尿便失禁
- E.喉头水肿、呼吸道症状

52.上消化道出血量大于多少时，可使大便隐血试验呈阳性

- A.5ml
- B.10ml
- C.15ml
- D.20mL
- E.60ml

53.尸僵通常开始出现在死亡后

- A.2-4H
- B.4-6H
- C.6-8H
- D.8-10H

E.10-12H

54.女性，66岁，病人胸闷气短，杵状指、桶状胸，叩诊过清音，听诊呼吸音减弱、P2亢进，胸透见右心室大。最佳的吸氧方式是

- A.持续高流量吸氧
- B.间断中流量吸氧
- C.持续低流量吸氧
- D.间断高流量吸氧
- E.间断低流量吸氧

55.患者在注射青霉素过程中觉头晕、胸闷、面色苍白，查体脉细弱，血压下降。应立即注射的药物是

- A.盐酸肾上腺素
- B.氢化可的松
- C.异丙嗪
- D.去甲肾上腺素
- E.尼可刹米

56.滋补药的煎煮时间是

- A.第一煎30分钟，第二煎25分钟
- B.第一煎20分钟，第二煎15分钟
- C.第一煎60分钟，第二煎50分钟
- D.第一煎40分钟，第二煎25分钟
- E.第一煎50分钟，第二煎30分钟

57.男，36岁，突然腹痛，面色苍白，大汗淋漓，护士不应采取的措施是

- A.询问病史
- B.通知医生
- C.应用止痛剂
- D.测生命体征
- E.安慰病人

58.患者，男，55岁。脑血管意外，长期卧床，无自理能力，根据奥瑞姆的自理模式，这时护士提供的护理应属于的补偿系统是

- A.全补偿系统
- B.部分补偿系统
- C.支持系统
- D.教育系统
- E.辅助系统

59.女性，30岁，因乙型肝炎入传染病科隔离治疗，限制其活动。该病人活动受限是属于

- A.焦虑造成活动无力
- B.运动系统功能受损
- C.社会因素的需要
- D.治疗措施需要
- E.疾病影响机体活动

60.患者，女，24岁。因服毒昏迷不醒，被送入医院急诊室抢救，其家属不能准确地说出毒物名称，此时护士的正确处理方法是

- A.请家属立即查清毒物名称后洗胃
- B.抽胃内容物送检后用温开水洗胃
- C.鼻饲牛奶或蛋清水，以保护胃黏膜
- D.生理盐水清洁灌肠，减少毒物吸收
- E.禁忌洗胃，待清醒后用催吐法排除毒物

61.男，63岁。晨起取牛奶的路上突然摔倒，意识丧失，大动脉搏动消失。此时对该患者立即采取的措施是

- A.呼叫“120”
- B.胸外心脏按压
- C.立即送医院
- D.开放气道
- E.人工呼吸

62.男性，82岁，因呼吸困难，不能平卧，家属给病人吸氧后前来就诊。门诊护士应

- A.安排病人到隔离门诊就诊
- B.安排病人提前就诊
- C.让病人按挂号顺序就诊
- D.观察病人生命体征
- E.做好卫生宣教

63.口服药注意事项中正确的是

- A.服酸性药物前要漱口
- B.铁剂药物宜浓茶水送服
- C.促进食欲药物宜饭后服
- D.磺胺类药物宜多饮水
- E.对胃黏膜有刺激性药物宜饭前服

64.女，68岁，因食管静脉曲张破裂大出血而急诊入院，护士遵医嘱给予输血，在输注库存血1000ml后，出现手足抽搐、心率减慢症状，

应考虑出现了

- A.过敏反应
- B.发热反应
- C.出血倾向
- D.溶血反应
- E.枸橼酸钠中毒反应

65.男孩，3岁，患有肺炎住院后放弃已经学会的能够控制排便功能；出现尿床现象，其行为属于

- A.抑郁
- B.退化
- C.恐惧
- D.怀疑
- E.抵抗

66.患者，女，35岁。体温39.2℃，注射青霉素后发生过敏性休克。最佳的处理方法是

- A.停药、平卧、注射盐酸肾上腺素，保暖、吸氧
- B.停药、平卧、吸氧、注射抗组胺药物、保暖
- C.停药、平卧、测血压、注射呼吸兴奋剂、保暖
- D.停药、吸氧、保暖、注射阿拉明、平卧
- E.停药、吸氧、保暖、注射地塞米松、平卧

67.患者，男，39岁。因腿被铁钉刺伤，急诊入院，医嘱破伤风抗毒素注射，破伤风抗毒素皮试药液浓度为

- A.15U/ml
- B.50U/ml
- C.100U/ml
- D.150U/ml
- E.500U/ml

68.女性，25岁，因行子宫肌瘤切除术，术前需留置导尿管。为防止逆行感染，对留置尿管护理正确的是

- A.贮尿袋引流管位置低于耻骨联合
- B.每天倾倒1次引流袋
- C.每周更换1次引流管
- D.每周进行1次膀胱冲洗
- E.每天更换1次导尿管

69.男性，50岁，喉癌手术进行气管切开，病

人痰液较多，为其吸痰时应避免的操作是

- A.一根管吸净口腔痰液后再吸气管内痰液
- B.插管时，关闭负压吸引
- C.一次吸引不超过 15 秒
- D.从深部向上提拉，左右旋转
- E. 痰液未吸净需休息 2 分钟后再吸

70.患者，男，34岁。急性肺炎，在使用青霉素后发生过敏反应，出现面色苍白，出冷汗，发绀，血压下降等循环衰竭症状的原因是

- A.胃肠道平滑肌痉挛
- B.呼吸道分泌物增多
- C.中枢系统缺氧
- D.皮肤血管收缩
- E.周围血管扩张

71.患者，男，28岁。因食用了苍蝇叮咬过的食物，1周后出现全身不适、体温 39.0℃~

40.0℃呈稽留热、脉搏 60~70 次/分、表情淡漠。病程第 2 周出现玫瑰疹，对患者采取的隔离种类是

- A.严密隔离
- B.接触隔离
- C.昆虫隔离
- D.肠道隔离
- E.保护性隔离

72.患者男，30岁。咳嗽 3 个月，咳白色黏痰，内带血丝，午后低热，面颊潮红，疲乏无力，常有心悸、盗汗，较前消瘦。痰结核菌素试验阳性。对该患者的护理措施，正确的是

- A.不需隔离
- B.常到室外晒太阳
- C.服药至症状消失即可
- D.加强活动锻炼，增强体质
- E.做好用具、餐具、病室和痰的消毒

73.不属于新生儿家庭访视内容的是

- A.询问新生儿出生情况
- B.观察新生儿一般状况
- C.新生儿体格检查
- D.指导喂养及日常护理
- E.新生儿预防接种

74.患者男，55岁。肺心病并发Ⅱ型呼吸衰竭，遵医嘱给予吸氧。该患者为快速缓解症状，自行调大氧流量，30分钟大量出汗，烦躁不安，肌肉震颤，间歇抽搐。考虑该患者最可能并发了

- A.氧中毒
- B.肺性脑病
- C.低钙血症
- D.低镁血症
- E.低钾血症

75.某 4 个月患儿，人工喂养。近日反复出现发作性吸气困难，伴有吸气时喉鸣音，急诊入院。查血钙 1.7mmol/L，其余正常。首先考虑该患儿出现了

- A.中毒性肺炎
- B.喉痉挛
- C.气管异物
- D.惊厥
- E.支气管哮喘

76.某消化性溃疡患者即将出院，责任护士指导其回家后应注意的问题不包括

- A.生活规律，劳逸结合
- B.避免进食刺激性食物
- C.保护胃粘膜药宜在餐前 1 小时服用
- D.抗酸药宜在饭后和睡前服用
- E.上腹部疼痛时要及时服用去痛片止痛片

77.患者男，48岁，胃癌根治术后 1 个月，今日复诊时自诉进食半小时内出现心悸、出汗，面色苍白和头痛，上腹部饱涨不适等。护士对其进行健康教育，不恰当的内容是

- A.饮食方面宜少量多餐
- B.用餐时间限制饮水喝汤
- C.进餐后宜活动 20 分钟后休息
- D.宜进低碳水化合物，高蛋白饮食
- E.避免过甜、过咸、过浓的流质饮食

78.患者女，32岁。痛经 2 年，呈进行性加重。子宫后倾固定，子宫后壁触及 3 个通信结节，给予达那唑治疗。目前最重要的护理措施是

- A.保持心情愉快
- B.避免剧烈运动

- C.湿热敷下腹部
D.指导规范用药
E.给予清单饮食
- 79.可出现反常呼吸运动的是
A.浓胸
B.桶状胸
C.漏斗胸
D.连枷胸
E.血气胸
- 80.某产妇，足月产后3天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底位于脐上1指，子宫体软。以下护理措施中，错误的是
A.做好会阴护理
B.半卧位或抬高床头
C.监测体温变化
D.做好心理支持
E.红外线照射会阴部每日3次，每次1小时
- 81.某住院患者因持续咳黏痰，经X线和痰菌检查，诊断为真菌性肺炎，在护理评估时，需要考虑的发病因素不包括的是
A.是否使用免疫抑制剂
B.是否长期使用广谱抗生素
C.是否使用过糖皮质激素
D.是否有口腔念珠菌感染
E.是否鼻导管吸氧史
- 82.出现链霉素过敏反应时，使用葡萄糖碳酸钙的目的是
A.收缩血管，增加外周阻力
B.松弛支气管平滑肌
C.使毒性症状减轻
D.兴奋呼吸中枢
E.缓解皮肤瘙痒
- 83.肌肉注射的操作不妥的是
A.注射前做好解释
B.取髂前上棘和尾骨连线的外上1/4处为注射部位
C.推药液宜慢
D.注射油剂，针头宜粗长
E.刺激性强的药液后注射
- 84.患者男，64岁。良性前列腺增生术1天，护士对其进行健康教育，正确的内容是
A.手术后加强运动
B.手术后早期少饮水
C.排尿异常会在术后2个月内消失
D.术后要进行提肛肌锻炼
E.术后半年避免外出
- 85.患者男，55岁，支气管扩张20年，近年来手指末端增生，肥厚，指甲从根部到末端拱形隆起呈杵状。该患者出现这种变化的主要原因是
A.慢性缺氧
B.营养不良
C.反复感染
D.睡眠不足
E.运动过量
- 86.患者男，55岁。高血压病，身高176cm，体重86kg，该患者属于
A.体重低下
B.体重正常
C.体重超重
D.重度肥胖
E.中度肥胖
- 87.关于慢性胃炎的叙述，正确的是
A.多好发于青壮年
B.自身免疫性胃炎可伴有贫血
C.常有特征性腹部疼痛特点
D.均应进行抗幽门螺杆菌治疗
E.萎缩性胃炎随年龄增加症状可逐渐减轻
- 88.医疗文件具有法律效应，因抢救病人未能及时书写的，应在抢救结束后据实补记，补记的时间限制是
A.2小时内
B.4小时内
C.6小时内
D.8小时内
E.10小时内
- 89.早产儿，生后2天，胎龄34周。因发绀给予氧气吸入，为预防其氧中毒，正确的做法是

- A.维持动脉血氧分压在 80~90mmHg
B.维持经皮血氧饱和度在 85%~93%
C.连续吸氧时间不超过 7 天
D.吸氧浓度在 70%~80%
E.基于机械正压通

90.患者女，65岁。遵医嘱每天服用补钙制剂阿仑膦酸钠1次。正确的服药时间是

- A.晨起
B.早饭后
C.午饭后
D.晚饭后
E.睡前

91.患儿女，足月儿，因脐带绕颈，出生后1分钟Apgar评分为1分。经窒息复苏后，目前患儿仍嗜睡、反应差、呕吐。此时对该患儿不恰当的护理是

- A.头罩吸氧
B.监测生命体征
C.立即开奶
D.配合亚低温治疗
E.注意保暖

92.患儿男，34岁。左足麻木、疼痛，走路时小腿酸胀、易疲劳，足底有硬胀感，初步诊断为血栓闭塞性脉管炎。可确诊的辅助检查是

- A.肢体抬高试验
B.静脉注射硫酸镁10ml
C.仔细检查肢体各种脉搏动情况
D.行交感神经阻滞
E.行动脉造影

93.判断肋骨骨折，胸部检查最可靠的依据是

- A.局部肿胀
B.皮下瘀斑
C.皮下气肿
D.胸式呼吸消失
E.直接和间接压痛

94.某早产儿出生后因Apgar转入新生儿病房，治疗12天好转，今日医生通知家长出院，护士在出院指导时应向家长重点强调

- A.及时添加辅食

- B.预防感染
C.培养良好生活习惯
D.预防外伤
E.及早训练按时排便

95.患者，女，62岁。慢性支气管炎，肺气肿，痰液黏稠，不易咳出，用超声雾化吸入，操作中不妥的是

- A.稀释痰液药用糜蛋白酶
B.稀释药液至500ml，放入雾化罐内
C.水槽内放热水250ml
D.使用时先开电源开关，再开雾化开关
E.治疗时间15~20分钟位

【A3/A4型题】

(96-99题共用题干)

患儿女，10个月，足月产。反复腹泻1个月余。每天5~6次。时稀时稠。生后混合喂养，未添加辅食。查体：神清，表情呆滞，体重4.8kg；腹软、腹壁脂肪消失。

96.应先考虑该患儿为

- A.轻度营养不良，慢性腹泻
B.中度营养不良，慢性腹泻
C.重度营养不良，慢性腹泻
D.中度营养不良，迁延性腹泻
E.重度营养不良，迁延性腹泻

97.患儿变化最为显著地血清学指标是

- A.红细胞计数
B.淋巴细胞计数
C.白细胞计数
D.血清白蛋白浓度
E.血红蛋白浓度

98.关于该患儿的补液原则，正确的是

- A.补液总量适量减少，滴速宜稍慢
B.补液总量适量减少，滴速宜稍快
C.补液总量适量减少，保持正常滴速
D.补液总量适量增加，滴速宜稍慢
E.补液总量适量增加，保持正常滴速

99.患儿住院第2天晨起突然神志不清，面色苍白，脉搏细弱，呼吸表浅，出冷汗，首先应静

脉注射的是

- A.氨茶碱
- B.洛贝林
- C.地西洋
- D.葡萄糖
- E.地高辛

(100-103题共用题干)

患者女，38岁。慢性哮喘病史12年。近日感冒后病情加重，夜间咳嗽频繁，痰量多。查体：神志清，口唇轻度发绀；桶状胸；双肺叩诊过清音，呼吸低音，有干湿性啰音。经定量雾化吸入治疗后病情缓解，但PaO₂(55mmHg)仍低。

100.为防止病情进一步加重，最有效的措施是

- A.做腹式呼吸加强膈肌运动
- B.保持情绪稳定
- C.进行家庭氧疗
- D.坚持步行或慢跑等全身运动
- E.每日坚持用药

101.对该患者进行健康教育重在提高

- A.健康意识
- B.疾病的处理方法
- C.自我管理技能
- D.生活的规律性
- E.适应工作节奏

102.护士鼓励患者记哮喘日记，其监测内容不包括

- A.吸氧时间及次数
- B.症状发作程度
- C.所应用的药物
- D.每日症状发作次数
- E.上次住院时间

103.经治疗，患者状况好转。复诊时护患者注意避免各种诱发因素

- A.避免摄入引起过敏的食物
- B.避免吸入刺激性气体
- C.避免接触外界人员
- D.避免呼吸道感染
- E.避免剧烈运动

(104-106题共用题干)

患者男，50岁。肝硬化5年。中午进食后突然呕血，色暗红，量约350ml，急诊入院。查体：神志清，T37.5℃，P120次/分，BP90/60mmHg。患者情绪高度紧张，诉说有濒死的感觉，经抢救，患者病情平稳后行门体分流术。

104.入院时，患者主要的心理问题是

- A.抑郁
- B.恐惧
- C.焦虑
- D.淡漠
- E.悲哀

105.患者入院后采取的处理措施中不正确的是

- A.输液、输血
- B.应用保肝药物
- C.静脉止血药物的应用
- D.三强二囊管压迫止血
- E.应用肥皂水灌肠

106.分流术后24小时内应指导患者采取的卧位是

- A.半坐卧位
- B.俯卧位
- C.平卧位
- D.中凹位
- E.头低足高位

(107-108题共用题干)

患者，男，27岁。急性细菌性肠炎1天未进食，医嘱静脉输液5%GS1000ml、0.9%NaCl1500ml、抗生素、VitB6、VitC、KCl。

107.该患者静脉输液的最主要目的是

- A.治疗与补充血容量
- B.治疗与纠正酸中毒
- C.治疗与补充水分、电解质
- D.补充血容量与纠正渗透压
- E.供给热量

108.输液的注意事项中，不正确的是

- A.茂菲管液面过高，拔出液体瓶内针头降液面
- B.茂菲管内液面保持1/2~2/3满

- C.KCl 输入出现疼痛时减慢滴速
D.更换液体时严格无菌操作
E.按照先盐后糖的顺序

(109—110题共用题干)

某新生儿出生6小时，进行预防接种。109.接种卡介苗的正确方法是

- A.前臂掌侧下段 ID
B.三角肌下缘 ID
C.三角肌下缘 H
D.上臂三角肌 H
E.臀大肌 IM

110. 接种乙肝疫苗的正确方法是

- A.前臂掌侧下段 ID
B.三角肌下缘 ID
C.三角肌下缘 H
D.上臂三角肌 H
E.大腿前部外侧 IM

(111—114题共用题干)

患者女，20岁。因近1个月脾气暴躁、怕热、多汗、多食、失眠去医院就诊。查体，甲状腺1度肿大，两手颤抖，眼球有轻度突出，心率90次/分。实验室检查： $T_3 6.5 \text{ nmol/L}$ ， $T_4 263 \text{ nmol/L}$ ，均高于正常水平

- 111.该患者最可能的诊断是
A.生理性甲状腺肿
B.甲状腺功能亢进性心脏病
C.甲状腺功能亢进症
D.地方性甲状腺肿
E.甲状腺癌

- 112.该患者的最佳治疗方法是
A.手术治疗
B.放射性 ^{131}I 治疗
C.普萘洛尔治疗
D.甲巯咪唑治疗
E.心得安治疗

- 113.应用此治疗期间，应观察的不良反应是
A.红细胞减少
B.粒细胞减少

- C.骨质疏松
D.声音嘶哑
E.甲状腺功能低下

114.患者出现上述不良反应时，正确的护理措施是

- A.给予含铁丰富的饮食
B.补充甲状腺素
C.给予含钙丰富的饮食
D.给予清咽含片
E.预防感染

(115—116题共用题干)

患者，女，45岁。在为果树喷洒敌百虫农药时，出现头痛、无力、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状，被急送入院，医护人员立即给予洗胃。

115.洗胃过程中，护士发现有血性液体流出，同时患者腹痛加剧，此时正确的做法是

- A.观察的同时继续洗胃
B.继续缓慢洗胃
C.快速洗胃
D.立即停止洗胃
E.休息片刻，继续洗胃

116.应选择的洗胃溶液是

- A.蛋清水
B.4%碳酸氢钠
C.淡石灰水
D.1:5000高锰酸钾溶液
E.5%醋酸

(117—118题共用题干)

患者女，68岁。慢性阻塞性肺疾病10年。因咳嗽、咳痰加重，伴发热、喘息3天入院，给予氨茶碱等治疗。

117.对该患者进行胸部评估是，可发现的体征是

- A.胸廓不对称隆起
B.呼气延长
C.呼吸频率减慢
D.支气管偏向一侧

E.可闻及湿罗音

118.应用氨茶碱治疗的目的是

- A.控制细菌感染
- B.减少支气管分泌物
- C.稀释痰液
- D.松弛支气管平滑
- E.降低体温

(119—120题共用题干)

患者男，45岁。糖尿病5年，近来因血糖控制不住，自感心前区疼痛入院治疗。遵医嘱给予三餐前速效胰岛素、睡前长效胰岛素的“三短一长”治疗方案。某日夜间，患者突然感到心慌、出虚汗、全身无力，继而神志恍惚。

119.值班护士首先判断患者可能发生了

- A.心绞痛
- B.胰岛素过敏
- C.心律失常
- D.低血糖反应
- E.高渗性昏迷先兆

120.此时应首先采取的措施是

- A.端坐位吸氧
- B.嘱患者立即尽是甜食
- C.测血压
- D.测血糖，确认是否发生了低血糖
- E.找专人陪护患者

(121—122题共用题干)

患者，男，65岁，因“直肠癌”拟行手术治疗。医嘱“青霉素皮内试验”，护士配制好青霉素皮试液后给患者注射。

121.注射的剂量应是

- A.1500U
- B.200U
- C.150U
- D.20U
- E.15U

122.注射前应询问患者的情况不包括

- A.既往是否使用过青霉素
- B.最后一次使用青霉素的时间

C.有无其他药物或食物过敏

D.是否对海鲜、花粉过敏

E.家属有无青霉素过敏

(123—125题共用题干)

患者，男，32岁。因脑外伤入院，神志不清，查体：体温39.8℃，脉搏65次/分，呼吸16次/分，血压160/90mmHg，医嘱给予降温，静脉滴注甘露醇。

123.此时最主要的降温方式是

- A.乙醇拭浴
- B.温水拭浴
- C.腋窝置冰袋
- D.头部戴冰帽
- E.腹股沟置冰袋

124.此时降温的主要目的是

- A.减轻充血
- B.减轻出血
- C.减轻脑水肿
- D.促进炎症局限
- E.加速神经冲动传导

125.为患者降温时应注意将肛温维持在

- A.33℃左右
- B.34℃左右
- C.35℃左右
- D.35.5℃左右
- E.36℃左右

(126—127题共用题干)

患者，女，因脑挫裂伤入院2天，呈持续睡眠状态，可被唤醒，能够简单回答问题，但反应迟钝，随后又很快入睡。

126.该患者的意识障碍程度应为

- A.嗜睡
- B.意识模糊
- C.昏睡
- D.浅昏迷
- E.深昏迷

127.该患者重点观察的内容是

- A.体温
- B.脉搏
- C.呼吸
- D.血压
- E.神志

(128—129题共用题干)

患者，男，59岁。患者在家时排便正常，但入院4天没有排便，饮食正常。

- 128.遵医嘱给予开塞露治疗，不正确的是
- A.为保护患者隐私，用屏风遮挡，拉好窗帘
 - B.剪去封口后，先挤出少许液体润滑开口处
 - C.患者取左侧卧位
 - D.轻插入肛门后将药液全部挤入直肠
 - E.嘱患者无需保留，可立即排便

129.开塞露的作用机制是

- A.在肠道内吸水膨胀后，增加肠内容物的容积
- B.在肠腔维持高渗透压，阻止肠丙盐和水分的吸收
- C.润滑软化粪便，减少肠内水分被吸收
- D.使粘膜通透性增加，使电解质和水向肠腔渗

透

E.刺激十二指肠分泌缩胆囊肽，促进肠分泌肠液和蠕动

(130-131共用题干)

患者男，70岁。有高血压病史10年。2小时前大便用力后突然出现头痛、喷射状呕吐、言语不清，跌倒在地，急诊就诊。

130.分诊护士最恰当的处理是

- A.优先心血管内科急诊
- B.优先神经外科急诊
- C.优先普外科急诊
- D.优先骨科急诊
- E.进一步询问病史

131.接诊护士在配合医生体检时，不正确的做法是

- A.扶患者坐起，听双肺呼吸音
- B.测量生命体征，观察瞳孔、意识
- C.迅速建立静脉通道
- D.头部放置冰袋
- E.禁食禁水

全国护士执业资格考试
精准模拟卷（五）

全国护士执业资格考试精准模拟卷（五）专业实务

【A1/A2题型】

1. 患者女，32岁。诊断抑郁症。通过矫正患者认知或思维方式来达到治疗目的的心理治疗方法是

- A. 行为治疗
- B. 认知疗法
- C. 贝克认知疗法
- D. 人本主义治疗
- E. 精神分析治疗

2. 与甲胎蛋白明显相关的肿瘤是

- A. 原发性肝癌
- B. 淋巴肉瘤
- C. 骨肉瘤
- D. 肺癌
- E. 结肠癌

3. 中毒性痢疾多见于

- A. 新生儿
- B. 婴幼儿
- C. 老人
- D. 青年
- E. 成人

4. 患者，男性，25岁，诊断为支气管扩张，该病人痰特点是

- A. 果酱样
- B. 大量脓痰久置分3层
- C. 铁锈色
- D. 咖啡样
- E. 粉红色

5. 男，50岁，有胃溃疡病史。突发大量呕血约800ml，患者烦躁不安，面色苍白，皮肤湿冷，血压100/85mmHg，心率102次/分，其属于

- A. 休克早期
- B. 休克期
- C. 休克晚期
- D. 未发生休克
- E. 虚脱

6. 甲状腺良性突眼一般在

- A. 18mm以下
- B. 18mm以上
- C. 19mm以下
- D. 19mm以上
- E. 20mm以上

7. 1岁，小儿，男，因畏食来院求医，护士应首先为其检查

- A. 前囟
- B. 体重
- C. 坐高
- D. 牙齿
- E. 骨骼发育

8. 急性乳腺炎的致病菌多为

- A. 变形杆菌
- B. 白色葡萄球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 大肠杆菌

9. 某孕妇，第1胎，妊娠39周来院检查，医生告之临产先兆，收住院，最可靠的依据是

- A. 宫缩强度增加
- B. 见红
- C. 尿频
- D. 胎儿下降感
- E. 上腹部舒适感

10. 引起急性肾盂肾炎最常见的致病菌是

- A. 大肠埃希菌
- B. 变形杆菌
- C. 葡萄球菌
- D. 产碱杆菌
- E. 链球菌

11. 干性支气管扩张症的主要症状是

- A. 反复咳嗽
- B. 大量脓痰
- C. 肌肉酸痛
- D. 反复咯血

E. 营养不良

12. 某患者自诉胸闷、呼吸不畅，不能平卧。观察发现病人呼气时间长于吸气时间，呼吸费力，无明显三凹征。此种呼吸可能是
- A. 大叶性肺炎
 - B. 哮喘发作
 - C. 喉头水肿
 - D. 临终前表现
 - E. 代谢性酸中毒

13. 某患者因车祸造成脑损伤，整天处于睡眠状态已2天，不易唤醒，醒后答非所问，很快又入睡，判断该患者的意识障碍程度为
- A.嗜睡
 - B.意识模糊
 - C.昏睡
 - D.谵妄
 - E.昏迷

14. 女，30岁，3周前有上呼吸道感染症状，服感冒药后症状好转，近1周来出现心慌、气短、胸闷。心电图检查示频发室性早搏，X线检查示心影稍扩大，应首先考虑
- A.风湿性心脏病
 - B.扩张性心脏病
 - C.病毒性心肌炎
 - D.感染性心内膜炎
 - E.急性心包炎

15. 某肺心病患者，血气分析：动脉血氧分压6kPa（45mmHg），动脉血二氧化碳分压10kPa（75mmHg）。应给予哪种氧疗法
- A.持续低流量、低浓度给氧
 - B.持续高流量、高浓度给氧
 - C.间歇低流量、低浓度给氧
 - D.间歇高流量、高浓度给氧
 - E.间歇高流量、乙醇湿化给氧

16. 吸气时出现脉搏显著减弱或消失的现象可见于
- A.主动脉瓣关闭不全
 - B.心包积液
 - C.右心衰竭

- D.冠心病
- E.房室传导阻滞

17. 肝硬化失代偿期最突出的表现是
- A.脾大
 - B.腹水
 - C.肝掌
 - D.贫血
 - E.出血

18. 腹股沟斜疝的疝环位于
- A.腹股沟韧带中点
 - B.耻骨结节外侧
 - C.肿块最突出处
 - D.精索前内方
 - E.腹股沟韧带中点上1.5~2.0cm

19. 患者，男，得知自己患淋巴瘤后情绪易怒，且有时会拒绝治疗。此时，护士与他沟通时应避免的行为是
- A.为他提供发泄的机会
 - B.倾听了解他的感受
 - C.当拒绝治疗时对他进行批评
 - D.及时满足他的合理需求
 - E.对他的不合理行为表示理解

20. 穿脱隔离衣时要避免污染的部位是
- A.腰带以下
 - B.腰带
 - C.领子
 - D.袖子后面
 - E.胸前、背后

21. 重症肺炎因二氧化碳潴留导致的酸碱平衡紊乱类型是
- A.呼吸性酸中毒
 - B.呼吸性碱中毒
 - C.代谢性酸中毒
 - D.代谢性碱中毒
 - E.混合型酸中毒

22. 有关腹膜的叙述正确的是
- A.网膜不是腹膜形成的
 - B.壁腹膜主要受肋间神经和腰神经支配

- C. 盆腔腹膜较其他部位吸收力强
D. 肠腹膜受体神经支配
E. 腹前壁在炎症时可引起弥漫性疼痛
23. 关于强迫症的描述以下哪项不对
A. 强迫观念
B. 强迫意向
C. 强迫行为
D. 有意识的自我强迫和反强迫
E. 病前癔症性格多见
24. 造成右心功能不全呼吸困难的原因是
A. 上呼吸道感染
B. 体循环静脉淤血
C. 支气管狭窄及阻塞
D. 毛细血管阻力增加
E. 过度劳累
25. 患者女，56岁，护士巡视病房发现其皮肤湿冷、弹性差，护士在收集资料时使用了何种方法
A. 视诊
B. 叩诊
C. 嗅诊
D. 触诊
E. 听诊
26. 患者男，46岁，阿米巴痢疾，护士遵医嘱为其进行保留灌肠治疗，下列步骤中正确的是
A. 患者取左侧卧位
B. 臀部抬高约10cm
C. 肛管轻轻插入肛门7~10cm
D. 保留药液在20分钟以上
E. 药液注入完毕，再注入温开水50ml
27. 患者女，50岁。因风湿性心脏瓣膜病人院，给予抗心衰和抗感染治疗后好转，拟今日出院，护士在指导中应强调，预防链球菌感染最重要的措施是
A. 减少运动，多休息
B. 坚持锻炼，防止呼吸道感染
C. 坚持限制钠盐饮食
D. 减轻心理压力，增强康复信心
E. 定期复查，必要时作细菌培养
28. 关于子宫肌瘤的变性，下列哪项错误
A. 红色变性
B. 囊性变
C. 玻璃样变
D. 肉瘤变
E. 葡萄样变
29. 缓解心绞痛发作最有效、作用最快的药物是
A. 硝苯地平
B. 硝酸甘油
C. 阿司匹林
D. 利多卡因
E. 阿托品
30. 患者男，68岁。胸痛3小时，诊断为急性心肌梗死，给予急诊溶栓治疗。下列对直接诊断冠脉再通最有价值的是
A. 冠脉造影示闭塞动脉再通
B. 胸痛2小时内基本消失
C. 出现心律失常
D. 心电图抬高ST段回降>50%
E. 血清心肌酶峰值提前
31. 患儿8个月，一天前突然发热、咳嗽，随后呕吐三次，大便稀、黄色水样10余次，黏液少，无腥臭。体检，39℃，精神萎靡，前囟及眼窝凹陷，啼哭少泪，咽稍充血，心肺(-)。腹软，皮肤弹性略差，大便检查(-)，考虑引起腹泻的病原体最可能是
A. 轮状病毒
B. 副大肠杆菌
C. 白色念珠菌
D. 金黄色葡萄球菌
E. 致病性大肠杆菌
32. 婴幼儿最常见的贫血是
A. 营养性缺铁性贫血
B. 失血性贫血
C. 地中海贫血
D. 再生障碍性贫血
E. 溶血性贫血
33. 病区的物理环境应

- A. 安静、整洁、干燥、光线适宜
B. 安静、整洁、安全、光线适宜
C. 安静、安全、潮湿、光线适宜
D. 安静、整洁、安全、无装饰
E. 整洁、安全、无装饰、光线适宜
34. 下列药物中常用于高血压急症时需快速降压的是
A. 硝酸甘油
B. 口服呋塞米
C. 口服蒙诺
D. 多巴胺快速静脉点滴
E. 硝普钠静脉点滴
35. 患者肖某，男，50岁，患肾功能衰竭住院，入院后护士小刘观察发现，患者24小时尿量为200ml。请问该患者排尿状况属于
A. 正常
B. 无尿
C. 尿闭
D. 尿潴留
E. 少尿
36. 垂体性侏儒症的原因是
A. 促肾上腺皮质激素分泌增加
B. 婴幼儿甲状腺激素分泌不足
C. 甲状腺激素分泌不足
D. 胰岛素分泌不足
E. 生长激素及生长激素释放激素缺乏
37. 良性前列腺增生症最典型的症状是
A. 尿线变细、尿滴沥
B. 尿频及夜尿次数增多
C. 进行性排尿困难
D. 急性尿潴留
E. 尿失禁
38. 呕吐物为隔宿食物多见于
A. 胃癌
B. 幽门梗阻
C. 肠梗阻
D. 食物中毒
E. 急性胃炎
39. 阑尾作为免疫器官，可参与产生和促进成熟的细胞是
A. B淋巴细胞
B. T淋巴细胞
C. 中性粒细胞
D. 嗜碱性粒细胞
E. 嗜酸性粒细胞
40. 肺结核空洞和肺脓肿空洞最可靠的鉴别诊断方法是
A. 痰的性状
B. 肺部体征
C. 胸部X线检查
D. 痰细菌学检查
E. 外周血细胞检查
41. 急腹症在未明确诊断时可对没有休克的病人
A. 流质饮食
B. 给予镇痛药
C. 实施胃肠减压
D. 便秘者行低压灌肠
E. 可服用少量石蜡油
42. 可判定类风湿关节炎病人处于活动期的主要表现是
A. 关节疼痛
B. 关节畸形
C. 关节肿胀
D. 类风湿结节
E. 关节功能障碍
43. 患者男，29岁。初步诊断为阿米巴痢疾收入院，医嘱：留取粪便做阿米巴原虫检查。护士应为患者准备的标本容器是
A. 无菌容器
B. 清洁容器
C. 干燥容器
D. 装有培养基的容器
E. 加温的清洁容器
44. 出生后24小时内应接种的疫苗是
A. A群流脑
B. 乙肝疫苗

- C. 百白破混合制剂
D. 麻疹减毒活疫苗
E. 脊髓灰质炎减毒活疫苗
45. 乳房脓肿多采用以乳晕为中心的放射状切口，其目的是
A. 可避免损伤乳腺导管
B. 有利于引流通畅
C. 有利于换药操作
D. 可避免损伤乳头
E. 可减轻疼痛
46. 在消化性溃疡发病中起决定性作用的因素是
A. 药物
B. 吸烟
C. 精神因素
D. 饮食失调
E. 胃酸胃蛋白酶
47. 临幊上最常见的脑血管病为
A. 脑血栓形成
B. 短暂性脑缺血发作
C. 脑栓塞
D. 脑出血
E. 蛛网膜下隙出血
48. 合成清蛋白的场所是
A. 肝脏
B. 胆道
C. 脾脏
D. 胰腺
E. 肾脏
49. 利尿剂降低血压的主要作用机制是
A. 减少血容量
B. 阻断 β 受体
C. 阻断 α 受体
D. 阻滞钙通道
E. 扩张小动脉
50. 容易引起急性肾衰竭的损伤是
A. 挫伤
B. 挤压伤
- C. 刺伤
D. 扭伤
E. 裂伤
51. 男性，45岁，2型糖尿病，多食、多饮、多尿、消瘦：护士通过收集资料了解到该病人存在知识缺乏，并为其制订护理计划，此时护士与病人处于护患关系发展时期的
A. 开始期
B. 工作期
C. 熟悉期
D. 解决期
E. 结束期
52. 患者有慢性上腹隐痛半年，饭后上腹饱胀感，胃液分析空腹游离酸：0，组胺试验：5，下列诊断中可考虑
A. 肥厚性胃炎
B. 胃溃疡
C. 胃黏膜脱垂
D. 萎缩性胃炎
E. 十二指肠球部溃疡
53. 癫痫单纯失神发作的特征性表现是
A. 恶心呕吐
B. 头痛头晕
C. 全身抽搐
D. 短暂意识障碍、活动中断、呆滞凝视
E. 口吐白沫、角弓反张
54. 左心衰竭的早期脉搏表现是
A. 脉搏短绌
B. 不整脉
C. 交替脉
D. 奇脉
E. 水冲脉
55. 患者，男性，69岁，脑出血，入院时意识不清，左侧肢体偏瘫。护士为其测量血压、体温，正确的操作是
A. 测直肠温，上肢血压
B. 测口温，上肢血压
C. 测腋下温，右上肢血压
D. 测腋下温，左下肢血压

E. 测直肠温，左上肢血压

56. 患者男，78岁，退休教师，高血压住院治疗，年轻护士小李为其进行静脉输液，静脉穿刺3次均失败，后更换张护士才穿刺成功。患者非常不满意，其女儿向护士长抱怨，从此，患者拒绝李护士为其护理。护患关系发生冲突的主要因素是

- A. 信任危机
- B. 角色模糊
- C. 理解差异
- D. 角色压力
- E. 责任不明

57. 内源性感染是指

- A. 饮食不当引起的感染
- B. 通过医疗器械的感染
- C. 患者与护士之间的感染
- D. 患者与患者之间的感染
- E. 自身病原体引起的感染

58. 外感头痛发生的主要病邪为

- A. 风
- B. 寒
- C. 暑
- D. 湿
- E. 火

59. 患者男，45岁，胃大部切除术后，不能进食，给予脂肪乳、氨基酸静脉输入，4天后注射部位沿静脉走向出现条索状红线，局部发红、肿胀、灼热、疼痛及发热等全身症状。护士采取的处理措施错误的是

- A. 局部用冰袋冷敷
- B. 停止在此部位静脉输液，并将患肢抬高、制动
- C. 超短波理疗，每日一次，每次15~20分钟
- D. 如意金黄散加醋调成糊状，局部外敷
- E. 合并感染，遵医嘱给予抗生素治疗

60. 护士夜间巡视病房发现一高血压患者突然憋醒，被迫坐起，胸闷、咳嗽，烦躁不安，听诊两肺布满湿啰音。护理此患者应迅速采取的护理措施是

- A. 安慰患者稳定情绪
- B. 补充水分稀释痰液
- C. 置患者两腿下垂坐位
- D. 给予氧气吸入
- E. 观察血压变化

61. 中药的“四气”指的是

- A. 元气、宗气、营气、卫气
- B. 酸、苦、甘、辛
- C. 寒、热、温、凉
- D. 升、降、浮、沉
- E. 温、清、消、补

62. 患者男，18岁，因打架斗殴全身多处刀伤，紧急入院清创缝合治疗。在清创缝合过程中医生不慎将局麻药误入血管，可能引起

- A. 发热反应
- B. 自身免疫反应
- C. 变态反应
- D. 溶血反应
- E. 中毒反应

63. 类风湿因子(RF)的主要类型是

- A. IgA型
- B. IgD型
- C. IgE型
- D. IgM型
- E. IgG型

64. 患者王某，急性腹膜炎入院，无其他疾病，手术后康复出院，护士应

- A. 仅更换清洁的大单、被罩及枕套即可
- B. 用消毒剂擦拭患者使用过的家具及地面
- C. 用紫外线灯进行空气消毒
- D. 将同病室的其他患者转移出病室后对病室内空气进行熏蒸消毒
- E. 无需处理和更换床垫

65. 男，48岁。突感胸骨后压榨性疼痛，伴出汗、恶心，含硝酸甘油休息后仍不缓解，临床诊断最大可能是

- A. 心绞痛
- B. 高血压性心脏病
- C. 心肌炎

- D. 急性心肌梗死
E. 充血性心力衰竭
66. 患者王某，男，68岁，因肝癌行肝肿瘤切除术，术后大出血，给予输入大量库存血，术后患者出现手足抽搐、血压下降、心率缓慢、心电图出现Q-T间期延长，该患者出现了何种反应
A. 溶血反应
B. 过敏反应
C. 循环负荷过重
D. 枸橼酸钠中毒反应
E. 出血倾向
67. 导致肾性骨病的病因中，下列哪项不正确
A. 活性维生素D₃缺乏
B. 继发甲状旁腺功能亢进
C. 营养不良
D. 铅中毒
E. 铁负荷减少
68. 女性，30岁。发热伴牙龈出血三周。查体：贫血貌，脾肋下3cm，胸骨压痛（+），血红蛋白70g/L，白细胞14×10⁹/L，血小板35×10⁹/L，骨髓增生明显活跃，原始细胞占0.62。为进一步诊断，应首选的检查是
A. 染色体核型分析
B. 细胞化学染色
C. 血清铁测定
D. 血细菌培养
E. 抗血小板抗体检测
69. 正常分娩胎膜破裂的时间一般是
A. 临产期
B. 潜伏期
C. 活跃期
D. 第二产程
E. 第三产程
70. 学龄期儿童少尿的标准是每日尿量少
A. 50ml
B. 100ml
C. 200ml
D. 400ml
E. 500ml
71. 正常宫颈阴道部上皮为
A. 单层立方上皮
B. 单层柱状上皮
C. 复层柱状上皮
D. 复层鳞状上皮
E. 单层鳞状上皮
72. 绞窄性肠梗阻疼痛的性质
A. 锐痛
B. 钝痛
C. 胀痛
D. 持续性腹痛，阵发性加剧
E. 阵发性绞痛
73. 易发生乳腺癌的情况是
A. 42岁未孕
B. 45岁绝经
C. 14岁月经初潮
D. 30岁初次足月产
E. 生育后哺乳10个月
74. 采集24小时尿标本时，其正确的采集时间是
A. 早7:00至次晨7:00
B. 早9:00至次晨9:00
C. 早11:00至次日9:00
D. 晚7:00至次日晚7:00
E. 晚11:00至次日晚11:00
75. 某女性患者，24岁，贫血1年。血红蛋白80g/L，红细胞3×10¹²/L，网织红细胞0.007，白细胞、血小板正常。经口服铁剂治疗7天后，血红蛋白不升，网织红细胞为0.0143。最可能的诊断是
A. 溶血性贫血
B. 再生障碍性贫血
C. 巨幼红细胞性贫血
D. 缺铁性贫血
E. 脾功能亢进
76. 子宫的解剖结构正确的是
A. 位于盆腔下方

- B. 宫颈外口呈圆形
C. 宫腔容量为 2ml
D. 位于膀胱与直肠之间
E. 子宫峡部非孕状态下长约 3cm
77. 骨肉瘤的好发部位是
A. 股骨近端
B. 股骨远端
C. 胫骨远端
D. 腓骨远端
E. 胫骨远端
78. 肾病综合征患者尿中蛋白含量大多
A. <1g
B. 1~2g
C. 2~3g
D. 3~3.5g
E. >3.5g
79. 哮喘病人提示病情严重的表现是
A. 大汗淋漓
B. 张口呼吸
C. 咳血
D. 奇脉
E. 哮鸣音不明显
80. 在胎儿分娩过程中，贯穿于整个产程的是
A. 衔接
B. 下降
C. 俯屈
D. 仰伸
E. 内旋转
81. 患者，男性，35岁。近2个月来右腰部有隐痛、钝痛。今晨7时突然发作阵发性刀割样疼痛，向下腹及会阴部放射。患者辗转不安，呻吟呼痛，面色苍白，伴镜下血尿。此疼痛为
A. 心绞痛
B. 肠绞痛
C. 胆绞痛
D. 肾绞痛
E. 坐骨神经痛
82. 某原发性肝癌患者，突然出现腹部剧痛、
- 腹膜刺激征阳性，该患者可能并发了
A. 肝癌腹膜移位
B. 肝癌结节破裂
C. 急性胃穿孔
D. 急性胆囊炎
E. 急性胰腺炎
83. 昏迷病人口唇呈樱桃红色常提示
A. 一氧化碳中毒
B. 有机磷农药中毒
C. 脑溢血
D. 脑肿瘤
E. 安眠药中毒
84. 患者，男，34岁，因车祸致右下肢开放性骨折，大量出血，被送来急诊。在医生未到之前，接诊护士应立即
A. 详细询问车祸发生的原因
B. 向医院有关部门报告
C. 给患者注射镇静剂
D. 给患者使用止血药
E. 给患者止血，测量血压，建立静脉通道
85. 蛛网膜下腔出血患者不应出现
A. 频繁呕吐
B. 一过性意识障碍
C. 一侧肢体瘫痪
D. 脑膜刺激征
E. 剧烈头痛
86. 营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序是
A. 面颊—胸背—腹部—臀部—四肢
B. 胸背—腹部—臀部—四肢—面颊
C. 腹部—胸背—臀部—四肢—面颊
D. 臀部—四肢—面颊—胸背—腹部
E. 腹部—胸背—四肢—面颊—臀部
87. 空气栓塞导致患者死亡的原因是空气阻塞了
A. 上腔静脉入口
B. 肺动脉入口
C. 肺静脉入口
D. 下腔静脉入口
E. 主动脉入口

88. 病室冬季温度为
A. 18~20℃
B. 20~22℃
C. 16~18℃
D. 22~24℃
E. 20~24℃
89. 要发生心肌梗死，心肌缺血时间需达
A. 30分钟以上
B. 15分钟以上
C. 45分钟以上
D. 120分钟以上
E. 60分钟以上
90. 属于甲类传染病的是
A. 疟疾
B. 艾滋病
C. 乙肝
D. 霍乱
E. 黑热病
91. 护士小刘，误将10床患者的葡萄糖酸钙注射进了11床患者的静脉，注射后才发现错误，但患者并不知情，也未出现异常反应。此时小刘妥善的做法是
A. 无人知道，隐瞒不报
B. 立即向患者解释，取得患者谅解
C. 立即向护士长汇报
D. 立即向医师汇报
E. 立即向护理部汇报
92. 患者刚出院，对病床单元的处理下列哪项不妥
A. 撤下被服送洗
B. 床垫、棉胎置于日光下曝晒6小时
C. 痰杯、便盆浸泡于消毒液中
D. 病床单元用消毒液擦拭
E. 立即铺好备用床
93. 构成传染过程必备的三个因素是
A. 病原体、社会因素、自然因素
B. 病原体、人体和病原体所处的环境
C. 病原体的数量、致病力、特异性定位
D. 传染源、传播途径、易感人群
- E. 屏蔽作用、吞噬作用、体液作用
94. 患者，男性，68岁，肝硬化腹水，体质虚弱，生活不能自理。护士为患者做口腔护理时。应特别注意观察口腔有无
A. 糜烂
B. 烂苹果味
C. 臭鸡蛋味
D. 肝臭味
E. 腐臭味
95. 正确测量头围的方法是
A. 自枕后到额部中央绕头一周的长度
B. 自枕后沿两耳到眉间绕头一周的长度
C. 自枕后结节到眉间绕头一周的长度
D. 自眉弓上缘经枕后结节绕头一周的长度
E. 自眉弓上2cm处到枕后结节绕头一周的长度
96. 患者男，50岁，被诊断为胃癌晚期。患者常说“一定是误诊了，我要去北京大医院进一步检查”，提示患者处于心理反应的
A. 愤怒期
B. 协议期
C. 忧郁期
D. 接受期
E. 否认期
97. 患儿，8岁，右下肢外伤、铜绿假单胞菌感染。对其换药后的污染敷料，正确的处理是
A. 过氧乙酸浸泡后清洗
B. 高压灭菌后再清洗
C. 清洗后，煮沸消毒
D. 丢入污物桶，集中处理
E. 单独放置，送焚烧炉焚烧
98. 造成胎儿宫内生长发育迟缓最常见的原因是
A. 臀位
B. 胎盘早剥
C. 高龄初产
D. 妊娠高血压疾病
E. 经产妇

99. 中医的五脏是指心、肝、脾、肾和
- A. 胆
 - B. 小肠
 - C. 三焦
 - D. 胃
 - E. 肺
100. 患者男，35岁，不慎误服了4049（乐果），送入院就诊。患者神志清，为患者洗胃，最佳的洗胃液是
- A. 温开水
 - B. 2%~4%碳酸氢钠溶液
 - C. 生理盐水
 - D. 5%醋酸
 - E. 1:15000~1:20000高锰酸钾
101. 子痫患者最主要的死亡原因是
- A. 脑水肿
 - B. 脑溢血
 - C. 肾衰
 - D. 急性黄色肝萎缩
 - E. 循环衰竭
102. 患者刘先生，因高热行物理降温，物理降温后将所测得的体温绘制在体温单上，其表述正确的是
- A. 红圈，以红实线与降温前体温相连
 - B. 红圈，以红虚线与降温前体温相连
 - C. 红点，以红实线与降温前体温相连
 - D. 蓝圈，以红虚线与降温前体温相连
 - E. 蓝圈，以蓝虚线与降温前体温相连
103. 女，30岁，已婚。近几日感觉白带增多呈稀薄泡沫状，伴外阴瘙痒。首先应做的检查是
- A. 阴道分泌物悬滴检查
 - B. 宫颈涂片检查
 - C. 阴道镜检
 - D. 窥器检查
 - E. 双合诊检查
104. 慢性肺心病引起的心脏肥厚、扩大主要发生在
- A. 左心房
- B. 左心室
- C. 右心房
- D. 右心室
- E. 整个心脏
105. 中医的“五脏”是指
- A. 心、肝、脾、肺、肾
 - B. 肝、胆、脾、肺、肾
 - C. 心、脑、肝、肺、肾
 - D. 心、肝、肺、肾、胃
 - E. 胆、胃、大肠、小肠、膀胱
106. 有关心源性水肿发生机制错误的是
- A. 肾血流量减少
 - B. 继发性醛固酮增多
 - C. 毛细血管静水压增高
 - D. 组织液生成增多
 - E. 血浆胶体渗透压增高
107. 腹部实质性脏器损伤破裂的主要表现是
- A. 感染性休克
 - B. 急性腹膜炎
 - C. 急性肠梗阻
 - D. 膈下游离气体
 - E. 低血容量性休克
108. 患者，女性，18岁，四肢皮肤反复出现紫癜1年余。血小板明显减少，红、白细胞基本正常。应考虑为
- A. 白血病
 - B. DIC
 - C. 贫血
 - D. 特发性血小板减少性紫癜
 - E. 再生障碍性贫血
109. 蛛网膜下腔出血病人最突出的表现是
- A. 恶心、呕吐
 - B. 剧烈头痛
 - C. 烦躁不安
 - D. 意识障碍
 - E. 偏瘫失语
110. 接种卡介苗患者结核菌素反应硬结的特点是

- A. 直径 10~15mm
- B. 颜色呈深红色
- C. 质地较硬
- D. 边缘不清楚
- E. 反应持续 7~10 天

111. 患者，女性，69岁。高血压，间断服用降压药物，血压控制在(120~150)/(70~90) mmHg。今晨测血压 120/80mmHg。其健康教育的说法不正确的是
- A. 适当运动
 - B. 血压控制理想，可暂时停药
 - C. 服药后卧床片刻，防止直立性低血压
 - D. 低盐、低脂、低胆固醇饮食
 - E. 避免情绪激动

112. 老年男性尿路梗阻最常见的原因是
- A. 尿路结石
 - B. 尿路感染
 - C. 尿道损伤
 - D. 膀胱肿瘤
 - E. 前列腺增生

113. 林女士，足月自然产后 4 天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上 1 指，子宫体软，应考虑为
- A. 子宫肌炎
 - B. 盆腔结缔组织炎
 - C. 子宫内膜炎
 - D. 急性输卵管炎
 - E. 腹膜炎

114. 某破伤风患者，神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛、抽搐，所住病室环境下列哪项不符合病情要求
- A. 保持病室光线充足
 - B. 相对湿度 50%~60%
 - C. 门、椅脚钉橡皮垫
 - D. 开门、关门动作轻
 - E. 室温 18~20℃

115. 甲胎蛋白阳性可初步诊断
- A. 早期肝硬化
 - B. 肝肾综合征

- C. 原发性肝癌
- D. 肝转移癌
- E. 淋巴性肝炎

116. 患者，女性，76岁，肺癌，晨间护理时发现骶尾部出现水泡，下列问题中应优先解决的是
- A. 语言沟通障碍
 - B. 便秘
 - C. 清理呼吸道无效
 - D. 皮肤完整性受损
 - E. 营养失调

117. 患者女，65岁。做家务时心绞痛发作，即含硝酸甘油 0.5mg，2分钟后眼前发黑、恶心，此时，应协助其
- A. 行心电图检查
 - B. 清淡饮食
 - C. 活动四肢
 - D. 立即平卧
 - E. 再含硝酸甘油 0.3mg

118. 思维迟缓是
- A. 癔症的典型症状
 - B. 强迫症的典型症状
 - C. 抑郁症的典型症状
 - D. 恐怖症的典型症状
 - E. 精神分裂症的典型症状

119. 王女士昨天刚做了双下肢截肢手术。早上护士进病房时发现她躺在床上暗暗地流泪，此时护士的最佳反应应该是
- A. 悄悄离开病房
 - B. 询问同室患者
 - C. 静静地坐在床旁陪陪她
 - D. 试着让患者说出伤心的原因
 - E. 联系患者的家属，指导家属做好陪护

120. 诊断急性腹膜炎的可靠体征是
- A. 腹胀
 - B. 腹膜刺激征
 - C. 肝浊音界消失
 - D. 肠鸣音减弱
 - E. 移动性浊音

121. 胃壁细胞可分泌
- A. 胃蛋白酶原
 - B. 胃液
 - C. 胃蛋白酶
 - D. 盐酸和内因子
 - E. 胃泌素
122. 良性肿瘤的局部表现包括
- A. 无包膜
 - B. 形状规则
 - C. 质地硬
 - D. 肿块活动度小
 - E. 多发常见
123. 患者，22岁，女性。游泳运动员。因车祸双下肢截肢，术后患者常独自哭泣，护士判断该患者是哪一个层次的需要没有得到满足
- A. 生理的需要
 - B. 家庭支持的需要
 - C. 自我实现的需要
 - D. 尊重的需要
 - E. 爱与归属的需要
124. 轮椅护送患者时，护士操作正确的是
- A. 轮椅后背与床尾平齐
 - B. 翻起脚踏板，背向床头
 - C. 嘱患者尽量向前坐
 - D. 如无车闸，护士可站在轮椅前固定轮椅
125. 患者，男性，40岁。左前臂二度烧伤4天，局部创面湿润、疼痛。护士为了改善患者的局部状况，可在局部进行
- A. 红外线照射，每次20~30分钟
 - B. 冷湿敷，每次10~15分钟
 - C. 热湿敷，水温40~60℃，局部及周边涂凡士林，盖单层纱布
 - D. 放置冰袋，每次15分钟
 - E. 放置45~50℃热水袋，避免烫伤
- 【A3/A4题型】**
(126~129题共用题干)
- 女性，28岁。近日来发热，腰痛伴尿急、尿频、尿痛，查尿白细胞25个/HP。
126. 考虑可能是
- A. 急性肾炎
 - B. 慢性肾炎
 - C. 泌尿系感染
 - D. 急进性肾炎
 - E. 肾病综合征
127. 引起该患者发病的原因是
- A. 免疫缺陷
 - B. 细菌感染
 - C. 遗传因素
 - D. 过敏
 - E. 营养过剩
128. 护士告知该患者多饮水，其主要目的是
- A. 降低体温
 - B. 缓解尿频
 - C. 营养需要
 - D. 冲洗尿路
 - E. 治疗腰痛
129. 针对该疾病的预防，应重点告知病人
- A. 保持会阴部卫生
 - B. 长期锻炼
 - C. 加强营养
 - D. 常服抗生素
 - E. 戒烟酒
- (130~131题共用题干)
- 患者女性，46岁，由于下岗，对生活失去信心，同时不能照顾家庭，伴失眠，被诊断为“抑郁症”。
130. 不可能出现的症状是
- A. 兴趣缺乏
 - B. 睡眠障碍
 - C. 思维贫乏
 - D. 自责和厌世感
 - E. 言语动作迟缓
131. 护士在接诊患者时应注意的是
- A. 介绍医院专长
 - B. 护士自我介绍

- C. 直截了当的询问
- D. 让患者放松情绪
- E. 直接给出明确诊断

(132~133题共用题干)

患儿6岁，有食不洁食物史，高热6小时，呕吐2次，惊厥1次入院，体温40℃，面色苍白，四肢冷，脉细速，脑膜刺激征阴性，今日未排大便，7小时无尿。

132. 此患儿最可能的诊断是()

- A. 中毒型痢疾
- B. 爆发型流脑
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 败血症
- E. 中毒性肺炎

133. 为进一步确诊，应立即进行的检查是

- A. 血常规
- B. 脑电图
- C. 腰穿
- D. 头部CT

E. 粪便检查

(134~135题共用题干)

男，62岁，因患糖尿病而长期接受胰岛素治疗，尿糖基本控制在(+～++)。昨晚因多食后，今上午尿糖定性试验(+++)，自行增加了12U胰岛素，1小时后突然感到心悸、饥饿、出冷汗，随即昏迷，急送入院。

134. 为明确诊断，应立即进行的检查是

- A. 血糖检查
- B. 尿糖检查
- C. 血酮检查
- D. 尿酮检查
- E. 血pH值检查

135. 抢救上述患者，应立即给予

- A. 静脉注射500g/L葡萄糖
- B. 静脉滴注小剂量胰岛素
- C. 静脉推注氯化钾
- D. 静脉滴注50g/L碳酸氢钠100ml
- E. 静脉滴注复方氯化钠100ml

全国护士执业资格考试精准模拟卷（五）实践能力

1. 静脉输液发生空气栓塞时，造成患者死亡的原因是空气阻塞了
A. 肺动脉入口
B. 肺静脉入口
C. 主动脉入口
D. 上腔静脉入口
E. 下腔静脉入口
2. 衡量婴幼儿营养状况的体格发育指标是
A. 胸围
B. 牙齿
C. 身高
D. 体重
E. 头围
3. 肠梗阻患者的临床表现不包括
A. 腹痛
B. 腹胀
C. 腹泻
D. 呕吐
E. 肛门停止排气、排便
4. 骨质疏松最常见的症状是
A. 疼痛
B. 身长缩短
C. 骨折
D. 呼吸困难
E. 偏瘫
5. 关于沐浴法的叙述正确的是
A. 浴室温度在 20℃左右
B. 水温调节在 38~40℃
C. 应在餐后半小时进行
D. 浴室应闩门以保证安全
E. 创伤病人不宜淋浴
6. 不属于护理理论四个基本概念的是
A. 人
B. 健康
C. 保健
D. 环境
E. 护理
7. 焦虑性神经发作有 2 种形式，一种为广泛性焦虑障碍，另一种为
A. 畏惧症
B. 惊恐发作
C. 强迫症
D. 疑病症
E. 癔症
8. 不符合支气管扩张，临床表现的是
A. 反复咯血
B. 咳大量脓痰
C. 病变部位固定湿罗音
D. 病程多呈急性过程
E. 可有杵状指
9. 肺炎支原体肺炎治疗首选
A. 青霉素
B. 氨基糖苷类
C. 阿昔洛韦
D. 先锋霉素
E. 红霉素
10. 心力衰竭伴快速心房颤动时首选静脉使用的正性肌力药物是
A. 西地兰
B. 地高辛
C. 多巴胺
D. 氨力农
E. 多巴酚丁胺
11. 煮沸消毒时为提高沸点，可加入
A. 氯化铵
B. 亚硝酸钠
C. 碳酸钠
D. 碳酸氢钠
E. 碳酸铵
12. 对老年人运动的要求正确的是
A. 老年病人应停止活动
B. 可随意活动
C. 健康老年人可随意活动
D. 健康老年人运动前不用进行评估

- E. 老年病人根据身体状况选择活动
13. 患者男，15岁，胸部被撞约1小时入院。自觉胸痛，面色紫绀，呼吸急促。左胸部出现反常呼吸运动，最重要的护理评估内容是
A. 血压
B. 体温
C. 呼吸
D. 脉搏
E. 意识
14. 自发性气胸的治疗措施中首要的是
A. 消除病因
B. 防治感染
C. 预防复发
D. 预防并发症
E. 使肺尽早复张
15. 阿尔茨海默症患者的及时发现症状是
A. 妄想
B. 人格改变
C. 记忆障碍
D. 语言功能障碍
E. 空间技能障碍
16. 强调护患关系在护理中作用的理论是
A. 保健系统模式
B. 自理模式
C. 适应模式
D. 人际间关系模式
E. 人类基本需要层次论
17. 服用抗酸药物时应避免食用
A. 水果
B. 米饭
C. 牛奶
D. 面食
E. 鸡蛋
18. 患者女，52岁，诊断为高血压急症。医嘱速尿20mg IV。执行后患者出现乏力腹胀，肠鸣音减弱的症状。该患者可能发生了
A. 高钾血症
B. 低钾血症
C. 高钠血症
D. 低钠血症
E. 低氧血症
19. 患者男，60岁。肝硬化10年，近2日嗜睡，今晨测体温时呼之不应，但压迫其眶上神经有痛苦表情。该患者的意识状态为
A. 深昏迷
B. 昏睡
C. 嗜睡
D. 浅昏迷
E. 意识模糊
20. 直肠癌的早期症状是
A. 粘液血便
B. 排便困难，便条变细
C. 里急后重
D. 排便习惯改变
E. 腹胀、腹痛
21. 患者男，50岁。因前列腺增生症住院，行经尿道前列腺电切术治疗。术后健康教育措施中，错误的是
A. 进食高纤维食物
B. 多饮水
C. 尽早锻炼如跑步等
D. 进行盆底肌肉锻炼
E. 2个月后可行性生活
22. 测量血压的方法不正确的是
A. 测量前病人需休息片刻
B. 袖带松紧以能放入一指为宜
C. 袖带下缘应距肘窝2~3cm
D. 听诊器胸件置于肘横纹下2cm处
E. 放气以每秒0.5kPa的速度使汞柱缓慢下降
23. 以人为中心，以护理程序为基础，现代护理观为指南，对人实施从生理心理和社会各个方面的护理，从而使达到最佳健康状况的护理是
A. 个案护理
B. 功能制护理
C. 小组护理
D. 责任制护理

E. 整体护理

24. 进入第二产程的标志是

- A. 宫口开全
- B. 胎头拔露
- C. 胎头着冠
- D. 胎膜已破
- E. 外阴膨隆

25. 患者女，30岁。分娩后2周发生阴道大量出血入院，护士对患者进行健康评估时，与病情最不相关的是

- A. 了解患者的分娩史
- B. 评估患者的血压、脉搏、呼吸、神志情况
- C. 观察患者阴道出血量
- D. 了解宫底的大小及有无压痛
- E. 母乳喂养情况

26. 慢性心功能衰竭患者经保守治疗，病情好转出院。患者做出以下哪项陈述证明其还没有充分了解出院指导

- A. “如果我睡不好觉，只能坐起来才能睡着我应当来复诊”
- B. “如果我呼吸越来越短，越来越急，应当来复诊”
- C. “如果我饮食没变化，但体重越来越轻，我应当来复诊”
- D. “如果我把开的药都吃完了，病情没变化，就来复诊继续开药”
- E. “如果我咳嗽、发烧，应当先把剩下的维生素吃掉，然后来复诊”

27. 遇有机物时放出新生氧气，能抗菌除臭的漱口溶液是

- A. 1%~3%过氧化氢
- B. 2%~3%硼酸
- C. 0.1%醋酸
- D. 0.02%呋喃西林
- E. 复方硼酸

28. 在住院处办理完入院手续后，可免去沐浴的病人是

- A. 左心衰竭
- B. 风湿性关节炎

C. 高血压一期

- D. 慢性支气管炎
- E. 胆结石待手术

29. 患者男，45岁。以胰腺癌收入院，查体，皮肤巩膜黄染。患者诉全身瘙痒，给予的护理措施不包括

- A. 协助患者抓挠减轻瘙痒
- B. 涂抹止痒药物
- C. 用温水毛巾擦拭
- D. 剪除患者指甲
- E. 注意观察患者皮肤情况

30. 急性有机磷农药中毒患者使用胆碱酯酶复能剂的原则，正确的是

- A. 应该尽量地少用
- B. 应该尽早地使用
- C. 不与阿托品合用
- D. 只用于轻度中毒
- E. 只用于重度中毒

31. 患者男，5岁。摔倒后左肘疼痛送来急诊。分诊护士判断该患者发生骨折的最重要的依据是

- A. 左上臂疼痛
- B. 局部肿胀
- C. 左上臂畸形
- D. 局部压痛
- E. 肘关节

32. 高血压的防范健康教育对象是

- A. 学龄期儿童
- B. 中老年人群
- C. 高血压病高危人群
- D. 高血压病人
- E. 全人群

33. 健康足月新生儿生后第二天，对其脐部的护理错误的是

- A. 勤换尿布，衣物柔软
- B. 脐部保持清洁、干燥
- C. 接触新生儿前后要洗手
- D. 严格执行无菌操作技术
- E. 用3%过氧化氢液清洗脐部

34. 患者女，63岁。因右下肢静脉曲张行大隐静脉高位结扎剥脱术。术后护士指导其使用弹力绷带的正确方法是
A. 包扎前应下垂患肢
B. 手术部位的弹力绷带应缠绕的更紧
C. 两圈弹力绷带之间不能重叠
D. 由近心端向远心端包扎
E. 包扎后应扪及足背动脉搏动
35. 支气管哮喘的主要临床表现是
A. 吸气性呼吸困难伴三凹征
B. 发作性呼吸困难伴窒息感
C. 反复发作带哮鸣音的呼气性呼吸困难
D. 带哮鸣音的混合性呼吸困难
E. 呼吸困难伴哮鸣音
36. 现代护理学形成过程中经历的第一个阶段是
A. 以疾病为中心
B. 以病人为中心
C. 以健康为中心
D. 以保健为中心
E. 以预防为中心
37. 患者男，48岁。诊断为颅内肿瘤入院。患者有颅内高压症状，护士给予患者床头抬高15—30度，其主要目的是
A. 有利于改善心脏功能
B. 有利于改善呼吸功能
C. 有利于颅内静脉回流
D. 有利于鼻饲
E. 防止呕吐物误入呼吸道
38. 患者男，36岁。胃溃疡5年，规律用药但依然反复发作。护士在收集资料时发现患者饮食极不规律，常暴饮暴食，每日饮酒量约500ML。在进行健康指导时应着重给患者讲解的是
A. 药物的不良反应
B. 胃溃疡的并发症
C. 合理饮食的重要性
D. 胃溃疡的发病机制
E. 保持情绪稳定的重要性
39. 急性胰腺炎患者禁用的药物是
A. 654-2
B. 阿托品
C. 哌替啶
D. 施他宁
E. 吗啡
40. 新生儿室的室温应保持在
A. 18℃—20℃
B. 20℃—22℃
C. 22℃—24℃
D. 24℃—26℃
E. 28℃—30℃
41. 患者女，28岁。乏力、心悸、头晕2个月就诊。患者面色苍白，皮肤干燥。医嘱血常规检查。护士在解释该检查项目的目的正确说法是
A. 检查是否有感染
B. 检查是否有出凝血功能障碍
C. 检查是否有贫血及其程度
D. 检查肝功能是否有损害
E. 检查肾脏功能是否有损害
42. 消化性溃疡患者服用铝碳酸镁片的正确方法是
A. 温水吞服
B. 咀嚼后服用
C. 餐后俩小时服用
D. 餐前服用
E. 餐后服用
43. 对无并发症的急性腮腺炎患儿，正确的隔离方式是
A. 保护性隔离
B. 接触隔离
C. 血液隔离
D. 消化道隔离
E. 家中隔离
44. 患者男，62岁。2年前行“人工瓣膜置换术”，术后遵医嘱服用华法林。护士建议该患者日常生活中使用电动剃须刀剃须，主要目的是
A. 避免出血

- B. 避免损伤皮肤引发感染性心内膜炎
C. 避免交叉感染
D. 方便老年人使用
E. 经济实用
45. 患者女，36岁孕妇。产前检查漏斗骨盆。现足月妊娠，胎膜早破来诊。查体：胎头入盆。医嘱：入院行各项检查，拟次日行剖宫产术。护士对其进行健康教育，不正确的内容是
A. 讲明产道异常对母儿的影响
B. 说明剖宫产的必要性
C. 解释剖宫产术前、术后注意事项
D. 嘱其保持会阴清洁
E. 鼓励术前适当下床活动
46. 在浅表性炎症后期用热的目的是
A. 收缩毛细血管，减轻充血和出血
B. 减少脑细胞耗氧，利于脑细胞功能恢复
C. 放松肌肉、韧带等组织，解除疼痛
D. 促使白细胞释放蛋白溶解酶，溶解坏死组织
E. 降低毛细血管通透性，减轻组织对神经末梢的压迫
47. 对病人进行思想、情感、动机、精神状态、人格类型、应激水平的评估属于
A. 心理评估
B. 病理评估
C. 认识评估
D. 感知评估
E. 社会评估
48. 孕妇产前检查时发现胎儿臀位，需要给予胎位矫正。护士应告知其最佳的干预时间是
A. 孕8周
B. 孕16周
C. 孕24周
D. 孕30周
E. 孕36周
49. 腋性指头炎典型的临床表现是
A. 手指发麻
B. 搏动性跳痛
C. 寒战、发热
D. 晚期疼痛加剧
- E. 晚期指头明显发红、肿胀
50. 患者男，62岁。诊断2型糖尿病坚持口服降糖药治疗，血糖控制较好。患者拟计划春游，出发前血糖低于哪个值时应注意低血糖
A. 3.9mmol/L
B. 4.9 mmol/L
C. 5.9 mmol/L
D. 6.9 mmol/L
E. 7.9 mmol/L
51. 肝硬化腹水患者每日摄盐量宜控制在
A. 1.2—2.0g
B. 2.5—3.0g
C. 3.5—4.0g
D. 4.5—5.0
E. 5.5—6.0
52. 患者男，38岁，胃穿孔合并腹膜炎手术后第7天，体温39度，伤口无红肿，大便次数频多，有粘液，伴里急后重，该患者可能并发了
A. 肠炎
B. 肠粘连
C. 盆腔脓肿
D. 脐下脓肿
E. 细菌性痢疾
53. 患者因焦虑入院，每天晚上总是躺在床上翻来覆去睡不着觉，一直到凌晨1点，患者表现属于睡眠障碍的那一种
A. 入睡困难
B. 时醒时睡
C. 夜不眠
D. 浅睡眠
E. 正常
54. 孕妇，孕30周，臀先露，为矫正胎位，可采取的体位是
A. 膝胸卧位
B. 半卧位
C. 左侧卧位
D. 膀胱结石位
E. 俯卧位

55. 8个月男婴，在社区准备接种麻疹疫苗，护士在为其消毒时，应采用的消毒剂是
- A. 2%碘酊
 - B. 0.5%碘伏
 - C. 0.9%生理盐水
 - D. 75%乙醇
 - E. 90%乙醇
56. 急性肾小球肾炎初起常见的症状是
- A. 水肿
 - B. 少尿
 - C. 蛋白尿
 - D. 尿沉渣有白细胞
 - E. 血尿
57. 患者男，45岁。患支气管扩张症，间断咳嗽，近日因受凉咳大量黄色浓痰，入院治疗，医嘱体位引流。护士指导患者体位引流时，错误的是
- A. 在饭后1小时进行。
 - B. 引流前做生理盐水超声雾化
 - C. 引流同时行胸部叩击
 - D. 引流后可给治疗性雾化吸入
 - D. 每次引流15~20分钟
58. 患者女，29岁，口服安定100片，家人发现时呼之不应，意识昏迷，急诊来医院，错误的护理措施是
- A. 立即洗胃
 - B. 立即催吐
 - C. 硫酸镁导泻
 - D. 0.9生理盐水洗胃
 - E. 监测生命体征
59. 患儿5岁，在门诊诊断为“房间隔缺损”，拟择期手术治疗。门诊护士对家属的健康教育要点，错误的是
- A. 本病为一种先天性心脏病
 - B. 经过治疗，大多数情况下，预后良好
 - C. 治疗方案以手术为主
 - D. 术前最重要的是防止皮肤破损
 - E. 术前注意保暖，避免着凉，感冒
60. 溃疡性结肠炎的好发部位
- A. 升结肠
 - B. 横结肠
 - C. 降结肠
 - D. 乙状结肠
 - E. 盲肠
61. 患者女，32岁。因“乏力、纳差5天，尿黄1天”来诊，经实验室检查诊断为急性病毒性肝炎（甲型）。对于其5岁的儿子，适宜的做法是
- A. 不需要采取任何措施
 - B. 预防性服用抗病毒药物
 - C. 进行相关检查，若未感染可不做处理
 - D. 进行相关检查，若未感染可注射人丙球蛋白
 - E. 进行相关检查，若未感染可注射高价特异性免疫球蛋白
62. 脑外伤开颅术后1天应采取的体位是
- A. 头高足低位
 - B. 去枕仰卧位
 - C. 半坐卧位
 - D. 侧卧位
 - E. 头低足高位
63. 长期静脉输入脂肪乳、氨基酸患者，易发生静脉炎，其症状不包括
- A. 局部发红、肿胀
 - B. 沿静脉走向出现条索状红线
 - C. 头痛、恶心、呕吐
 - D. 局部灼热、疼痛
 - E. 畏寒、发热
64. 分散注意力方法减轻患者疼痛，以下不属于该方法的是
- A. 给患儿糖果、玩具
 - B. 减弱呼吸
 - C. 听优美旋律
 - D. 松弛疗法
 - E. 唱歌
65. 患者，男性，56岁，肝硬化。自述乏力、食欲缺乏。体检：神志清楚，消瘦，轻度黄疸，腹部移动性浊音(+)。x线餐检查提示胃底食管静脉曲张。护士为患者制定的饮食计划不应包

括

- A. 高蛋白饮食
- B. 适量脂肪饮食
- C. 高热量饮食
- D. 低盐饮食，适当限水
- E. 高纤维素、粗粮饮食，以保证大便通畅

66. 下列不属于护理诊断的是

- A. 潜在并发症：出血
- B. 体温过高：与肺部感染有关
- C. 有受伤的危险：与头晕有关
- D. 便秘：与进食粗纤维食物少有关
- E. 知识缺乏：缺乏冠心病居家自我护理的知识

67. 昏迷病人从急诊室被送入病室后值班护士首先应

- A. 填写各种卡片
- B. 通知医生、配合抢救、测量生命体征
- C. 询问病史，评估发病过程
- D. 通知营养室，准备膳食
- E. 介绍医院环境

68. 患者女，60岁，肝硬化10年，大量腹水，深昏迷急诊平车入院，该患者应该选择的体位是

- A. 中凹卧位，头偏向一侧
- B. 平卧位，头下加枕
- C. 侧卧位，膝下给枕
- D. 左侧卧位，头下加枕
- E. 侧卧位，头偏向一侧

69. 患者男，62岁，心绞痛两年，4小时前出现胸骨中段剧烈疼痛，舌下含服硝酸甘油不能缓解，查体：心率增强，心尖部可闻及舒张期奔马律，心电图ST段抬高，这患者的检查结果可能出现

- A. 血糖减低
- B. 白细胞减少
- C. 血清心肌酶升高
- D. C反应蛋白降低
- E. 红细胞沉降率正常

70. 子宫内膜异位症患者的典型症状是

- A. 撕裂样疼痛

B. 转移性腹痛

- C. 继发性渐进性痛经
- D. 脐周疼痛
- E. 牵拉性疼痛

71. 患者女，72岁。患帕金森病5年。随诊中患者表示现在多以碎步，前冲动作行走，并对此感到害怕。患者进行行走训练时，护士应提醒患者避免

- A. 思想尽量放松
- B. 尽量跨大步
- C. 脚步尽量抬高
- D. 双臂尽量摆动
- E. 将注意力集中与地面

72. 可能造成睡眠障碍的因素不包括

- A. 急性应激性反应
- B. 饮用浓咖啡
- C. 过度担心失眠
- D. 睡前进食过多
- E. 安静环境

73. 患儿女，3个月。因发热、咳嗽3天病情加剧来诊。查体：患儿烦躁不安，气促，T 39℃，P 180次/分，R 50次/分，肺部可闻及较多细湿啰音，心音低钝，肝肋下3cm。该患儿的护理措施错误的是

- A. 面罩给氧
- B. 置患儿于半卧位
- C. 避免各种刺激
- D. 加快输液速度
- E. 备好抢救用品

74. 患者男性，发现腹部包块三年，实验室检查外周血细胞成分与骨髓相似，该患者可能患有

- A. 单核细胞增多症
- B. 慢性粒细胞白血病
- C. 多发性骨髓瘤
- D. 慢性淋巴细胞白血病
- E. 急性早幼粒细胞白血病

75. 患者男，45岁。无诱因突发四肢抽搐，呼吸急促，面色发绀，两眼上翻，口吐白沫，呼

之不应。症状持续 3 分钟后，抽搐停止但仍昏迷。家属急送医院救治，查体时患者再次出现类似发作。此时的做法不恰当的是

- A. 解开患者的衣领，衣扣和腰带
- B. 患者的头部侧向一边
- C. 患者的上下臼齿间放压舌板
- D. 控制患者的肢体以制止抽搐
- E. 安定静脉推注

76. 原发性高血压的发病相关因素中无正确的是

- A. 体重超重
- B. 长期饮酒
- C. 低盐饮食
- D. 遗传
- E. 长期精神紧张

77. 胰腺癌好发部位是

- A. 胰头
- B. 胰尾
- C. 胰体
- D. 全胰腺
- E. 胰体尾部

78. 流行性腮腺炎的潜伏期平均为

- A. 6 天
- B. 9 天
- C. 12 天
- D. 15 天
- E. 18 天

79. 关于新生儿黄疸健康教育的叙述，错误的是

- A. 保管患儿衣物时勿放入樟脑丸
- B. 保持患儿大便通畅
- C. 母乳性黄疸的患儿需中断母乳喂养
- D. 红细胞 G6PD 缺陷的患儿，忌食蚕豆
- E. 有后遗症的患儿，给予康复治疗和功能锻炼

80. 心肺复苏时首选的给药途径是

- A. 中心静脉输注
- B. 气管内注射
- C. 心内注射
- D. 外周静脉输注

E. 骨髓腔注射

81. 急性水中毒患者的治疗应该立即快速输入

- A. 葡萄糖
- B. 甘露醇
- C. 等渗盐水
- D. 低渗盐水
- E. 高渗盐水

82. 关于心绞痛疼痛特点的描述错误的是

- A. 阵发性疼痛、胸骨后疼痛
- B. 劳累或情绪激动时发作
- C. 可放射至心前区、左上肢
- D. 持续时间长、像针刺刀扎样痛
- E. 持续数分钟，为压榨性疼痛

83. 患者男，37岁。因胆石症行胆囊切除术，胆总管切除术，术后放置 T 管。护士向患者家长解释时。应说明使用 T 管的首要目的是

- A. 引流胆汁和减压
- B. 促进伤口引流
- C. 提供冲洗胆道的途径
- D. 阻止胆汁进入腹膜腔
- E. 将胆汁进入十二指肠的量减至最少

84. 3岁幼儿，未患过水痘。现该幼儿班级里出现水痘患儿。该幼儿应在家中隔离观察的时间是

- A. 1 周
- B. 2 周
- C. 3 周
- D. 4 周
- E. 5 周

85. 患儿男，3岁。因化脓性脑膜炎入院。脓液细菌培养显示为脑膜炎双球菌感染。进行抗菌治疗首选的抗菌素是

- A. 青霉素
- B. 阿奇霉素
- C. 庆大霉素
- D. 链霉素
- E. 红霉素

86. 患者男，68岁。行胰头十二指肠切除术。

- 术后4小时，患者变换卧位5分钟内，患者腹腔引流管大量红色血性液体。正确的措施是
- A. 保持原卧位
 - B. 持续吸引负压，促进引流
 - C. 密切观察生命体征，报告医生
 - D. 加快输液输血速度
 - E. 夹闭引流管，暂停引流
87. 心脏骤停最常见的原因是
- A. 严重的电解质紊乱。
 - B. 三碱平衡失调。
 - C. 药物中毒或过敏。
 - D. 冠心病
 - E. 手术或麻醉意外
88. 扩张型心肌病的主要体征是
- A. 听诊心脏杂音
 - B. 叩诊心界扩大
 - C. 咳粉红色泡沫样痰
 - D. 心率增快
 - E. 出现心律失常
89. 慢性左心功能不全患者的主要临床表现是
- A. 咳嗽
 - B. 心悸
 - C. 下肢水肿
 - D. 肝脏肿大
 - E. 呼吸困难
90. 患者男，40岁。因脑外伤住院。住院后患者出现脑疝征兆，立即输入200ml甘露醇治疗，其目的是
- A. 降低血压
 - B. 升高血压
 - C. 降低颅内压
 - D. 升高颅内压
 - E. 增加血容量
91. 患者男，19岁。车祸致伤，急诊。神志朦胧、咯血、口鼻均有血外溢，呼吸困难、烦躁不安。皮肤严重擦伤，肿胀，心率98次/分，血压120/90mmHg，左大腿中下段有瘀斑和严重擦伤。此时最重要的护理措施是
- A. 请胸外科医师会诊处理
- B. 清除上呼吸道异物，保持呼吸通畅
- C. 开放静脉通道，输血
- D. 鼻导管低流量吸氧
- E. 立即手术
92. 我国慢性肾衰的首要病因是
- A. 肾小球肾炎
 - B. 糖尿病肾病
 - C. 高血压肾病
 - D. 多囊肾
 - E. 梗阻性肾病
93. 麻痹性肠梗阻的特点为
- A. 腹痛不明显，肠鸣音亢进。
 - B. 腹胀显著，呕吐成溢出性
 - C. 腹胀明显，并阵发性剧痛
 - D. 腹胀明显，肠鸣音减弱或消失
 - E. 可见胃肠型及蠕动波
94. 急性上呼吸道感染的患者出现咽痛加重伴声音嘶哑征对咽痛声音嘶哑给予的最恰当的护理措施是
- A. 适当休息
 - B. 保持室内空气流通
 - C. 维持水电瓶横
 - D. 给予雾化吸入
 - E. 对患者进行隔离
95. 处理支气管扩张大咯血的重要措施是
- A. 保持呼吸道通畅
 - B. 静脉输血
 - C. 给予抗生素
 - D. 肌注镇静剂
 - E. 口服止咳药
96. 肺炎时可以减轻胸痛的最常用的体位是
- A. 患侧卧位
 - B. 仰卧位
 - C. 端坐位
 - D. 健侧卧位
 - E. 俯卧位
97. 护士配合医生进行心包穿刺操作时，正确的是

- A. 术前嘱患者禁食 2-3 小时
B. 术前准备阿托品
C. 第一次可抽液 350ml 以上
D. 抽液中禁止夹闭胶管
E. 术后待心包引流液小于 50ml/d 时可拔管
98. 患者男，45岁。直肠癌行根治术（Miles术）后，造口周围皮肤保护的健康指导不包括
A. 擦干后涂上锌氧油
B. 注意有无红、肿、破溃
C. 及时清洁皮肤
D. 常规使用乙醇清洁
E. 防止粪水浸渍
99. 26岁孕妇，妊娠足月，入院待产。夜间呼唤护士，自述感觉胎动过频。此时最不恰当的处理是
A. 立即听胎心音
B. 通知值班医生
C. 吸氧
D. 左侧卧位
E. 立即做剖腹产准备
100. 患儿 7 个月，腹泻。排黄绿色稀薄样便 2 天，每日 4-5 次，精神状态好，为预防脱水给口服补盐液（ORS），其张力是
A. 1/5 张
B. 1/4 张
C. 1/3 张
D. 1/2 张
E. 2/3 张
101. 患者女性，住院期间活动后反复发生心绞痛，给予硝酸甘油静脉泵入，用药后出现面部潮红、头胀痛、头昏、心动过速，正确的处理方法是
A. 立即停止用药
B. 嘱患者平卧一段时间
C. 给予抗过敏治疗
D. 适当限制活动
E. 舌下含服硝酸甘油
102. 对尿路感染患者的健康教育中，错误的是
A. 鼓励患者多饮水
- B. 长期预防性服用抗生素
C. 及时治疗尿路结石
D. 及时治疗尿路损伤
E. 保持会阴部清洁
103. 患者，男性，68岁，肺炎/高热、呼吸困难，咳大量脓臭痰，每日约 60ml，胸片提示右胸下部大片暗影，胸腔穿刺抽出脓液后脓液未见减少，其治疗方法是
A. 锁骨中线第 2 肋骨间隙闭式引流
B. 胸腋后线第 6 肋骨间隙闭式引流
C. 抗生素治疗
D. 胸腔穿刺抽脓
E. 开胸手术
104. 患者男，45岁，患有支气管哮喘史 20 余年，每年急性发作数次，经用药治疗后可以缓解。患者在与护士交流时询问：由于自觉症状消失后即停止服药，因此下次发作时是否可以先自行服用上次剩余的药物？护士首先要向患者说明的是
A. 应每天定时口服支气管扩张剂
B. 需认识到要长期规范治疗哮喘，不得自行停药
C. 鼓励多做运动，锻炼身体
D. 应当寻求医生帮助，及时解决用药问题
E. 应当寻找发病原因，避免复发，以减少用药
105. 怀疑急性胰腺炎时，首选的检查项目是
A. 血钾
B. 血肌酐
C. 血淀粉酶
D. 血尿酸
106. 急性胃炎并发大出血时，进行纤维胃镜检查的时间是
A. 0-12 小时内 B. 12-24 小时内
C. 24-48 小时内 D. 48 小时以后
E. 出血停止后
107. 预防风湿性心瓣膜病的根本措施是
A. 长期服用抗风湿药物
B. 积极防治链球菌感染
C. 防止复发，卧床休息

- D. 增加营养，避免过劳
E. 居室要防寒避湿
108. 不属于食管癌中晚期典型症状的是
A. 滴水难进
B. 进食时呛咳
C. 胸骨后烧灼样疼痛
D. 胸痛，声音嘶哑
E. 食管气管瘘
109. 护理法洛四联症患儿时，增加水分的主要目的是
A. 预防形成脑血栓
B. 预防并发肺感染
C. 预防并发亚急性细菌性心内膜炎
D. 预防心力衰竭
E. 预防中枢神经系统感染
110. 患者男，20岁，因工程塌方被石板压迫4小时，伤肢严重缺血坏死。该损伤属于
A. 扭伤
B. 挤压伤
C. 挫伤
D. 冲击伤
E. 撕裂伤
111. 患者男，68岁。被人搀扶步行入医院，分诊护士见其面色苍白，呼吸困难，家属称其“肺心病又发作”，需立即对其进行的处理是
A. 为患者挂号
B. 不作处理，等待医生到来
C. 吸氧、测量血压
D. 扣背
E. 让患者去枕平卧于平车上
112. 肾癌的典型症状为
A. 血尿、肿块、膀胱刺激症状
B. 血尿、疼痛、膀胱刺激症状
C. 血尿、肿块、疼痛
D. 血尿、排尿困难
E. 疼痛、排尿困难
113. 患者男，58岁。行动不便。3天来反复上腹痛，进餐后发作或加重，伴反酸嗳气。电话咨询社区护士其应进行哪项检查，社区护士的建议是
A. 腹部平片 B. B超
C. CT D. 胃镜
E. MRI
114. 护士准备按医嘱给患者注射西地兰0.1mg，西地兰针剂的剂量是0.4mg/2ml。护士应该注射的毫升数是
A. 0.1ml B. 0.2ml
C. 0.3ml C. 0.4ml
E. 0.5ml
115. 原发性醛固酮增多症的临床特征为
A. 高血压、高肾素血症
B. 高血压、高血钾和高肾素血症
C. 高血压、低血钾和低肾素血症
D. 低血压、低血钾
E. 低血压、高血钾
- 【A3/A4型题】**
(116-117共用题干)
新生儿女，出生第5天，因全身冰冷、拒奶24小时入院。查体T35℃，反应差，皮肤暗红色，心音低钝，双小腿皮肤如硬橡皮样。脐带已脱落。
116. 最可能的诊断是
A. 新生儿水肿
B. 新生儿红斑
C. 新生儿寒冷损伤综合征
D. 新生儿败血症
E. 新生儿皮下坏疽
117. 应首先采取的护理措施是
A. 指导母乳喂养
B. 复温
C. 加强脐部护理
D. 给氧气吸入
E. 遵医嘱用抗生素
- (118-119共用题干)
患者男，50岁。因“神志不清、行为异常5天，昏迷1天”入院，既往有肝硬化病史8年。

入院查体：呼之不应，压眶反射无反应。皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查：血氨 145μg/dl。脑电图显示脑电波每秒 3 次。诊断为肝硬化、肝性脑病。

118. 患者入院后制定的护理措施不恰当的是
- A. 取仰卧位，头偏向一侧
 - B. 鼻饲 25% 葡萄糖供给热量
 - C. 如有便秘及时用肥皂水灌肠
 - D. 每日入液量以尿量增加 1000ml 为准
 - E. 必要时使用约束带

119. 患者经治疗后好转，神志清楚，此时适宜的饮食是
- A. 绝对禁食蛋白质饮食
 - B. 限制碳水化合物的摄入
 - C. 逐步增加蛋白质饮食，以植物蛋白为主
 - D. 高糖饮食
 - E. 普食

(120-121 题共用题干)

患者，男性，80 岁，有慢性支气管炎病史 20 年，一周前受凉后再次出现咳嗽、咳痰、痰白质粘稠，伴有呼吸困难、胸闷、乏力，以慢性阻塞性肺疾病入院治疗。

120. 入院后，患者出现口唇发绀，呈端坐呼吸，护理人员应重点监测
- A. 24 小时尿量
 - B. 意识状态
 - C. 血电解质
 - D. 呼吸的频率节律及深度
 - E. 血压脉搏

121. 如果患者病情进一步发展，呼吸困难加重，脓痰不易咳出，护士为患者提供了一系列有效护理措施，以保持呼吸道通畅，但其中不正确的是
- A. 胸部叩击时，嘱患者侧卧位，在餐后 2 小时至餐前 30 分钟完成
 - B. 雾化吸入一般 10-20 分钟，激素类药物吸入后指导患者漱口
 - C. 吸痰前给予患者高浓度氧气，每次吸引时间不超过 15 秒

- D. 遵医嘱应用支气管扩张剂
- E. 鼓励患者多饮水

(122-123 共用题干)

患者男，35 岁，因失眠、乏力、少语 1 个月，加重 2 周来院就诊，查体：意识清醒、精神疲惫、消瘦、语音低、情绪不稳，诉“不想活了”。诊断为抑郁症。

122. 评估该患者时首先要注意的问题是
- A. 机体的营养状况
 - B. 认知与感知状况
 - C. 有无自伤自杀行为
 - D. 睡眠与休息状况
 - E. 注意安慰开导

123. 针对患者首要的心理护理是
- A. 鼓励患者抒发自己的内心情感
 - B. 激发患者积极情绪
 - C. 鼓励患者学习新的应对技巧
 - D. 与患者建立良好的护患关系
 - E. 劝阻患者的自杀想法

(124-126 共用题干)

患者男，41 岁。体重 82kg。因车祸致 T1-4 骨折。四肢瘫痪，呼吸困难，对自己的病情非常担心。

124. 导致呼吸困难的主要原因是
- A. 腹胀导致膈肌上移
 - B. 肺栓塞
 - C. 呼吸机麻痹
 - D. 痰液分泌过多堵塞气道
 - E. 血块压迫气道

125. 搬运患者的方法是

- A. 单人背起患者搬运
- B. 单人抱起患者搬运
- C. 二人搬运，其中一人抬肩一人抬脚
- D. 三人搬运，其中二人平托患者躯干部，一人抬脚
- E. 四人搬运，其中三人将患者平托到木板上，一人固定头面部

126. 在与患者的沟通中，会对患者的心理产生不良影响的是

- A. 向患者介绍脊髓损伤的手术并发症
- B. 指导患者进行功能锻炼
- C. 安排康复较好的患者与其交流
- D. 建议患者听柔和的音乐放松心情
- E. 与患者共同探讨缓解症状的护理方案

(127-128 共用题干)

患者男，72岁。1个月前因急性脑梗死致左侧肢体偏瘫入院，2周前出院。社区护士对患者进行访视，发现患者目前意识清晰，血压维持在145/95mmHg左右。左侧肢体偏瘫，右侧肢体肌力良好，皮肤弹性好。语言表达部分障碍。目前久卧床，可在床上独立进餐，现由老伴照料。

127. 社区护士对该患者及家属进行健康教育时，目前教育内容的侧重点是

- A. 家庭消毒隔离知识
- B. 脑梗死的预防
- C. 传染性疾病及老年常见病的预防
- D. 患肢康复锻炼
- E. 死亡教育

128. 首选的健康教育形式是

- A. 发放视频教育光盘
- B. 推荐相关健康教育网站

C. 组织社区病友座谈会

- D. 对其进行个别教育
- E. 提供宣传册

(129-130 共用题干)

患者女，25岁。患风湿性心瓣膜病，不明原因持续发热1月余，体温波动在37.5-38.5℃之间，应用多种抗生素治疗无效，今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。

129. 现遵医嘱行血培养检查。抽取血培养标本时间的选择，正确的是

- A. 第1日间隔1h采血，共3次，体温升高时采血
- B. 第1日间隔1h采血，共3次，不需体温升高时采血
- C. 第1日间隔1h采血，共3次，寒战升高时采血
- D. 入院3小时内采血，间隔1h/次
- E. 停用抗生素2-7天后采血，体温升高时采血

130. 入院后心脏彩超检查示二尖瓣有大小为10mm*10mm赘生物，护士最应预防和关注的

- A. 心力衰竭 B. 肺部感染
- C. 动脉栓塞 D. 出血
- E. 深静脉血栓

答案及解析

专业实务（一）答案

- 1.A【解析】股静脉注射法：目的用于抢救危重病人时。定位：股三角区。髂前上棘和耻骨结节连线的中点与股动脉相交，股动脉内侧0.5cm处，即为股静脉。
- 2.C【解析】血培养标本：一般血培养取血5ml；亚急性细菌性心内膜炎病人，应取血10~15ml，以提高细菌培养阳性率，已用抗生素应在检测单上注明。采血培养标本尽可能在使用抗生素前或寒战时采血。
- 3.B【解析】咽拭子标本采集：采集真菌培养标本，应在口腔溃疡面上采取分泌物。一般用无菌棉签擦拭两侧腭弓和咽、扁桃体的分泌物。
- 4.B【解析】无痛注射原则的是：分散病人注意力、体位舒适放松肌肉、注射时两快一慢、注射刺激性强的药物进针要深。
- 5.E【解析】皮下注射法的目的：1.用于各种药物过敏实验。2.用于预防接种。3.是局麻的先驱步骤。
- 6.B【解析】肝硬化的饮食护理中高钠饮食尽量少食用；可给予高热量、高蛋白、高维生素、易消化的食物；若肝功能损害显著或有肝性脑病先兆者、血氨偏高者应限制或禁食蛋白质，待病情好转后，可进食植物蛋白。
- 7.B【解析】病毒性心肌炎致病菌以肠道和呼吸病毒感染较常见，尤其是柯萨奇病毒B。
- 8.E【解析】选项中，可以预防感染的是抗生素。
- 9.E【解析】利多卡因是阻滞钠通道的拮抗剂。
- 10.E【解析】《人体器官移植条例》明确规定活体器官接受人必须与活体器官捐赠人之间有特定的法律关系，即配偶关系、直系血亲或者三代以内旁系血亲关系，或者有证据证明与活体器官捐赠人存在因帮扶等形成了亲情关系。
- 11.E【解析】不管患者是何种身份，我们都要给予平等的治疗与服务。
- 12.D【解析】烧伤的患者需要保护性隔离，烧伤后的患者机体抵抗力低下，容易并发感染，所以需要保护。
- 13.A【解析】应当由远心端向近心端挤压。
- 14.A【解析】只有卫生计生行政部门负责处理违规操作。
- 15.B【解析】急性淋巴管炎首选的擦拭药液是50%硫酸镁。
- 16.B【解析】患者沟通提问过程中，如果护士采用的是封闭式提问，其主要的优点是护士可以在短时间内获得需要的信息。
- 17.E【解析】内镜检查取出异物后，患儿需在4小时后方可进食。
- 18.B【解析】焦虑是害怕某些环境刺激所形成的条件反射，有诱因然后发作。
- 19.C【解析】患儿体温39.7℃，最后可能的是高热惊厥。
- 20.C【解析】全身青紫0分，四肢伸展0分，无呼吸0分，心率80次/分，1分，用洗耳球刺激有皱眉1分，共2分。
- 21.E【解析】肺透明膜病变早期，应给予的首选措施是持续气道正压通气。
- 22.E【吸氧】头罩法适用于3岁以内的患儿。
- 23.D【解析】2%戊二醛灭菌剂，广谱、高效，对金属腐蚀性小。适用于内镜等不耐热的医疗器械。
- 24.C【解析】空气进入静脉后，随血流经右心房至右心室，如空气量大，容易阻塞肺动脉入口，使血液不能进入肺内，引起严重缺氧，甚至死亡。所以应防止空气栓塞肺动脉入口。
- 25.E【解析】产前检查健康史的内容不包括配偶的家族史。
- 26.B【解析】过氧乙酸为无色透明液体，弱酸性，易挥发，有强烈刺激性气味，对皮肤和眼睛有强烈刺激性，过氧乙酸本身不稳定，应在避光、密封、低温条件下储存，因此不能悬挂及抖散。

过氧乙酸有腐蚀性，不能用于金属器械的消毒。过氧乙酸有刺激性、腐蚀性，手不能直接接触，稀释为0.2%的溶液才可用于皮肤消毒。

27.C【解析】临幊上为高热患者物理降温，将冰袋、冰囊放置于所需的部位，如高热降温置冰袋于前额、头顶和体表大血管流经处，如颈部、腋下、腹股沟等，以增加散热。冷疗的禁忌部位包括：①枕后、耳郭、阴囊处：以防冻伤；②心前区：以防引起反射性心率减慢、房室传导阻滞；③腹部：以防腹泻；④足底：以防反射性末梢血管收缩而影响散热或引起一过性冠状动脉收缩。昏迷、感觉异常、年老体弱者慎用冷疗。

28.E【解析】消化性溃疡的病因和发病机制较为复杂，与多种因素有关。概括来说是胃、十二指肠局部黏膜损害因素和黏膜保护因素之间失去平衡所致。

29.D【解析】烧伤后毛细血管通透性增加，血浆成分丢失到组织间、水疱内或体表外，导致低血容量性休克。

30.D【解析】外阴不包括子宫附件：大阴唇损伤易形成血肿；阴道前庭位于椭小阴唇之间；小阴唇富含神经末梢。

31.C【解析】右向左分流型（青紫型）是临幊病情重、病死率高的类型，由于畸形的存在，使右心压力增高并超过左心向左分流；或大血管起源异常，使大量含氧量低的静脉血流入体循环，临幊上出现持续青紫，严重缺氧，故又称为青紫型先天性心脏病。

32.C【解析】张力性气胸由于气管、支气管或肺损伤裂口呈活瓣状，进入胸膜腔空气不断增多，压力逐渐升高，超过大气压。胸膜腔穿刺有高压气体冲出。

33.D【解析】各类休克的共同病理生理基础是有效循环血量锐减和组织灌注不足及由此导致的微循环、代谢改变和内脏器官继发性损害等。感染性休克主要是由于细菌及毒素作用所引起，常见于严重胆道感染，急性化脓性腹膜炎、绞窄性肠梗阻和败血症等。

34.A【解析】脊椎结核是骨关节结核的最常见者，好发于儿童和青年。以腰椎最多。病变好累及相邻的两个椎体，附件较少受累。临幊上，常有脊柱活动受限，局部疼痛，冷性脓肿和窦道形成。还可发生脊柱变形和脊髓受压症状。

35.B【解析】最容易让患儿接受治疗的言语技巧是夸赞式语言，鼓励患儿战胜疾病。

36.E【解析】先观察，再做进一步处理。

37.D【解析】卡介苗禁忌症：1、早产、难产、伴有明显的先天性畸形的新生儿。2、发热、腹泻等急性传染病的患儿。3、心、肺、肾等慢性疾病、严重皮肤病、过敏性皮肤病、神经系统疾病的患者、以及对预防接种有过敏反映者。

38.D【解析】湿温多发于长夏和初秋气候炎热潮湿较多之季。

39.【答案】C【解析】正常情况下，从胎儿娩出到胎盘娩出约需5~15分钟，一般不超过30分钟。

40.D【解析】濒死期：临终表现的进一步恶化，为临终过程的最后阶段，但却是死亡过程的开始阶段，表现为意识模糊或丧失，呼吸、循环衰竭、代谢紊乱，机体各系统和功能严重障碍。

41.A【解析】留取尿标本的最佳时间是晨起第一次尿的中段尿。

42.A【解析】强心药物具有正性肌力作用，适于治疗以收缩功能异常为特征的心力衰竭，尤其伴快速心律失常的患者作用最佳。洋地黄类药物：是临幊最常用的强心药物，具有正性肌力和减慢心率作用，在增加心肌收缩力的同时，不增加心肌耗氧量。

43.A【解析】护士在执行医嘱时不能根据需要自行调整医嘱。

44.C【解析】幽门螺杆菌感染为消化性溃疡的重要发病原因。幽门螺杆菌感染破坏了胃十二指肠的粘膜屏障，幽门螺杆菌分泌的空泡毒素蛋白和细胞毒素相关基因蛋白可造成胃十二指肠黏膜上皮细胞受损和炎症反应，损害了黏膜的防御修复机制。幽门螺杆菌感染还可引起高胃泌素血症，胃酸分泌增加，这两方面协同作用促使胃十二指肠黏膜损害，形成溃疡。

45.C【解析】医疗机构临床用血的规定：必须进行配型核查。

- 46.A【解析】尸体护理：将床放平，尸体仰卧，头下垫一枕头，以防面部淤血变色，两臂置于身体两侧，脱去衣裤，留一大单遮盖尸体。用棉花将口、鼻、耳、阴道、肛门等孔道塞住，以防体液外溢，注意棉花不要外露。
- 47.D【解析】细菌性肝脓肿最常见的致病菌为大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。胆道系统是最主要的入侵途径和最常见的病因。
- 48.C【解析】肺炎感染时给予的饮食是：高蛋白质、高热量、高维生素、易消化的流质饮食或半流质饮食，鼓励多饮水，每日饮水在1500~2000ml。
- 49.B
- 50.B
- 51.B【解析】心包内少量液体可起到润滑作用，大量就会形成病理性疾病。
- 52.C
- 53.D【解析】无菌盘有效期为4小时。
- 54.C【解析】交流的形式包括语言性交流和非语言性交流，其中非语言性交流较为常用。护士非语言行为包括倾听，面部表情，专业性皮肤接触，身体姿势和步态等。倾诉属于语言性交流。
- 55.B【解析】光照消毒法是利用紫外线照射，使菌体蛋白发生光解变性导致细菌死亡。
- 56.D
- 57.C【解析】题目表现为过敏，但无休克症状，有荨麻疹症状，即为C选项。
- 58.D【解析】肝性脑病灌肠禁用肥皂水，可以用生理盐水或弱酸性溶液进行灌肠。
- 59.B【解析】此患者为无尿（24小时尿量<100ml）
- 60.A【解析】x线检查早期表现为关节周围软组织肿胀，晚期则出现关节半脱位和骨性强直畸形。以手指和腕关节的x线片最有价值。对诊断、病变分期、检测病变的演变均有重要意义。
- 61.D【解析】高血压患者应采用无盐低钠饮食。
- 62.C【解析】有紧急情况时，护士应该安排及时就诊。
- 63.C【解析】8~9个月开始注意培养有意识地模仿发音，如“爸爸”“妈妈”等，12个月能说简单的单词，如“再见”“没了”等。
- 64.A【解析】易被热破坏的药物：应按要求冷藏在2~10℃的冰箱内，如各种疫苗、抗毒血清、白蛋白、青霉素皮试液等。
- 65.D【解析】风湿性心脏病，下床、洗漱、就餐、走动后即气喘、出汗时应以卧床休息为主，限制运动。
- 66.B
- 67.B【解析】患者妹妹指责接诊护士没有及时联系医生，从而延误抢救导致患者死亡：护士坚持自己已尽职尽责，从题目中可以看到是角色出现了冲突问题。
- 68.A【解析】小腿外侧疼痛，足背麻木，压迫的是腓总神经。
- 69.C【解析】患者感到痛苦、悲哀，欲轻生，表现为忧郁期。
- 70.A【解析】嗜睡是指：轻度刺激能唤醒，醒后能正确、简单回答问题，但反应迟钝。昏睡是指：不易唤醒，强刺激可被唤醒，醒后答非所问，停止刺激后又进入熟睡状态。浅昏迷是指：压迫眶上缘有痛苦表情。深昏迷是指：意识完全丧失，对各种刺激均无反应。意识模糊是指：可以被唤醒，但思维语言不连贯。
- 71.E【解析】维生素D缺乏性佝偻病积极进行站立行走、锻炼可造成长骨的畸形。
- 72.B【解析】剧烈头痛、喷射性呕吐、偏瘫提示出现了脑部转移。
- 73.D【解析】系统性红斑狼疮禁用碱性肥皂，避免化妆品及化学药品。
- 74.A【解析】题目中胸部透视，见右中叶有大片浅淡的阴影，感染的致病菌多为肺炎链球菌，再加上是社区获得的肺炎，即确定为肺炎链球菌。

- 75.B【解析】风湿性心瓣膜病患者常见并发症有栓塞，血栓脱落引起周围动脉栓塞，题目中为：下肢动脉栓塞。
- 76.C【解析】如果把鼻腔塞住脑脊液会逆流回颅内，引起颅内感染。
- 77.C【解析】定时测定肢体长度可有效防止牵引过度。
- 78.A【解析】库欣综合征的饮食护理为：给予高蛋白、高钾、高钙、低钠、低热量、低碳水化合物的饮食，鼓励病人食用柑橘、枇杷、香蕉、南瓜等含钾高的水果，避免刺激性食物，禁烟酒。
- 79.E【解析】痛风的局部护理为：为减轻疼痛，可用夹板固定，或受累关节给予湿敷，发病24小时内可使用冰敷或25%硫酸镁湿敷，减少炎性渗出，消除关节肿痛。24小时后可使用热敷，促进局部组织渗出物的吸收。
- 80.D【解析】右侧有血性液体流出，即可取右侧卧位，以免脑脊液回流入脑，引起感染。
- 81.A【解析】子宫肌瘤是女性生殖系统中最常见的良性肿瘤，常见病变有玻璃样病变（透明性）、囊性变、红色变、肉瘤变及钙化。
- 82.A【解析】肿瘤患者震惊否认期是指明确诊断后，病人震惊，表现为不言不语，知觉淡漠，眼神呆滞甚至晕厥。继之极力否认，希望诊断有误，要求复查，甚至辗转多家医院就诊、咨询，企图否定诊断。
- 83.A【解析】急性白血病患者出血的最主要原因是血小板减少。
- 84.A【解析】医疗事故是医疗机构或医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故。造成患者死亡、重度残疾的为一级医疗事故。
- 85.A【解析】由题干可知，该患者出现了Ⅱ型呼吸衰竭，应采用低浓度持续给氧。其原因为低浓度给氧既可防止严重缺氧引起的组织损伤，又可防止二氧化碳潴留加重；而间歇吸氧不仅不能防止二氧化碳潴留加重，还会加重缺氧。因此采取低浓度持续给氧的原则。
- 86.B【解析】道蛔虫病多发生于青少年和儿童，常突发上腹部剑突下钻顶样剧烈疼痛，坐卧不安，大汗淋漓。疼痛可向右肩背部放射，伴恶心、呕吐，呕吐物中有时可见蛔虫。体格检查可在剑突下或稍右方有轻度压痛。
- 87.D【解析】甲状腺危象系甲状腺功能亢进症病情恶化时的严重症候群，可危及生命，常因各种诱因所致的大量甲状腺素突然释放入血导致。
- 88.B【解析】此人的表现符合晕厥的特点。
- 89.E【解析】病毒性心肌炎患者的血清心肌酶可升高。
- 90.D【解析】颅内压增高的特征性表现为喷射状呕吐，且患者有明显的诱因。
- 91.B【解析】该高血压患者应坚持在非药物治疗的基础上，长期服用降压药物，将血压控制平稳，而不应该在血压降至正常后就停药。
- 92.D【解析】根据患者的诊断及临床表现：受凉后痰多、黏稠、不易咳出可看出保持患者的呼吸道通畅是目前迫切需要解决的问题。
- 93.A【解析】胃酸、胃蛋白酶分泌增多是消化性溃疡的主要发病因素。
- 94.B【解析】过度嗜睡是指日间睡眠过度或反复短暂睡眠发作或觉醒维持困难的状况，并无法用睡眠时间不足来解释，且影响到职业和社会功能。
- 95.B【解析】氯霉素是引起再生障碍性贫血的最常见药物。
- 96.C【解析】本题是考查镜下脓尿的概念。高倍视野下白细胞>5个时，称为镜下脓尿。
- 97.D【解析】风、寒、暑、湿、燥、火是四季气候中的六种表现，正常情况下称为“六气”，若太过或不及，使人体正气不足时，叫做“六淫”，即风邪、寒邪、暑邪、湿邪、燥邪、火邪。
- 98.C【解析】随意运动的丧失称为瘫痪。
- 99.B【解析】染色体核型与胎儿成熟度无关。
- 100.C【解析】昏睡是指整天处于睡眠状态，不易唤醒，醒后答非所问，很快又入睡。

101.E【解析】该患儿为先天性心脏病，在做小手术(如拔牙)时，应给予抗生素预防感染，防止感染性心内膜炎发生。

102.B【解析】此题考查心功能的分级。I级：患者患有心脏病但活动量不受限制，平时一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III级：心脏病患者体力活动明显限制，小于平时一般活动即引起上述的症状。IV级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。

103.E【解析】铁与肠道内硫化氢生成硫化铁，硫化铁的颜色是黑色的，所以大便的颜色是黑色的。

104.E【解析】该患者瞳孔缩小可能为有机磷农药中毒所致昏迷，呕吐物鉴定可辅助明确诊断昏迷原因。

105.E【解析】一氧化碳中毒病人口唇黏膜呈樱桃红色。

106.A【解析】癫痫的单纯失神发作(小发作)常于儿童时起病，表现为短暂的意识障碍，突然发呆、失神、言语中断或正常行动中止，手持物件可能落地，但不跌倒，每次发作不超过30秒，随即恢复其发作前的谈话或行动，对发作经过无记忆。

107.C【解析】肾结核、骨关节结核大多继发于肺结核，是结核杆菌经原发活动病灶通过血液循环侵入肾、骨关节而引起感染。根据该患者的表现，应考虑脊柱结核。

108.A【解析】大肠埃希菌是引起急性肾盂肾炎最常见的致病菌，约占60%~80%。

109.B【解析】正常中性粒细胞比例为50%~70%。

110.C【解析】腹膜炎时，细菌分泌的内外毒素使肠道功能紊乱，引起麻痹性肠梗阻。

111.C【解析】首先应考虑危及生命的护理问题，则清理呼吸道无效可引起窒息。应首选C。

112.D【解析】此题考查促进排痰的措施，各备选项均为维持气道畅通的措施，但不同措施适用条件不同，体位引流适用于痰量较多而呼吸功能尚好的支气管扩张、肺脓肿等病人。故此题D选项不适用。

113.D【解析】有效咳嗽的要点是通过深呼吸屏气后蓄积的巨大压力帮助患者将痰液咳出，而不是让患者每次连续轻咳，这样的咳嗽难以有效排痰，护士应予以纠正。

114.A【解析】根据血气分析结果判断患者为II型呼衰，此类型患者的氧疗原则是持续低流量氧气吸入(1~3L/min)，以免缺氧纠正过快引起呼吸中枢抑制。

115.B【解析】呼吸系统疾病患者特别是痰液粘稠不易咳出者，其气道管理非常重要，护士应积极采取措施促进患者排痰，常用的措施有：有效咳嗽、定时翻身拍背、体位引流及机械吸痰等，不同的方法其适应症不同。A选项不具有排痰的作用；C选项与有效咳嗽的主旨相斥；再根据题干可判断老年患者，神志清醒，有呼吸困难，难以忍受机械吸引和体位引流；故选择B。

116.E【解析】患者出现急性的缺氧和二氧化碳潴留加重，从发病机制来看主要是由于通气功能障碍所致，护士应考虑到痰液粘稠堵塞气道的可能性，因而最有效的则是开放气道，护士应做好开放气道的准备，故E正确。使用镇静剂或加大氧流量均会抑制呼吸中枢，加重病情；而使用呼吸兴奋剂会加大耗氧量，同时加重二氧化碳潴留，也会导致病情加重，降低氧浓度对缓解病情没有意义，故ABCD均可排除。

117.B【解析】心率70次/分：1分；呼吸弱而不规则：1分；全身皮肤青紫：0分；四肢肌张力松弛：0分；刺激咽喉无反应：0分。

118.D【解析】新生儿抢救床的温度为30~32℃。

119.B【解析】患儿窒息时，首要解决的是危及生命的问题，故为B选项，清理呼吸道为首要措施。

120.C【解析】血钙为1.71mmol/L为新生儿低血钙。

121.B【解析】新生儿出现低血钙时应给予静脉补充钙剂。

122. E【解析】患儿在补充维生素 D 的同时需要适当补充钙剂，以防血钙下降将导致手足搐搦症的发生。
123. D【解析】佝偻病激期的患儿骨密度减低，进行站立等训练，会增加骨骼负担，容易引起骨折或骨骼弯曲。
124. A【解析】禁食及胃肠减压可减少胃酸与食物刺激胰腺分泌，减轻腹痛与腹胀，宜为首选措施。
125. C【解析】急性胰腺炎根据病理损害程度分为水肿型和出血坏死型，前者多见，一般较轻，数日可自愈，不出现全身和局部并发症，而后者则病情较重，容易并发休克、腹膜炎等，死亡率高。
126. D【解析】经过治疗后腹痛、恶心基本缓解，可给予少量碳水化合物类流食，以后逐渐恢复饮食，但禁忌食用高脂肪高蛋白。
127. C【解析】禁食及胃肠减压可减少胃酸与食物刺激胰腺分泌，减轻腹痛与腹胀。
128. C【解析】出血坏死型可出现低钙血症，且低血钙程度与临床严重程度平行，血清淀粉酶高低不一定反映病情的轻重。
129. C【解析】急性胰腺炎约 50% 有胆结石、胆道炎症和胆道蛔虫等胆道疾病所引起。胆道疾病是急性胰腺炎最常见的病因。
130. D【解析】该病人因胸部损伤导致气胸，目前胸膜腔内增高，严重影响病人的呼吸和循环功能，血压偏低，脉压减小，皮下气肿，并出现发绀，符合张力性气胸的特点，由于胸膜腔内压力过高，而且伤侧胸腔压力不断升高，造成呼吸和循环功能障碍，出现呼吸困难及发绀。
131. C【解析】若引流管连接处脱节，管道系统失去密封性，外界气体可进入，形成气胸，应及时钳闭引流管近端，恢复系统的密闭性，后进一步处理。
132. E【解析】水封瓶中长管与病人的胸腔内引流管相通，若胸腔引流管通畅，随着病人的呼吸，因胸腔内压力的变化，长管内的水柱也可出现波动。
133. C【解析】搬动病人的过程中可能出现连接处脱节，引流瓶破碎或高于引流管引出处等情况，为防止意外发生，应用两把止血钳夹闭引流管。

实践能力（一）答案

1. A【解析】咳嗽为最常见的早期症状，表现为阵发性刺激性呛咳，无痰或有少许白色黏液痰；肿瘤增大引起支气管腔狭窄，咳嗽呈高金属音；有继发感染时，痰液增多，可呈脓痰。
2. D【解析】实证概念指人体感受外邪，或疾病过程中阴阳气血失调，体内病理产物蓄积，以邪气盛、正气不虚为基本病理，表现为有余、抗胜、停聚特征的各种证候。
3. B
4. A【解析】黄疸型肝炎可分为黄疸前期、黄疸期、恢复期，前期平均 5~7 天，最突出的表现是消化道症状，有食欲减退、厌油、恶心、呕吐、腹胀、腹痛和腹泻。
5. D【解析】血友病为遗传性疾病，是一组最常见的遗传性凝血因子缺乏的出血性疾病。病理机制为凝血因子基因缺陷导致其水平和功能低下，而使血液不能正常地凝固，临床主要表现为自发性关节和组织出血，以及出血引致的畸形。
6. D【解析】儿童生长发育各系统器官发育的速度不同神经系统发育早，先快后慢；生殖系统发育先慢后快；淋巴系统则先快而后回缩。
7. E【解析】夏科氏三联征是指腹痛、寒战高热、黄疸（三个症状需此顺序出现）。为肝外胆管结石继发胆管炎的典型症状。
8. D【解析】甲亢突眼患者应低盐饮食，所以 D 选项是错误的。
9. B【解析】多奈哌齐（安理申）：改善认知功能，服用 6 个月治疗期间，可见到症状无进一步恶化。

10. C 【解析】急性宫颈炎为淋病奈瑟菌和衣原体引起的感染。主要表现为白带增多，呈乳白色黏液状，淡黄色脓性。
11. A 【解析】流行性脑脊髓膜炎简称为流脑，是由脑膜炎奈瑟菌引起的急性化脓性脑膜炎。其主要临床表现为突发高热、剧烈头痛、频繁呕吐、皮肤黏膜瘀点、瘀斑及脑膜刺激征，严重者可有败血症休克和脑实质损害，常可危及生命。部分病人暴发起病，可迅速致死。
12. D 【解析】皮下脂肪消耗的顺序依次是腹部、躯干、臀部、四肢、最后是面部。测量小儿皮下脂肪厚度常选用的部位是腹部。
13. D 【解析】心肌疾病长期服药者严格遵医嘱服用不可随意改变药物种类、剂量、不可随意停药。
14. A
15. C 【解析】臀红不是新生儿生理状态而是病理状态，常因护理不当、大小便刺激所致。
16. A 【解析】此题选 A. 大脑，中枢神经系统皮质神经元细胞对缺氧最敏感。缺氧、二氧化碳潴留及酸中毒可造成脑组织水肿，甚至颅内压增高造成脑疝危象。
17. B 【解析】原发性肝癌的临床表现，肝区疼痛为最常见和最主要的症状，约半数以上病人以此为首发症状，多呈间歇性或持续性钝痛或刺痛。
18. B 【解析】宫颈癌早期表现为接触性出血，而非阴道大量出血。
19. B 【解析】急性肾小球肾炎的典型表现为水肿、血尿、高血压及肾小球滤过率下降。
20. A 【解析】破伤风的产生主要是继发于各种创伤（尤其是窄而深的伤口）或不洁条件下的分娩，破伤风杆菌存在于不洁环境中。
21. C
22. D
23. C 【解析】腹膜炎时会产生大量内毒素，内毒素吸收引起肠麻痹，肠蠕动功能受损导致肠梗阻。
24. A 【解析】制动性保护具只能短期使用，须定时松解约束带，一般每 2 小时松解一次，同时注意病人肢体应处于功能位。
25. A 【解析】氧中毒的发生为长时间吸入高浓度氧，与体位咳嗽都无关。
26. E 【解析】血管紧张素转换酶主要功能有两个：催化血管紧张素 I 转化为血管紧张素 II；使缓激肽失活。血管紧张素转化酶抑制剂因这两种功能而成为治疗高血压、心力衰竭、糖尿病合并高血压等疾病的理想靶点。血管紧张素转化酶抑制剂能减少血管紧张素 II 的生成，并增加缓激肽的活性。
27. D 【解析】结核菌属分枝杆菌，染色具有抗酸性，又称抗酸杆菌。
28. E 【解析】I 度轻型：宫颈外口距处女膜缘 < 4cm，未达处女膜缘；重型：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。II 度轻型：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内；重型：宫颈及部分宫体脱出阴道口。III 度宫颈与宫体全部脱出阴道口外。
29. E 【解析】此知识点是护理人际关系，护患关系的基本模式中主动-被动型：亦称支配服从型模式，是最古老的护患关系模式。将患者视为简单的生物体，忽视了人的心理、社会属性，将治疗疾病的重点置于药物治疗和手术治疗方面。
30. D
31. A
32. B
33. D 【解析】缺铁性贫血主要为体内铁不足，饮食应多食含铁较多的食物，而动物内脏中铁含量相对较多，且橙汁中的维生素 C 可以促进铁的吸收。
34. D 【解析】幽门梗阻时呕吐物为宿食，有酸臭腐浊味，小肠低位梗阻时呕吐物可有粪臭味。

35. E【解析】心功能不全左心衰最早出现的是劳力性呼吸困难，严重时，典型表现为夜间阵发性呼吸困难，可呈端坐呼吸。
36. A
37. B
38. B【解析】肾病综合征有四大特点：大量蛋白尿，低蛋白血症，水肿，高脂血症。大量蛋白尿是最根本的病理生理改变，水肿是最常见的症状。
39. E【解析】垂体后叶素的不良反应当出现过敏反应时可出现四肢冰冷，面色苍白，血压下降等，不包括面色潮红。
40. A【解析】第一产程适宜灌肠的情况是初产妇宫口扩张小于4CM，经产妇小于2CM时可行2%温肥皂水灌肠500~1000ML，温度39~42℃，以便清洁肠道并可通过反射作用刺激宫缩，以加速产程进展。但有阴道流血、胎膜早破、胎位异常、胎头未衔接、有剖宫产史、胎儿窘迫、重度妊娠合并心脏病等，应禁忌灌肠。
41. E【解析】子宫内膜癌好发于绝经期和绝经后的妇女，典型的临床表现为阴道不规则流血。
42. B【解析】缺水的性质是根据血钠的浓度判断，正常为135~145mmol/L，低于135为低渗性缺水，高于145为高渗性缺水。
43. E【解析】患儿为维生素D缺乏性佝偻病，为预防骨骼畸形和骨折应该避免久站，久坐，久立，久行。
44. E【解析】小儿惊厥最常见的是高热惊厥，其发病率为成人的10~15倍。且患儿体温39.8℃，为高热。
45. C【解析】已婚妇女停经56天，考虑为妊娠，出现阴道流血，下腹撕裂样痛且宫颈抬举痛明显，血压较低，考虑异位妊娠破裂出血。
46. C【解析】胆红素脑病一般发生在生后2~7天，早产儿更容易发生，典型的临床表现包括：警告期（反应低下、肌张力降低）、痉挛期（肌张力增高、抽搐、凝视、尖叫）、恢复期（肌张力恢复）、后遗症期。
47. D【解析】膀胱结石主要表现为排尿突然中断，改变体位或活动后尿可继续排出；尿道结石表现为排尿困难，点滴状排尿及尿痛。
48. A
49. E【解析】胃癌患者的饮食应该是高蛋白、高热量、高维生素、低脂肪、易消化和少渣的食物。
50. C【解析】嵌顿性疝容易导致血运障碍，引起肠坏死、腹膜炎，故应该严密观察有无腹痛腹膜刺激征。
51. E【解析】患者为早孕反应，一般不需要特殊处理，孕12周左右会消失，指导孕妇避免空腹，少量多餐；食用清淡食物。
52. A【解析】消化液一般为无色清亮的，胆汁为黄绿色，当呕吐物内还有大量胆汁时可呈现黄绿色。
53. A【解析】尿比重测量用于估计肾脏的浓缩功能，正常在1.015~1.025之间，少尿时尿比重低于1.014说明肾浓缩功能障碍或肾功能衰竭。
54. E【解析】门静脉高压症患者食管胃底的静脉因高压呈迂曲状，轻微的刺激如坚硬粗糙的食物都可引起破裂出血，放置胃管很容易造成出血。
55. C【解析】无痛性肉眼血尿一般为泌尿系肿瘤常见的临床表现。
56. A
57. C【解析】负压吸痰时每次吸痰时间应该小于15秒。
58. B【解析】有错误，应在相应文字上画双横线，就近书写正确文字并签全名。
59. A【解析】危重病人标志是放在护士站病区病人一览表中。

-
60. C
61. C 【解析】输入致热物质会导致发热反应；输入致敏物质会导致过敏反应；输入药液浓度过高刺激血管会导致静脉炎；输入药液量大，速度过快会导致循环负荷过重（急性肺水肿）；输液滴管中空气未排尽会导致空气栓塞。
62. E
63. D
64. C
65. D
66. D
67. B
68. E
69. C
70. E
71. B 【解析】HIV 侵入人体后，有选择地侵犯和破坏 CD4⁺T 淋巴细胞，使机体细胞免疫功能受损。
72. A 【解析】临幊上最常幊的脑血管病为脑血栓形成。
73. E 【解析】肾结核最早出现的症状是慢性膀胱刺激征（尿频、尿急、尿痛）。
74. B 【解析】溃疡性结肠炎是一种病因不明的慢性直肠和结肠非特异性炎性疾病，腹泻为主要的症状。
75. D 【解析】疼痛部位在腰部并向会阴部放射且有镜下血尿应是肾绞痛。
76. D 【解析】风湿性心脏病合并心房颤动时，易引起栓塞。
77. B
78. E 【解析】乳腺癌最常见的淋巴结转移部位是同侧腋窝淋巴结。
79. C 【解析】股骨离肺较远，除非癌细胞转移过去才能对其产生破坏。
80. C 【解析】A 一氧化碳不易出去，B 生活常识：浴室一般较其他房间窗户小不易通风，D 正好相反一旦感应到一氧化碳浓度高能自动熄火的煤灶更好，E 这里的通气开关应该是指煤气的通气开关，长期开放产生的一氧化碳多。
81. E 【解析】肝硬化失代偿期患者门脉高压侧支循环建立开放，胃底食管静脉曲张，轻微刺激便可破裂出血。
82. A 【解析】此病的特点是痰多，痰的本质是“垃圾+细菌”，故关键措施是将痰液引流出。
83. A 【解析】此题考查的是便秘与腹泻的区别，BCDE 一般都是腹泻时出现。学习时要养成爱对比的习惯。
84. B 【解析】急性上呼吸道感染约有 70%~80% 由病毒引起。
85. E 【解析】室颤时心脏为完全无效收缩，一切值均消失——血压测不到、脉搏摸不到，脑完全无供血，需要立即心肺复苏。
86. C
87. C 【解析】心脏压塞时易出现的异常脉搏是奇脉，奇脉是指大量心包积液患者在触诊时桡动脉搏动呈吸气性显著减弱或消失，呼气时复原的现象。
88. B 【解析】排便次数因人而异，一般成人每天排便 1—3 次，成人每天排便超过 3 次或每周少于 3 次视为排便异常。
89. A 【解析】急性上呼吸道感染（急性扁桃体炎）患者应进温度适宜饮食或流质饮食，多饮水；体温高时每 4 小时测量体温 1 次；并发细菌感染时及时使用抗菌药物治疗；限制探视，避免交叉感染；禁食辛辣刺激的食物。
90. D 【解析】男性导尿时，将阴茎向上提起，使之与腹壁成 60° 夹角，耻骨前弯可被拉直，利于插管。

91. A
92. D 【解析】局部用冷 30 分钟，需观察局部皮肤，若出现苍白、青紫，有麻木感应立即停止；局部用冷 1 小时可反射性地引起局部血管扩张。
93. D 【解析】心肺复苏的有效指征是病人心跳呼吸恢复，大动脉可扪及搏动，面色、口唇、甲床色泽转为红润，散大的瞳孔缩小，意识逐渐恢复，有尿，心电图波形有改变。
94. D 【解析】脑死亡的标准为：对刺激无感受性及反应性；无运动，无呼吸；无反射；脑电波平坦。上述标准 24 小时内反复复查无改变，并排除体温过低及中枢神经系统抑制剂的影响，即可作为脑死亡的诊断。
95. C 【解析】尿潴留的原因包括机械性梗阻和非机械性梗阻，使用利尿剂会使肾脏尿液产生增加，加重尿潴留。
96. C 【解析】温水擦浴用于高热病人降温。方法：盆内盛 32~34℃ 的温水 2/3 满。
97. C
98. E
99. D 【解析】护患关系的发展过程中初始期也就是第一期，是从病人与护士开始接触时就开始了。此期的主要任务是护患之间建立信任关系，并确定病人的需要。
100. E 【解析】健康宣传资料属于书面语言沟通。
101. B 【解析】主观资料是指病人自身的主诉，包括所感觉的、所经历的以及看到的、听到的、想到的内容的描述。
102. C
103. E
104. B
105. C
106. E
107. C 【解析】呼吸衰竭的处理原则是保持呼吸道通畅条件下，改善缺氧及二氧化碳潴留，以及代谢功能紊乱。
108. A 【解析】处理好高热、惊厥、呼吸衰竭是抢救乙脑病人的关键，降温可先选物理降温，再遵医嘱药物降温或亚冬眠疗法。
109. C 【解析】吻合口瘘是食管癌术后最严重的并发症，多发生在术后 5~10 天。表现为持续高热、呼吸困难、胸痛、患侧胸膜腔积气积液，全身中毒症状明显。
110. B 【解析】产后子宫恢复时会有宫缩痛，宫体肌纤维缩复一般产后当日子宫平脐或脐下一横指，以后每日下降 1~2 厘米。
111. D 【解析】胰腺炎患者的饮食指导应禁酒。
112. C 【解析】硫酸镁导泻后会出现腹泻大便次数增多大便性质改变，严重腹泻会引起体液不足脱水，导致血压下降呼吸改变尿量减少但一般不会引起体温的改变。
113. E 【解析】维生素 C 略为酸性有酸味，服用后可引起唾液分泌增多，加重腮腺肿痛。
114. B 【解析】患者并没有体液过多的表现，无水肿及体液潴留。
115. B 【解析】关节炎晨僵的护理：晨起后行温水浴，或用热水浸泡僵硬关节，而后活动关节。夜间睡眠戴弹力手套保暖，可减轻晨僵程度。
116. C 【解析】腹式呼吸锻炼正确的方法是：以半卧位、平卧位、立位最适宜；用鼻吸气，经口呼气，呼吸缓慢而均匀，勿用力呼气，吸气时腹肌放松，腹部鼓起，呼气时腹肌收缩，腹部下陷，呼气与吸气的时间比例为 (2~3) : 1，每分钟 10 次左右，每日训练 2 次，每次 10~15 分钟。
117. B 【解析】症状明显，体征与症状不成正比。
118. C 【解析】乳癌腋窝淋巴结肿块特点是早期可被推动，晚期固定不易推动。

-
119. D 【解析】先心病的患儿应注意多休息，休息是恢复心脏功能的重要条件，可以减少心肌耗氧量。
120. B
121. D 【解析】进行侵袭性操作时都会接触到血液，是血源性传播疾病最危险的操作。
122. E 【解析】护士的职业防护，发生损伤时的紧急处理流程。
123. A
124. C 【解析】慢性阻塞性肺疾病患者出现面色发绀，口唇呈黑紫色，呼吸困难，是严重缺氧表现，应立即给予吸氧纠正缺氧。
125. C 【解析】慢性阻塞性肺疾病患者吸氧原则是：鼻导管吸氧，低流量（1-2L/min）、低浓度（25%-29%）持续吸氧，吸氧时间>15 小时/天，夜间不可间断。
126. C 【解析】臭氧灭菌灯消毒法适用于空气、医院污水、诊疗用水、物品表面的消毒，简便易操作，使用率高，尤其适用于空气消毒。
127. C 【解析】体温计的消毒常用 70% 的乙醇、1% 过氧乙酸、1% 消毒灵溶液消毒。
128. B 【解析】清洁区是指未被病原微生物污染的区域，如更衣室、配膳室、值班室、浴室、卫生间及库房等。
129. D
130. E
131. C
132. D
133. D
134. A

专业实务(二) 答案

1. C 【解析】慢性腹泻指病程至少超过 2 个月的腹泻或间歇期在 2~4 周内的复发性腹泻。
2. D 【解析】胆道阻塞性后，胆汁排泄障碍，大便可呈白陶土色。
3. A 【解析】慢性胃炎最主要的病因是 H_p 感染。
4. E 【解析】引起上消化道出血最常见的疾病是消化性溃疡。
5. E 【解析】糖皮质激素、噻嗪类利尿剂、磺胺类药物等可诱发急性胰腺炎。
6. A 【解析】肺结核最主要的传播途径是呼吸道。
7. C 【解析】病人出现呕血提示胃内积血至少超过 250ml。
8. B 【解析】呕吐宿食是幽门梗阻的特征表现之一。
9. A 【解析】壁细胞主要分泌盐酸、内因子。
10. A 【解析】心前区疼痛最常见的原因是冠心病。
11. C 【解析】III型肺结核是最常见的继发性肺结核。
12. E 【解析】肺气肿的发生与抗胰蛋白酶的缺乏有关。
13. B 【解析】早期阑尾炎症侵及黏膜及黏膜下层时，内脏神经受累，定位不准确。
14. A 【解析】特异性血小板抗体产生的部位主要是脾脏。
15. A 【解析】病毒性肝炎是我国引起肝硬化的最常见的原因。
16. E 【解析】心源性水肿时，血浆胶体渗透压降低。
17. C 【解析】肠结核的好发部位是回盲部。
18. A 【解析】血小板在特发性血小板减少性紫癜患者体内寿命明显减少，约为 1~3 天。
19. D 【解析】高级神经中枢功能失调在高血压的发病机制中占主导地位。
20. E 【解析】苯及其衍生物是已被肯定是可致白血病的化学物质。
21. C 【解析】II型呼吸衰竭的血气变化是缺氧和二氧化碳潴留同时存在。
22. E 【解析】炎症性疾病所致急腹症一般有麻痹性肠梗阻表现，因此肠鸣音减弱或消失。
23. D 【解析】肺心病肺动脉压力增高，引起右心室的压力负荷过重。
24. C 【解析】甲胎蛋白对原发性肝癌的诊断具有特异性和专一性。
25. D 【解析】罗沙替丁为 H₂ 受体拮抗剂。
26. E 【解析】铁剂治疗的最早的化验是网织红细胞数上升。
27. D 【解析】痰中发现结核菌，是诊断肺结核的最可靠的依据。
28. D 【解析】风湿性心脏病合并心房颤动时，易引起栓塞。
29. D 【解析】痰中发现结核菌，即可诊断肺结核。
30. A 【解析】正常人尿液中可有少量的透明管型。
31. B 【解析】雷尼替丁是 H₂ 受体拮抗剂。
32. A 【解析】血清脂肪酶常在起病后 24~72 小时开始上升，持续 7~10 天，而血清淀粉酶升高常在发病后 6~12 小时升高，48 小时下降，一般持续 3~5 天后下降。
33. C 【解析】10% 葡萄糖液中加入 10U 胰岛素和 1.59 氯化钾混合为极化液，它可以促进心肌摄取和代谢葡萄糖，使钾离子进入细胞内，稳定心肌细胞膜，从而利于心肌收缩和减少心律失常的发生。
34. D 【解析】醉酒步态是指行走时躯干重心不稳，步态紊乱不准确如醉酒状。见于小脑疾病、酒精及巴比妥中毒。
35. B 【解析】肝硬化失代偿期的临床表现最突出的是腹水，约 75% 以上病人有腹水。
36. A 【解析】长期应用肾上腺糖皮质激素(泼尼松)可引起满月面容。
37. C 【解析】扑翼样震颤是肝性脑病特征性的临床表现。
38. E 【解析】心房纤颤是甲亢病人最常见的心律失常。
39. B 【解析】两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色淤斑为胰腺出血的证据。

-
40. E【解析】肺气肿病人，胸部叩诊时呈过清音。
41. A【解析】风湿性疾病最早、最常见的症状是关节疼痛。
42. B【解析】蝶形红斑是系统性红斑狼疮病人典型的皮肤损害。
43. C【解析】类风湿性关节炎出现的手指畸形是梭状指。
44. E【解析】一氧化碳中毒病人口唇黏膜呈樱桃红色。
45. C【解析】重度一氧化碳中毒的患者，脑水肿发展到高峰的时间是在病后的24~48小时。
46. D【解析】热痉挛发生时，以腓肠肌痉挛最为多见，体温多正常。
47. B【解析】腹腔内有较多液体存留时(约1000ml以上)，因重力液体积聚在腹腔低处，故此处叩诊呈浊音。
48. C【解析】急腹症在未明确诊断时应做到“四禁”，即禁饮食、禁灌肠、禁用泻剂，禁用强效镇痛剂，对没有休克的病人按需要实施胃肠减压。
49. D【解析】绞窄性肠梗阻的腹痛为持续性疼痛、阵发性加剧。单纯性肠梗阻的腹痛为阵发性绞痛。麻痹性肠梗阻的腹痛为持续性胀痛。
50. C【解析】骨折的专有体征是畸形、异常活动、骨擦音或骨擦感。关节脱位的专有体征是畸形、弹性固定、关节盂空虚。
51. B【解析】口对口人工呼吸的要领是每次深吸气时必须尽量多吸气，吹出时必须用力，使病人胸廓隆起。有效的口对口人工呼吸可以看到病人胸廓起伏。
52. B【解析】中医的“四诊”是指望、闻、问、切四种诊断方法，是调查了解疾病的基本方法。
53. D【解析】痰饮是机体水液代谢障碍所形成的病理产物，一般认为湿聚为水，积水成饮(清稀)，饮凝成痰(稠浊)。
54. B【解析】溃疡性结肠炎是一种病因不明的慢性直肠和结肠非特异性炎性疾病。腹泻为最主要的症状。
55. C【解析】患者为青壮年，且有蛋白尿、血尿(镜下)、水肿和高血压，符合肾小球肾炎的判断。
56. A【解析】急性梗阻性化脓性胆管炎是在胆道梗阻的基础上继发感染引起的最严重的感染性急腹症。大量高压脓性胆汁逆向扩散至肝窦，细菌及其毒素进入血液循环引起感染性休克。
57. B【解析】己烯雌酚可提高子宫平滑肌对宫缩素的敏感性。
58. A【解析】该孕妇临产，规律宫缩，已破膜，但胎头高浮，应首先测量入口径线。
59. B【解析】患者有多年风湿性心脏病史，突然出现脑功能受损的表现，首先应考虑脑栓塞的可能。
60. C【解析】腹部叩诊有移动陛浊音患者，腹腔穿刺抽出液的性质可以作为诊断的重要依据。
61. C【解析】饱餐后突发上腹部持续性疼痛，全腹有压痛，腹肌紧张，肝浊音界消失。因此考虑胃肠穿孔。立位腹部平片见膈下游离气体可明确诊断。
62. C【解析】该患者大便性质和习惯改变，因此怀疑结肠和直肠病变，而直肠指检操作简单，对判断直肠癌有非常重要的意义。
63. E【解析】静脉补钾时钾浓度不能超过0.3%。现剩余液体500ml，最多可加入10%氯化钾为 $500 \times 0.3\% \div 10\% = 15\text{ml}$ 。
64. D【解析】病人24小时尿量80ml，故为无尿(尿闭)。
65. A【解析】病人血钾为8.8mmol/L，最大的危害是心脏骤停。
66. E【解析】合并血红蛋白尿的病人在输液时应保持尿量在50ml/h以上。
67. B【解析】乳腺癌的主要表现为乳内肿块和腋窝淋巴结肿大。该病人42岁，乳内质硬、无痛性肿块，有同侧腋窝淋巴结肿大，应首先考虑乳腺癌。
68. A【解析】早孕反应中不包括腹痛这一症状。
69. D【解析】根据患者的诊断及临床表现：受凉后痰多、黏稠、不易咳出可看出保持患者的呼

吸道通畅是目前迫切需要解决的问题。

70. B【解析】触摸是一种非语言沟通的特殊形式，包括抚摸、握手和拥抱等，可以传递关心、理解、体贴、安慰等。产妇分娩时，护士抚摸产妇的腹部或握住产妇的手，产妇会感到安慰，甚至感觉疼痛的减轻。

71. C【解析】肺炎链球菌致病力是由于多糖荚膜对组织的侵袭作用，累及几个肺段或整个肺叶。病变以纤维素渗出为主，按发展过程分为充血水肿期、红色肝样变期、灰色肝样变期、溶解消散期四期。

72. E【解析】该病人尿频、尿急、尿痛，最可能是泌尿系感染，有助于诊断的检查是尿镜检细胞数。

73. A【解析】假月经是部分女婴在生后5~7天出现阴道流出少量的血液，持续1周左右停止，是由于母体雌激素在孕期进入胎儿体内，出生后突然消失引起，是新生儿的特殊生理状态，一般不必处理。

74. B【解析】不规律宫缩、胎儿下降感、见红为先兆临产的标志，其中见红为最可靠依据。

75. D【解析】III级：一般体力活动显著受限，休息时间不适或有轻度心力衰竭，轻微日常活动即感不适、心悸、呼吸困难。

76. D【解析】按中国九分法，成人双下肢面积为46%，儿童双下肢面积=成人双下肢面积-(12-年龄)。

77. B【解析】喂食首先影响的是体重，而且体重是判断小儿体格发育和营养状况的最重要的指标，故应首先检查。

78. C【解析】进食时哭闹是引起气管异物的常见原因，剧烈呛咳、喉鸣、呼吸困难也符合发生气管异物的特征。

79. D【解析】口渴喜冷饮、烦躁不安、大便干结、舌红苔黄而干、脉数均是热证的表现。

80. A【解析】咳嗽伴胸痛提示病变累及胸壁层胸膜或牵涉痛，前者除伴发热外，还可以听到胸膜摩擦音；病变累及脏层胸膜时没有疼痛。

81. B【解析】患者并非有意的不合作，而是对所有的外来吩咐的一种无意的、不由自主的对抗。属于违拗症状。

82. D【解析】新生儿低血糖常无症状或无特异性症状，可表现为反应差或烦躁、喂养困难、哭声异常、肌张力低、激惹、惊厥、呼吸暂停等。经补充葡萄糖后症状消失、血糖恢复正常是新生儿低血糖者的典型特征。

83. C【解析】活动后气促乏力、常喜下蹲位、发绀、胸骨左缘2~4肋间闻及III级收缩期杂音、杵状指都是法洛四联症的典型症状。

84. A【解析】意识不清、呼吸不规则、两侧瞳孔不等大和对光反射迟钝提示为脑疝。

85. A【解析】冬季出生和人工喂养是导致维生素D缺乏的常见原因；平时睡眠不安、多汗，是维生素D缺乏的表现；晒太阳可能诱发血钙降低，故出现抽搐。综合以上几个方面可判断本病是维生素D缺乏性手足搐搦症。

86. A【解析】根据白带情况，病人极可能为滴虫性阴道炎，查找病原体的首选方法应为A选项。

87. C【解析】产后子宫内膜炎轻者有低热、下腹疼痛及压痛、子宫复旧欠佳及恶露量多伴有臭味；重者有寒战、高热、头痛、心率快、白细胞增多、官腔分泌物细菌培养阳性。

88. D【解析】该患者为Ⅱ级高血压，同时患有糖尿病，属于高危患者。

89. C【解析】机体不动的时间愈长，发生深静脉血栓的危险性愈高。按摩最主要的目的是促进下肢血液循环，减少下肢深静脉血栓的发生率。

90. B【解析】老年人运动后最适宜的心率可由公式：心率=170-年龄，可算出。

91. B【解析】慢性肾小球肾炎多见于青中年男性，病程迁延1年以上，主要临床表现为血尿、轻中度蛋白尿、水肿和高血压，实验室检查尿蛋白(+~+++），可以见到管型，且以蛋白尿为特征

表现。该病例符合慢性肾小球肾炎的诊断。

92. E【解析】正常骨盆测量值：髂棘间径 23~26cm；髂嵴间径 25~28cm；髂耻外径 18~20cm；出口横径及坐骨结节问径 8.5~9.5cm；对角径 12.5~13cm。该患者每个测量值均小于正常值。若每个平面径线均小于正常值 2cm 或更多，为均小骨盆。

93. D【解析】该患者童年有麻疹等病史，应为继发性支气管扩张症。引起继发性支气管扩张症最主要的病因是支气管组织的炎性感染和支气管阻塞，两者相互影响，促进支气管扩张的发生、发展反复感染破坏支气管壁各层组织，破坏管壁的支撑作用，同时炎症使黏膜充血、水肿，分泌物阻塞管腔，导致引流不畅而加重感染。

94. C【解析】根据病史和血气分析结果判定该患者为Ⅱ型呼吸衰竭，应给予低浓度氧疗，因为病人长期缺氧伴有慢性 CO₂ 留滞，使得呼吸中枢对 CO₂ 浓度改变已不敏感，此时缺 O₂ 就成为维持病人呼吸的重要刺激因子，若吸人氧浓度过高，随缺氧的短暂改善，解除了对中枢的兴奋作用，将使呼吸受到抑制。

95. D【解析】根据患者的病史、诱因、临床表现及血气分析结果判断该患者发生了呼吸衰竭。

96. C【解析】根据老年男性，安静状态起病，起病缓慢，有肢体麻木的前驱症状，无意识障碍，以偏瘫为主要临床表现的病史特点，考虑脑血栓形成可能性大。

97. B【解析】再生障碍贫血是由于多种原因引起的骨髓造血功能衰竭的一类贫血，以外周血全血细胞减少为主要特征。其中，有防御功能的中性粒细胞减少，是患者发生感染发热的主要原因。

98. E【解析】成人口对口人工呼吸和胸外心脏按压同时进行，不论单人或双人抢救，人工循环和人工呼吸的比例均为 30:2，即心脏按压 30 次，吹气 2 次。

99. B【解析】开放性气胸病人有明显的呼吸困难、发绀，甚至休克。胸壁伤口处能听到空气出入胸膜腔的吹风声。

100. C【解析】患者年轻女性，主要表现为尿急、尿频、尿痛等尿路刺激征的表现，伴有腰痛和发热，尿常规检查可见到白细胞增多，符合泌尿系感染的诊断。

101. B【解析】泌尿系统感染的病因是细菌感染，致病菌以大肠杆菌多见。

102. D【解析】大量饮水可使尿量增多，以增加对尿路上细菌和炎症物质的冲刷。

103. A【解析】注意个人卫生，每天清洗会阴部有利于预防泌尿系感染。

104. B【解析】慢性肾小球肾炎的诊断要点为蛋白尿、水肿、高血压 1 年以上，可以考虑慢性肾小球肾炎的诊断。

105. A【解析】考查慢性肾小球肾炎的发病机制。慢性肾炎的发病起始因素是免疫介导炎症。

106. D【解析】考查慢性肾小球肾炎病情加重的诱因。慢性肾炎可因感染、劳累、血压升高或服用肾毒性药物而使病情加重，出现肾功能的进行性损害。本病例中的诱因为劳累。

107. B【解析】该患者住院后接受抗心衰治疗，其中必然包括利尿药物的应用，如使用强效利尿剂则会有发生血钾降低的危险。从本题看病人发生了低钾血症。

108. A【解析】风湿性心瓣膜病与链球菌感染有关，因此要积极防治链球菌感染。

109. A【解析】黄疸按病因分为溶血性黄疸、肝细胞性黄疸、梗阻性黄疸。肝细胞性黄疸总胆红素和直接胆红素升高，尿胆原和尿胆红素呈阳性，尿液颜色变深，其他肝血清酶检查均有异常。根据患者的症状体征和实验室检查，诊断其属于肝细胞性黄疸。溶血性黄疸时总胆红素、直接胆红素和间接胆红素升高，尿胆原阳性黄疸，尿胆红素阴性，尿液颜色加深。多吃胡萝卜引起的黄疸，并没有实验室检查结果的异常。D 和 E 可以引起梗阻性黄疸，主要表现为总胆红素、直接胆红素和间接胆红素升高，尿胆原阴性，尿胆红素阳性，尿液颜色变浅。

110. B【解析】纤维蛋白原、凝血酶原及凝血因子 V、VII、VIII、IX、X 均在肝细胞内合成。当肝细胞严重损害，凝血因子生成减少，导致凝血障碍，凝血酶原时间延长。其他选项的检查在肝细胞损伤时可正常。

111. C【解析】该患者在烈日下从事重体力劳动时出现高热、无汗和意识障碍“三联征”，为热

射病(中暑高热)。

112. E【解析】该患者发生了中暑高热伴休克，此时最适宜的降温措施是动脉快速推注 4℃ 5% 葡萄糖盐水。

113. B【解析】正常出生体重儿指出生体重为 2500~4000g 的新生儿。低体重出生儿指出生体重不足 2500g 者；其中，体重不足 1500g 的又称极低出生体重儿；体重不足 1000g 者又称超低出生体重儿。巨大儿指出生体重大于 4000g 者。

114. A【解析】该新生儿胎龄 32 周，为早产儿，其耳壳缺乏软骨，耳周不清楚。

115. C【解析】抑郁发作的典型症状是“三低”症状，即情感低落、思维迟缓、意志活动减退为主要特征。

116. D【解析】护理人员在照顾抑郁患者时，要具备温和、接受的态度，要有耐心和信心。让患者放松情绪。

117. E【解析】腮腺炎患儿可局部冷敷或用青黛散调醋局部湿敷以减轻腮腺肿痛。

118. A【解析】中上腹剧痛伴发热、寒战、呕吐、腹胀、腹泻等，是急性胰腺炎的常见临床表现。

119. B【解析】如患儿出现持续高热、剧烈头痛提示可能发生了脑膜脑炎；如出现睾丸肿痛提示可能发生了睾丸炎；如出现中上腹剧痛，提示可能发生了胰腺炎。

120. D【解析】除 D 外，其余均为腹水的原因。

121. D【解析】肝硬化大量腹水的病人，护理措施主要包括：限制水、钠的摄入，盐在 1~2g/d，进水量限制在 1000ml/d 左右；应用药物促进水、钠的排泄。本病例中患者呼吸困难，故不能平卧位休息。

122. D【解析】结合临床表现，实验室检查，特别是 ALT 2300U/L 来分析，病人最可能患的是病毒性肝炎。

123. D【解析】对病毒性肝炎最有价值的检查是病毒标志物检测。

124. A【解析】第一产程是指从间歇期 5~6 分钟的规律宫缩开始，到子宫颈口开全。初产妇需 11~12 小时；经产妇需 6~8 小时。第一产程分为潜伏期和活跃期。潜伏期指临产后规律宫缩开始，至宫口扩张 3cm，约需 8 小时。活跃期指宫颈口扩张 3cm 至宫口开全。约需 4 小时，最长 8h。该产妇潜伏期 6 小时，活跃期 5 小时，第一产程 11 小时，产程正常。

125. E【解析】从宫口开全到胎儿娩出，称为第二产程。初产妇需 1~2 小时，经产妇一般数分钟即可完成。该产妇宫口开全 2 小时，胎儿仍未娩出，为第二产程延长。

126. C【解析】胎儿枕骨在孕妇骨盆的左侧，可判断为枕左横。

127. A【解析】胎儿在宫内有缺氧征象危及胎儿健康和生命者，称为胎儿窘迫。正常胎心率为 120~160 次/分，现胎心 164 次/分，初步判断为胎儿窘迫早期，故给予吸氧，通过提高母体血氧含量以改善胎儿血氧供应，同时嘱产妇左侧卧位，观察 10 分钟，若胎心率恢复正常，可继续观察。

128. D【解析】稽留热：体温高达 39℃ 以上，持续数日或数周，波动幅度小，24 小时温差不超过 1℃。

129. B【解析】对高热病人应每隔 4 小时监测一次体温，待体温恢复正常 3 天后改为每日 2 次。

130. E【解析】该患者在静滴青霉素时出现休克的表现，可能为青霉素过敏所致。

131. C【解析】抢救过敏性休克应立即停药，首选 0.1% 盐酸肾上腺素，先皮下注射 0.3~0.5ml，紧接着作静脉穿刺注入 0.1~0.2ml，继以 5% 葡萄糖液滴注，维持静脉给药畅通。在病程中可重复使用数次。一般经过 1~2 次肾上腺素注射，多数病人体克症状在半小时内均可逐渐恢复。

132. E【解析】该患者骨盆骨折合并低血容量性休克，此时的病理生理改变主要是微循环障碍。

133. E【解析】该患者合并低血容量性休克，首要的护理措施是快速输血输液，补充血容量。

134. C【解析】患者青壮年，慢性、周期性、节律性上腹痛，空腹加重，餐后缓解，为十二指肠溃疡的特征性表现。

135. A【解析】纤维胃镜是诊断消化性溃疡的首选。

实践能力（二）答案

1. B【解析】原发性肝癌肝区疼痛为最常见和最主要的症状，多呈间歇性或持续性钝痛或刺痛、胀痛。
2. D【解析】自发性气胸最早出现最典型的症状是胸痛。
3. A【解析】呼吸衰竭机体缺氧时最先受损的是大脑，脑细胞对缺氧特别敏感，一般缺氧4~6分钟，大脑将发生不可逆损害。
4. D【解析】洋地黄药不仅能增强心肌收缩力，还可以通过兴奋迷走神经而减慢心率，因此当心率60次/分时，应立即停止使用。
5. A【解析】肺心病失代偿期的两大临床表现是：呼吸衰竭和右心衰竭；呼吸衰竭主要症状即呼吸困难加重，夜间尤甚。
6. E【解析】痤疮的护理不能挤压，避免引起感染。
7. C【解析】前列腺增生病人最初出现的症状是尿频，早期仅表现为夜尿次数明显增多。进行性排尿困难是前列腺增生病人的典型表现症状。
8. E【解析】头皮血肿抽出积血后应加压包扎，以防压力突然改变引发并发症。
9. A【解析】慢性胃炎一般无明显的临床症状，多数为上腹部隐痛或不适、反酸、上腹部饱胀、嗳气。
10. C【解析】对于心脏的器质性病变最有效的检查是超声心动图。
11. A【解析】子宫内膜异位症手术切口在腹部，采用半卧位，可减轻腹壁张力，减轻切口拉力减轻疼痛。
12. D【解析】丹毒有接触传染性应予以隔离。
13. E【解析】闭合性单处肋骨骨折处理重点是镇痛、固定胸廓和防治并发症。
14. A【解析】精神分裂症的病人是在意识清楚的情况下，出现思维联想过程缺乏连贯性和逻辑性。
15. C【解析】对于肝炎的治疗原则为综合性治疗，以休息、营养为主；辅以适当药物治疗；避免使用有肝损害的药物。
16. B【解析】面部“危险三角区”的疖受到挤压时，细菌可沿眼静脉和内眦静脉进入颅内的海绵状静脉窦，引起化脓性海绵状静脉窦炎，出现寒战、高热、头痛，甚至昏迷，死亡率很高。
17. B
18. E【解析】室颤是最严重的心律失常，相当于心室停搏。
19. E【解析】传染病流行过程中除要具备三个基本条件外，还要受自然因素和社会因素的制约，其中社会因素起主导作用。
20. B【解析】第三产程就是胎盘娩出期，从胎儿娩出到胎盘娩出。需要5~15分钟，不超过30分钟。对产妇的评估最重要的是评估宫缩的情况、阴道出血的量和颜色，分娩后继续在产房观察2小时。因为此阶段产妇容易发生并发症，最常见的是产后出血。
21. C【解析】宫颈炎的临床表现为白带增多，呈乳白色黏液状、淡黄色脓性、血性，炎症扩散至盆腔时可出现腰酸、下腹坠痛。
22. A【解析】十二指肠溃疡患者腹痛的特点是疼痛—进食—缓解，空腹时明显，故又称为饥饿痛。
23. B【解析】胰腺炎患者腹痛进食后可加剧。
24. D【解析】阿尔茨海默病患者回忆出现错误并坚持己见时，不能坚持说服其接受正确的观点，鼓励患者促进其记忆恢复。
25. D【解析】对瘫痪患者应勤翻身，预防压疮的发生。

-
26. C
27. D 【解析】甲亢患者的饮食应无碘盐，避免进食含碘丰富的食物。
28. E 【解析】硬膜外血肿患者的意识障碍典型表现是中间清醒期。
29. D
30. C 【解析】血培养是诊断菌血症和感染性心内膜炎的最有价值的方法。近期未接受过抗生素治疗的病人血培养阳性率可高达95%以上。
31. D 【解析】肺炎患儿易并发心衰应严密观察呼吸心率的变化。
32. C 【解析】胎动减弱消失，胎心率90次/分，考虑胎儿宫内缺氧窘迫，应紧急处理，不可继续观察。
33. C
34. C 【解析】患者膝盖有陈旧性疾患不能负重，其他运动膝盖都要负重故不可选。
35. D 【解析】患者饮酒后出现的醉酒反应，并非感染应用抗生素无效。
36. A 【解析】患者有高血压病史，因情绪波动后出现剧烈头痛、呕吐、昏迷，瞳孔先缩小后散大，对光反射消失，应考虑颅内出血导致颅内压增高形成脑疝。
37. D 【解析】阑尾发生穿孔时表现为腹痛突然加剧，并有腹膜炎症状。
38. A 【解析】妊娠高血压综合征的基本病变是全身小动脉痉挛。小动脉痉挛造成管腔狭窄，周围阻力增大，内皮细胞损伤，通透性增加，体液和蛋白质渗漏，表现为血压上升、蛋白尿、水肿和血液浓缩等。
39. B 【解析】糖尿病足出现破损时应彻底清创、引流、促进肉芽组织生长。
40. C 【解析】患者有高血压病史不可随意服用药物，避免加重肝肾负担。
41. D 【解析】叩背时应将手指并拢，手指向掌心弯曲呈空心掌。
42. D 【解析】大隐静脉高位结扎剥脱术后休息或卧床时抬高患肢30°~40°，以利于静脉回流。
43. C 【解析】烈日下从事田间劳动1小时后出现的不适。
44. A 【解析】阿尔茨海默病患者应鼓励病人参加工娱治疗活动，促进病人记忆和行为等不同程度的恢复，不能将患者关在家里。
45. B 【解析】急腹症患者禁忌灌肠。
46. D
47. C 【解析】癌症患者属于消耗性疾病，应该给予高热量、高蛋白、富含营养的食物。
48. C
49. D 【解析】脑出血最容易出现的并发症是脑疝，脑疝也是导致死亡的直接原因。
50. B 【解析】慢性阻塞性肺疾病患者痰多黏稠，翻身时突然出现面色发绀，烦躁不安，考虑痰液堵塞引起了窒息，应尽快吸痰。
51. C
52. D 【解析】强迫意向是指病人明知道这样做是荒谬的，努力控制自己不去做，但却又无法摆脱这种内心冲动。
53. C
54. D 【解析】环磷酰胺可引起骨髓抑制，主要为白细胞减少。
55. C 【解析】对癫痫有诊断意义的检查是脑电图。
56. D 【解析】支气管扩张患者痰液较多，不能顺利排出，积聚于某一部位时可听闻固定而持久的局限性湿罗音。
57. B 【解析】消化性溃疡患者最常见的并发症是消化道出血，且患者有头昏、乏力、黑矇考虑已经有出血，故应观察大便的颜色看有无黑便。
58. A 【解析】口底、颌下与颈部的急性蜂窝织炎，易致喉头水肿或压迫气管，引起呼吸困难甚至窒息。

59. C 【解析】艾滋病的传播途径是经血液、性、母婴垂直传播，并不会经口传播，吸食大麻并不会接触到血液。
60. B
61. A 【解析】瘘管切开术或瘘管切除术，适用于低位单纯性肛瘘。挂线疗法适用于高位或低位单纯性肛瘘，不会出现肛门失禁。
62. B 【解析】应用阿托品达阿托品化时需停药，阿托品化的表现为患者瞳孔较前扩大、颜面潮红、口干、皮肤干燥、肺部湿罗音减少或消失、心率加快。
63. E 【解析】口服避孕药的禁忌症有①严重心血管疾病者②急、慢性肝炎和肾炎③血液病、血栓性疾病④内分泌疾病如糖尿病需用胰岛素控制者、甲状腺功能亢进者⑤恶性肿瘤、癌前期病变、子宫或乳房肿块 病人⑥哺乳期妇女⑦月经稀少或年龄>45岁者⑧用药后有偏头疼或持续头痛者⑨产后未满6个月或月经未来潮者⑩年龄>35岁的吸烟妇女。
64. D
65. E
66. A 【解析】对于外伤后的有出血或休克征象的患者应尽快建立静脉通路，打开了静脉通道才能及时有效抗休克治疗。
67. B 【解析】硫酸镁治疗妊高症因为镁离子可抑制运动神经末梢释放乙酰胆碱，使骨骼肌松弛。但硫酸镁使用过量会使呼吸肌及心肌收缩功能受到抑制，危及生命。硫酸镁中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失。
68. C
69. D 【解析】糖皮质激素吸入治疗通常需要规律吸入一周以上才可起效，同时，吸药后应漱口，以防口、咽部真菌感染。
70. A
71. D 【解析】肺性脑病的表现为患者出现精神恍惚、白天嗜睡、夜间失眠、多语或躁动。
72. D 【解析】右心衰竭的特征性表现为肝颈静脉回流征阳性。
73. D 【解析】口腔白色乳凝块样物，不易拭去可考虑为鹅口疮，为真菌感染，应选用碳酸氢钠溶液。
74. E
75. B 【解析】肌力活动分级：0级完全瘫痪、肌力完全丧失；1级可见肌肉轻微收缩，但无肢体运动；2级肢体可移动位置，但不能抬起；3级肢体能抬离床面，但不能对抗阻力；4级能做对抗阻力的运动，但肌力弱；5级肌力正常。
76. E 【解析】胃癌术后最常见的并发症为术后胃出血，若引流管内引出大量鲜红液体应警惕。
77. E 【解析】该患儿抽搐的原因是高热。
78. D 【解析】坐浴水温为43~46°C。
79. E 【解析】糖尿病肾病是常见的慢性并发症也是I型糖尿病病人死亡的主要原因，可有蛋白尿、水肿、高血压、肾功能减退及尿毒症等症状。
80. C
81. B 【解析】原发性肝癌肿块逐渐增大，可出现间歇性或持续性钝痛或刺痛。当癌肿破裂时，大量的血液和胆汁流入腹腔，可突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征。
82. B 【解析】阑尾炎术后腹胀未排气排便说明肠蠕动未恢复，使用阿托品为解痉镇痛剂会减慢肠蠕动。
83. D 【解析】肺性脑病患者应慎用镇静、麻醉药品，以防加重病情。
84. E 【解析】休克血容量补足的体征心率120次/分以下。
85. C 【解析】胸腔闭式引流保持长管在水面下3~4cm。
86. C

87. D 【解析】洋地黄药物不易与钙剂同时应用，如果必须使用应间隔 4 小时以上。
88. C 【解析】链霉素的不良反应有肾功能损害。
89. C 【解析】肛周疾病术后应禁食辛辣食物。
90. E 【解析】缓泻剂不可长期应用，会使肠道肛门排便功能紊乱。
91. B 【解析】持久性房颤，易形成左心房附壁血栓，若脱落可引起动脉栓塞。若栓子进入脑血管发生脑栓塞，造成脑组织缺血缺氧而发生脑梗死，从而出现偏瘫、头痛。
92. C 【解析】呕吐宿食为幽门梗阻的特征性表现。
93. D 【解析】妊娠合并糖尿病患者的新生儿在出生后应严密监测血糖，并于娩出 30 分钟后定时滴服 25% 葡萄糖液防止低血糖。
94. C 【解析】钙剂应缓慢静脉滴注。
95. B 【解析】烧伤肢体应维持并固定于功能位，手部固定在半握拳的姿势且指间垫油纱布以防黏连。
96. C 【解析】肝硬化患者失代偿期典型体征大量腹水。
97. D 【解析】后尿道位于盆腔内，坐骨支骨折容易损伤后尿道。
98. A
99. D 【解析】超声雾化吸入雾滴小而均匀，直径在 5μm 以下，药液可达终末细支气管及肺泡，能有效的稀释痰液促进痰液排出。
100. C 【解析】法洛四联症患儿缺氧发作时给予囊胸卧位可减少右向左分流减轻症状。
101. A 【解析】胃穿孔时胃内容物进入腹腔引起急性腹膜炎，腹膜刺激征阳性，腹肌紧张可呈板状腹。
102. A 【解析】严重哮喘病人可出现心率增快、奇脉、胸腹反常运动和发绀。
103. A 【解析】妊娠晚期长时间仰卧位，盆腔瘀血加重，胎盘后血管破裂可致胎盘早剥。应避免长时间仰卧位。
104. A 【解析】多根多处肋骨骨折，局部胸壁失去支撑而软化，产生与呼吸运动相反的运动，临床称为反常呼吸运动。
105. C 【解析】脊髓型颈椎病治疗禁用领枕带牵引、推拿按摩治疗。
106. A 【解析】风湿性心瓣膜病与 A 族乙型溶血性链球菌反复感染有关。
107. C 【解析】昏迷患者昏迷其可留置导尿，但不持续留置。
108. D 【解析】回纳疝块后压迫内环，增加腹压是否脱出，脱出为斜疝，否则为直疝。
109. B
110. D 【解析】降低颅内压防止脑疝发生。
111. C 【解析】脑疝前驱症状会出现脉压增大，脉搏慢而有力，呼吸深而慢。
112. E 【解析】高血压患者为预防脑出血应禁酒。
113. B 【解析】急性脱髓鞘性多发性神经炎临床表现感觉障碍起病时肢体远端感觉异常，如麻木、蚁走感、针刺感和灼热感，伴有肌肉酸痛，或轻微的手套、袜套样感觉减退。
114. C
115. E
116. B 【解析】癫痫持续状态的治疗首先给地西泮 10~20mg 静脉注射。
117. A 【解析】几乎所有 SLE 病人均有肾脏损害，约半数病人有狼疮性肾炎。表现为肾小球肾炎或肾病综合征，可见不同程度的水肿，血尿、蛋白尿、管型尿、高血压及肾功能不全，一旦发展为尿毒症，则成为病人死亡的常见原因。
118. B
119. A 【解析】脊髓损伤后括约肌功能障碍，排尿异常、长期留置尿管，导致泌尿系的感染和结石。其余四项为骨折的并发症。

-
- 120.B
- 121.B【解析】压疮炎性浸润期的特点是皮肤表面颜色转为紫红，皮下产生硬结，表皮出现水疱，水疱易破溃。
- 122.A【解析】压疮炎性浸润期的护理措施对未破的小水疱可用无菌纱布包扎，可自行吸收；大水疱应先消毒局部皮肤，再用无菌注射器抽出水疱内液体（不可剪去表皮），表面涂以消毒液，并用无菌辅料包扎。如水疱已经破溃，应消毒创面及周围皮肤，再用无菌辅料包扎。
- 123.B【解析】麻醉后未清醒的病人应给去枕平卧位防止呕吐物流入气管引起的窒息及防止颅内压降低所引起的头痛。
- 124.B【解析】屈膝仰卧位可以减轻腹壁张力，减轻切口疼痛。
- 125.E
- 126.C
- 127.D
- 128.A【解析】心肌酶是出现最早、恢复最早的可以反应心肌梗死的情况。
- 129.B【解析】CPK 检查要求血清标本，采集时将血液沿血管壁缓慢注入干燥试管内，勿将泡沫注入，并避免震荡，以防红细胞破裂溶血。
- 130.D

专业实务（三）答案

- 1.A
- 2.D【解析】急性胎儿窘迫初期，先表现为胎动过频，继而转弱及次数减少，进而消失。
- 3.A【解析】妊娠晚期性交可以导致胎膜早破，刺激引起早产。
- 4.A
- 5.D【解析】阑尾炎术后尿潴留是常见的并发症之一，主要观察患者的体征，下腹胀痛，膀胱膨隆。
- 6.B【解析】肾结核多为继发性的，大多是由肺结核侵犯。
- 7.C【解析】乙肝疫苗第一次接种是 24 小时内、第二次接种时间是 1 个月、第三次接种时间是 6 个月。
- 8.A【解析】护患关系的发展分为三期，1. 初始期，认识阶段. 2 工作期：护理阶段 3. 结束期，康复出院。
- 9.B【解析】避孕药的不良反应有：1. 类早孕反应。2. 月经改变，月经不规则，少量出血，称处破性出血。还有经期缩短，经量减少，痛经减轻或消失，若出现闭经，应停药。3. 体重增加。4. 色素沉着。
- 10.A【解析】口服肠道抗生素 3-5 天，如：甲硝唑
- 11.E【解析】由责任护士和其辅助护士负责一定数量患者从入院到出院期间各种治疗、基础护理、专科护理、护理病例书写、病情观察、用药治疗及健康教育的护理方式属于责任制护理。
- 12.B【解析】颅前窝骨折皮下瘀斑的典型体征“熊猫眼”征，免眼征。
- 13.B【解析】血性恶露持续 3-4 天，浆液恶露持续 10 天左右，白色恶露 3 周干净。
- 14.A【解析】磺胺药是最早用于预防和治疗全身感染的合成化学药，抗菌谱广，疗效确切，使用该药物时应该多喝水，增加排泄，减少毒性。
- 15.E【解析】接种疫苗是最有效的预防措施，主动免疫。
- 16.C【解析】硝苯地平是第一代钙拮抗剂，为抗高血压、防治心绞痛药物。
- 17.C【解析】一次献血一般为 200 毫升，最多不超过 400 毫升，两次采集间隔期不少于 6 个月。
- 18.A【解析】臭氧消毒后 30 分钟方可进入。
- 19.D【解析】糖尿病酮症酸中毒的呼吸有烂苹果味。
- 20.B【解析】急性上呼吸道感染约有 70%~80% 由病毒引起。

-
- 21.A【解析】2小时翻身一次。
- 22.C
- 23.D【解析】进食期间给予肠外营养，轻型急性胰腺炎一般一周后开始无脂低蛋白流食，并逐渐过渡至低脂肪饮食。
- 24.C【解析】龙葵碱中毒先催吐，然后用2%碳酸氢钠液或0.5%鞣酸溶液洗胃(2)内服硫酸钠导泻，也可用1:5000高锰酸钾液洗胃。
- 25.D【解析】能解除平滑肌的痉挛，缓解内脏绞痛，治疗有机磷农药中毒。
- 26.C【解析】二甲双胍每天用药在500~2000mg剂量范围以内有效；用药方法是进餐时或进餐后服用；作用机制是：促进外周围组织利用葡萄糖，抑制葡萄糖异生及糖原分解；二甲双胍的不良反应有腹部不适、恶心、呕吐、腹泻口中有金属味、或酸中毒；二甲双胍是治疗超重或肥胖2型糖尿病患者的首选用药，它不会使体重增加。
- 27.B
- 28.B【解析】面部表情痛苦、呼吸急促、面颊潮红、鼻翼煽动为急性面容。
- 29.C【解析】使用洋地黄类药物时应先观察患者的心率，洋地黄类能有效地加强心肌收缩力，减慢心率，抑制心脏传导。
- 30.D【解析】肝硬化腹水限盐在1~2g/天，高血压患者每日不超过6g。
- 31.D【解析】多根多段胸骨骨折后，没有完整的肋骨支撑胸廓，出现反常呼吸。
- 32.B【解析】烧伤病人丢失及消耗蛋白质较多，应补充高蛋白、高热量以及多种维生素，提高免疫力。大面积烧伤者可适时输入适量血浆或全血或人体血清蛋白，以增强抵抗力。
- 33.D【解析】微生物、病毒等人类的健康带来危害。
- 34.E【解析】胎位30周后不可自行转为头先露，需行体外矫正。
- 35.D
- 36.C
- 37.A
- 38.D
- 39.A【解析】热疗法作用是促进炎症的消散和局限，缓解疼痛减轻，深部组织充血，保暖。
- 40.C【解析】灯距为30~50cm。
- 41.B
- 42.E【解析】少尿是指24小时少于400ml，或每小时尿量少于17ml。
- 43.D
- 44.A
- 45.B【解析】戊二醛常用于浸泡不耐热的医疗器械、精密仪器：如内镜等。
- 46.D
- 47.B【解析】压力蒸汽灭菌法是一种临幊上应用最广、效果最可靠的首选灭菌方法，用于耐高温、耐高压、耐潮湿的物品，如各种器械、敷料、搪瓷类、玻璃制品、橡胶内、某些药品、溶液、细菌培养等的灭菌。
- 48.B【解析】营养不良的早期表现为体重不增，随后体重下降。
- 49.D【解析】有排卵者的在月经第5天刮，无排卵的在月经来潮前一周刮。
- 50.E
- 51.B
- 52.C【解析】血清病型反应，一般于用药后7~12天发生，临幊表现为：发热、皮肤瘙痒、荨麻疹、腹痛、关节肿痛、全身淋巴结肿大等。
- 53.D
- 54.E

55.C

56.E

57.E【解析】产后十天子宫降至盆骨腔内，产后六周恢复到正常未孕期大小。

58.B【解析】法洛四联症的特点是以肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥大为主要临床特征，其中以肺动脉狭窄为重要畸形。

59.E

60.B【解析】I级：体力活动不受限。II级体力活动轻度受限，日常活动可引起气急、心悸。III级体力活动明显受限，稍事活动即引起气急、心悸，有轻度脏器淤血体征。IV级活动重度受限，休息状态下也气急、心悸，有重度脏器淤血体征。

61.D【解析】肾衰引起代谢紊乱，钾排不出去，从而高血钾症。高血钾可导致心脏骤停。

62.C【解析】妇科检查：阴道黏膜及宫颈充血，呈紫蓝色，子宫峡部极软，子宫体与子宫颈似不相连，称黑加征。

63.E

64.B【解析】贫血是尿毒症患者必有的表现，为正色素正细胞性贫血，主要是由于促红细胞生成素减少，导致红细胞生成减少和破坏。

65.B【解析】自发性低血糖是营养不良最严重的并发症。

66.D【解析】水肿是肾病综合症最常见的症状，是因为低白蛋白血症导致血浆胶体渗透压减低，水分外渗所致。水肿从眼睑、颜面部开始，以后则逐渐以下肢为主，呈可凹性。

67.D【解析】白血病感染的主要原因是发热，发热感染最主要的原因是成熟的细胞缺乏。

68.C【解析】甲硝唑，能抑制多种原虫的氧化还原反应，使病原体氮链断裂，虫体死亡。不良反应为恶心、腹泻、腹痛等胃肠道反应，偶尔见头痛、失眠、皮疹、白细胞减少和神经系统症状等，停药后可恢复，妊娠早期、哺乳期妇女、中枢神经系统疾病及血液病患者禁用。

69.E【解析】腹股沟斜疝发生绞窄时可有血运障碍，渗出液为血性渗出，淡黄色渗出液为感染性渗出。

70.B【解析】 ^{131}I 碘实验时，食用无碘盐，避免进食含碘丰富的食物，如海带、紫菜等。

71.C【解析】呼吸窘迫综合征早期的病理表现为：多种炎症导致血管通透性增加，血液成分外渗，肺间质和肺泡发生水肿，肺泡萎缩，肺顺应性降低，从而导致通气、血流比例失调。肺透明膜病为早产儿的肺发育不成熟，表面活性物质缺乏所致。

72.B【解析】肝硬化的临床表现有出血倾向，主要与肝合成凝血因子减少等因素有关。

73.D【解析】根据临床表现可以判断为原发性高血压。

74.D【解析】血尿素氮(BUN)：临上以将其作为判断肾小球滤过功能的指标。血肌酐(Cr)：临上检测血肌酐是常用的了解肾功能的主要方法之一。24h 尿蛋白定量：临上测定蛋白排出情况。

尿微量白蛋白排泄率(UAER)：临上是测定糖尿病影响肾脏的早期征象。尿肌酐清除率：检测肾功能的比值。

75.A

76.B

77.E

78.E

79.A【解析】再生障碍性贫血的病因是：药物及化学物质，最常见的是氯霉素。

80.C

81.D

82.C【解析】产后一周缩小至约妊娠 12 周大小，产后十天子宫降至骨盆腔内，产后六周恢复到正常未孕大小。

- 83.B【解析】宫颈癌是最常见的妇科恶性肿瘤，鳞状细胞癌最为多见，好发部位是宫颈移行带（鳞、柱状上皮交界处）直接蔓延是最常见的转移途径。
- 84.D【解析】 $21+4 \times X=53\% \quad X=8L$
- 85.C【解析】子宫肌瘤可能与体内雌激素水平过高或长期受雌激素刺激有关，外源性雌激素可加速肌瘤生长。因此，是否长期使用雌激素对于子宫肌瘤的诊断很重要。
- 86.B【解析】小肌瘤一般无月经量的改变，大的肌壁间肌瘤可出现月经期缩短，经期延长月经量增大。黏膜下肌瘤常表现为月经量过多，经期延长，因此月经量过多与子宫肌瘤的生长部位有密切的关系。
- 87.D【解析】地西洋是控制惊厥和癫痫持续状态的首选药物，但青光眼慎用。
- 88.E【解析】一氧化碳中毒后应立即将病人转到新鲜空气处，解开衣服，注意保暖，保持呼吸道通畅。
- 89.B【解析】前囟闭合的时间是1-1岁半，后囟最迟6-8周。闭合颅骨骨缝约3-4个月，闭合。
- 90.A【解析】月经周期是以两次月经第一日的间隔时间，而不是本次月经干净至下次月经来潮。
- 91.B【解析】此患者障碍为癔症中的运动障碍，病人不用语言表达意见或回答问题，但可以书写或手势与人交谈称缄默症。
- 92.A【解析】应该是坐在椅子的前部1/2或1/3处，而不是后部。
- 93.B【解析】小脑幕切迹疝可使颞叶内侧的海马回和钩回向下移位，挤入小脑幕裂孔，压迫小脑幕切迹内的中脑、动眼神经、大脑后动脉和中脑导水管，同侧大脑脚（锥体束）和动眼神经受压，造成同侧瞳孔散大对侧肢体上运动神经元瘫痪。
- 94.C【解析】此新生儿为生理性体重下降，十天左右恢复正常。
- 95.B【解析】气管切开，患者室内相对湿度以50%-60%为宜。中暑患者可动脉快速推注4℃的葡萄糖盐水进行降温，室温以20-25摄氏度为宜。产妇病室既应该保暖，也需开窗通风。通风，可以减少室内细菌，破伤风病人应置于光线暗些的病室，避免诱发抽搐。
- 96.B【解析】妊娠时胎膜早破，为防止脐带脱垂，应采用头低足高位。
- 97.B【解析】密切观察局部皮肤颜色有无变化，可以及时发现因约束带过紧而造成的组织缺血。
- 98.B【解析】过氧乙酸对于金属有腐蚀性，因此不宜用于浸泡金属器械。
- 99.E【解析】无菌持物钳只能用于夹取无菌物品，不能夹取油纱布或进行换药、消毒等。
- 100.A【解析】推注有阻力，回抽无回血，应考虑针头在血管外。
- 101.C【解析】肾上腺素是一种激素和神经传递体，会使心脏、肝、筋骨的血管扩张，皮肤、黏膜的血管收缩。是拯救濒死病人的必备药品。
- 102.C【解析】病人已进行青霉素治疗，如停药3天后再用，或用药途中更换批号，均应重新做过敏实验。
- 103.C【解析】青霉素过敏性休克在抢救时首先采取的措施是：立即停药，平卧，皮下注射0.1%盐酸肾上腺素。
- 104.D【解析】静脉注射可直接用于体内，发挥药效最快。
- 105.A【解析】护士应遵医嘱给药，不可自行给药、加药或减药。
- 106.C【解析】服磺胺药需多饮水的目的是：避免尿中结晶析出影响肾功能。
- 107.C【解析】洋地黄类药物的药理作用是正性肌力和负性频率，常用于治疗心力衰竭和房颤，所以应观察心率。
- 108.C
- 109.C【解析】水槽和雾化罐切忌加温水或热水；在使用过程中，如发现水槽里的水温超过50℃时或水量不足时，应先关机，再更换冷蒸馏水。
- 110.E【解析】为防止感染，消毒为首要原则。

- 111.D【解析】2岁以下婴幼儿不宜进行臀大肌注射，因臀大肌尚未发育好，注射时有损伤坐骨神经的危险，最好选用臀中肌和臀小肌。
- 112.B【解析】肌肉注射法中侧卧位为：上腿伸直并放松，下腿稍弯曲。
- 113.C【解析】皮下注射时针头斜面向上，与皮肤呈30°~40°角，迅速刺入针梗的1/2~2/3。
- 114.D【解析】链霉素过敏反应的处理方法：可静脉缓慢推注10%葡萄糖酸钙（或氯化钙）10ml，以使钙离子和链霉素结合而减轻中毒症状。
- 115.A【解析】破伤风抗毒素皮试液的标准：每毫升含破伤风抗毒素150U。在前臂掌侧下段皮内注射0.1ml（含破伤风抗毒素15U），20分钟后进行观察、判断。
- 116.D【解析】链霉素皮试液的标准：每毫升含链霉素2500U。在前臂掌侧下段皮内注射0.1ml（含链霉素250U），20分钟后进行观察。
- 117.C【解析】脑组织缺氧为过敏性休克病人出现的中枢神经系统症状的原因。
- 118.C
- 119.D【解析】空气栓塞可直接猝死。
- 120.B【解析】静脉炎的护理措施是：立即停止局部输液，抬高患肢并制动，可在局部用95%乙醇或50%硫酸镁进行热湿敷。
- 121.C【解析】空气栓塞和急性肺水肿均可出现呼吸困难，但是急性肺水肿主要体现在咳粉红色泡沫痰，而空气栓塞有水泡声。
- 122.E【解析】端坐位可以减少下肢血液回流入心脏，减轻心肺负担。
- 123.D
- 124.A【解析】已发生破伤风症状控制并解除痉挛是治疗的重要环节。
- 125.B【解析】首要解决生命危险问题，其中窒息是死亡的原因，危及生命。
- 126.E【解析】破伤风病人的治疗、护理等各项操作尽量集中，可在使用镇静剂30分钟内进行，避免刺激打扰病人而引起抽搐。
- 127.C【解析】目前患儿主要是尿少、水肿，造成体内水钠潴留，故其首选的护理诊断是体液过多。
- 128.A【解析】急性肾小球肾炎最主要的是卧床休息，防止因活动而增加心脏负荷，从而诱发心力衰竭。
- 129.E【解析】可通过观察尿量、尿色来判断肾出血情况，若尿色加深则提示肾出血加重。
- 130.D【解析】患者应绝对卧床休息2~4周

实践能力（三）答案

- 1.E【解析】头部放冰袋是血液病病人较为适宜的降温措施。
- 2.D【解析】急性胰腺炎常见的诱因包括：胆道疾病、酗酒和暴饮暴食、胰管梗阻、手术与创伤、内分泌与代谢障碍、药物、感染等。预防措施主要是去除常见的诱因，而抑制胰酶活性的药物属于急性胰腺炎的治疗措施。
- 3.D【解析】丹毒即网状淋巴管炎，起病急、进展快，先有畏寒、发热、头痛、全身不适等全身症状，继之局部出现片状红疹，颜色鲜红，中央较淡、边界清楚并略隆起。
- 4.D【解析】精神分裂症可再现神经衰弱症状群。但它们主要区别是对治疗有无要求，即自知力的有无，精神分裂症无治疗要求，神经衰弱有治疗要求。
- 5.A【解析】对氨基水杨酸钠、氨硫脲、乙胺丁醇都是抑菌药，只有吡嗪酰胺是杀菌药。
- 6.E【解析】腰椎单纯压缩性骨折，椎体压缩不足2/3或老年人不能耐受复位和固定者，应卧硬板床，骨折部位加厚枕，使脊柱过伸，3日后进行腰背肌锻炼。椎体压缩大于1/3的年轻病人，可用双踝悬吊法过伸复位，复位后石膏背心固定3个月，固定期间坚持每日背肌锻炼。
- 7.C【解析】食管癌的治疗以手术治疗为主，辅以化疗、放疗等综合治疗。
- 8.C【解析】膀胱肿瘤最常见、最早出现的症状是间歇无痛全程肉眼血尿，尿频、尿痛属于晚期

症状。

9.C【解析】成人哮喘多是由呼吸道感染引起，所以，控制呼吸道感染是预防成人哮喘发作的主要措施。

10.A【解析】约90%原发性颅内肿瘤病人出现颅内压增高的症状和体征，通常呈慢性、进行性加重的过程。

11.A【解析】阴阳五行学说的“五行”是金、木、水、火、土五种物质及其运动变化。

12.D【解析】头高足低位适用于：颈椎骨折进行颅骨牵引时作反牵引力；预防脑水肿，减轻颅内压；开颅手术后等。

13.B【解析】对到门诊就诊的患者首先要进行预检分诊。

14.E【解析】磺胺类药物如复方新诺明，容易在体内形成结石，多饮水则可加速排泄，减少毒副作用。

15.A【解析】严密观察病情属于特级护理内容，B属于一级护理内容，C、D属于三级护理内容，E属于二级护理内容。

16.B【解析】淤血红润期局部皮肤受压或潮湿后，出现红、肿、热、痛或麻木，短时间内不见消退，皮肤表面无破损。

17.A【解析】出院病历的排列顺序是：住院病历首页、出院(或死亡)记录、入院记录、病史和体检单、病程记录、各种检查检验报告单、护理记录单、医嘱单、体温单。

18.C【解析】推轮椅时，嘱病人手扶轮椅扶手，身体尽量向后靠，不能前倾或自行下轮椅。要随时观察病人病情，下坡时要减慢速度。上下轮椅时要固定车闸。

19.E【解析】当颅内压增高时，脑灌注压下降，血流量减少，机体代偿性反应而出现血压升高(收缩压增高为主，脉压增大)，脉搏慢而有力，呼吸慢而深(二慢一高)。随着病情加重，超过机体代偿能力时，出现血压下降、脉搏快弱、呼吸浅促或潮式呼吸(二快一低)，最终呼吸停止、心脏停搏。这种典型的生命体征改变称为库欣(Cushing)反应。

20.A【解析】支气管哮喘病人急性发作时应取端坐位，有利于缓解呼吸困难。

21.D【解析】2%戊二醛溶液加入0.3%碳酸氢钠，成为2%碱性戊二醛，用于浸泡器械、内镜等。消毒需10~30分钟，灭菌需7~10小时。

22.D【解析】已经去除铝盖的无菌溶液在倒出液体后，如一次未用完，应立即塞好瓶塞、消毒，注明开瓶日期和时间，24小时内可再使用。

23.A【解析】无菌操作中若无菌手套破裂或不慎被污染，应立即更换。

24.C【解析】为左上肢骨折的病人更衣时，应先脱右上肢，后脱左上肢；先穿左上肢，后穿右上肢。

25.A【解析】测量呼吸常在测量脉搏后，护士手仍按在病人手腕处保持诊脉姿势，不需向病人解释，以免病人紧张影响测量结果。观察病人胸部或腹部的起伏次数30秒，将测得数值乘以2。若呼吸异常，需观察1分钟。

26.D【解析】测量肱动脉血压时，血压计“0”点应与心脏、肱动脉在同一水平位上。坐位时肱动脉平第四肋软骨，仰卧位时，肱动脉平腋中线水平。

27.D【解析】肝胆胰疾病的饮食护理要求低脂、高糖、高蛋白、高维生素饮食。

28.B【解析】孵化血吸虫毛蚴的标本，留取粪便50g(鸭蛋大小)，必要时留取24小时大便，要及时送检。

29.C【解析】鼻饲时胃管插入的长度是45~55cm。

30.D【解析】取溃疡面坏死组织进行涂片检查，如能找到真菌菌丝；或取坏死组织进行培养而有真菌生长，是最可靠的诊断依据。

31.A【解析】导尿时应先铺橡胶单和治疗巾，初步消毒后在两腿之间打开导尿包，戴无菌手套后，铺洞巾，润滑导尿管前端备用。再次消毒后插入导尿管。

- 32.D【解析】男性导尿时应提起阴茎使之与腹壁成 60° ，使耻骨前弯消失，以利插管。
- 33.A【解析】立即终止输血，应用大剂量糖皮质激素，碱化尿液、利尿，保证血容量和水电解质平衡，纠正低血压，防治肾衰竭和DIC。
- 34.A【解析】侧卧位时上腿伸直，下腿稍弯曲。B、C、D、E都符合无痛注射的原则。
- 35.E【解析】发药时如病人提出疑问，应重新核对，确认无误后再耐心解释，协助服药。
- 36.C【解析】皮肤试验常取前臂掌侧下段，预防接种常选择上臂三角肌下缘。消毒皮肤禁用安尔碘，以免影响结果判断。注射时针尖斜面应完全进入皮内后再放平注射器，注入0.1ml药液使局部成一半球形皮丘。注射完毕迅速拔出针头，禁用棉签按压。
- 37.A【解析】因库存血随保留时间的延长，会出现酸性增加，钾离子浓度升高，故大量输入库存血可导致酸中毒和高钾血症。
- 38.A【解析】新鲜血基本保留了血液中原有的所有成分，主要适用于血液病病人，可补充各种血细胞、凝血因子和血小板。
- 39.B【解析】采集血清标本时，抽血后应立即取下针头，将血液沿管壁缓慢注入干燥试管内，并避免振荡，以防红细胞破裂溶血而直接影响检查结果的准确性。
- 40.E【解析】尿标本中加入甲苯，可形成一薄膜覆盖于尿液表面，防止细菌污染，保持尿液中化学成分不变。
- 41.C【解析】留痰标本如查找癌细胞，应立即送检，或用10%甲醛或95%乙醇溶液固定后送检。
- 42.D【解析】缺氧和二氧化碳潴留同时存在时，应低流量、低浓度持续吸氧。如给予高浓度吸氧，则缺氧反射性刺激呼吸的作用消失，从而导致呼吸抑制，使二氧化碳潴留更加严重，发生二氧化碳麻醉甚至呼吸停止。
- 43.C【解析】简易呼吸器使用时呼吸气囊的挤压频率为16~20次/分。
- 44.B【解析】尸体料理时应洗脸，闭合口、眼，如有义齿将其装上，以维持尸体良好的外观。
- 45.D【解析】对于危重患者及大手术后的患者除了口头交班还需要进行床边交班等以便全面了解病情。
- 46.B【解析】临时医嘱一般只执行一次，并应在短时间内执行。A、C、D、E都属于长期医嘱。
- 47.E【解析】当体温与脉搏重叠时，先绘制体温符号，再用红笔在体温外画红圈表示脉搏。
- 48.C【解析】根据病例分析，该病人的发作为癫痫小发作，故首选的药物是乙琥胺。
- 49.A
- 50.B【解析】该患者持续性疼痛，明显压痛，腹肌紧张，须怀疑绞窄性疝，并有绞窄性肠梗阻，须紧急手术，以防肠道坏死。
- 51.B【解析】该患者为老年慢阻肺的急性发作期，痰多黏稠，翻身时突然出现面色发绀，烦躁不安。应考虑出现了呼吸道痰液阻塞，应首先采取的措施是吸痰。
- 52.D【解析】该患者最有可能为腹腔内实质性脏器损伤，主要表现为失血性休克，但若单纯行抗休克治疗是无法达到预期效果的，必须在抗休克同时剖腹探查，手术止血。
- 53.E【解析】该患者出现反常呼吸运动会严重影响呼吸和循环，急救时可以通过局部加压固定来有效控制反常呼吸。
- 54.E【解析】该患者为开放性气胸，急救时应迅速封闭伤口，然后按封闭性气胸处理。
- 55.E【解析】对该产妇应首先进行阴道检查或肛门检查，以明确胎头颅骨最低点的位置，并能协助判断胎位。但若有异常阴道流血或怀疑有前置胎盘，应禁止肛查。
- 56.D【解析】患者为急性脑出血，现一侧瞳孔散大，呼吸不规则，可能是脑疝的表现。
- 57.E【解析】通常用钙离子拮抗钾离子对心肌的抑制作用。
- 58.E【解析】该患者左上肢有假关节现象，说明存在完全性骨折，应予以临时固定，以防止骨折断端再移位而损伤周围血管、神经或软组织，同时固定后可减轻疼痛，便于转送。
- 59.B【解析】软组织闭合性损伤24小时内，应局部冷敷，收缩血管，减少出血，减轻肿胀。24

- 小时后热敷促进淤血吸收。
60. A【解析】首先气管切开行人工辅助呼吸，防止窒息死亡。
61. B【解析】深、浅昏迷的主要区别是角膜反射及防御反射是否存在。
62. E【解析】该患者引流时间长，引流量较小，可以拔出T管，脱出后可严密观察脱管后有无腹痛、黄疸、发热。
63. E【解析】宫缩不强且未破膜的待产妇可在室内走动，有助于加速产程进展。破膜后应立即卧床。
64. E【解析】脓性指头炎发病初期指头轻度红肿、针刺样疼痛，逐渐转为搏动性跳痛，肢体下垂时更明显，多伴有恶寒、发热等全身症状。感染进一步加重，指头皮肤反而变白，疼痛减轻，提示局部组织趋于坏死。因此治疗应在出现搏动性疼痛时应及早切开减压，不可待有波动时才手术，以免延误治疗，发生指骨缺血性坏死或慢性指骨骨髓炎。
65. B【解析】下肢静脉曲张手术后若无异常情况，24~48小时即应鼓励患者下床活动。患肢抬高30°，同时做足背伸屈运动，以促进静脉血液回流。弹力绷带一般需维持2周。若发生深静脉血栓形成，则局部禁止按摩，以免血栓脱落。
66. E【解析】根据病史，患者为急性左心衰竭发作。针对该类患者的给氧宜采用高浓度吸氧并经乙醇湿化。
67. D【解析】责任护士应根据心功能制订活动计划，让患者体力和精神充分休息，循序渐进增加活动量。对于心功能Ⅱ级者，强调保证午睡，可适当从事轻体力工作和家务劳动。
68. C【解析】肺癌手术因切口较大、分离粘连广泛、大量毛细血管充血及胸腔内负压等因素，均可使术后胸腔内渗血较多。故24小时内最常见的并发症是出血。
69. E【解析】该患者为尿失禁病人，留置导尿管后，为预防泌尿系感染，应鼓励病人多饮水，必要时行膀胱冲洗。
70. D【解析】每分钟40滴，每小时的量为 $40 \div 15 \times 60(ml) = 160ml$ 。
71. C【解析】辅食添加顺序为：出生2周~3个月的小儿可添加流质食物，如鱼肝油、鲜果汁、菜汁；4~6个月可添加泥状食物，如蛋黄、稀粥、米糊等；7~9个月可添加末状食物，如烂面、饼干、蛋、肉末等；10~12个月可添加软碎食物，如稠粥、面条、碎菜、碎肉、馒头等。
72. E【解析】口腔黏膜的上腭中线和齿龈切缘上有黄白色小斑点是马牙的表现，数周后可自然消退，不可挑割，以防发生感染。
73. E【解析】方颅、肋骨串珠是佝偻病激期的表现，此期应减少负重，防止骨骼畸形，故该患儿不宜进行站立锻炼。
74. B【解析】一般妇女在服用避孕药后，可使月经变得规则，经期缩短，经血量减少，同时使痛经症状减轻或消失。
75. B【解析】膀胱镜检查+活检是确诊膀胱癌最可靠的办法。
76. E【解析】用冷水洗脸和洗鼻有利于预防感冒。
77. B【解析】对于哮喘发作的病人，应鼓励患者多饮水，以稀释痰液，促进痰液排出，必要时可静脉补充液体，该题部分已明确提出患者痰液黏稠，因而更需注意液体的补充。
78. C
79. C【解析】预防压疮最好的方法就是避免局部组织长期受压，可以每2小时为病人翻身按摩一次。因此答案为选项C。
80. D【解析】红外线灯照射有消炎、镇痛、促进创面干燥结痂和肉芽组织生长的作用。
81. A【解析】ac的意思是“饭前”。
82. B【解析】王某主要是由于失血过多，引起低血容量性休克，输血的主要目的是补充血容量。因此，B选项为正确答案。
83. B【解析】头罩法吸氧是将患儿的头部置于头罩内进行吸氧的方法，此法简便，无刺激，能根

据病情调节氧浓度，长时间吸氧也不会发生氧中毒，而且透明的头罩有利于观察病情。鼻导管法和鼻塞法适用于长期吸氧的患者；面罩法适用于张口呼吸及病情较重的患者；氧气枕法适用于家庭氧疗、抢救或转移患者时。

84.D【解析】肢体纵轴应与牵引力线平行防止骨骼错位。

85.C【解析】惊厥发作时，应该迅速应用止惊药物，首选地西泮（尤其适用于惊厥持续状态），其次是苯妥英钠（适用于癫痫持续状态、地西泮无效时）、苯巴比妥（新生儿惊厥首选）等，必要时用10%水合氯醛保留灌肠。

86.C【解析】进行伤口换药时应遵循从相对清洁伤口到污染伤口的换药顺序。

87.E【解析】糖皮质激素（泼尼松）为治疗慢性特发性血小板减少性紫癜的首选药物。但如果应用糖皮质激素治疗6个月以上无效者，是脾切除的适应证。脾切除的作用机理是减少血小板破坏及抗体的产生。

88.E【解析】采取头低足高位可以防止脐带脱垂。

89.E【解析】肺结核是经过飞沫传播，故应给予呼吸道隔离。

90.A【解析】湿热敷部位有伤口者，应严格按无菌原则处理。

91.B【解析】需长期行注射患者，注射部位应交替使用，皮下注射常用的注射部位有上臂三角肌下缘、腹部、后背、大腿前侧及外侧。

92.B【解析】黄疸、四肢麻木、腰背酸痛是溶血反应的典型表现，在溶血反应初期红细胞凝集成团，阻塞部分小血管，可引起头疼、四肢麻木、腰背酸痛和胸闷等症状。中期由于凝集的红细胞发生溶解，大量血红蛋白散布到血浆中，可出现黄疸和血红蛋白尿，同时伴有寒战、高热、呼吸急促、血压下降等症状；另外溶血反应一般发生于输血10~15ml后。病人输血反应发生的时间和症状均符合溶血反应的特点。

93.D【解析】肺心病伴呼吸衰竭的病人多为II型呼衰，缺氧伴CO₂潴留。此时呼吸中枢对CO₂的反应性差，呼吸维持主要靠低氧血症对颈动脉窦、主动脉体的化学感受器的兴奋作用，若吸入高浓度氧气，氧分压迅速上升，使外周化学感受器失去低氧的刺激，导致呼吸减慢变浅，会进一步加重CO₂潴留，严重时可陷入CO₂麻醉。因此，应给予低流量、低浓度给氧。乙醇湿化给氧常用于急性肺水肿病人；加压给氧常用于CO中毒病人。

94.B【解析】绝经后妇女出现不规则阴道流血是宫体癌病人的常见主诉。

95.D【解析】分段诊刮是确诊子宫内膜癌（又称宫体癌）最常用的刮取内膜组织方法，将组织送病理检查。

96.C【解析】手术治疗是子宫体癌首选的治疗方法，尤其对于早期病例。

97.B【解析】颅内压正常值为0.7~2.0kPa(70~200mmH₂O)。

98.E【解析】颅内压增高“三主征”即头痛、呕吐和视乳头水肿三项颅内压增高的典型表现。

99.D【解析】用肥皂水灌肠可加重颅内压增高。

100.A【解析】蛇咬伤应就地先用大量清水冲洗伤口，挤出毒液，但不能用温水，以免促进毒素的吸收。

101.C【解析】病人伤肢处于下垂位：保持伤口引流通畅和创面清洁、干燥。

102.C【解析】采用红外灯照射时，每次照射时间20~30分钟。

103.E【解析】在照射过程中，应随时观察患者局部皮肤反应，如皮肤出现桃红色的均匀红斑，为合适；如皮肤出现紫红色，应立即停止照射，并涂以凡士林保护皮肤。

104.D【解析】照射完毕，关闭开关，应嘱患者休息15分钟后再离开治疗室，以防感冒。

105.A【解析】门诊护士在遇到高热、剧痛、呼吸困难、出血、休克等病人时，应安排提前就诊。该患者腹部剧烈疼痛，应安排提前就诊。

106.B【解析】轮椅椅背应与床尾平齐。

107.E【解析】面色苍白是护士通过观察得到的资料，属于客观资料。

- 108.E【解析】乳癌根治术后，皮瓣下常规放置引流管并接负压吸引，是为了能及时、有效地吸出残腔内的积液、积血，有利于皮瓣愈合。
- 109.D【解析】乳癌根治术后7~10日内，病人不外展肩关节以防皮瓣移动而影响创面愈合。
- 110.B【解析】乳癌根治术后若出现手指发麻、皮肤发绀、皮温下降、脉搏不能扪及，提示腋窝部血管受压，应及时调整包扎绷带或胸带的松紧度。
- 111.A【解析】根据血气分析结果判断该患者为II型呼吸衰竭，此类患者氧疗原则是持续低流量(1~2L/min)给氧，以免缺氧纠正过快引起呼吸中枢抑制。
- 112.B【解析】呼吸系统疾病患者特别是痰液黏稠不易咳出者，其气道护理非常重要，护士应积极采取措施促进患者排痰，常用的促进排痰的措施主要包括有效咳嗽、翻身拍背、体位引流及机械吸痰等。
- 113.E【解析】根据题干判断，患者出现急性的缺O₂和CO₂潴留加重，从发病机制来看主要是由于通气功能障碍导致的。具体到该患者的情况，护士应考虑黏稠痰液堵塞气道的可能性，因而最有效的措施就是开放气道，护士应做好气管插管或气管切开的准备。
- 114.A【解析】根据临床表现、基础疾病(肺心病病史20年)和诱因(肺部感染)判断该患者可能出现了呼吸衰竭。
- 115.D【解析】此患者为肺源性呼吸困难，选取体位的原则应尽可能扩大肺容量，以利呼吸，取半卧位时，膈肌下沉，使肺容量扩大，可减轻患者的呼吸困难。
- 116.B【解析】该患者为慢性肺心病，已出现肺性脑病的表现，主要表现为烦躁，即处于兴奋期，而CO₂潴留所引起的中枢神经系统的症状表现为先兴奋、后抑制，该患者处于肺性脑病的早期，继而会进入抑制期，因此不宜使用镇静剂，以免加重肺性脑病。
- 117.A【解析】精神稍差、前囟平坦、尿量正常是轻度脱水的表现；血清钠140mmol/L是等渗性脱水的表现。
- 118.B【解析】患儿因进食饺子过量发生腹泻，大便6~10次/天，故腹泻为首要的护理问题，其他症状较不明显。
- 119.E【解析】该患儿是由于添加辅食不当引起的腹泻，故应立即停止辅食。
- 120.D【解析】根据病例分析患者最可能是急性心肌梗死，故对病情评估最有帮助的是心绞痛病史。
- 121.C【解析】急性心肌梗死拍胸片的意义不大。
- 122.C【解析】创伤的急救原则是抢救生命第一，恢复功能第二，顾全解剖完整性第三。该患者左下肢有活动性出血，股骨干骨折，应先抢救生命，处理休克。
- 123.E【解析】因该患者有活动性出血，股骨干骨折易发生低血容量性休克，故在护理中应特别注意有无休克。
- 124.B【解析】该患者为宫外孕出血合并低血容量性休克，入院后护士应首先测量生命体征，建立静脉通道。
- 125.D【解析】该患者出现了低血容量性休克，应安置休克体位——中凹卧位。
- 126.A【解析】相对于体位引流其他排痰方法更安全和有效。
- 127.D【解析】吸痰时应边提拉边抽吸。
- 128.D【解析】肺心病吸氧的原则是低流量、低浓度、持续。
- 129.D【解析】血小板减少性紫癜患者往往有凝血功能障碍，所以操作时应注意动作轻柔。
- 130.B【解析】对取下的义齿可用冷开水冲洗刷净，浸于清水中保存，不可浸于开水、乙醇中保存，浸义齿的水应每天更换。
- 131.E【解析】行膀胱全切肠道代膀胱术的病人，术前按肠切除进行肠道准备。
- 132.D【解析】回肠膀胱术后，应密切观察造瘘口的大小、形状、颜色，正常造瘘口肿胀、鲜红、潮湿，如灰暗且发绀，可能是由于血供受阻，应立即通知医生。

-
133. A 【解析】高血压及饮酒病史，突然发病，肢体瘫痪，应首先考虑为脑出血(内囊出血)。
134. E 【解析】脑出血的病人可引起颅内压增高，严重时可引起脑疝。而脑疝是引起病人死亡的主要原因。所以脑出血的病人首要解决的问题是降低颅内压。
135. B 【解析】由题意得知病人出现脑疝，脑疝病人首选甘露醇快速静脉滴注。

专业实务(四) 答案

1. C 【解析】脊椎结核约占骨关节结核总数的一半，其中以儿童和青少年发生为最多。所有脊椎均可受累，但以腰椎为多见，胸椎次之。
2. A 【解析】温水湿敷有利于缓解系统性红斑狼疮的皮肤损害。化妆品会刺激皮肤，加重皮损，因此应禁用化妆品。紫外线使皮肤上皮细胞凋亡，新抗原暴露而成为自身抗原，因此紫外线是系统性红斑狼疮发病的重要诱因。肥皂水属于碱性，会加重系统性红斑狼疮的皮肤损害。
3. A 【解析】病人的脑干反射消失，脑电波消失，无自主呼吸，处于深昏迷状态，说明患者处于脑死亡期。临床死亡期的诊断依据为心跳、呼吸停止，但脑电波并没有消失；濒死期病人的呼吸、心跳减慢，脑干功能仍然存在。因此，选项 A 为正确答案。
4. B 【解析】国际抗癌联盟提出的 TNM 分期法中，T 指原发肿瘤，N 指淋巴结，M 指远处转移。
5. D 【解析】Ⅲ级：一般体力活动显著受限，休息时间不适或有轻度心力衰竭，轻微日常活动即感不适、心悸、呼吸困难。
6. E 【解析】妊娠 36 周末，宫底高度应在剑突下 2 横指。
7. E 【解析】洗胃的目的不包括排出肠道积气。
8. B 【解析】患者进入手术室时，最常出现的心理反应是对麻醉和手术的恐惧。
9. A 【解析】壁细胞主要分泌盐酸、内因子。
10. C 【解析】护士首次执业注册及办理执业注册变更后，其执业许可期限是 5 年。
11. E 【解析】该病人尿频、尿急、尿痛，最可能是泌尿系感染，有助于诊断的检查是尿镜检细胞数。
12. A 【解析】腹外疝常见的疝内容物为腹腔内活动度较大的脏器，其中最常见的是小肠，其次是大网膜。
13. D 【解析】有生育史排除原发性闭经，考虑为继发性，该患者有工作压力大、紧张等应激反应，可能是下丘脑性闭经。
14. D 【解析】支气管扩张和肺脓肿可咳大量脓性痰，量大，静置后分为 3 层。
15. E 【解析】急性肾盂肾炎病人多饮水的主要目的是促进细菌、毒素排出。
16. A 【解析】分娩时子宫肌产生规律性收缩，是临产后的最主要产力。腹肌和膈肌收缩力(腹压)是第二产程时娩出胎儿的主要辅助力量，在第三产程中可促使胎盘娩出。肛提肌收缩力在第二产程中可协助胎先露在骨盆腔内完成内旋转和仰伸等作用，并在第三产程中可协助胎盘娩出。
17. D 【解析】胰腺癌多发生于胰腺头颈部，约占 2/3，其次是体尾部，约占 1/4，全胰癌较少见。
18. B 【解析】基础体温测量呈单相型提示卵巢无排卵，是不孕的原因。
19. D 【解析】急性白血病发生感染最主要的原因是成熟粒细胞缺乏。以口腔炎多见。常见致病菌为革兰阴性杆菌，如铜绿假单胞菌、肺炎杆菌。
20. A 【解析】碳酸氢钠可以分解敌百虫使得再次中毒。
21. A 【解析】血清淀粉酶在发病后 8 小时开始升高，12~24 小时达到高峰；尿液淀粉酶发病后 12~24 小时开始升高，1~2 周达到高峰；此病人 8 小时前发病，故血清淀粉酶测定最有诊断意义。
22. A 【解析】腺体增大是甲亢的临床特点。
23. D 【解析】阑尾管腔阻塞是急性阑尾炎的主要病因，引起阑尾腔梗阻的最常见原因是淋巴滤泡增生。
24. B 【解析】该病人为肝癌晚期患者，现烦躁不安、躁动，为保证安全，应加床档，用约束带保

-
- 护患者。加床档主要防止病人坠床，约束带主要用于躁动或精神科病人。
- 25.D【解析】高钾血症是慢性肾衰的危险情况。
- 26.C【解析】机体不动的时间愈长，发生深静脉血栓的危险性愈高。按摩最主要的目的是促进下肢血液循环，减少下肢深静脉血栓的发生率。
- 27.D【解析】妊高征的治疗原则是镇静、解痉、降压、利尿，适时终止妊娠。解痉的首选药物为硫酸镁。在使用硫酸镁前或过程中，应注意定时检查膝反射是否减弱或消失，呼吸每分钟不少于16次，尿量每小时不少于25ml或每24小时不少于600ml。硫酸镁治疗一旦出现中毒反应，立即静脉注射10%葡萄糖酸钙10ml。
- 28.C【解析】根据病史及查体情况，该患者为慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿急性加重期，其氧疗的原则是持续低流量吸氧。
- 29.D【解析】患者最大可能是急性肾盂肾炎。
- 30.E【解析】小儿肠套叠的主要表现为腹痛、呕吐、便血、腹部“腊肠样包块”，其中便血为肠套叠最重要症状之一。发病后4~12小时就可出现紫红色或果酱样便，并有黏液。
- 31.E【解析】呼气性呼吸困难以呼气费力、呼气时间延长伴有广泛哮鸣音为特点。由肺组织弹性减弱及小支气管痉挛狭窄所致，多见于支气管哮喘、喘息型慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿等。
- 32.A【解析】洋地黄中毒可出现各种心律失常，但以室性期前收缩二联律最为多见。
- 33.E【解析】维生素D缺乏性手足搐搦症又称佝偻病性手足搐搦症或佝偻病性低钙惊厥，多见于1岁内小儿，尤以3~9个月发病率最高，春季多见。
- 34.D【解析】胎方位是胎儿先露的指示点与母体骨盆的关系，分为枕先露、臀先露、肩先露。宫底部触到圆而硬的胎头，胎背位于母体腹部右前方。胎心音于脐上右侧听到，方位应是骶右前。
- 35.B【解析】血栓闭塞性脉管炎营养障碍期有明显的血管壁增厚及血栓形成，常出现静息痛，并伴有趾甲生长缓慢、增厚变形，皮肤干燥变薄、苍白、汗毛脱落和肌肉萎缩等。患肢胫后动脉和足背动脉搏动消失。
- 36.D【解析】口罩取下后，将污染面向内对折，放入小袋，再放入口袋；一次性口罩使用时间不超过4小时；纱布口罩应每2~4小时更换一次；不戴口罩的时候不可以将口罩挂在胸前。
- 37.D【解析】胃窦部有G细胞，能分泌促胃液素，可促进胃酸的分泌。
- 38.A【解析】急性梗阻性化脓性胆管炎是在胆道梗阻的基础上继发感染引起的最严重的感染性急腹症。大量高压脓性胆汁逆向扩散至肝窦，细菌及其毒素进入血液循环引起感染性休克。
- 39.A【解析】室性阵发性心动过速、心室颤动、心室扑动和III度房室传导阻滞是随时有猝死危险的心律失常。
- 40.E【解析】糖皮质激素、噻嗪类利尿剂、磺胺类药物等可诱发急性胰腺炎。
- 41.B【解析】齿状线以上为黏膜，由直肠上下动脉供血，淋巴回流至腹主动脉旁淋巴结，静脉经门静脉回流入肝，由自主神经支配；齿状线以下为皮肤，由肛管动脉供血，淋巴回流至腹股沟淋巴结，静脉经髂外静脉入下腔静脉，由脊神经支配。
- 42.B【解析】卡介苗：皮内注射；乙肝：肌内注射；风疹疫苗和麻疹疫苗都是皮下注射；脊髓灰质炎减毒活疫苗是糖丸：口服。
- 43.B【解析】对肝性脑病患者口服乳果糖，在结肠中被细菌分解为乳酸和醋酸，使肠内呈酸性，从而减少氨的产生、吸收。
- 44.C【解析】会阴部骑跨伤时，将尿道挤向耻骨联合下方，引起尿道球部损伤。前尿道损伤时可出现尿道口滴血，出现会阴部、阴囊、下腹部处肿胀、淤斑和血肿，疼痛致尿道括约肌反射性痉挛出现排尿困难。
- 45.A【解析】小儿患支气管肺炎时，炎症使肺泡壁充血水肿而增厚，支气管黏膜水肿管腔狭窄，造成通气和换气功能障碍，导致缺氧和二氧化碳潴留。其中主要是低氧血症引发多系统和器官出现功能障碍。

46.C【解析】根据病史和血气分析结果判定该患者为Ⅱ型呼吸衰竭，应给予低浓度氧疗，因为病人长期缺氧伴有慢性CO₂潴留，使得呼吸中枢对CO₂浓度改变已不敏感，此时缺O₂就成为维持病人呼吸的重要刺激因子，若吸人氧浓度过高，随缺氧的短暂改善，解除了对中枢的兴奋作用，将使呼吸受到抑制。

47.D【解析】铁锈色痰是肺炎球菌肺炎的典型表现。

48.E【解析】成年男性的血红蛋白参考值为120~160g/L；成年女性110~150g/L。

49.B【解析】诊断贫血及贫血程度最重要的指标是血红蛋白计数。

50.D【解析】造成清理呼吸道无效的主要原因为痰液黏稠，以湿化气道、稀释痰液为主。故应选择超声雾化吸入。

51.D【解析】甲类传染病包括霍乱和鼠疫两种。

52.C【解析】由于化疗药物不易通过血脑屏障，隐藏在中枢神经系统的白血病细胞不能被有效杀伤，急性白血病患者容易发生中枢神经系统白血病，尤其在缓解期。轻者表现为头痛、头晕，重者表现为头痛、呕吐、颈项强直，甚至抽搐、昏迷，脑脊液压力增高等。

53.C【解析】进食时哭闹是引起气管异物的常见原因，剧烈呛咳、喉鸣、呼吸困难也符合发生气管异物的特征。

54.A【解析】特异性血小板抗体产生的部位主要是脾脏。

55.E【解析】发病前有链球菌感染史，是急性肾小球肾炎的表现。

56.D【解析】尿菌落计数阳性的标准是≥105/ml。

57.D【解析】强行约束容易导致患儿受伤。

58.E【解析】医院的饮食通常可分为基本饮食、治疗饮食、试验饮食。其中基本饮食包括普通饮食、软质饮食、半流质饮食和流质饮食。

59.B【解析】做妊娠试验要留晨尿，因为晨尿内绒毛膜促性腺激素的含量高，容易获得阳性结果。

60.A【解析】临终患者心理反应过程分为5个阶段：否认期、愤怒期、协议期、忧郁期和接受期。最早出现的心理反应是极力否认，拒绝接受事实。

61.D【解析】老年人，有慢性咳嗽病史，出现右心衰表现，故应首先考虑慢性肺源性心脏病。

62.D【解析】由题干可知患者处于抑郁期，结合患者的表现，选项D正确。

63.C【解析】10%葡萄糖液中加入10U胰岛素和1.59氯化钾混合为极化液，它可以促进心肌摄取和代谢葡萄糖，使钾离子进入细胞内，稳定心肌细胞膜，从而利于心肌收缩和减少心律失常的发生。

64.D【解析】患者的脉搏快(120次/分)，血压低(60/45mmHg)，考虑为休克，此时最首要的措施是补充血容量。

65.B【解析】急性梗阻性化脓性胆管炎在我国较多见，胆管结石是最常见的梗阻因素，其他因素有肿瘤、炎性狭窄、蛔虫等。

66.E【解析】心力衰竭是在尿毒症患者的心血管并发症中，常见的死亡原因。

67.C【解析】开放式问题没有固定答案，让患者自由作答。

68.A【解析】由题干得知，患者意识清楚，且具有合作能力，所以清除毒物的最好方法是口服催吐法。

69.A【解析】病人血钾为8.8mmol/L，最大的危害是心脏骤停。

70.C【解析】扑翼样震颤是肝性脑病特征性的临床表现。

71.E【解析】奥美拉唑、兰索拉唑是质子泵阻滞剂，法莫替丁、雷尼替丁是H₂受体拮抗剂，质子泵阻滞剂和H₂受体拮抗剂均是抑制胃内酸度药物，硫糖铝均为胃黏膜保护剂，在胃酸条件下产生沉淀，形成弥散性的保护层覆盖于溃疡面上，促进溃疡黏膜再生和溃疡愈合，抗酸作用最弱。

72.C【解析】抑郁症是以显著而持久的心境低落为主的一组精神障碍，并有相应的思维和行为改变。抑郁症是情感性精神病，所以情绪改变最主要，当然情绪低落是首要症状。

- 73.D【解析】引流管通畅时有气体或液体排出，或引流瓶长管中的水柱随呼吸上下波动。
- 74.E【解析】下肢水肿、心悸，应首先考虑右心衰。
- 75.E【解析】该患儿3岁，仅留有骨骼畸形，而无其他临床症状，符合佝偻病后遗症期的特点。
- 76.C【解析】外源性哮喘属于速发型I型变态反应，发作时血清内显著升高的免疫球蛋白为IgE。
- 77.E【解析】补碱时，钙进一步降低，故易出现低钙抽搐。
- 78.D【解析】病人认为与他无关的事物都与他有关。
- 79.E【解析】溃疡性结肠炎的病变位于大肠，多数在直肠和乙状结肠，可扩展至降结肠、横结肠，也可累及全结肠。病变主要限于大肠黏膜与黏膜下层，呈连续性弥漫性分布。
- 80.A【解析】该病人的呼吸特征属于潮式呼吸，见于中枢神经系统疾病。
- 81.C【解析】胸痛和呼吸困难是肺癌晚期最突出的症状。
- 82.D【解析】肌力按程度分为6级：0级：完全瘫痪；1级：肌肉有收缩，但无肢体运动；2级：肢体可在床面上移动，但不能抬起；3级：肢体能脱离床面，但不能对抗阻力；4级：能作对抗阻力的运动，但肌力较弱；5级：肌力正常。由此判断，只有D项是正确的。
- 83.C【解析】首先根据病史、诱因及临床表现（皮肤潮红、球结膜水肿）考虑该患者出现了呼吸衰竭；该患者为慢性支气管炎、慢性阻塞性肺气肿，常常表现为II型呼吸衰竭，氧疗原则应为持续低流量吸氧。
- 84.D【解析】新生儿低血糖常无症状或无特异性症状，可表现为反应差或烦躁、喂养困难、哭声异常、肌张力低、激惹、惊厥、呼吸暂停等。经补充葡萄糖后症状消失、血糖恢复正常是新生儿低血糖者的典型特征。
- 85.B【解析】CPK是急性心肌梗死（AMI）确诊的特异性指标，是出现最早、恢复最早的酶，其高低不受进食的影响，因此要立即执行。
- 86.A【解析】医生应尊重病人的自主原则，同时在获得知情同意后，要权衡利弊，从最有利于病人治疗的角度出发告知病情，并重点减轻病人的痛苦。
- 87.C【解析】活动后气促乏力、常喜下蹲位、发绀、胸骨左缘2~4肋间闻及III级收缩期杂音、杵状指都是法洛四联症的典型症状。
- 88.D【解析】白血病的发生与许多因素有关，如物理因素、药物及化学物质、生物因素、遗传因素等，免疫功能亢进与白血病发病无关。
- 89.B【解析】颅内出血的新生儿易采用的头高侧卧位，可增加静脉回流，有利于减轻脑水肿，同时可防止患儿呕吐造成窒息。
- 90.E【解析】除E以外，其余均为系统性红斑狼疮的诱因。
- 91.B【解析】吸烟是慢支发病的主要病因，故戒烟对病人尤为重要。
- 92.D【解析】收集资料时，应保护病人隐私，因此A、B项错误，D项正确；沟通时应注意倾听，不要随意打断病人，C项错误；与病人交谈时，一般采取工作距离，E错误。
- 93.D【解析】小儿惊厥可由感染性和非感染性疾病引起，其中感染性疾病中各种感染造成的高热惊厥是最常见的原因。
- 94.A【解析】咳嗽伴胸痛提示病变累及胸壁层胸膜或牵涉痛，前者除伴发热外，还可以听到胸膜摩擦音；病变累及脏层胸膜时没有疼痛。
- 95.B【解析】风湿性心内膜炎主要侵犯心瓣膜，其中又以二尖瓣受损最为常见。
- 96.B【解析】患者已经发热1周，且最高体温与最低体温之差不超过1℃，符合稽留热的特点。
- 97.E【解析】心源性水肿首先发生于身体的下垂部位。
- 98.D【解析】皮质醇增多症的特征性表现有向心性肥胖、满月脸、皮肤痤疮、紫纹、多毛、高血压症候群，女性男性化及性功能障碍等。
- 99.D【解析】类风湿结节的出现提示病人病情处于活动期。

100. E【解析】下肢静脉曲张术后 24 小时鼓励病人下地行走，促进下肢静脉回流，避免深静脉血栓形成。
101. E【解析】腹部实质性脏器损伤破裂主要表现为内出血、低血容量性休克，腹部空腔脏器损伤破裂主要表现为急性腹膜炎。
102. B【解析】损伤在 24 小时内应冷敷，24 小时后可热敷、红外线灯照射。
103. E【解析】蛛网膜下腔出血起病急骤，剧烈头痛，喷射性呕吐，可有最具特征性的脑膜刺激征，脑脊液压力增高多为血性。
104. B【解析】2 岁~12 岁小儿的体重计算公式为：体重(kg)=年龄×2+8；2~12 岁小儿身高计算公式为：身高(cm)=年龄×7+75。通过计算可知正确答案为 B。
105. C【解析】目前认为慢性胃炎多由幽门螺杆菌感染引起。
106. A【解析】黄疸且尿液呈茶色，最可能的是急性溶血。
107. D【解析】该患者为Ⅱ级高血压，同时患有糖尿病，属于高危患者。
108. B【解析】急性溶血时可出现血红蛋白尿，呈酱油色。
109. C【解析】生理性黄疸是新生儿出生 24 小时后血清胆红素由出生时的 $17\sim51 \mu\text{mol/L}$ ($1\sim3 \text{mg/dl}$)，逐步上升到 $86 \mu\text{mol/L}$ (5mg/dl) 或以上临幊上出现黄疸而无其他症状， $10\sim14$ 天消退，未成熟儿可延迟至 $3\sim4$ 周，血清胆红素足月儿不超过 $221 \mu\text{mol/L}$ (12mg/dl)。
110. A【解析】肾上腺素是救治心脏骤停的首选药物，主要效力是增加全身循环阻力，升高收缩压和舒张压，增加冠状动脉灌注和心脏血流量。
111. A【解析】二尖瓣狭窄伴有房颤时，血栓脱落引起周围动脉栓塞，以脑动脉栓塞常见。
112. D【解析】该患者以肺炎入院，进入病区后，护士应予以迎接并通知病区医生，要为患者测量生命体征，建立住院病历。准备急救物品对该患者不适用。
113. D【解析】支气管扩张症的病人以咯血为本病的特点。
114. B【解析】内痔位于齿状线上方，由直肠上静脉丛形成，表面为直肠黏膜；外痔位于齿状线下方，由直肠下静脉丛形成，表面为肛门皮肤。因此齿状线是区分内痔与外痔的解剖结构。
115. B【解析】在众多相关理论中，一般系统论构成了护理程序的基本框架，是护理程序的步骤及内涵的核心。
116. E【解析】多年消化性溃疡病史，出现腹痛、呕吐，且有宿食，故应考虑为幽门梗阻。
117. C【解析】腹泻多发生于秋冬季，80%以上是由病毒感染所致，以轮状病毒感染最为常见。
118. C【解析】CK-MB 是诊断急性心肌梗死特异性最高的酶。
119. C【解析】老年心力衰竭患者症状加重的最常见诱因是感染，特别是呼吸道感染。
120. A【解析】氧浓度高于 60%，持续时间超过 24 小时，则可能会发生氧中毒，其表现为恶心、烦躁不安、面色苍白、干咳、胸痛、进行性呼吸困难等。
121. B【解析】该患者有慢性肝病史，现有消瘦、腹胀、纳差等症状，体征有黄疸和腹水，首先应考虑肝硬化伴腹水，可行肝穿刺活组织检查以确诊。
122. E【解析】出现食管静脉曲张破裂出血，出血量大，速度快，患者最先可能出现失血性休克。应迅速建立静脉通路进行补液、输血维持有效循环。
123. B【解析】该患者为肝硬化失代偿期，由于存在食管下段和胃底静脉曲张，午饭可能进食粗糙坚硬食品机械损伤消化道出现了呕血症状。
124. C【解析】该患者出现了上消化道出血，出血后淤血堆积在胃肠道内，经细菌分解作用后产生大量的氨，由肠壁扩散至血循环，引起血氨升高，从而促发肝性脑病。
125. C【解析】该患者出现精神错乱、幻觉，伴有扑翼样震颤、脑电图异常符合昏睡期。
126. B【解析】昏睡者应禁食蛋白质，可鼻饲或静脉给予葡萄糖供给热量。足量的葡萄糖除可以提供热量和减少组织蛋白分解产生氨之外，有利于促进氨与谷氨酸结合形成谷氨酰胺而降低血

氨。

127. B 【解析】小苏打为碱性，可促进肠道氨的吸收，加重肝性脑病。
128. B 【解析】病人因反复呕吐，导致脱水，皮肤干燥，弹性消失，故判断为体液不足。
129. C 【解析】对于幽门梗阻的病人应每晚洗胃，以减轻胃粘膜的水肿。
130. E 【解析】术后若发生肠胃吻合口出血，首先可以通过胃肠减压管吸出血液，当失血量达到一定程度，病人可出现血容量不足表现。

实践能力（四）答案

1. B 【解析】病室湿度过高时，空气潮湿，有利于细菌繁殖，机体水分蒸发慢，所以病人会感到闷热、难受。
2. C 【解析】病区白天理想的声音强度是 35dB~40dB，达到 50~60dB 病人可感到疲倦不安，影响休息与睡眠。
3. A 【解析】劳力性呼吸困难是左心衰最早出现的症状。
4. B 【解析】B 超检查时最重要的辅助检查。
5. B 【解析】化脓性脑膜炎健康宣教重点是避免各种感染的发生。
6. D 【解析】氧气雾化吸入时，药液稀释至 5ml 以内注入雾化器，不使用湿化瓶或湿化瓶内不加水，嘱病人吸气时按住出气口，呼气时松开出气口。
7. C 【解析】在我国以结核菌性占首位，其次为化脓性、创伤性。
8. C 【解析】劳力性呼吸困难、心绞痛、晕厥是主动脉瓣狭窄典型的三联征。
9. B 【解析】12 小时胎动，30 次以上，这说明胎动良好，胎儿在子宫内不存在缺氧问题，孕妇只要继续监测就好了；如果得出的结果在 20 次左右，即为胎动可疑。怀疑存在胎儿窘迫、缺氧问题，这时孕妇该进行严格的自我监测；如果第二天还是这种情况就该到医院做胎心监护了，如果得出的结果在 10 次以下，属于胎动减少，孕妇应立即到医院做检查。
10. B 【解析】医生到达前，护士应根据病情快速作出分析、判断，进行紧急处理，如测血压、止血、给氧、吸痰、建立静脉通道、进行胸外心脏按压和人工呼吸等。医生到达后，立即汇报抢救情况，积极配合抢救，正确执行医嘱。
11. C 【解析】哮喘发作的缓解药物有 β_2 受体激动剂类如沙丁胺醇类，迅速舒张支气管平滑肌，有一定抗炎症的作用。是控制症状首选用药。
12. A 【解析】严重哮喘者可出现发绀、心率增快、奇脉、颈静脉怒张、胸腹反常运动。
13. B 【解析】长期鼻饲的病人应定期更换胃管，乳胶胃管每周更换一次，硅胶胃管每月更换一次。
14. E 【解析】无菌包被无菌等渗盐水浸湿后应重新灭菌。
15. B
16. A 【解析】一级医院是直接为一定人口的社区提供预防、治疗、保健、康复服务的基层医院、卫生院。
17. A 【解析】主要是局部组织长期受压，如卧床病人长时间不能随意变换体位，受压局部血液循环障碍，形成组织损伤。又如使用石膏、夹板等矫形器具时，衬垫不当，松紧不适宜，石膏内表面凹凸不平，致使局部组织长期受压形成。
18. E 【解析】接触隔离适用于经体表或伤口直接或间接接触感染的疾病，如破伤风、气性坏疽等。
19. B 【解析】测量脉搏常选用浅表的大动脉，最方便和常用的是最靠拇指侧手腕上的桡动脉。其次是靠近外耳道处的颞动脉和颈部两侧的颈动脉。
20. A 【解析】呼吸增快指成人每分钟呼吸超过 24 次，常见于发热、哮喘、心力衰竭、贫血等疾患。
21. B 【解析】高热、兴奋、精神紧张、失眠等均可使血压升高。

22. E【解析】“您回家要注意休息，按时服药并在规定的时间来复查，您慢走”，属于迎送用语。
23. E【解析】灭鼠药中毒后忌用脂肪类和碱性食物，以减少毒物的吸收，限制饮水。
24. C【解析】当鼻饲管插入15cm时，将患者头部托起，使下颌靠近胸骨柄以增大咽喉部通道的弧度，便于管端沿咽后壁滑行、徐徐插入至预定长度。插入后应观察鼻饲管是否在口腔内，且注意观察患者是否出现呛咳、呼吸困难、面部发绀。
25. E【解析】女病人月经期、妊娠后期、产后2周内、阴道出血和盆腔急性炎症均不宜坐浴，以免引起感染。
26. B【解析】艾瑞克森心理发展理论把人的一生分为8个心理社会发展阶段，每个发展阶段均有一个中心问题或危机必须解决。其中发展任务是自我认同与角色紊乱的第五期，即青春期，12~18岁。
27. C【解析】昼夜24小时尿量超过2500ml为多尿。
28. C【解析】氧浓度和氧流量的换算公式： $\text{氧浓度}(\%) = 21 + 4 \times \text{氧流量(L/分)}$ 。
29. E【解析】小量不保留灌肠可软化粪便，排除肠道积存气体减轻腹胀，适用于腹部及盆腔手术后肠胀气以及为保胎孕妇解除便秘。
30. E【解析】尿失禁病人常对饮水有顾虑，往往自动减少饮水量，这样易增加尿路感染的机会。要对病人说明尿液对排尿反射刺激的必要性，保持摄入液体每日在2000~2500ml。睡前限制饮水，以减少夜间尿量。
31. D【解析】长期服用抗生素，不仅会产生耐药性或发生其他病菌的感染，使病情得以继续发展、恶化。
32. B【解析】男孩不听从父母安排，用自己的标准，可见他独立性增强。
33. E【解析】重度抑郁症患者，药物治疗是中度以上抑郁发作的主要治疗措施。
34. B【解析】硬结直径>1.5cm为结果阳性。
35. D【解析】输液的目的可改善和恢复血容量、补充丢失的液体，可矫正水、电解质平衡，恢复细胞内外液的容量和渗透压的平衡，以保证细胞的正常代谢，维持正常生理功能，可纠正酸碱平衡紊乱，可供给营养物质和能量。
36. E【解析】输液过程中出现静脉痉挛的主要原因是：患者所穿刺肢体长时间暴露在冷环境中，或所输入的药液温度过低。
37. C【解析】A、B、D、E均为预防溶血反应的措施。输血前应用异丙嗪是防止过敏反应的措施。
38. B【解析】磺胺药在尿液中的溶解度很小，因而易形成结晶析出堵塞肾小管，对肾脏产生较大损害。除大量饮水外，也可同时服用碳酸氢钠（小苏打片），以碱化尿液，达到减少结晶形成的目的。
39. B【解析】孵化血吸虫毛蚴的标本，留取粪便50g（鸭蛋大小），必要时留取24小时大便，要及时送检。
40. B【解析】当患者认为生病是自己行为不当的结果，内心常产生害羞与罪恶，尤其是患者自认为所患疾病是不易被社会接受的疾病时。常感到无地自容。因此该患者的心理反应属于羞辱和罪恶。
41. C【解析】护理管理的任务就是提高护理工作的效率和效果，提高护理工作质量，因此核心就是护理质量管理。
42. B【解析】发生溶血反应是受血者血清中的凝集素和输入血中红细胞表面的凝集原发生凝聚反应。红细胞凝聚成团，继而凝集的红细胞发生溶解，大量血红蛋白释放到血浆中出现黄疸和血红蛋白尿。
43. A【解析】低分子右旋糖酐属于胶体溶液，分子量较中分子右旋糖酐小，其溶液在血管内存留的时间长，因此可以降低血液黏稠度，减少红细胞聚集，改善血液循环和组织灌输量。

44. B【解析】对毒物性质不明的急性中毒者，应抽出胃内容物送检，洗胃液选用温开水或生理盐水，待毒物性质确定后，再采用对抗剂洗胃。
45. C【解析】对危重患者保持口腔清洁，每日常规用0.02%呋喃西林液为患者进行口腔护理2次。
46. A【解析】低盐饮食是食盐量不超过2g/d，不包括食物内自然含有的氯化钠。
47. D【解析】局部有伤口热疗时按无菌操作要求进行。
48. A【解析】股外侧肌外侧处大血管、神经干很少通过，且注射范围较广，适用于多次注射者。
49. A【解析】当患者出现病情突变时，或多或少都会出现紧张、多疑、迁怒、不信任，甚至暴力行为。此时要帮助其分析原因和后果，传递坏消息时要使用委婉的语言。有迁怒行为时，不要将迁怒行为个人化，要制止他的无理要求或暴力行为。
50. C【解析】左侧卧位适用范围为灌肠、肛门检查，臀部肌内注射。该患者有冠心病史应采取左侧卧位。
51. E【解析】喉头水肿和呼吸道症状是最早出现的症状。
52. A【解析】消化道出血时，出血量在5ml以上即可出现粪便隐血试验阳性。
53. A【解析】尸僵开始出现在死亡后的2~4h。
54. C【解析】患者很可能是肺气肿、肺心病，应给予持续低流量吸氧，防止引发肺性脑病。
55. A【解析】患者出现青霉素过敏反应，表现为过敏性休克，首选药物是盐酸肾上腺素。
56. C【解析】滋补药的煎煮时间是第一煎60分钟，第二煎50分钟。
57. C【解析】应用止痛剂可掩盖病情的真相，对诊断和治疗不利。
58. A【解析】该患者脑血管意外，长期卧床，无自理能力，根据奥瑞姆的自理模式，应提供全补偿系统。
59. D【解析】乙型肝炎病人被要求入传染科隔离治疗，这是一项治疗措施，是利于患者康复的措施，由于该措施使患者的活动空间缩小，影响其活动，属于治疗措施的需要。
60. B【解析】该患者服毒昏迷，在不知毒物名称和性质的情况下，护士应抽取胃内容物送检后用温开水洗胃。
61. D【解析】应先开放气道，再行人工呼吸、胸外心脏按压（人工循环）。
62. B【解析】患者年龄大、病情重应该提前就诊，尽早就诊处置。
63. D【解析】磺胺类药物由肾脏排出，尿少时易析出结晶，使肾小管堵塞，服用此药后要多饮水。
64. E【解析】大量输入库存血可引起枸橼酸钠中毒，出现手足抽搐、心率减慢等症状。
65. B【解析】患病以后表现为行为较幼稚。患儿出现放弃已经学会的技能，如已经能够控制大小便的儿童患病后又出现尿床现象。此行为属于退化。
66. A【解析】注射青霉素发生过敏性休克后，应立即停药，将病人平卧，注射盐酸肾上腺素，并保暖、吸氧。
67. D【解析】取破伤风抗毒素1500U，抽取0.1ml加生理盐水稀释至1ml即成。
68. A【解析】留置尿管护理中应保持管道通畅防止逆行感染，其中的措施包括贮尿袋引流管位置低于耻骨联合、及时排空集尿袋，定时更换集尿袋。每周更换导尿管1次。定时进行膀胱冲洗。
69. A【解析】为降低呼吸道感染，应该做到吸痰管每次更换，严禁口腔吸引完毕后再吸气道，否则将口腔内细菌带入气管内，引起感染。
70. E【解析】该患者出现了以血压下降为主的过敏性休克的表现。青霉素引起I型超敏反应的机制：（1）致敏阶段：青霉素作为一种半抗原进入机体后与体内蛋白质结合成完全抗原，刺激机体产生IgE，IgE吸附到肥大细胞与嗜碱性粒细胞上。（2）发敏阶段：当青霉素再次进入机体后与肥大细胞和嗜碱性粒细胞上IgE结合致脱颗粒释放生物活性介质。（3）效应阶段：释放的介质作用于效应的靶器官与组织，引起平滑肌收缩，周围血管通透性增加、扩张，腺体分泌增加。

71.D 【解析】伤寒是由伤寒杆菌引起的经消化道传播的急性传染病。临床特征为长程发热、全身中毒症状、相对缓脉、肝脾肿大、玫瑰疹及白细胞减少等。根据该患者的病史及表现，应考虑伤寒的可能，对患者采取消化道隔离。

72.E 【解析】结核菌素感染阳性，防止其传染。

73.B 【解析】新生儿家庭访视：①明确新生儿的出生情况；②新生儿出生后生活状态及家居环境的了解和指导；③新生儿的预防接种及疾病筛查；④对新生儿喂养与护理的指导；⑤新生儿的体重监测；⑥新生儿体格检查。

74.B 【解析】肺性脑病早期可表现为头痛，头昏，记忆力减退，精神不振，工作能力降低等症状，继之可出现不同程度的意识障碍，轻者呈嗜睡，昏睡状态，重则昏迷，主要系缺氧和高碳酸血症引起的二氧化碳麻醉所致，此外还可有颅内压升高，视神经乳头水肿和扑击性震颤，肌阵挛，全身强直-阵挛样发作等各种运动障碍，精神症状可表现为兴奋，不安，言语增多，幻觉，妄想等。

75.B 【解析】喉痉挛轻者可表现为轻微吸气性喘鸣，重者可出现完全性上呼吸道梗阻。血清离子钙降低是引起惊厥、喉痉挛、手足抽搐的直接原因。正常值为 $2.25\sim2.75\text{mmol/L}$ 。

76.E 【解析】不可服用止痛药，一是会掩盖病情，而是止痛药一般都会损伤胃粘膜。

77.C 【解析】避免胃癌术后的并发症倾倒综合征，注意进餐后应平卧10~20分钟，少食多餐，避免过甜、过咸、过浓的流质饮食，应该进食低碳水化合物和高蛋白饮食。

78.D 【解析】根据患者痛经，进行性加重，妇科检查子宫后倾固定，子宫峡部后壁可触及多个小结节，触痛明显诊断首先考虑子宫内膜异位症。达那唑，该药副作用大，对肝肾的有一定损害，长期使用会引起骨质疏松。需要规范用药。

79.D 【解析】反常呼吸运动是一种病理的呼吸运动，是胸部外伤后至胸部多根多处肋骨骨折，使胸壁失去完整肋骨支撑而软化所致，正常人在吸气时胸廓抬起，呼气时胸壁下降；反常呼吸运动正好相反，在吸气时胸廓下降，呼气时胸壁抬起。在胸外伤时，多处多根肋骨骨折时，胸廓的完整性遭到破坏，导致胸部伤处软组织失去胸廓的支撑，出现反常呼吸，即随呼气外凸，吸气时凹陷，又被称为连枷胸。

80.E 【解析】每次会阴照射时间为20分钟。

81.E 【解析】鼻导管吸氧不会引起真菌性肺炎。

82.C 【解析】链霉素可与钙离子络合，减轻毒性症状是使用葡萄糖酸钙的目的。

83.B 【解析】取髂前上棘和尾骨连线的外上1/3处为注射部位。

84.E 【解析】健康宣教：（一）经膀胱前列腺增生部分切除术 1. 手术切口：可出现迟发性感染、切口疝、线头反应、局部不适、永久性疤痕等；2. 复发可能；3. 术后4周后，如果尿线细可行尿道扩张术；4. 多饮水、忌辛辣、不憋尿、忌大便干燥；5. 不做硬板凳；6. 术后半年内，可出现血尿、镜下血尿；7. 排尿不畅或尿失禁。

85.A 【解析】支气管扩张症常见并发症是肺源性心脏病。杵状指由于肢体末端血液循环障碍引起。

86.C 【解析】BMI计算：体重/身高² 过轻、低于18.5 正常、18.5~24.99 过重、25~28 肥胖、28~32 非常肥胖。

87.B 【解析】自身免疫性胃炎典型症状是伴随贫血。

88.C

89.B 【解析】新生儿长期吸入高浓度纯氧，部分儿童尤其是早产儿会造成晶状体后纤维增生，引起失明。

90.A 【解析】每天第一次进食、喝饮料或应用其它药物治疗之前的至少半小时，用白水送服。

91.C 【解析】有些情况是不适合早期喂养的，比如：新生儿曾有过宫内窘迫和窒息；新生儿呼吸困难；新生儿正在使用呼吸机、有可能导致缺血和缺氧。这样的情况下，可能出现胃

肠道功能障碍，食物不易消化，容易引起肠道感染和坏死性小肠结肠炎。还有些情况也不宜早期喂养，如动脉导管未闭，使用消炎痛药物时，患有败血症时，还有脐动脉插管及换血术后 24 小时内都应该控制喂奶。

92.A 【解析】肢体抬高试验是血栓闭塞性脉管炎的主要检查。

93.E 【解析】肋骨骨折典型检查结果是直接和间接压痛。

94.B

95.C 【解析】超声雾化吸入操作是将冷蒸馏水 250ml 加入雾化器水槽内。

96.E 【解析】出生体重 $+6 \times 0.7 + (\text{月龄} - 6) \times 0.5$ ，一般女患儿 10 个月体重应在 8.57kg 左右，体重减轻大于 40%，属重度营养不良。病程 2 周~2 月属迁延性腹泻。

97.D 【解析】白蛋白，总蛋白量减低，血钾，血钙偏低，常并有锌及其它微量元素缺乏。

98.A 【解析】补液量根据小儿体重计算，该患儿严重营养不良，补液相应减少，速度要减慢。

99.D 【解析】腹泻导致营养不足，应及时补充葡萄糖补充能量。

100.C 【解析】 $\text{PaO}_2 (55 \text{ mmHg})$ 仍低，应首先纠正低氧血症，进行家庭氧疗。

101.C 【解析】哮喘是一种终身性疾病，不可治愈，但可以通过有效的哮喘管理，通常可以实现并维持哮喘控制，健康教育应帮助患者掌握自我管理技能。

102.E 【解析】哮喘日记的作用是为疾病预防和治疗提供参考资料，应记录吸氧时间及次数、症状发作程度、发作次数等症状及主观感觉，记录所应用的药物，除此之外记录反映肺功能状况的峰流速值。

103.D 【解析】针对个体情况有效控制可诱发哮喘的各种因素，包括避免摄入引起过敏的食物、避免吸入刺激性气体、避免呼吸道感染、避免剧烈运动、避免持续的喊叫等过度换气的动作，不养宠物，带围巾口罩避免冷空气刺激，在缓解期应加强体育锻炼、耐寒锻炼及耐力训练，以增强体质。

104.B 【解析】患者情绪高度紧张，诉说有濒死感，由此判断患者此时十分恐惧。

105.E 【解析】肝硬化易并发肝性脑病，可用生理盐水或弱酸性溶液灌肠，忌用肥皂水。

106.C 【解析】分流术后，观察有无吻合口出血、肝性脑病等并发症：平卧 48 小时，翻身动作应轻缓，保持大小便通畅，1 周后方可下床活动，以防止血管吻合口破裂。

107.C 【解析】该患者为细菌性肠炎，1 天未进食，静脉输液的最主要目的是治疗与补充水分、电解质。

108.A 【解析】茂菲滴管内液面过高，可倾斜溶液瓶，使瓶内的针头露出液面上，必要时用手挤压输液管上端，瓶内空气即进入输液管内，让液体缓缓流下，直至露出液面。

109.B 【解析】卡介苗注射部位为上臂三角肌外下缘皮内注射（ID）。

110.E 【解析】乙型肝炎疫苗接种在出生后 24 小时内及 1 月、6 月各注射 1 次。新生儿的接种部位为大腿前部外侧肌肉内，儿童和成人为上臂三角肌畔部肌肉内注射。

111.C

112.D 【解析】甲亢治疗主要包括抗甲状腺药物、 ^{131}I 及手术治疗。药物治疗简单易行，常用 ATD 分为碘腺类和咪唑类，甲巯咪唑（属咪唑类药物）可做首选药。故选 D，甲状腺三度肿大或内科治疗不理想考虑手术治疗。

113.B 【解析】粒细胞减少为抗甲状腺药物常见不良反应。

114.E 【解析】粒细胞减少易并发感染，故预防感染。

115.D 【解析】洗胃过程中，若有血性液体流出，应立即停止洗胃。

116.D 【解析】敌百虫中毒选用 1% 的盐水或清水洗胃，亦可 1:5000 高锰酸钾洗胃，禁用碱性药物洗胃，因其在碱性环境下可以分解出毒性更强的敌敌畏。

117.B

- 118.D【解析】氨茶碱具有舒张支气管平滑肌作用，并具有强心、利尿、扩张冠状动脉、兴奋呼吸中枢和呼吸肌作用。
- 119.D【解析】低血糖为糖尿病常见潜在并发症之一，部分人群易在后半夜及清晨发生低血糖，故病人正在接受“三短一长”治疗方案，极易发生低血糖。
- 120.D【解析】较长时间的低血糖昏迷可引起脑部损伤，一旦确认病人发生低血糖，应尽快补充糖分，解除脑细胞缺糖状态，同时注意低血糖诱发的心脑血管疾病。
- 121.B【解析】青霉素皮试液每毫升含青霉素200~500U，皮试时在前臂掌侧下段注射青霉素皮试液0.1ml(含青霉素20~50U)，20分钟后观察判断。
- 122.E【解析】青霉素皮试前应详细询问病人的用药史、过敏史。如停药3天后再用或用药中更换药物批号，均应重新做过敏试验。
- 123.D【解析】脑外伤患者降温的重点在头部，戴冰帽可降低脑细胞代谢，减少需氧量，提高脑细胞对缺氧的耐受性。
- 124.C【解析】脑外伤患者头部戴冰帽，其主要目的是减轻脑水肿。
- 125.B【解析】降温时应注意将肛温维持在33~35℃，即34℃左右。
- 126.A【解析】患者处于嗜睡状态，因为病人处于持续睡眠状态，但能被言语唤醒，醒后能较正确回答问题，刺激去除后又很快入睡，符合嗜睡的状况。
- 127.E【解析】脑挫裂伤患者意识障碍严重，应重点观察神志。
- 128.E【解析】开塞露进入直肠后应让药物多停留一段时间，才会有效刺激直肠壁，病人才会排便。
- 129.C【解析】开塞露能润滑并刺激肠壁，软化大便，使易于排出。
- 130.A【解析】患者有高血压病史，大便用力后突然出现头痛、喷射状呕吐、言语不清，跌倒在地，考虑高血压脑出血，应优先心血管科急诊。
- 131.A【解析】根据表现考虑脑出血，应尽量减少搬动，减少出血。

专业实务(五) 答案

1. B【解析】认知疗法是根据人的认知过程，影响其情绪和行为的理论假设，通过认知和行为技术来改变求治者的不良认知，从而矫正并适应不良行为的心理治疗方法。
2. A【解析】甲胎蛋白测定对诊断肝细胞癌有相对专一性。
3. B【解析】中毒性痢疾见于婴幼儿。
4. B【解析】大量脓痰，静置后可分3层：上层为泡沫、中层为黏液、下层为脓性物和坏死组织，伴有厌氧菌感染时痰液恶臭。
5. A【解析】患者烦躁不安，面色苍白，皮肤湿冷，血压正常，均为休克早期的表现。
6. A【解析】甲状腺良性突眼一般在18mm以下，恶性突眼在18mm以上。
7. B【解析】畏食首先影响的是体重，而且体重是判断小儿体格发育和营养状况的最重要的指标，故应首先检查。
8. C【解析】急性乳腺炎的致病菌以金黄色葡萄球菌最为多见，少数为溶血性链球菌引起。
9. B【解析】不规律宫缩、胎儿下降感、见红为先兆临产的标志，其中见红为最可靠依据。
10. A【解析】大肠埃希菌是引起急性肾盂肾炎最常见的致病菌，约占60%~80%。
11. D【解析】支气管扩张症的病人以咯血为唯一症状时称为干性支气管扩张症。
12. B【解析】患者呼气时间长于吸气时间，呼吸费力，是典型呼气性呼吸困难。呼气性呼吸困难常见于肺气肿和支气管哮喘发作。
13. C【解析】昏睡是指整天处于睡眠状态，不易唤醒，醒后答非所问，很快又入睡。
14. C【解析】有感冒史，出现心慌、气短、频发早搏，应首先考虑病毒性心肌炎。
15. A【解析】由题干可知，该患者出现了II型呼吸衰竭，应采用低浓度持续给氧。其原因为低浓度给氧既可防止严重缺氧引起的组织损伤，又可防止二氧化碳潴留加重；而间歇吸氧不仅不能

- 防止二氧化碳潴留加重，还会加重缺氧。因此采取低浓度持续给氧的原则。
16. B【解析】此现象属于奇脉，心包积液可出现奇脉。
17. B【解析】肝硬化失代偿期的临床表现最突出的是腹水，约75%以上病人有腹水。
18. E【解析】腹股沟斜疝的疝囊从位于腹壁下动脉外侧的腹股沟管内环突出，向内、向下、向前斜形经过腹股沟管，再穿出腹股沟管外环，可进入阴囊。因此其疝环为腹股沟管内环，其位置位于腹股沟韧带中点上1.5~2.0cm。
19. C【解析】该患者的心理反应为愤怒期，此期应允许病人发怒、抱怨，给病人以宣泄的机会，要认真倾听病人的心理感受，理解其不合作行为，及时满足病人的合理需求。
20. C【解析】手勿触及隔离衣内面，保持隔离衣内面及领部清洁，穿脱隔离衣时，应避免污染衣领、面部、帽子和清洁面。
21. A【解析】重症肺炎时，肺通气、弥散和肺功能障碍，导致肺泡换气减少，动脉血二氧化碳分压增高，碳酸氢根浓度增加，pH值下降，H⁺离子浓度上升导致呼吸性酸中毒。
22. B【解析】壁层腹膜主要受体神经（肋间神经和腰神经的分支）的支配，对各种刺激敏感，痛觉定位准确。脏层腹膜受自主神经支配，来自交感神经和迷走神经末梢，对牵拉、胃肠腔内压力增加或炎症、压迫等刺激较为敏感，其性质常为钝痛而定位较差，多感觉局限于脐周腹中部；重刺激时常引起心率变慢、血压下降和肠麻痹。
23. E【解析】强迫症是以反复出现强迫观念和强迫动作作为基本特征的一类神经症性障碍。以有意识的自我强迫与有意识的自我反强迫同时存在为特征。强迫观念是以刻板形式反复进入患者意识领域的思想、表象或意向。患者明知强迫症状的持续存在毫无意义且不合理，却不能克制地反复出现，愈是企图努力抵制，反而感到紧张和痛苦。
24. B【解析】右心衰竭主要表现为体循环淤血，导致毛细血管床淤血，造成循环性缺氧而引起呼吸困难。
25. D【解析】触诊是通过手的感觉来感知患者身体的某部位有无异常的检查方法，如用触觉来了解所触及体表的温度、湿度、弹性、光滑度、柔软度。
26. B【解析】抬高臀部防止药液溢出。阿米巴痢疾病变在回盲部，应取右侧卧位，以提高疗效，肛管应插入15~20cm，保留1小时以上，注药完毕，再注入温开水5~10ml。
27. B【解析】预防链球菌感染最重要的措施是定期复查，必要时作细菌培养。
28. E【解析】子宫肌瘤的变性有玻璃样变、囊性变、红色变、钙化、肉瘤变。
29. B【解析】应用硝酸酯类药物，是最有效、作用最快的终止心绞痛发作的药物。例如：舌下含化硝酸甘油0.3~0.6mg，1~2分钟开始起效，作用持续30分钟左右，或舌下含化硝酸异山梨醇酯5~10mg，2~5分钟起效，作用持续2~3小时。
30. A【解析】溶栓治疗效果可根据冠状动脉造影直接判断。
31. A【解析】多发在秋冬季节，发病年龄多为6~24个月的婴幼儿，伴上呼吸道感染症状，伴有脱水，大便水样和蛋花样是轮状病毒肠炎，又是秋季腹泻的典型表现。
32. A【解析】婴幼儿最常见的贫血是营养性缺铁性贫血，也是我国儿科重点防治的四病之一。
33. B【解析】病区的物理环境应安静、整洁、安全、光线适宜、通风、温湿度、装饰。
34. E【解析】高血压急症时采取逐步控制性降压的方式将血压逐步降到正常水平，硝普钠通常为首选药物。硝普钠可扩张动脉和静脉，降低心脏前后负荷。
35. E【解析】少尿：24小时尿量少于400ml或每小时尿量少于17ml者。无尿或尿闭：24小时尿量少于100ml或12小时无尿者。
36. E【解析】垂体性侏儒症的原因是生长激素及生长激素释放激素缺乏。
37. C【解析】尿频是良性前列腺增生症患者的最初症状，夜间较明显，随梗阻加重，尿频更加明显。进行性排尿困难是良性前列腺增生症患者最典型的症状。
38. B【解析】呕吐宿食是幽门梗阻的特征表现之一。

39. A【解析】阑尾作为免疫器官，在18岁以前可参与B淋巴细胞的产生和促进成熟。
40. D【解析】痰中发现结核菌，是诊断肺结核的最可靠的依据。
41. C【解析】急腹症在未明确诊断时应做到“四禁”，即禁饮食、禁灌肠、禁用泻剂，禁用强效镇痛剂，对没有休克的病人按需要实施胃肠减压。
42. D【解析】类风湿结节的出现提示病人病情处于活动期。
43. E【解析】因阿米巴原虫在低温环境中可失去活力而难以查找，所以检查阿米巴原虫在采集标本之前，应先将清洁容器加温，再嘱病人排便，并连同便盆立即送检。
44. B【解析】乙肝疫苗在出生后24小时内、1个月、6个月内初种3次，周岁时复查，免疫成功者，3~5年加强一次。
45. A【解析】乳房脓肿多采用以乳晕为中心的放射状切口，其目的是为了避免乳腺导管损伤，形成乳瘘。
46. E【解析】胃酸胃蛋白酶在消化性溃疡发病因素中起决定性作用。
47. A【解析】临幊上最常见的脑血管病为脑血栓形成。
48. A【解析】肝脏是合成清蛋白和某些凝血因子的唯一场所，肝功能减退时可出现低清蛋白血症和凝血酶原时间延长。
49. A【解析】利尿剂作为治疗高血压的一线药物，已被广泛应用，它是通过抑制肾小管对钠和水的再吸收，达到排钠利尿作用，使人体内钠和水的排出量超过摄入量，使血容量和细胞外液量减少，心输出量下降，而达到降压作用。
50. B【解析】大腿挤压伤导致肌肉缺血坏死，大量肌红蛋白入血，在肾小管内形成管型，堵塞肾小管，发生肾衰竭。
51. A【解析】护患关系的发展可分为三期：开始期、工作期、结束期。从该题题干说给信息可看出，护士在收集资料制订护理计划，具体的护理行动还没开始，因此属于开始期。
52. D【解析】患者有慢性胃痛，但无规律性，主要伴有消化不良的症状，空腹胃酸降低，组胺刺激后无明显增加，说明是真性低胃酸，故考虑诊断为萎缩性胃炎。十二指肠溃疡时多数伴有胃酸增高，且疼痛有节律性。
53. D【解析】癫痫单纯失神发作的特征性表现是短暂意识障碍、活动中断、呆滞凝视。
54. C【解析】交替脉是左心衰竭的特征性体征；水冲脉常见于主动脉瓣关闭不全；奇脉又叫吸停脉，常见于心包积液。
55. C【解析】精神异常、昏迷、不能合作者，不宜采用口温测量；左侧肢体偏瘫，应测右测肢体血压，一般选用右上肢。
56. A【解析】本病例主要是由于张护士出现技术上的差错、失误，导致失去患者的信任，严重影响护患关系的建立和发展，属于信任危机。
57. E【解析】内源性感染又称自身感染，指病原体来自于患者自身所引起的感染。
58. A【解析】风邪是百病之长。
59. A【解析】局部用50%硫酸镁或95%乙醇溶液行湿热敷，每日2次，每次20分钟。
60. C【解析】结合病例，患者出现急性左心衰竭表现，采取半坐卧位，双腿下垂，利用重力作用将部分血液滞留在下肢和盆腔，使静脉回心血量减少，从而减轻肺部淤血和心脏负担。
61. C【解析】中药的“四气五味”是指中药的寒、热、温、凉四种药性和酸、苦、甘、辛、咸五种味道。
62. E【解析】局麻药中毒后中枢神经系统早期有精神症状，如眩晕、多语、烦躁不安或嗜睡，动作不协调，眼球震颤，中期常有恶心、呕吐、头痛、视物模糊、颜面肌肉震颤、抽搐，晚期全身肌肉痉挛、抽搐，严重者可发生昏迷。
63. D【解析】类风湿因子的主要类型是IgM。
64. B【解析】急性腹膜炎是由细菌感染、化学刺激或损伤所引起的外科常见的一种严重疾病。

- 因此，患者出院后要用消毒剂擦拭患者使用过的家具及地板。
65. D【解析】急性心肌梗死有持久的胸骨后疼痛，含硝酸甘油，休息后仍不缓解，发热、白细胞计数和血清心肌坏死标记物增高以及心电图进行性改变，可发生心律失常、休克或心力衰竭，属于急性冠脉综合征的严重类型。
66. D【解析】大量输血使枸橼酸钠大量进入体内，如果患者的肝功能受损，枸橼酸钠不能完全氧化和排出，而与血中的游离钙结合使血钙浓度下降。
67. E【解析】肾性骨病的原因主要是指尿毒症时骨骼的病理改变。按照常见程度依次为纤维性骨炎、肾性骨软化症、骨质疏松症和肾性骨硬化症。主要的病因是 $1,25-(OH)_{2}VD_3$ 缺乏，继发性甲状旁亢，营养不良，铝中毒及铁负荷过重。
68. B【解析】根据题干中所述，提示为慢性粒，单核细胞性白血病，可有贫血、感染和（或）出血、胸骨压痛（+）、脾大表现。该患者已做血象和骨髓象的检查，为进一步诊断，需做细胞化学检查协助鉴别诊断。
69. C【解析】正常分娩时，破膜多发生于宫口近开全时。而活跃期是指从宫颈扩张3cm至宫口开全10cm。
70. D【解析】学龄期儿童每日正常尿量少于400ml，学龄前儿童少于300ml，婴幼儿少于200ml，即为少尿。新生儿每公斤体重少于0.5ml/h即为无尿。
71. D【解析】子宫颈阴道部表面主要由非角化的鳞状上皮所覆盖。宫颈管主要由柱状上皮覆盖。
72. D【解析】绞窄性肠梗阻的腹痛为持续性疼痛、阵发性加剧。单纯性肠梗阻的腹痛为阵发性绞痛。麻痹性肠梗阻的腹痛为持续性胀痛。
73. A【解析】乳腺癌与月经初潮早，绝经晚，未生育，未哺乳有关。
74. A【解析】采集24小时尿标本时，嘱病人于早7:00排空膀胱，弃去尿液后开始留取尿液，至次晨7:00留取最后一次尿液，将全部尿液盛于集尿瓶中。
75. D【解析】根据血红蛋白80g/L，判断患者为中度贫血。因为其白细胞、血小板正常，可排除再生障碍性贫血、脾功能亢进。患者经口服铁剂治疗7天后，血红蛋白不升，网织红细胞由0.007上升至0.0143，符合缺铁性贫血患者服铁剂后1周网织红细胞上升达高峰，但血红蛋白于2周后上升的特点。另外，溶血性贫血、巨幼红细胞性贫血患者接受铁剂治疗均无效。故该患者最可能的诊断是缺铁性贫血。红细胞生成减少。
76. D【解析】子宫位于骨盆腔中央，膀胱与直肠之间，成年女性子宫腔容量约5ml。子宫峡在非孕期长约1cm，妊娠末期可达7~10cm，形成子宫下段。未产妇的子宫颈外口呈圆形；已产妇的子宫颈外口受分娩的影响形成大小不等的横裂。
77. B【解析】骨肉瘤好发于长管状骨干骺端，股骨远端、胫骨和肱骨近端是常见发病部位。
78. E【解析】肾病综合征是由多种病因引起的大量蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症和水肿为临床表现的一组综合征。24小时尿蛋白定量大多超过3.5g。
79. E【解析】哮喘病人发作时，病情严重的表现为哮鸣音减弱或不明显。
80. B【解析】下降是指胎头沿骨盆轴前进的动作，其贯穿于胎儿分娩的全过程，临幊上以观察胎头下降的程度作为判断产程进展的重要指标。
81. D【解析】该患者的症状属于肾绞痛。
82. B【解析】原发性肝癌患者腹部疼痛常局限于右上腹部，呈持续性胀痛或钝痛，疼痛原因与肿瘤增长迅速使肝包膜被牵拉有关，患者突然出现腹部剧痛、腹膜刺激征，根据病史，应首先考虑肝癌结节破裂，并破入腹膜。
83. A【解析】病人昏迷且口唇呈樱桃红色，最可能的是CO中毒。
84. E【解析】该患者因外伤骨折、大量出血急诊，在医生未到之前，接诊护士应立即给患者止血，测量血压，建立静脉通道，防止低血容量性休克。
85. C【解析】蛛网膜下腔出血一般无肢体的瘫痪。

86. C【解析】营养不良患儿皮下脂肪消失的顺序为腹部最先，面部最后，因此可以测量腹部皮下脂肪的厚度判断营养不良的程度。
87. B【解析】进入静脉的空气量大，空气进入右心室后阻塞肺动脉入口，使右心室内的血液不能进入肺动脉，因而，从机体组织回流的静脉血不能在肺内进行气体交换，引起机体严重缺氧而死亡。
88. A
89. E【解析】在冠状动脉严重狭窄的基础上，一旦心肌需血量猛增或冠脉血供锐减，使心肌缺血达60分钟以上，即可发生急性心肌梗死。
90. D【解析】甲类传染病包括：鼠疫、霍乱。
91. C【解析】发生护理差错后，当事人应立即报告护士长及科室相关领导，护士长应在24小时内填写报表上报护理部。
92. E【解析】出院患者对于床单位的处理应是：①撤下被服送洗；②床垫、棉胎置于阳光下曝晒6小时；③痰杯、便盆浸泡于消毒液中；④病床单元用消毒液擦拭；⑤铺备用床，准备迎接新患者。
93. D【解析】传染病流行过程必须具备传染源、传播途径、人群易感性三个基本环节。切断其中任何一个环节都能阻止传染病的流行。
94. D【解析】肝功能损害的患者，呼气可有特殊性臭味——肝臭。肝臭味表明肝功能可能受到严重损害，是病情危重的表现。
95. D【解析】正确测量头围的方法是自眉弓上缘经枕后结节绕头一周的长度，头围可以反映脑发育和颅骨生长。头围测量在2岁以内最有价值。
96. E【解析】否认期：患者得知自己患不治之症时表现出震惊与否认，不承认自己患了绝症或者是病情恶化，认为这可能是医生的误诊，他们常怀着侥幸心理到处求医以期推翻诊断。
97. E【解析】铜绿假单胞菌感染是外科的特殊感染，通过伤口分泌物的接触传播。患者的污染敷料应单独放置，焚烧处理。
98. D【解析】造成胎儿宫内生长发育迟缓最常见的原因是妊娠高血压疾病。
99. E【解析】中医的五脏是指心、肝、脾、肾和肺。
100. B【解析】1605、1059、4049（乐果）常用2%~4%碳酸氢钠洗胃，禁忌使用高锰酸钾，否则可氧化成毒性更强的物质。
101. B【解析】子痫患者最主要的死亡原因是脑溢血。
102. B【解析】物理或药物降温30分钟后所测温度用红“0”表示，绘在降温前体温符号的同一纵格内，并以红虚线与降温前温度相连，下次所测体温符号与降温前的体温符号以蓝线相连。
103. A【解析】根据白带情况，病人极可能为滴虫性阴道炎，查找病原体的首选方法应为A选项。
104. D【解析】肺心病肺动脉压力增高，引起右心室的压力负荷过重。
105. A【解析】中医的“五脏”是指心、肝、脾、肺、肾，六腑是指胆、胃、大肠、小肠、膀胱和三焦。
106. E【解析】心源性水肿时，血浆胶体渗透压降低。
107. B【解析】腹部实质性脏器损伤破裂主要表现为内出血、低血容量性休克，腹部空腔脏器损伤破裂主要表现为急性腹膜炎。
108. D【解析】该患者符合特发性血小板减少性紫癜（ITP）的特点。ITP是由于外周血血小板免疫性破坏过多及其寿命缩短，造成的血小板减少性出血性疾病。
109. B【解析】蛛网膜下腔出血时，脑膜刺激征明显，故头痛剧烈。
110. D【解析】接种卡介苗者结核菌素反应硬结的特点是：直径多为5~9mm，颜色呈浅红色，质地较软，边缘不清，反应持续2~3天。
111. B【解析】该高血压患者应坚持在非药物治疗的基础上，长期服用降压药物，将血压控制平

- 稳，而不应该在血压降至正常后就停药。
- 112.E【解析】前列腺增生是老年男性尿路梗阻的最常见原因。
- 113.C【解析】产后子宫内膜炎轻者有低热、下腹疼痛及压痛、子宫复旧欠佳及恶露量多伴有臭味；重者有寒战、高热、头痛、心率快、白细胞增多、官腔分泌物细菌培养阳性。
- 114.A【解析】破伤风病人的病室光线宜暗些。
- 115.C【解析】甲胎蛋白对原发性肝癌的诊断具有特异性和专一性。
- 116.D【解析】患者骶尾部发现水泡，发生压疮，皮肤完整性受损，应优先解决。
- 117.D【解析】硝酸甘油有扩张周围血管的作用，不良反应有头晕、头胀痛、头部跳动感、面红、心悸等，偶有血压下降。应用硝酸甘油时，含药后应平卧，以防直立性低血压的发生。
- 118.C【解析】思维迟缓是一种抑制性的思维联想障碍，即联想抑制，联想速度减慢、数量的减少和困难。患者表现为言语缓慢、语量减少，语声甚低，反应迟缓。患者自觉脑子变笨，反应慢，思考问题困难。患者感到“脑子不灵了”、“脑子迟钝了”。多见于抑郁状态或情感性精神障碍抑郁发作。
- 119.C【解析】患者因双下肢截肢而感到悲伤流泪，是内心情绪的正常反应，护士这时静静地坐在床旁陪陪她，可以给患者提供很大的心理安慰，使患者的不良情绪可以得以宣泄，是一种正确的做法。不作为或者强迫患者说话都是不正确的沟通方法，所以选c。
- 120.B【解析】诊断急性腹膜炎的可靠体征是压痛、反跳痛、肌紧张，即腹膜刺激征。
- 121.D【解析】壁细胞分泌盐酸和内因子；黏液细胞分泌黏液；主细胞分泌胃蛋白酶原；内分泌细胞：G细胞分泌胃泌素，D细胞分泌生长抑素。
- 122.B【解析】无包膜、形状规则、质地硬、肿块活动度小为恶性肿瘤的特征。
- 123.C【解析】游泳运动员失去双下肢意味着有可能不能继续从事游泳生涯，患者自我实现的需要将得不到满足。
- 124.A【解析】轮椅护送患者时，应将轮椅面向床头，翻起脚踏板。
- 125.A【解析】因为患者局部有创面，故最好选择红外线灯，以达到消炎、镇痛、促进局部干燥结痂和肉芽组织生长的作用。
- 126.C【解析】患者年轻女性，主要表现为尿急、尿频、尿痛等尿路刺激征的表现，伴有腰痛和发热，尿常规检查可见到白细胞增多，符合泌尿系感染的诊断。
- 127.B【解析】泌尿系统感染的病因是细菌感染，致病菌以大肠杆菌多见。
- 128.D【解析】大量饮水可使尿量增多，以增加对尿路上细菌和炎症物质的冲刷。
- 129.A【解析】注意个人卫生，每天清洗会阴部有利于预防泌尿系感染。
- 130.C【解析】抑郁发作的典型症状是“三低”症状，即情感低落、思维迟缓、意志活动减退为主要特征。
- 131.D【解析】护理人员在照顾抑郁患者时，要具备温和、接受的态度，要有耐心和信心。让患者放松情绪。
- 132.A【解析】该患儿高热、惊厥、呕吐、面色苍白、四肢发冷、有不洁饮食史都符合中毒型细菌性痢疾的特征。
- 133.E【解析】大便培养分离出志贺菌属痢疾杆菌可以确诊本病。
- 134.A【解析】根据病例分析，该病人最可能是发生了低血糖反应，所以应立即进行的检查是血糖检查。
- 135.A【解析】低血糖的处理是立即口服或静注500g/L葡萄糖。

实践能力（五）答案

- 1.A【解析】空气进入静脉，可随血流先进入右心房，再进入右心室。如空气量少，则随着心脏的收缩被右心室压入肺动脉，并分散到肺小动脉内，最后经毛细血管吸收，因而损害较小；如空气量大，则空气在右心室内阻塞肺动脉入口，使血液不能进入肺内进行气体交换，引起机体严重

- 缺氧，甚至导致病人死亡。
- 2.D【解析】体重为各器官，组织和体液的总重量，是小体格生长的代表，是营养情况的重要指标。
- 3.C【解析】肠梗阻主要症状：腹痛，呕吐，腹胀，停止排便排气。
- 4.A【解析】疼痛是骨质疏松最常见，最主要的症状。以腰背痛多见，占疼痛病人的70%~80%。
- 5.E【解析】浴室温度在24℃左右，水温调节在40~45℃，饭后1小时才能沐浴，浴室不宜闩门，以防意外的发生。创伤病人身体虚弱，且多有开放性伤口，进行淋浴容易引起意外和伤口感染。因此不主张创伤病人淋浴。
- 6.C【解析】护理理论四个基本概念的是人、环境、健康、护理。
- 7.B【解析】焦虑性神经症有两种主要的临床形式：惊恐障碍和广泛性焦虑。
- 8.D【解析】支气管扩张症，病程多呈慢性经过，起病多在小儿或青年期。
- 9.E【解析】肺炎支原体肺炎治疗首选红霉素。红霉素静脉输入速度不易过快，浓度不易过高，以免引起疼痛和静脉炎。
- 10.A【解析】正性肌力药物有洋地黄类和非洋地黄类药物，可使心肌收缩力增强西地兰为静脉注射用制剂，适用于急性心衰或慢性心衰加重时，特别适用于心衰伴快速心房颤动者。
- 11.D【解析】煮沸灭菌法适用于金属器械、玻璃及橡胶类等物品，在水中煮沸至100℃后，持续15~20分钟，一般细菌可被杀灭，但带芽胞的细菌至少需要煮沸1小时才能杀灭。如在水中加碳酸氢钠，使成2%碱性溶液，沸点可提高到105℃，灭菌时间缩短至10分钟，并可防止金属物品生锈。
- 12.E【解析】老年人应根据个人的年龄、健康状况、所患疾病以及有无运动习惯等，选择不同的运动方式、运动强度以及运动时间，量力而为。
- 13.C【解析】患者胸部外伤，出现呼吸急促发绀，且有反常呼吸，考虑气胸，首先应注意观察的是呼吸状态。
- 14.E
- 15.C【解析】记忆障碍是AD的早期突出症状或核心症状。
- 16.D【解析】强调护患关系在护理中作用的理论是Peplau人际关系模式。
- 17.C【解析】抗酸药物多含碳酸钙和碳酸氢钠，若服用时饮用牛奶常会出现恶心、呕吐、腹痛等症状，若钙盐沉积于肾实质，可造成肾脏不可逆性损害。
- 18.B【解析】速尿是排钾类利尿剂。低钾血症：腹胀，肠鸣音减弱或消失。
- 19.D【解析】意识大部分丧失，无自主运动，对声、光刺激无反应，对疼痛刺激尚可出现痛苦的表情或肢体退缩等防御反应。
- 20.D
- 21.C【解析】术后1~2个月内避免剧烈活动，如提重物，跑步等，防继发性出血。
- 22.D【解析】听诊器胸件应置于肘窝肱动脉搏动最明显处。
- 23.E【解析】整体护理是以人为中心，以护理程序为基础，现代护理观为指南，对人实施从生理、心理和社会各个方面的护理。
- 24.A【解析】第二产程是指从宫颈口开全到胎儿娩出。
- 25.E【解析】产后两周阴道大量流血，考虑产后出血。产后出血的原因与婴儿喂养的方式无关。
- 26.E
- 27.A【解析】1%~3%过氧化氢溶液：遇有机物时，放出新生氧，抗菌除臭。
- 28.A【解析】一般患者需经过卫生处置，但是危、急、重症可酌情处理，左心衰属于该类患者，需立即救治。
- 29.A【解析】避免指甲抓挠，防伤皮肤。
- 30.B【解析】早期足量使用，但剂量不宜过大，副作用明显，用量过大可能引起室性期前收缩，

- 室颤或传导阻滞。中、重度中毒时，与阿托品合用，效果更好。
- 31.C 【解析】骨折专有体征：畸形，假关节活动，骨擦音或骨擦感。
- 32.E 【解析】向病人及家属宣传原发性高血压的病因、诱因、临床表现、治疗方法等有关知识，让病人了解原发性高血压虽难以彻底治愈，但通过调整生活方式和服用降压药物，可将血压控制在一个合适的水平，改善预后。向健康人宣传，可促使采取有效措施预防高血压发生。
- 33.E 【解析】以棉签蘸酒精溶液消毒脐带残端，脐轮和脐窝。
- 34.E 【解析】弹力绷带应自下而上包扎，注意保持合适的松紧度，以能扪及足背动脉搏动和保持足部正常皮肤温度为宜。
- 35.C
- 36.A 【解析】现代护理学形成过程中经历的第一个阶段是以疾病为中心。
- 37.C
- 38.C 【解析】刺激性饮料，烈性酒除直接损伤黏膜外，还能促进胃酸过度分泌。
- 39.E 【解析】急性胰腺炎患者止痛，禁用吗啡，以防引起奥狄氏括约肌痉挛加重病情。
- 40.C
- 41.C
- 42.E 【解析】抗酸药应在餐后1小时及睡前服用。
- 43.E 【解析】无并发症的急性腮腺炎患儿一般在家中隔离治疗，采取呼吸道隔离。
- 44.A 【解析】华法林为抗凝药，容易引起出血。
- 45.E 【解析】胎膜已破，禁止下床活动。
- 46.D 【解析】炎症早期用热可促进炎性渗出物吸收消散；炎症后期用热，可促进白细胞释放蛋白溶解酶，溶解坏死组织，使炎症局限。
- 47.A 【解析】心理评估的内容包括病人的思想、情感、动机、精神状态、人格类型、应激水平等方面。
- 48.D 【解析】胎位不正最合适的纠正时间为孕30~32周之间。
- 49.B
- 50.A 【解析】非糖尿病者血糖<2.8mmol/L可诊断低血糖，而糖尿病患者血糖<3.9mmol/L，即可诊为低血糖。
- 51.A 【解析】限盐在1~2g/d，进水量限在1000ml/d左右。
- 52.C 【解析】术后5~7天体温升高，或下降后又上升，并有腹痛，腹胀，腹部包块或排便排尿改变等，提示可能出现盆腔脓肿。
- 53.A
- 54.A
- 55.D
- 56.A 【解析】急性肾小球肾炎患者中，80%以上以水肿为首发症状。
- 57.A 【解析】引流宜在饭前进行。
- 58.B 【解析】患者已昏迷，催吐容易引起呕吐物误吸而窒息。
- 59.D 【解析】术前最重要的是防止感染。
- 60.D
- 61.E 【解析】甲型肝炎为粪口传播的传染性疾病，对其密切接触人员应注意保护隔离。
- 62.A 【解析】开颅手术后常采取头高脚低位，可以有效预防脑水肿。
- 63.C 【解析】发热反应会出现头痛、恶心、呕吐、脉速等全身症状。
- 64.B 【解析】分散注意力：有节律的深呼吸，用鼻深吸气，用口慢慢呼气，反复进行。
- 65.E 【解析】曲张的食管静脉或胃底静脉可因粗糙的食物、物理或化学性刺激及腹内压增高而突发破裂。因此，供给少渣、易消化的质软食物，避免吃坚硬粗糙的食物。

- 66.A【解析】“潜在并发症：出血”属于合作性问题或潜在并发症，它应该是由医、护合作解决的问题，不属于护士独立解决的问题范畴，因而不属于护理诊断。B、D、E三个选项属于现存护理诊断，C属于潜在的护理诊断。
- 67.B【解析】危重病人病情变化快，应该严密监测，并做好配合抢救的准备。
- 68.E【解析】昏迷患者应该给予侧卧位或头偏向一侧，以防呕吐引发窒息。
- 69.C 【解析】该患者可能出现急性心肌梗死，因此可能出现血清心肌酶升高。
- 70.C
- 71.E【解析】眼睛注视前方，不要注视地面。
- 72.E【解析】安静的环境有助于改善睡眠障碍。
- 73.D【解析】加快输液速度，容易引发心衰。
- 74.B【解析】患者有腹部包块提示患者可能有脾肿大，而脾肿大是慢性粒细胞白血病的主要体征，外周血细胞成分与骨髓相似，提示骨髓细胞改变缓慢，因此推测患者患有慢性粒细胞白血病。
- 75.D【解析】制止关节抽搐，若用力不当可引发骨折以及肌肉拉伤。
- 76.C【解析】原发性高血压的发病因素尚不完全清楚目前认为是多种因素的结果。包括：体重超重或肥胖、长期饮酒、高盐饮食、遗传、职业、吸烟、精神紧张等。
- 77.A
- 78.E
- 79.C【解析】母乳性黄疸可暂停母乳喂养1—4天，或改为隔次母乳喂养，黄疸消退后再恢复母乳喂养。
- 80.D
- 81.B【解析】急性水中毒，发病急骤，主要是脑水肿引起颅内压增高，表现为头痛、呕吐、躁动、昏迷等神经、精神症状，应立即快速输入甘露醇，降低颅内压。
- 82.D【解析】心绞痛的疼痛持续时间约3—5分钟，很少超过15分钟，疼痛性质常为压迫、紧缩或发闷感，也可有烧灼感，但不是锐痛或刺痛。
- 83.A【解析】T管目的：1，引流胆汁 2，引流残余结石 3，支撑胆道。
- 84.C【解析】易感儿接触后应隔离观察3周。
- 85.A【解析】脑膜炎双球菌应选青霉素，氨苄西林或头孢三代。
- 86.C【解析】引流管出现大量鲜红色血性液体，考虑术后并发症出血，应立即报告医生。
- 87.D【解析】心脏骤停病因包括心脏病（以冠心病最多见）严重的电解质紊乱和酸碱平衡失调、意外事件、药物中毒或过敏、某些治疗、手术或麻醉意外。
- 88.B【解析】心脏扩大是扩张型心肌病的主要体征。
- 89.E【解析】最典型的是阵发性夜间呼吸困难。
- 90.C
- 91.B【解析】口鼻中有血液外溢，应立即清除呼吸道内异物，保持呼吸道通畅，防止窒息。
- 92.A【解析】根据多年流行病学调查，我国导致慢性肾衰竭的首位原因为各种肾小球肾炎，其次为糖尿病肾病。
- 93.D【解析】麻痹性肠梗阻，腹胀显著遍及全腹，听诊时肠鸣音减弱或消失。
- 94.D【解析】考虑患者并发急性病毒性喉炎，应鼓励患者多饮水咽痛声音嘶哑时给予雾化吸入处理。
- 95.A【解析】处理支气管扩张大咯血的重要护理措施是保持呼吸道通畅，避免窒息。
- 96.A【解析】肺炎胸痛患者取患侧卧位可以减少患侧活动度，既防止病灶向健侧扩散，又有利于健侧肺的通气功能。
- 97.B【解析】术前备静脉用阿托品，以备术中发生迷走反射时使用。
- 98.D

- 99.E 【解析】胎动过频，不一定会立即进行剖腹产。
- 100.C
- 101.B 【解析】部分患者使用硝酸甘油后，可出现面部潮红、头胀痛、头昏、心动过速，应告诉患者是由于药物扩张血管所致，以解除其顾虑，第一次用药后嘱患者平卧一段时间。
- 102.B 【解析】长期使用抗生素可能会造成自身菌群失调引起真菌感染。
- 103.B 【解析】通过患者的临床表现及辅助检查，可以判断患者患有急性脓胸，而经治疗后脓液不见减少宜尽早实施胸腔闭式引流。根据胸腔闭式引流的位置可知，选择 B。
- 104.B
- 105.C 【解析】血淀粉酶增高是急性胰腺炎时有诊断意义的实验室检查。
- 106.C 【解析】纤维胃镜检查在急性大出血 24~48 小时内进行，可确定出血部位和病变程度，并可采取镜下直视止血。
- 107.B
- 108.C 【解析】胸骨后烧灼样疼痛以及哽咽感，针刺样或牵拉、摩擦样疼痛均属于食管癌早期表现。
- 109.A 【解析】法洛四联症患儿血液黏稠度高，发热，出汗，吐泻时，体液量减少，加重血液浓缩易形成血栓，因此要注意供给充足液体。
- 110.B
- 111.C
- 112.C 【解析】血尿、肿块、腰痛是肾癌的三个主要症状，间歇无痛血尿为肾癌的常见症状，表示肿瘤已经穿入肾盏，肾盂，腰部常为钝痛或隐痛，血块通过输尿管时可引起绞痛。
- 113.D 【解析】反复上腹痛，进餐后发作或加重，伴反酸嗳气考虑胃炎，应进行胃镜检查可明确诊断。
- 114.E
- 115.C 【解析】原发性醛固酮增多症是由于肾上腺或异位组织分泌过多的醛固酮，抑制了肾素分泌，而产生以高血压低血钾为特征的综合征。
- 116.C 【解析】全身冰冷，查体 T35℃，考虑新生儿寒冷损伤综合征。
- 117.B 【解析】复温是治疗护理的关键措施，原则是循序渐进，逐步复温。
- 118.C 【解析】肥皂水会加重肝性脑病，禁用。
- 119.C 【解析】肝硬化肝性脑病患者应限制蛋白质的摄入量逐渐缓慢增加。
- 120.D 【解析】该患者首先考虑为慢性阻塞性肺疾病急性发作，此时患者出现低氧的表现，应考虑慢性阻塞性肺疾病的严重并发症，呼吸衰竭。呼吸衰竭时呼吸频率节律和幅度均可发生变化。慢性阻塞性肺疾病为呼气性呼吸困难，出现点头或提肩呼吸等伴有辅助呼吸肌参与呼吸运动的体征，严重者二氧化碳储留可引起呼吸停止。
- 121.C 【解析】对慢性阻塞性肺疾病患者，应提供保持呼吸道通畅的有效措施，如吸痰，在吸痰时应注意在吸痰前、中、后均应吸入纯氧 1~2 分钟避免吸痰引起低氧血症。
- 122.C 【解析】自杀是抑郁症患者最严重的变现和死亡原因。
- 123.E
- 124.C 【解析】高位截瘫患者由于脊髓损伤，出现呼吸肌麻痹，影响呼吸。
- 125.E 【解析】脊髓损伤患者在搬运时，应采用四人搬运法，防止脊髓扭曲断裂。
- 126.A 127.D 128.D
- 129.E 【解析】急性感染性心内膜炎应在入院后 3 小时内，每隔 1 小时 1 次共取 3 个血标本后开始治疗。亚急性感染性心内膜炎已用过抗生素病人，应停药 2~7 天后采血。
- 130.C 【解析】风湿性心瓣膜病患者二尖瓣已有赘生物形成，赘生物脱落，容易导致动脉拴塞。