

1. 氨硝酸银可使牙齿变黑，禁用于恒牙
2. 乳牙龋病的治疗药物中 氟化钠无腐蚀性 可用于不合作的患儿
3. 混合牙列时期的年轻恒牙在牙列中有活跃的垂直向和水平向的移动度 所以在修复牙体时以恢复牙冠的解剖形态为目的 不强调恢复牙齿间的接触点
4. 间接盖髓术应用于深龋近髓或外伤牙冠折断近髓无明显牙髓炎症的患牙 症状轻微的轻度牙髓充血的患牙
5. 如果不能明确牙髓状况需要观察牙髓反应时 也可以用氧化锌丁香油糊剂暂时充填观察 4~6 周后若无症状再去去除表层暂时的充填材料 垫底后永久充填
6. 乳牙患龋以下颌乳磨牙最多 上颌乳磨牙和上颌乳前牙为次 下颌乳前牙最少
7. 乳牙龋齿的药物治疗主要适用于龋损面广泛的不易制备洞形的浅龋或环状龋
8. 环状龋的形成与乳牙牙颈部出生后釉质之矿化度低有关
9. 术前 X 线片了解根尖周组织及牙根吸收情况 牙根吸收 1 / 2 时不宜做活髓切断术
10. 乳牙早萌多见于下颌中切牙
11. 额外牙好发于上颌中切牙之间 前牙区多见
12. 外伤牙多发生于上颌中切牙 其次为上颌侧切牙 下颌切牙较少见
13. 乳牙挫入对恒牙胚的影响最严重 挫入时一定要明确牙齿移位的方向
14. 根管治疗术的适应证是牙髓坏死及根周尖炎而具有保留价值的乳牙
15. 年轻恒牙的牙髓治疗的原则是尽可能保存活髓或牙乳头
16. 恒牙萌出后 3~5 年牙根才能发育完成
17. 乳牙早失的原因包括:①因严重龋病、牙髓病及根尖周病而被拔除②恒牙异位萌出 乳牙根过早吸收脱落 ③牙齿因外伤脱落 ④天性牙齿缺失
18. 乳牙早失后 牙齿间隙缩窄最快发生在拔牙后 6 个月内 如果继承恒牙近期内不能萌出 间隙就会缩小 需要及时制作间隙保持器
19. 乳牙滞留常见下颌乳中切牙滞留 恒中切牙于舌侧萌出 呈现双排牙现象

2 0 .年轻恒牙龋去净腐质可能露髓时 可以采用保留部分软化牙本质避免露髓 采取氢氧

化钙间接盖髓 妥善垫底后充填 1 0 ~ 1 2 周后再次治疗 去除软化牙本质 确定未露髓 再做
间

接盖髓 垫底、充填 此法也称二次去腐法或间接牙髓治疗法

2 1 .乳牙慢性牙槽脓肿往往由龈沟排脓 年轻恒牙也偶有此途径排脓情况

2 2 .目前常用的盖髓剂首选氢氧化钙类制剂