

月度考试

- 1、（A1 型题）牙周病患者中因牙龈萎缩而在牙颈部以下的部位产生的龋多为
 - A.颈部龋
 - B.冠部龋
 - C.邻面龋
 - D.根龋
 - E.窝沟龋
- 2、（A1 型题）以下有关复合树脂的论述中，不恰当的是
 - A.无机填料是决定复合树脂物理性能和临床应用的关键成分
 - B.树脂基质是复合树脂的主要聚合成分
 - C.最常用的树脂基质是丙烯酸酯类
 - D.每层充填和固化的材料厚度不超过 2mm
 - E.化学固化复合树脂为目前主流的复合树脂
- 3、（A1 型题）若充填后上颌前牙牙齿咬物折裂，为冠根联合折，裂纹直达根尖，则应
 - A.备牙、全冠修复
 - B.使用氢氧化钙垫底充填
 - C.根管治疗
 - D.桩核冠修复
 - E.拔除牙齿
- 4、（A1 型题）左上尖牙面窝沟的龋损，黑色沉着区下方为龋白斑，可以诊断为
 - A.窝沟浅龋
 - B.窝沟中龋
 - C.窝沟深龋
 - D.牙本质敏感
 - E.牙髓炎
- 5、（A1 型题）畸形中央尖的患牙，除了能够见到牙齿面上突起的畸形牙尖，X 线片上还能看到
 - A.牙本质呈线样透射影
 - B.牙釉质呈线样透射影
 - C.未发育完成呈喇叭形的根尖部
 - D.髓腔枝叶状畸形
 - E.根管闭锁
- 6、（A1 型题）下列哪项不是牙齿脱位后伴发的各种并发症
 - A.牙髓坏死
 - B.牙髓腔变窄或消失
 - C.牙根外吸收
 - D.边缘性牙槽突吸收
 - E.逆行性牙髓炎
- 7、（A1 型题）下列有关牙本质过敏症的叙述中，不正确的是
 - A.发作迅速、疼痛尖锐
 - B.发作时间短暂
 - C.是一种独立的疾病
 - D.刺激除去后疼痛立即消失
 - E.以机械刺激最为显著
- 8、（A1 型题）慢性根尖周囊肿的诊断主要依靠
 - A.牙髓电活力检查

- B.温度试验
- C.咬诊和叩诊
- D.探诊和扪诊
- E.X线检查

- 9、（A1型题）慢性根尖周炎类型中，哪一种类型是以局部骨质增生为特征的
- A.根尖周肉芽肿
 - B.根尖周囊肿
 - C.根尖周骨硬化症
 - D.根尖周脓肿
 - E.以上均不是
- 10、（A1型题）根尖周脓肿切开排脓术中，橡皮引流条的更换频率是
- A.每天一次
 - B.每两天一次
 - C.每三天一次
 - D.每周一次
 - E.每五天一次
- 11、（A1型题）根管治疗中，根管消毒常用药物刺激性最强的为
- A.丁香油
 - B.FC
 - C.CP
 - D.碘仿
 - E.抗生素类药物
- 12、（A1型题）实习医生准备为患者进行牙髓活力电测验，但其带教老师却否定他的建议，原因可能为
- A.患者年龄大
 - B.患者为女性
 - C.患者年龄小
 - D.患者经济状况差
 - E.患者带有心脏起搏器
- 13、（A1型题）最易被致龋菌利用产酸的糖是
- A.葡萄糖
 - B.蔗糖
 - C.麦芽糖
 - D.果糖
 - E.乳糖
- 14、（A1型题）牙隐裂不明显时常采用的检查方法
- A.咬诊
 - B.电活力检测
 - C.碘酊染色
 - D.探诊
 - E.冷热诊
- 15、（A1型题）静止龋出现的条件是
- A.机体抵抗力增加
 - B.龋损处致龋的环境消失
 - C.口腔内致龋菌数量减少
 - D.口腔唾液流量增加
 - E.摄糖总量减少
- 16、（A1型题）龋齿的治疗方法包括

- A. 充填术+再矿化疗法
- B. 修复治疗+磨除法
- C. 充填术+窝沟封闭
- D. 充填术+药物治疗+磨除法
- E. 药物治疗+充填术+拔除术

17、（A1 型题）急性牙髓炎需要与以下哪种情况进行鉴别诊断

- A. 慢性闭锁性牙髓炎
- B. 慢性溃疡性牙髓炎
- C. 急性上颌窦炎
- D. 慢性增生性牙髓炎
- E. 牙周脓肿

18、（A1 型题）根尖周囊肿的临床表现之一是

- A. 牙髓活力正常
- B. 叩诊无异样反应
- C. 根尖周叩诊疼痛
- D. 根管内溢出黄色清亮液体
- E. X 线片见牙根吸收

19、（A1 型题）粘结剂对牙本质的固位作用不包括

- A. 微机械嵌合
- B. 化合键
- C. 分子间引力
- D. 氢键
- E. 压缩结合

20、（A1 型题）两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为

- A. 融合牙
- B. 结合牙
- C. 双生牙
- D. 过大牙
- E. 畸形中央尖

21、（A1 型题）在诊断深龋和可复性牙髓炎时，用了冷水做温度试验，应避免

- A. 隔离唾液
- B. 干燥牙面
- C. 先测下牙后测上牙
- D. 冷水进入窝洞内
- E. 先测对照牙

22、（A1 型题）下列有关龋病药物疗法的叙述中，不正确的是

- A. 氟化物对软组织无腐蚀性
- B. 硝酸银一般只用于乳牙和后牙
- C. 75%氟化钠甘油糊剂是常用的氟化物
- D. 氟化物不使牙变色
- E. 硝酸银可用于牙颈部龋

23、（A1 型题）关于根尖 1/3 根折，不正确的描述是

- A. 是最常见的根折类型
- B. 6~8 周后牙髓活力可能恢复
- C. 活力尚存的患牙应定期复查
- D. 需做预防性牙髓治疗
- E. 复诊牙髓坏死时做根管治疗术

- 24、(A1型题) 流行病学中的疾病之间分布是指
- A.历史分布、地区分布、职业分布
 - B.年龄分布、性别分布、职业分布
 - C.性别分布、民族分布、地区分布
 - D.年龄分布、季节分布、地区分布
 - E.人群分布、时间分布、地区分布
- 25、(A1型题) 关于侧压根管充填法不正确的是
- A.主尖应充满根尖并于根尖孔平齐
 - B.主尖尖端应位于根管狭窄处
 - C.副尖可不必到达根尖
 - D.副尖可根据情况放入不同的根数
 - E.临床上多数情况下,放入主尖后还需要插入副尖
- 26、(A1型题) 猛性龋常发生的人群是
- A.头颈部放疗患者
 - B.釉质发育不全的患者
 - C.某些传染病患者
 - D.氟牙症患者
 - E.有严重牙周病的患者
- 27、(A1型题) II类洞制备时鸠尾峡应位于
- A.窝洞轴髓线角处
 - B.窝洞轴髓线角边缘右侧
 - C.窝洞轴髓线角中线侧
 - D.面的中央
 - E.窝洞的中央
- 28、(A1型题) 一磨牙因慢性根尖周炎进行根管治疗,在根管预备的注意事项中不正确的是
- A.首先测定工作长度
 - B.器械只应到达根尖狭窄处
 - C.根管锉应逐号使用
 - D.每换一根锉,应进行根管冲洗
 - E.器械应超出根尖孔预备
- 29、(A1型题) 关于磨牙症,正确的是
- A.仅见于睡眠时有磨牙习惯者
 - B.不会影响牙周组织
 - C.是咀嚼系统的一种功能异常运动
 - D.见于有咀嚼槟榔习惯者
 - E.仅见于白天有无意识地磨牙习惯者
- 30、(A1型题) 做牙髓活力温度测验时,应将冷热刺激源置于
- A.待测牙唇(颊)面颈 1/3 或中 1/3 处
 - B.待测牙面中央
 - C.待测牙腭舌侧中 1/3
 - D.待测牙唇颊面切 1/3
 - E.待测牙舌腭侧切 1/3
- 31、(A1型题) 为了便于清洁,防止继发龋,邻面洞的龈缘与邻牙之间的间隙宽度至少应为
- A.0.5mm
 - B.1mm
 - C.1.2mm
 - D.1.5mm
 - E.2mm

- 32、(A1型题)根据牙面解剖形态可以分为两种类型, I型为窝沟龋, 则II型为
- A.点隙龋
 - B.隐匿性龋
 - C.根面龋
 - D.线性釉质龋
 - E.平滑面龋
- 33、(A1型题)制备倒凹的目的主要是
- A.有利于充填
 - B.有利于垫底
 - C.有利于放置盖髓剂
 - D.有利于获得良好的固位形
 - E.有利于获得良好的抗力形
- 34、(A1型题)下列有关釉质发育不全的防治的说法中, 不正确的是
- A.轻症患牙不必治疗
 - B.患牙补充维生素D和矿物质
 - C.由于患牙发育矿化较差, 容易磨耗
 - D.注意妇幼保健, 可预防本病发生
 - E.重症患牙用复合树脂或用口腔修复学的方法覆盖牙面
- 35、(A1型题)牙体折断多见于上颌中切牙近中切角或切缘水平折断, 牙本质折断者可出现牙齿敏感症状, 有时近髓处透红、敏感, 此为牙折的何种类型
- A.牙冠横折
 - B.牙冠斜折
 - C.牙冠纵折
 - D.冠折未露髓
 - E.冠折露髓
- 36、(A1型题)细菌与牙髓的距离不同, 对牙髓的影响也不同, 下列说法正确的是
- A.当细菌距离牙髓 $<1.1\text{mm}$, 牙髓可发生明显的炎症
 - B.当细菌距离牙髓 $<0.5\text{mm}$, 牙髓可出现轻度炎症
 - C.当细菌距离牙髓 $\leq 0.2\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
 - D.当细菌距离牙髓 $<0.2\text{mm}$, 牙髓可发生明显的炎症
 - E.当细菌距离牙髓 $<1.1\text{mm}$, 牙髓内可找到细菌
- 37、(A1型题)根管治疗过程可发生的并发症
- A.器械折断
 - B.急性根尖周炎
 - C.皮下气肿
 - D.侧壁穿孔
 - E.以上都是
- 38、(A1型题)若从颜色分辨器械的号码, 则紫色应对应的是
- A.25号锉
 - B.30号锉
 - C.15号锉
 - D.10号锉
 - E.6号锉
- 39、(A1型题)随着年龄的增长, 牙齿面和邻面由于咀嚼作用而发生的均衡的磨损称为
- A.磨损
 - B.龋病
 - C.磨耗
 - D.酸蚀

E.楔缺

- 40、(A1型题) 调制银汞合金时, 若汞量过少, 可造成
- A.增加蠕变
 - B.可塑性增加
 - C.产生过度膨胀
 - D.修复体易变形
 - E.硬而脆
- 41、(A1型题) 遗传性乳光牙本质属于牙本质发育不全分型中的
- A.I型
 - B.n型
 - C.II型
 - D.II型+m型
 - E.I型+n型
- 42、(A1型题) 发生于牙齿颊面或舌面, 靠近釉牙骨质界处的龋损为
- A.釉质龋
 - B.冠部龋
 - C.根部龋
 - D.牙颈部龋
 - E.窝沟龋
- 43、(A1型题) 下列有关四环素牙的叙述中, 不正确的是
- A.妊娠和喂母乳的妇女不宜使用四环素类药物
 - B.12岁以下的小儿不宜使用四环素类药物
 - C.可使用可见光复合树脂修复治疗
 - D.可使用塑料贴面修复治疗
 - E.可使用高浓度过氧化氢液脱色治疗
- 44、(A1型题) 以下药物中作为根管倒充填材料时渗透最小, 根尖封闭性显著优于其他封闭剂的是
- A.氢氧化钙
 - B.树脂类
 - C.氧化锌丁香油类
 - D.玻璃离子类
 - E.硅酮类
- 45、(A1型题) 下列哪一项不是急性龈乳头炎的病因
- A.口呼吸
 - B.食物嵌塞
 - C.充填体悬突
 - D.不良修复体的边缘
 - E.不恰当地使用牙签
- 46、(A1型题) 根折牙临床表现的描述, 不正确的是
- A.外伤性纵折很多见
 - B.最常见的根折为根尖 1/3 折断
 - C.多见于牙根完全形成的成人牙齿
 - D.根折恒牙的牙髓坏死率为 20%~24%
 - E.部分根折患牙的牙髓出现“休克”现象
- 47、(A1型题) 试测主牙胶尖合适的重要指标是
- A.与牙根管的长度一致
 - B.达到患牙根管的工作长度
 - C.到达工作长度在取出时根尖部有回拉阻力

- D.刚能进入根管的根尖狭窄部
- E.与根备后的根管锥度一致

48、（A1 型题）变形链球菌菌体表面的黏附素是

- A.杂聚糖和果聚糖
- B.葡聚糖和果聚糖
- C.唾液糖蛋白和胶状物
- D.表面蛋白和脂磷壁酸
- E.乳酸脱氢酶和烯醇酶

49、（A1 型题）X 线片根尖周透射区包括多个未治疗牙时确诊病源牙的主要依据是患牙

- A.有无龋洞
- B.是否有牙周疾病
- C.牙髓有无活力
- D.有无窦道
- E.有无叩痛

50、（A1 型题）下列是由局部刺激因素引起的牙周疾病，除了

- A.单纯性龈炎
- B.慢性牙周炎
- C.多发性龈脓肿
- D.龈乳头炎
- E.肥大性龈炎

51、（A1 型题）内分泌因素与牙周病的关系正确的是

- A.性激素可单独引起牙周病
- B.妊娠性龈炎在分娩以后可自行完全消退
- C.内分泌的变化改变了牙周组织对病原刺激因素的反应
- D.牙龈不是性激素的靶器官
- E.青春期龈炎与菌斑无关

52、（A1 型题）成熟菌斑的基本结构分为

- A.获得性膜和唾液
- B.基层、中间层和表层
- C.上皮细胞和羟基磷灰石
- D.多糖和矿物质
- E.唾液蛋白、细菌和矿物质

53、（A1 型题）患龈炎时菌斑的变化如下，除外

- A.菌斑量增加
- B.革兰阳性球菌占优势
- C.菌斑内细菌组成改变
- D.菌斑内细胞比例变化
- E.菌斑内细菌数目增加

54、（A1 型题）有良好口腔卫生，妊娠期牙龈炎

- A.也会发生，因激素水平的变化，软组织易发炎
- B.也会发生，因妊娠期进食量大、次数多，细菌易生长
- C.不会发生，因细菌是牙龈炎的主要因素
- D.不会发生，因孕妇生活规律、抵抗力强
- E.不会发生，因妊娠期呕吐，唾液 pH 下降，细菌不易生存

55、（A1 型题）关于慢性龈炎时的龈沟错误的是

- A.龈沟探诊可达 3mm 或更多
- B.加深的龈沟称为龈袋

- C. 龈袋的上皮附着水平位于釉牙骨质界以下的根面上
D. 牙周探诊深度常大于组织学上的龈沟深度
E. 龈袋的形成是因牙龈肿胀或增生所致。
- 56、（A1 型题）长期口服苯妥英钠引起的药物性牙龈增生的程度与下列哪一个因素有关
A. 服药时间
B. 服药剂量
C. 血清中、唾液中的药物浓度
D. 服药的种类
E. 口腔的卫生状况
- 57、（A1 型题）判断有无牙周炎的重要指征是
A. 龈袋超过 3mm
B. 附着丧失
C. 龈红肿
D. 龈出血
E. 龈乳头增生
- 58、（A1 型题）关于广泛型侵袭性牙周炎的发病特点哪一项不正确
A. 发病年龄从青春期末至 35 岁
B. 病损累及大多数牙
C. 部分有局限型侵袭性牙周炎病史
D. 菌斑的沉积量大
E. 严重及快速的骨破坏
- 59、（A1 型题）造成临床牙齿松动的原因不包括
A. 咬合创伤
B. 牙槽骨吸收
C. 牙周膜的急性炎症
D. 女性激素水平变化
E. 牙髓炎症
- 60、（A1 型题）掌跖角化-牙周破坏综合征的临床表现，除了
A. 皮损及牙周病变常在 4 岁前共同出现
B. 患儿智力及身体发育异常
C. 乳牙萌出后即有深牙周袋
D. 恒牙萌出后按序发生牙周破坏
E. 手掌、足底、膝部及肘部局限性的过度角化
- 61、（A1 型题）根分叉病变的病因不正确的是
A. 菌斑微生物是主要病因
B. 创伤是促进因素
C. 根柱长的比根柱短的牙易发
D. 髓底副根管是易发因素
E. 牙颈部釉突是易发因素
- 62、（A1 型题）种植体周围组织病变的描述错误的是
A. 种植体周围组织病变的始动因子是菌斑微生物
B. 咬合负载过重是重要促进因素
C. 吸烟是影响种植体周围骨丧失的重要因素
D. 手术技术和术后处理不当易引起种植体周围组织病变
E. 两段式种植体容易感染牙周致病菌
- 63、（A1 型题）种植体周围炎的治疗不正确的是
A. 预防重于治疗，强调种植术后的维护

- B.初期治疗主要是去除病因
- C.局部氯己定治疗和全身应用抗生素一般联合使用
- D.手术治疗有切除性手术和引导性骨再生术
- E.只要仔细清洁，炎症均可彻底消除

- 64、（A1 型题）用光滑尖探针应检查的项目如下，但除外
- A.有无牙石
 - B.根面有无龋坏
 - C.有无釉珠
 - D.袋深
 - E.根分歧是否暴露
- 65、（A1 型题）牙周炎时 X 线片上牙槽骨吸收的最主要表现是
- A.牙槽骨高度降低
 - B.牙槽骨密度增强
 - C.根尖区骨密度减低阴影
 - D.牙周宽度均匀增加
 - E.牙槽嵴顶位于釉质牙骨质界下 1mm
- 66、（A1 型题）牙周基础治疗的目的在于
- A.改正不良骨外形
 - B.截除病变牙根
 - C.固定松动牙
 - D.修复缺失牙、恢复咀嚼功能
 - E.消除致病因素
- 67、（A1 型题）翻瓣术手术纵形切口应位于
- A.龈乳头中央
 - B.颊面中央
 - C.舌腭侧中央
 - D.颊面轴角处
 - E.牙龈缘
- 68、（A1 型题）能产生白细胞毒素的牙周致病微生物是
- A.牙龈卟啉单胞菌(Pg)
 - B.伴放线聚集杆菌(Aa)
 - C.巨核梭杆菌(Fn)
 - D.福赛拟杆菌(Bf)
 - E.中间普氏菌(Pi)
- 69、（A1 型题）造成食物垂直嵌塞的原因是
- A.深覆
 - B.充填物悬突
 - C.牙龈增生
 - D.面边缘嵴磨损不均
 - E.单侧咀嚼
- 70、（A1 型题）与牙槽骨快速破坏有关的菌斑是
- A.窝沟处的菌斑
 - B.以革兰阳性需氧菌为主的菌斑
 - C.龈上菌斑
 - D.非附着性龈下菌斑
 - E.附着性龈下菌斑
- 71、（A1 型题）牙石致病机制中最主要的是

- A.压迫牙龈
- B.妨碍口腔卫生的保持
- C.吸附细菌毒素
- D.粗糙表面的机械刺激
- E.牙石表面未钙化的菌斑

72、(A1型题)目前较公认的重度牙周炎的高危因素之一是

- A.饮酒
- B.吸烟
- C.嚼口香糖
- D.常饮甜饮料
- E.饮茶

73、(A1型题)下列关于额外牙的描述不正确的是

- A.又称为多生牙
- B.多见于乳牙列和混合牙列
- C.与发育缺陷或遗传有关
- D.多数呈较小的圆锥形
- E.可能造成恒牙的迟萌

74、(A1型题)乳牙根尖病治疗方法为

- A.直接盖髓
- B.活髓切断术
- C.变异干髓术
- D.根管治疗术
- E.干髓术

75、(A1型题)意外穿髓的乳牙可行

- A.间接盖髓
- B.活髓切断
- C.干髓治疗
- D.垫底后充填
- E.根管治疗

76、(A1型题)不能用于乳牙活髓切断术的药物为

- A.Ca(OH)₂
- B.戊二醛
- C.甲醛甲酚
- D.多聚甲醛
- E.Vitapex

77、(A1型题)乳牙根尖病治疗方法为

- A.直接盖髓
- B.活髓切断术
- C.变异干髓术
- D.根管治疗术
- E.干髓术

78、(A1型题)下列哪一项不是乳牙龋蚀的特点

- A.患龋率高于恒牙
- B.龋齿多发
- C.龋蚀在短时间内转变为牙髓炎等
- D.自觉症状不明显
- E.修复性牙骨质形成活跃

79、(A1型题)乳牙患龋特点

- A.患龋率高，但范围不大
- B.患龋率高，范围广泛
- C.发病早，症状明显
- D.发展速度慢，急性龋多见
- E.龋齿多发，修复性牙本质形成不活跃

80、（A1型题）乳牙根管治疗术与恒牙根管治疗术最根本的区别是

- A.洞型制备不同
- B.消毒药物不同
- C.垫底材料不同
- D.根充材料不同
- E.充填材料不同

81、（A1型题）牙间多生牙常引起的错畸形表现是

- A.开
- B.牙列拥挤
- C.反
- D.深覆
- E.深覆盖

82、（A1型题）乳牙患龋几岁达到患龋高峰

- A.2~3岁
- B.3~4岁
- C.7~8岁
- D.9~10岁
- E.11~12岁

83、（A1型题）慢性非特异性唇炎与以下因素无关

- A.气候干燥
- B.超敏反应
- C.烟酒刺激
- D.嗜好烫食
- E.舔唇不良习惯

84、（A1型题）皱纸状白斑好发于

- A.颊黏膜
- B.下唇
- C.上唇
- D.口区
- E.口底及舌腹

85、（A1型题）疱疹样口疮与疱疹性口炎的鉴别要点不包括

- A.两者病因不同
- B.两者病损表现形式不同
- C.病损持续时间不同
- D.两者分布部位不同
- E.是否影响皮肤

86、（A1型题）下列因素与扁平苔藓的发病无关的是

- A.某些药物
- B.精神创伤因素
- C.免疫异常
- D.遗传因素
- E.内分泌因素

- 87、（A1 型题）临床怀疑口腔念珠菌感染时，首先选用的辅助诊断技术为
- A. 唾液培养
 - B. 唾液及血清念珠菌抗体测定
 - C. 血清铁及维生素
 - D. 直接涂片镜检
 - E. 活体组织检查
- 88、（A1 型题）下列不是扁平苔藓发病部位的是
- A. 皮肤
 - B. 生殖器
 - C. 指甲
 - D. 眼结膜
 - E. 口腔黏膜
- 89、（A1 型题）对于无复发史而形状不规则的溃疡，且能在溃疡边缘找到锐利牙尖，最可能的诊断是
- A. 结核性溃疡
 - B. 深部真菌感染
 - C. 恶性肿瘤
 - D. 梅毒
 - E. 创伤性溃疡
- 90、（A1 型题）口腔黏膜血疱最常见的原因是
- A. 天疱疮
 - B. 血小板减少性紫癜
 - C. 理化及机械刺激
 - D. 血友病
 - E. 大疱性类天疱疮
- 91、（A1 型题）坏疽性口炎的发病原因可能是
- A. 局部创伤
 - B. 维生素缺乏
 - C. 口腔卫生不良
 - D. 病毒感染
 - E. 细菌感染
- 92、（A1 型题）口干症状见于
- A. 白斑
 - B. 复发性口腔溃疡
 - C. 白念珠菌病
 - D. 球菌性口炎
 - E. 扁平苔藓
- 93、（A1 型题）下列哪项不是毛状白斑的临床表现
- A. 多为双侧发生
 - B. 主要在舌缘、舌腹
 - C. 表面有毛状突起
 - D. 可以擦掉
 - E. 一般无自觉症状
- 94、（A2 型题）患者，男，17 岁，右上后牙 3 天来遇甜酸痛，平时无其它不适。查见 14 近中边缘嵴约小米大小透暗色区，建议充填用材料是
- A. 聚羧酸锌水门汀
 - B. 复合树脂
 - C. 银汞合金
 - D. 磷酸锌水门汀

E.玻璃离子水门汀

95、(A1型题)患者,男,24岁,上大学前一直在河北沧州居住,因上前牙有黄黑斑块要求治疗。检查:11,12,21,22唇面有黄褐色斑块,无缺损,表面光滑,质硬,叩(-),冷(-),乡亲中亦有相似情况。医师最可能的诊断是

- A.浅龋
- B.氟斑牙
- C.四环素牙
- D.釉质发育不全
- E.静止龋

96、(A2型题)男性患者,23岁,因牙齿折断前来就诊。查:牙体折断线累及牙冠与根部,斜行折裂多见,均与口腔相通,牙髓往往暴露,断片动度大,触痛明显。则可以诊断为以下哪种牙折

- A.冠折
- B.冠折露髓
- C.根折
- D.牙冠斜折
- E.冠根联合折

97、(A2型题)患者,20岁,男,右上后牙遇冷水痛近2月。检查见右上第一磨牙咬面深龋洞达牙本质深层,探痛明显且有穿髓孔,叩诊(±),冷测敏感,刺激去除后疼痛持续一段时间,该患牙应诊断为

- A.深龋
- B.可复性牙髓炎
- C.慢性牙髓炎
- D.牙本质过敏
- E.中龋

98、(A2型题)某患者因进食时咬到砂石后,右上第一磨牙近中舌尖劈裂缺损,牙本质外露,但未露髓,金属烤瓷全冠修复。半年后患牙出现自发性疼痛,冷热刺激疼痛加重。最可能的诊断为

- A.急性牙髓炎
- B.慢性牙髓炎
- C.慢性根尖周炎
- D.咬创伤
- E.牙本质过敏

99、(A1型题)男性,30岁。由于深龋引起急性根尖周炎在某院开髓治疗后,仍有剧烈疼痛,而且面部开始肿胀。检查见髓腔开放,开髓孔大,根管内无腐屑和渗出物,叩(+++),龈轻红肿,已服消炎药。分析原因最可能是

- A.开髓孔过小
- B.根管不通畅
- C.有其他感染源
- D.抗感染力不强
- E.根尖孔不通畅

100、(A2型题)患者,男,38岁。右上第二磨牙因龋致牙髓炎需行根管治疗。在根管治疗过程中的工作长度具体指

- A.根管长度
- B.X线片上牙的长度
- C.牙根实际长度
- D.根管口到根尖部的长度
- E.洞缘某点到根尖狭窄部的长度

101、(A2型题)患者,女,18岁。检查时发现左下第一磨牙穿髓孔,用尖锐探诊探查时剧痛,伴有少量暗色血液渗出,牙面堆积大量牙石。最可能的诊断为

- A.慢性闭锁性牙髓炎
- B.急性牙髓炎
- C.慢性溃疡性牙髓炎
- D.慢性增生性牙髓炎
- E.残髓炎

102、(A2型题)患者,男,30岁,牙龈疼痛、出血、口臭3天。检查:上下前牙唇侧牙龈充血肿胀,龈乳头顶端附着白色污秽坏死物,口臭明显,轻触牙龈出血,涂片检查见螺旋体及梭形杆菌满视野,该病诊断为

- A.急性龈乳头炎
- B.疱疹性龈口炎
- C.急性坏死性龈炎
- D.边缘性龈炎
- E.青春期龈炎

103、(A2型题)女,31岁。牙龈出血加重1个月。检查:全口牙龈鲜红色,牙龈肿胀、松软、光亮,极易出血,下前牙有自动出血。为了诊断,最应询问的是

- A.服药情况
- B.有无脓肿史
- C.牙齿松动史
- D.家族史
- E.月经情况

104、(A2型题)患者,女,31岁,牙龈炎症较严重,考虑妊娠期龈炎,最应询问的是月经情况以便对妊娠期龈炎进行诊断。故本题选E。

- A.口腔含漱剂含漱
- B.口服消炎药物
- C.口腔卫生指导
- D.龈上洁治术
- E.龈下刮治术

105、(A2型题)患者,女,50岁。牙龈刷牙出血近十年。检查见下前牙牙石(++),其他部位牙石(+),牙龈轻度至中度红肿,探诊出血,探珍深度普遍4~6mm,附着丧失2mm左右。最可能的诊断为

- A.边缘性龈炎
- B.坏死性龈炎
- C.慢性牙周炎
- D.侵袭性牙周炎
- E.白血病的牙龈病损

106、(A2型题)患者,女,33岁。近1~2年来自觉全口多数牙齿松动,咀嚼力量减弱。若诊断为侵袭性牙周炎,临床检查最有可能的发现是

- A.多数牙齿移位
- B.多发的牙周脓肿
- C.磨牙根分叉病变Ⅱ度
- D.多数牙槽骨中重度吸收
- E.多数牙牙龈退缩明显

107、(A2型题)女,42岁。左下牙床肿、牙松动半年,检查:牙龈肿胀、溢脓,探近中袋深,松动Ⅱ度,叩痛(+),牙髓无活力,X线片示根端骨吸收区与近中侧牙槽骨吸收相通,远中侧牙槽骨无吸收。该病应诊断为

- A.牙周-牙髓联合病变
- B.成人牙周炎
- C.根分叉区病变
- D.牙周脓肿
- E.侵袭性牙周炎

108、(A2型题)患者,男,4岁,上颌前牙残根,根尖从唇侧龈黏膜穿出。不正确的处理是

- A.口服抗菌药物
- B.拔出残根
- C.瘻道上碘酚
- D.做间隙保持器
- E.定期复查

109、(A2型题)患者,女,6岁,左上颌第二乳磨牙早失,前来医院检查恒牙萌出情况。乳牙早失对继承恒牙的影响不正确的是

- A.邻牙向近中移位
- B.继承恒牙正常萌出
- C.间隙有改变但不影响继承恒牙萌出
- D.继承恒牙错位萌出
- E.继承恒牙萌出困难

110、(A2型题)患者,男,9岁,左下颌第一恒磨牙残冠,X线片显示根分叉及根尖周处阴影明显,邻近第二恒磨牙牙冠已形成,但牙根尚未发育完全,位于第一恒磨牙颈缘线以下,左下颌第三磨牙牙胚未见。最恰当的措施是

- A.拔除残冠
- B.待第二恒磨牙移位替代第一恒磨牙
- C.勉强修复
- D.拔除后做间隙保持器
- E.暂时性保守治疗,维持至第二恒磨牙萌出后再拔除该牙,做义齿修复

111、(A2型题)患者,男,24岁,早餐进食过快,发现右侧软腭突然发现一处血疱;疼痛不适,大小约1.0cm×0.5cm,自述以前从未有过类似病损,体检口腔内其余黏膜及皮肤未见有异常,最可能的诊断是

- A.寻常型天疱疮
- B.大疱性类天疱疮
- C.血小板减少性紫癜
- D.黏膜血疱
- E.以上都不是

112、(A2型题)患者,女,52岁,双侧颊黏膜反复糜烂,疼痛不适,进食时加重,组织病理检查结果为上皮过度不全角化,基底细胞液化变性,固有层淋巴细胞带状浸润最可能的诊断是

- A.天疱疮
- B.良性黏膜类天疱疮
- C.多形渗出性红斑
- D.扁平苔藓
- E.系统性红斑狼疮

113、(A1型题)患者,男,舌背黏膜反复溃烂,疼痛不适,下肢皮肤可见多角形的丘疹,呈紫红色,界限清楚,表面可见Wickham纹,指甲增厚,最可能的诊断是

- A.扁平苔藓
- B.萎缩性舌炎
- C.盘状红斑狼疮
- D.先天性角化病
- E.瘢痕性类天疱疮

114、(A3/A4型题)患者,女,43岁。左下后牙肿痛3天就诊。检查见左下第一磨牙远中颈部龋,龋深及牙髓。无探痛,III度松动,叩痛(+++),颊侧根尖部龈红肿,扪痛,有波动感,左面下部轻度肿胀,体温38℃。诊断最可能是

- A.急性化脓性牙髓炎
- B.急性化脓性根尖周炎

- C.急性颌骨骨髓炎
- D.急性牙周脓肿
- E.急性蜂窝织炎

115、(A3/A4 型题)患者,女,43岁。左下后牙肿痛3天就诊。检查见左下第一磨牙远中颈部龋,龋深及牙髓。无探痛,III度松动,叩痛(+++),颊侧根尖部龈红肿,叩痛,有波动感,左面下部轻度肿胀,体温38℃。当日就诊处理

- A.开髓开放、消炎镇痛
- B.开髓开放、切开引流
- C.切开引流、消炎镇痛、
- D.开髓开放、切开引流、消炎镇痛
- E.拔牙、消炎镇痛

116、(A3/A4 型题)患者,男,60岁。1年来右侧上后牙痛,痛多在傍晚发生,并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查56龋深,叩痛(-),叩痛(+).为明确诊断必须做的检查是

- A.牙髓电活力测验
- B.牙髓温度测验
- C.耳鼻喉科会诊
- D.X线片检查
- E.松动度检查

117、(A3/A4 型题)患者,男,60岁。1年来右侧上后牙痛,痛多在傍晚发生,并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查56龋深,叩痛(-),叩痛(+).该患者主诉疾病最可能是

- A.深龋
- B.慢性鼻窦炎
- C.急性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎
- E.可复性牙髓炎

118、(A3/A4 型题)患者,男,60岁。1年来右侧上后牙痛,痛多在傍晚发生,并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查56龋深,叩痛(-),叩痛(+).治疗设计中最重要的是

- A.垫底充填
- B.根管治疗
- C.盖髓治疗
- D.拔除残根
- E.耳鼻喉科就诊

119、(A3/A4 型题)患者,男,16岁,主诉摔伤上前牙3小时,伤后自觉患牙松动,疼痛。临床检查见21临床牙冠变短,与对颌牙失去咬合,未露髓,牙齿动度约2mm,叩痛(+),X线片检查未见患牙牙根连续性破坏该疾病应诊断为

- A.牙震荡
- B.部分牙脱位
- C.嵌入性牙脱位
- D.完全牙脱位
- E.牙折

120、(A3/A4 型题)患者,男,16岁,主诉摔伤上前牙3小时,伤后自觉患牙松动,疼痛。临床检查见21临床牙冠变短,与对颌牙失去咬合,未露髓,牙齿动度约2mm,叩痛(+),X线片检查未见患牙牙根连续性破坏对该病的治疗,正确的是

- A.即刻复位,固定
- B.根管治疗后复位,固定
- C.对症治疗,观察其自然萌出
- D.复位后4周,行根管治疗
- E.降低咬合,使患牙休息

121、(A3/A4 型题)患者,男,16岁,主诉摔伤上前牙3小时,伤后自觉患牙松动,疼痛。临床检查见21临床牙冠变短,与对颌牙失去咬合,未露髓,牙齿动度约2mm,叩痛(+),X线片检查未见患牙牙根连续性破坏根尖1/3处折断的患牙处理为

- A.固定并定期观察
- B.牙髓状况良好,可调,观察
- C.不治疗
- D.牙髓治疗
- E.定期观察

122、(A3/A4 型题)患者,男,16岁,主诉摔伤上前牙3小时,伤后自觉患牙松动,疼痛。临床检查见21临床牙冠变短,与对颌牙失去咬合,未露髓,牙齿动度约2mm,叩痛(+),X线片检查未见患牙牙根连续性破坏牙体冠折后,牙髓有活力,应在什么时间实施永久性修复

- A.12小时之内
- B.24小时之内
- C.2周之内
- D.6~8周
- E.2个月之后

123、(A3/A4 型题)患者,男,30岁。因牙齿颜色不正常,要求治疗。临床检查:上颌中切牙、尖牙、第一磨牙、下颌前牙及第一磨牙牙面呈白垩色,伴带状缺损该疾病应诊断为

- A.氟牙症
- B.四环素牙
- C.先天性梅毒牙
- D.釉质发育不全
- E.遗传性牙本质发育不全

124、(A3/A4 型题)患者,男,30岁。因牙齿颜色不正常,要求治疗。临床检查:上颌中切牙、尖牙、第一磨牙、下颌前牙及第一磨牙牙面呈白垩色,伴带状缺损下列符合该病的描述为

- A.患者具有特定地区的生活史
- B.乳牙不会发生
- C.与微生物感染有关
- D.患牙对酸的抵抗力强,但不耐摩擦
- E.双侧对称发病

125、(A3/A4 型题)患者,男,30岁。因牙齿颜色不正常,要求治疗。临床检查:上颌中切牙、尖牙、第一磨牙、下颌前牙及第一磨牙牙面呈白垩色,伴带状缺损患牙发育障碍的发生时间是

- A.1岁以内
- B.1~2岁
- C.2~3岁
- D.3~4岁
- E.4岁以上

126、(A3/A4 型题)患者,女,13岁。前牙唇侧牙间乳头呈球状突起,松软光亮,局部刺激物不明显,探诊未见附着丧失最可能的诊断为

- A.侵袭性牙周炎
- B.妊娠期龈炎
- C.药物性牙龈增生
- D.青春期龈炎
- E.增生性龈炎

127、(A3/A4 型题)患者,女,13岁。前牙唇侧牙间乳头呈球状突起,松软光亮,局部刺激物不明显,探诊未见附着丧失造成此患者牙龈肥大的可能原因中不包括

- A.口呼吸
- B.吐舌习惯
- C.激素水平的改变

- D.上唇短
- E.刷牙不认真

128、(A3/A4 型题)患者,女,13岁。前牙唇侧牙间乳头呈球状突起,松软光亮,局部刺激物不明显,探诊未见附着丧失此患者的治疗措施如下,不正确的是

- A.改正不良习惯
- B.教正确的刷牙方法
- C.调节激素水平
- D.牙周基础治疗
- E.养成上、下唇闭合习惯

129、(A3/A4 型题)患者,女,19岁,上前牙松动3年,检查见上切牙松动Ⅱ度,扇形移位,口腔卫生较好,初步印象为局限性侵袭性牙周炎为确诊还应做的最重要的检查是

- A.查血
- B.活检
- C.脱落细胞诊断
- D.拍X线片
- E.力测定

130、(A3/A4 型题)患者,女,19岁,上前牙松动3年,检查见上切牙松动Ⅱ度,扇形移位,口腔卫生较好,初步印象为局限性侵袭性牙周炎若已确诊,其可能还具有的特征如下,但不包括

- A.上颌第一磨牙近中垂直骨吸收
- B.病变累及全口牙
- C.牙龈炎症表现轻微
- D.龈下菌斑中查出大量的伴放线聚集杆菌
- E.上前牙有深牙周袋

131、(A3/A4 型题)患者,女,19岁,上前牙松动3年,检查见上切牙松动Ⅱ度,扇形移位,口腔卫生较好,初步印象为局限性侵袭性牙周炎对该患者的治疗措施中不适当的是

- A.牙周基础治疗
- B.反复进行口腔卫生指导
- C.首选口服甲硝唑
- D.基础治疗后进行翻瓣手术治疗
- E.定期复查复治

132、(A3/A4 型题)患者,女,19岁,上前牙松动3年,检查见上切牙松动Ⅱ度,扇形移位,口腔卫生较好,初步印象为局限性侵袭性牙周炎侵袭性牙周炎牙槽骨吸收的特点如下,除外

- A.初期牙槽骨仅表现为疏松
- B.初期可见到牙槽硬骨板模糊不清,但牙槽骨无明显吸收
- C.病变中、晚期,骨吸收多呈杯状或角形吸收
- D.多发生牙槽骨的水平吸收
- E.牙槽骨吸收的范围和牙周袋深度常不一致

133、(B1 型题)对牙髓有刺激的粘固粉是

- A.氧化锌丁香油粘固粉
- B.聚羧酸锌粘固粉
- C.玻璃离子粘固粉
- D.磷酸锌粘固粉
- E.复合树脂

134、(B1 型题)粉剂由二氧化硅、三氧化二铝和氟化钙组成的粘固粉是

- A.氧化锌丁香油粘固粉
- B.聚羧酸锌粘固粉
- C.玻璃离子粘固粉
- D.磷酸锌粘固粉

E.复合树脂

135、(B1型题) 粉剂由煅烧过的氧化锌和氧化镁混合物组成的粘固粉是

- A.氧化锌丁香油粘固粉
- B.聚羧酸锌粘固粉
- C.玻璃离子粘固粉
- D.磷酸锌粘固粉
- E.复合树脂

136、(B1型题) 轻度四环素着色临床表现

- A.牙着色的颜色由棕黄色到黑灰色
- B.整个牙面呈现黄色和灰色，分布均匀
- C.牙表面着色深，严重者呈灰棕色、蓝紫色
- D.表面有明显的带状着色，颜色呈黄灰色或黑色
- E.牙釉质表面上可有少量的浅沟、小凹点或细横纹

137、(B1型题) 中度四环素着色临床表现

- A.牙着色的颜色由棕黄色到黑灰色
- B.整个牙面呈现黄色和灰色，分布均匀
- C.牙表面着色深，严重者呈灰棕色、蓝紫色
- D.表面有明显的带状着色，颜色呈黄灰色或黑色
- E.牙釉质表面上可有少量的浅沟、小凹点或细横纹

138、(B1型题) 重度四环素着色临床表现

- A.牙着色的颜色由棕黄色到黑灰色
- B.整个牙面呈现黄色和灰色，分布均匀
- C.牙表面着色深，严重者呈灰棕色、蓝紫色
- D.表面有明显的带状着色，颜色呈黄灰色或黑色
- E.牙釉质表面上可有少量的浅沟、小凹点或细横纹

139、(B1型题) 极重度四环素着色临床表现

- A.牙着色的颜色由棕黄色到黑灰色
- B.整个牙面呈现黄色和灰色，分布均匀
- C.牙表面着色深，严重者呈灰棕色、蓝紫色
- D.表面有明显的带状着色，颜色呈黄灰色或黑色
- E.牙釉质表面上可有少量的浅沟、小凹点或细横纹

140、(B1型题) 上颌中切牙腭面洞

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞

141、(B1型题) 上颌侧切牙邻面龋未累计切角

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞

142、(B1型题) 上颌中切牙切角缺损

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞

- D. IV类洞
- E. V类洞

143、(B1型题) 下颌第一磨牙近中邻面颈部龋

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞

144、(B1型题) 上颌尖牙颊侧颈部龋

- A. I类洞
- B. II类洞
- C. III类洞
- D. IV类洞
- E. V类洞

145、(B1型题) 与龈下牙石形成有关

- A. 龈上菌斑
- B. 附着型龈下菌斑
- C. 非附着型龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

146、(B1型题) 主要为革兰阴性厌氧菌构成的菌斑

- A. 龈上菌斑
- B. 附着型龈下菌斑
- C. 非附着型龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

147、(B1型题) 被认为是牙周炎“进展前沿”的菌斑

- A. 龈上菌斑
- B. 附着型龈下菌斑
- C. 非附着型龈下菌斑
- D. 陈旧的龈上菌斑
- E. 窝沟处龈上菌斑

148、(B1型题) 牙龈纤维瘤病

- A. 牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 1/3,很少波及附着龈
- B. 牙龈增生覆盖牙冠的 1/3 左右,一般不超过 2/3,严重者可波及附着龈
- C. 牙龈增生常覆盖牙冠的 2/3 以上,很少波及附着龈
- D. 牙龈增生覆盖牙冠的 2/3 以上,常波及附着龈
- E. 牙龈形态基本正常

149、(B1型题) 药物性牙龈增生

- A. 牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 1/3,很少波及附着龈
- B. 牙龈增生覆盖牙冠的 1/3 左右,一般不超过 2/3,严重者可波及附着龈
- C. 牙龈增生常覆盖牙冠的 2/3 以上,很少波及附着龈
- D. 牙龈增生覆盖牙冠的 2/3 以上,常波及附着龈
- E. 牙龈形态基本正常

150、(B1型题) 慢性龈炎;

- A. 牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 1/3,很少波及附着龈
- B. 牙龈增生覆盖牙冠的 1/3 左右,一般不超过 2/3,严重者可波及附着龈

- C.牙龈增生常覆盖牙冠的 2/3 以上，很少波及附着龈
- D.牙龈增生覆盖牙冠的 2/3 以上，常波及附着龈
- E.牙龈形态基本正常

答案

1、正确答案：D

答案解析：根龋，也称根面龋。多见于中老年人和牙周病患者。龋损部位多围绕牙颈部，可有龋洞，也常见牙根表面广泛的浅表损害。

2、正确答案：E

答案解析：光固化复合树脂：为目前主流的复合树脂。树脂含光引发体系，包括光敏剂和促进剂。化学固化复合树脂：为早期产品。树脂为双组分剂型，分别含有氧化还原引发体系。将两组分别调和后，氧化还原体系迅速产生自由基，引发聚合反应。化学固化复合树脂因操作时间不易控制，目前很少用于充填修复。

3、正确答案：E

答案解析：充填修复后牙齿完全裂至髓室底，按照此情况只有拔除。

4、正确答案：A

答案解析：窝沟浅龋可表现为龋损部位色泽变黑，进一步仔细观察可发现黑色沉着区下方为龋白斑，呈白垩色改变。

5、正确答案：C

答案解析：畸形中央尖 X 线检查可见髓室顶中心有向面中央部突起的畸形部分，并常见未发育完成呈喇叭形的根尖部。

6、正确答案：E

答案解析：牙齿脱位后，可以发生各种并发症：牙髓坏死；牙髓腔变窄或消失；牙根外吸收；边缘性牙槽突吸收。

7、正确答案：C

答案解析：牙本质过敏症又称过敏性牙本质或牙本质过敏，是牙齿在受到外界刺激，如温度（冷、热）、化学物质（酸、甜）以及机械作用（摩擦或咬硬物）等所引起的酸、软、痛症状，其特点为发作迅速、疼痛尖锐、时间短暂。导致牙本质过敏的外界刺激可以是生理范围的刺激。牙本质过敏症不是一种独立的疾病，而是多种牙体疾病共有的症状。

8、正确答案：E

答案解析：不同类型的慢性根尖周炎 X 线片表现特点不同：①慢性根尖周肉芽肿为围绕患牙根尖部的圆形或椭圆形的透射区，边界清楚。②慢性根尖周脓肿为根尖部不规则，边界比较模糊的透射区，周围的骨质也较疏松。③根尖周囊肿为根尖周圆形透射区，有阻射的白线围绕。④X 线检查见围绕患牙根尖部的透射区是诊断慢性根尖周炎的关键依据。

9、正确答案：C

答案解析：慢性根尖周炎的病变类型有四种：根尖周肉芽肿、慢性根尖周脓肿、根尖周囊肿和根尖周致密性骨炎；前三种以骨破坏病损为特征，后一种则为局部骨质增生性病变。

10、正确答案：A

答案解析：急性根尖周脓肿切开排脓时引流条每天更换 1 次，直至无脓时抽出。

11、正确答案：B

答案解析：甲醛甲酚（FC）是根管消毒剂中杀菌能力最强，刺激作用最大的一种药物，由于有细胞毒作用，所以一般用于髓腔封药，而不用根管内封药。

12、正确答案：E

答案解析：

13、正确答案：B

答案解析：

14、正确答案：C

答案解析：咬诊、探诊、染色法、透照法均可用于隐裂牙的检查。

15、正确答案：B

答案解析：静止龋由于致龋因素消失，已有的病变停止进展并再矿化而形成，如患龋部位可以自洁或者暴露在菌斑不能聚集的环境，所以B正确。

16、正确答案：A

答案解析：龋病的治疗包括非手术治疗（药物治疗/再矿化治疗/预防性树脂充填术）和充填治疗。；

17、正确答案：C

答案解析：急性牙髓炎需要与牙间乳头炎，急性上颌窦炎及三叉神经痛相鉴别。

18、正确答案：D

答案解析：根尖周囊肿生长很慢，多无自觉症状，牙体变色、呈深灰色，牙体无光泽。'避肿大小可由豌豆大到鸡蛋大。根尖部的龈黏膜呈半球形隆起，手压时像有乒乓球感，有弹性；根管内可溢出黄色清亮液体。囊肿压迫邻近牙时，有松动或移动。X线片上可见到根尖有较大的圆形透明区，边界清楚，周围骨质致密呈清楚放射白线。故选D。

19、正确答案：E

答案解析：粘结剂与牙本质之间借助于微机械嵌合，化学键、分子间引力，氢键等结合。

20、正确答案：B

答案解析：融合牙常由两个正常牙胚融合而成，可以是完全融合，也可以是不完全融合。牙本质总是相通连的。最常见于下颌乳切牙。双生牙系由一个内向凹陷将一个牙胚不完全分开而形成不完全的双生牙。通常双生牙为完全或不完全分开的牙冠，有一个共同的牙根和根管。结合牙为两个牙的牙根发育完全以后借助牙骨质粘连在一起。畸形中央尖多见于下颌前磨牙，尤以第二前磨牙最为常见，一般均位于颌面中央窝处，呈圆锥形突起。

21、正确答案：D

答案解析：深龋可在冷水进入窝洞时敏感，而冷刺激敏感是鉴别深龋和可复性牙髓炎的重要依据，所以做冷测时要避免冷水入窝洞。

22、正确答案：E

答案解析：常用的氟化物有75%氟化钠甘油糊剂、8%氟化亚锡溶液、酸性磷酸氟化钠（APF）溶液、含氟凝胶及含氟涂料等。氟化物对软组织无腐蚀性，不使牙变色，前后牙均可使用。硝酸银对软组织有强的腐蚀性，并使牙变黑，一般只用于乳牙和后牙，不可用于牙颈部龋。

23、正确答案：D

答案解析：根尖1/3处根折的牙应该先调、固定。有牙髓症状的再做根管治疗，根管治疗失败了才拔除。

24、正确答案：E

答案解析：

25、正确答案：A

答案解析：主尖尖端应位于根管狭窄处，根管在接近根尖时有一个狭窄的部位，距离解剖性根尖孔约0.5~2mm。除解剖性根尖孔，根管在接近根尖时有一个狭窄的部位，这就是牙本质牙骨质界，即生理性根尖孔，距离解剖性根尖孔约0.5~2mm。这个部位就是髓腔预备的终止点，也是根管充填的终止

点。此处亦称根尖基点，或称根尖止点。生理性根尖孔就是根尖狭窄。解剖性根尖孔是根管在牙根表面的开口，就是牙根从表面看的最顶端。

26、正确答案：A

答案解析：猛性龋常好发于唾液量减少患者，如舍格仑综合症患者，放射治疗患者。由于唾液量的极具减少，导致不易患龋的下前牙也发生的龋坏。称之为猛性龋。

27、正确答案：C

答案解析：鸠尾峡位于颊舌两侧牙尖之间，在轴髓线角的靠中线侧，所以C正确。

28、正确答案：E

答案解析：根管治疗术中根管预备不能超出根尖孔，应保证根尖止点，所以不能超预备。

29、正确答案：C

答案解析：

30、正确答案：A

答案解析：牙髓活力温度测验时，冷热刺激源应置于待测牙唇(颊)面颈1/3或中1/3处，紧贴数秒，观察患者反应。故本题答案为A。

31、正确答案：A

答案解析：

32、正确答案：E

答案解析：根据牙面解剖形态可以分为两种类型：I型为窝沟龋；II型为平滑面龋。

33、正确答案：D

答案解析：倒凹固位：倒凹是一种机械固位，在洞底的侧髓线角或点角处平洞底向侧壁牙本质作出的潜入小凹，有时也可沿线角作固位沟。充填体突入倒凹或固位沟内，防止充填体从垂直方向脱位。

34、正确答案：B

答案解析：对这类患牙再补充维生素D和矿物质，是毫无意义的。①注意妇幼保健，可预防本病发生。②由于患牙发育矿化较差，容易磨损。患龋后发展较快，应进行防龋处理。③轻症患牙不必治疗；重症患牙用复合树脂或用口腔修复学的方法覆盖牙面，不仅可改善外观，而且有助于防止龋病的发生。

35、正确答案：D

答案解析：冠折未露髓：仅限于冠部釉质或釉质和牙本质折断，多见于上中切牙近中切角或切缘水平折断，偶见折断面涉及大部分唇面或舌面。牙本质折断者可出现牙齿敏感症状，有时可见近髓处透红、敏感。

36、正确答案：C

答案解析：细菌在未进入牙髓腔之前，其毒性产物就可通过牙本质小管引起牙髓的炎症反应。当牙本质内的细菌距牙髓 $<1.1\text{ mm}$ 时，牙髓可出现轻度炎症； $<0.5\text{ mm}$ 时，牙髓可发生明显的炎症； $\leq 0.2\text{ mm}$ 时，牙髓内可找到细菌。

37、正确答案：E

答案解析：根管治疗并发症：器械分离、穿孔、软组织的化学损伤、急性根尖周炎、其他（器械的误咽误吸、皮下气肿、残髓炎等）。

38、正确答案：D

答案解析：在15号锉之前还有06号、08号、10号三根细锉，颜色分别为粉色、灰色和紫色。

39、正确答案：C

答案解析：在正常生理咀嚼过程中，随着年龄的增长，牙齿面和邻面由于咀嚼作用而发生的均衡的磨损称为生理性磨损。

40、正确答案：E

答案解析：

41、正确答案：C

答案解析：

42、正确答案：D

答案解析：平滑面龋损可进一步分为两个亚类：发生于近远中接触点处的损伤为邻面龋；发生于牙齿颊面或舌面，靠近釉牙骨质界处的龋损为牙颈部龋。

43、正确答案：B

答案解析：为防止四环素牙的发生，妊娠和喂母乳的妇女，以及8岁以下的小儿不宜使用四环素类药物。对四环素牙处理方法有三种，包括可见光复合树脂修复、塑料贴面修复以及高浓度过氧化氢液脱色治疗。

44、正确答案：D

答案解析：玻璃离子类当作为根管倒充填材料时渗透最小，根尖封闭性显著优于其他封闭剂。

45、正确答案：A

答案解析：

46、正确答案：A

答案解析：外伤性纵折很少见，牙根纵裂多数由于创伤性力或者患牙形态异常等因素造成，根折中牙根横断或斜形根折较多见，故选A；根折按其部位可分为近冠1/3、根中1/3和根尖1/3，最常见者为根尖1/3，儿童牙根尚未发育完成，牙根相对短粗，牙槽骨疏松，外伤造成根折较少，所以根折多见于牙根完全形成的成人牙齿，排除C；根折线感染时可导致牙髓坏死，坏死率20%左右，排除D；根折牙可有牙髓及牙周膜的充血，牙髓活力测定结果不一，可有牙髓休克出现，即电测无反应，但不说明牙髓坏死，排除E。所以此题选A。

47、正确答案：C

答案解析：主尖进入根管达到标记长度后向外拉出有“回拉阻力”，可初步确定，说明主尖在根尖部与根管壁紧密贴合，此为重要指标，故选C。

48、正确答案：D

答案解析：变形链球菌表面黏附素与牙表面获得膜结合而有利于细菌定植，表面蛋白（如葡萄糖连接蛋白）和脂磷壁酸为主要组成部分。故选D。

49、正确答案：C

答案解析：根尖周透射区代表根尖周的慢性炎症性疾病，通常患牙的牙髓活力已经丧失。只有牙髓坏死，炎性物质波及根尖周，才出现根尖周的病变。

50、正确答案：C

答案解析：单纯性龈炎、慢性牙周炎、龈乳头炎、肥大性龈炎均是牙龈组织受局部刺激时而发生的慢性炎症。只有多发性龈脓肿的病因尚不清楚，未明确是由局部刺激因素引起的，因此选C。

51、正确答案：C

答案解析：牙龈是一些性激素的靶器官，性激素不能单独引起牙周病，而是性激素的存在使牙龈对局部刺激的反应增强，可使原有炎症加重；妊娠期龈炎在分娩后可恢复到妊娠前水平，不一定完全消退；青春期龈炎的主要病因是菌斑，而性激素的改变是炎症发生的全身因素。故本题选C。

52、正确答案：B

答案解析：

53、正确答案：B

答案解析：患龈炎时，龈缘附近一般有较多的菌斑堆积，菌斑中细菌量也较健康牙周时多，菌斑中 G+ 球菌比例较健康时下降，而 G-厌氧菌明显增多。故本题选 B。

54、正确答案：C

答案解析：有良好口腔卫生，妊娠期牙龈炎不会发生，因细菌是牙龈炎的主要因素。去除引起牙龈炎发生的菌斑始动因素，将会保持牙龈健康。故本题选 C。

55、正确答案：C

答案解析：慢性龈炎由于牙龈增生产生假性牙周袋，即龈袋，其产生的原因是牙龈的炎性增生，而结合上皮的位置并未向根方迁移，结合上皮的位置位于由牙骨质界的冠方。因此选 C。

56、正确答案：E

答案解析：

57、正确答案：B

答案解析：诊断牙周炎的决定指标是附着丧失。因此选 B。

58、正确答案：D

答案解析：广泛型侵袭性牙周炎主要发生于 30 岁以下的年轻人，但也可见 35 岁以上者。受累的患牙广泛。可能由局限型病变发展而来。侵袭性牙周炎患者牙龈表面的细菌轻微，但已有深牙周袋，牙周组织破坏程度与局部刺激物的量不成正比。故本题选 D。

59、正确答案：E

答案解析：

60、正确答案：B

答案解析：掌跖角化-牙周破坏综合征的临床表现，皮损及牙周病变常在 4 岁前出现，牙周破坏严重，乳牙萌出后即有深牙周袋，恒牙萌出后按序发生牙周破坏，手掌、足底、膝部及肘部局限性的过度角化，患儿智力及身体发育正常。

61、正确答案：C

答案解析：根柱短的牙易发根分叉病变。因此选 C。

62、正确答案：E

答案解析：两段式种植体愈合期完全埋植于黏膜下，不易感染牙周致病菌。

63、正确答案：E

答案解析：

64、正确答案：D

答案解析：

65、正确答案：A

答案解析：

66、正确答案：E

答案解析：牙周基础治疗的目的主要是消除菌斑微生物等致病因素。故本题选 E。

67、正确答案：D

答案解析：

68、正确答案：B

答案解析：

69、正确答案：D

答案解析：

70、正确答案：D
答案解析：

71、正确答案：E
答案解析：菌斑是牙周病的始动因素，牙石致病机制中最主要的是牙石表面未钙化的菌斑。因此选E。

72、正确答案：B
答案解析：

73、正确答案：B
答案解析：

74、正确答案：D
答案解析：

75、正确答案：B
答案解析：

76、正确答案：D
答案解析：

77、正确答案：D
答案解析：

78、正确答案：E
答案解析：

79、正确答案：B
答案解析：

80、正确答案：D
答案解析：

81、正确答案：B
答案解析：

82、正确答案：C
答案解析：

83、正确答案：B
答案解析：

84、正确答案：E
答案解析：

85、正确答案：C
答案解析：

86、正确答案：A
答案解析：

87、正确答案：D
答案解析：

88、正确答案：D
答案解析：

89、正确答案：E

答案解析：

90、正确答案：C

答案解析：

91、正确答案：E

答案解析：

92、正确答案：C

答案解析：

93、正确答案：D

答案解析：

94、正确答案：B

答案解析：“到近中边缘嵴约小米大小透暗色区”且“3天来遇甜酸痛”提示患牙为中龋，应给予充填治疗。该部位充填材料不但要求强度，而且要求美观，因此首选复合树脂。

95、正确答案：B

答案解析：氟牙症临床表现特点是在同一时期萌出的釉质上有白垩色到褐色斑块，严重者还并发釉质的实质缺损

96、正确答案：E

答案解析：冠根折：折断线累计牙冠和根部，以斜行冠根折多见，均与口腔相通，牙髓往往暴露，患牙断片动度大，触痛明显。此占牙齿外伤的一小部分。

97、正确答案：C

答案解析：慢性溃疡性牙髓炎：探查洞底有穿髓孔，有探痛；对温度测验的反应可迟钝或敏感；叩诊轻度疼痛或不适；X线片检查可有根尖周牙周膜间隙增宽或硬骨板模糊等改变。

98、正确答案：A

答案解析：急性牙髓炎包括慢性牙髓炎急性发作。

99、正确答案：E

答案解析：本题考的知识点是急性根尖周炎治疗的应急处理。题干说明患牙急性根尖周炎髓腔已开放，开髓孔大、根管内无腐屑，提示A、B选项已排除；服消炎药表明已加强了抗感染处理。病例未提示有其他感染源的可能；而患牙叩(+++)和龈轻红肿提示急性根尖周炎仍处于急性根尖周脓肿阶段，根管内无渗出物，因此，根尖孔不通畅使根尖部积聚的脓液得不到引流是最可能的原因。因此标准答案为E

100、正确答案：E

答案解析：

101、正确答案：C

答案解析：

102、正确答案：C

答案解析：牙龈疼痛、出血、口臭，检查龈乳头顶端附着白色污秽坏死物，涂片检查特征性的梭形杆菌和螺旋体可明确诊断。故本题选C。

103、正确答案：E

答案解析：患者，女，31岁，牙龈炎症较严重，考虑妊娠期龈炎，最应询问的是月经情况以便对妊娠期龈炎进行诊断。故本题选E。

104、正确答案：C

答案解析：本病例诊断为妊娠期龈炎，其治疗原则与慢性龈缘炎相似，但应注意尽量避免使用抗生素等全身药物治疗，以免影响胎儿发育。该患者 DI-S 为 2，口腔卫生状况差，无需特殊处理，应予以认真细致的口腔卫生教育，嘱患者做好菌斑控制和必要的维护治疗。故选 C。

105、正确答案：C

答案解析：年龄大，口腔卫生状况差结合牙周袋形成及附着丧失，最可能的诊断为慢性牙周炎。故选 C。

106、正确答案：D

答案解析：

107、正确答案：A

答案解析：

108、正确答案：A

答案解析：

109、正确答案：A

答案解析：

110、正确答案：E

答案解析：

111、正确答案：D

答案解析：

112、正确答案：D

答案解析：

113、正确答案：A

答案解析：口腔扁平苔藓的皮肤损害：损害特点为扁平面有光泽的紫红色多角形丘疹，丘疹如绿豆大小，边缘境界清楚，质地坚硬干燥，融合后状如苔藓，放大镜下观察可看到有细白纹，称 Wickham 纹

114、正确答案：B

答案解析：

115、正确答案：D

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：D

答案解析：

118、正确答案：B

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：根据症状可确定为嵌入性牙脱位。

120、正确答案：A

答案解析：可在局麻下使患牙复位，固定。随诊观察。

121、正确答案：B

答案解析：根尖 1/3 处根折的患牙，如牙髓状况良好，可调后观察。故选 B。

122、正确答案：D

答案解析：牙齿的永久性修复都应在受伤后 6~8 周进行修复。故选 D。

123、正确答案：D

答案解析：根据发病患牙的位置，并伴有带状缺损的症状，可诊断为重度釉质发育不全。釉质发育不全需要与氟牙症进行鉴别诊断，氟牙症的患者年幼时有在高氟地区的生活史，患牙数量较多。上颌前牙多见。而釉质发育不全的患者，多为对称性发病，无幼年高氟地区生活史。

124、正确答案：E

答案解析：因其临床表现确定为釉质发育不全，故应有双侧对称发病的描述。

125、正确答案：A

答案解析：一岁以内时牙齿发育正处于矿化阶段，在此阶段患儿的全身疾病或局部刺激会导致釉质发育不全。

126、正确答案：D

答案解析：

127、正确答案：B

答案解析：

128、正确答案：C

答案解析：

129、正确答案：D

答案解析：

130、正确答案：B

答案解析：

131、正确答案：C

答案解析：

132、正确答案：D

答案解析：

133、正确答案：D

答案解析：

134、正确答案：C

答案解析：

135、正确答案：B

答案解析：

136、正确答案：B

答案解析：轻度四环素着色：整个牙面呈现黄色和灰色，分布均匀。

137、正确答案：A

答案解析：中度四环素着色：牙着色的颜色由棕黄色到黑灰色。

138、正确答案：D

答案解析：重度四环素着色：牙表面有明显的带状着色，颜色呈黄灰色或黑色。

139、正确答案：C

答案解析：极重度四环素着色：牙表面着色深，严重者呈灰棕色、蓝紫色。

140、正确答案：A
答案解析：

141、正确答案：C
答案解析：

142、正确答案：D
答案解析：

143、正确答案：B
答案解析：

144、正确答案：E
答案解析：

145、正确答案：B
答案解析：

146、正确答案：C
答案解析：

147、正确答案：C
答案解析：

148、正确答案：D
答案解析：

149、正确答案：B
答案解析：

150、正确答案：A
答案解析：