



2020 口腔 执业 (助理) 医师考试

王牌直播

核心考点精学笔记

- ◆ 核心考点
- ◆ 习题跟踪
- ◆ 名师精讲
- ◆ 重难剖析



金英杰独家资料 (电子版)



金英杰直播学院


JINYINGJIE.COM



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

月度考试

- 
- 1、（A1 型题）根管长度电测法在下列情况下易发生误差，除外
- A.髓腔内腐质未去净
 - B.髓腔内有金属充填物
 - C.根管内有脓血液
 - D.根尖尚未形成
 - E.根管有穿孔
- 2、（A1 型题）以下不属于根管冲洗目的是
- A.消毒灭菌
 - B.溶解坏死组织
 - C.引流
 - D.润滑根管
 - E.使根管壁牙本质软化
- 3、（A1 型题）下列哪种情况暂不适于作牙髓治疗
- A.近六个月内患有心肌梗死
 - B.头颈部肿痛，放疗后
 - C.艾滋病
 - D.出血性疾病
 - E.糖尿病
- 4、（A1 型题）下列关于活髓切断术不正确的是
- A.适于根尖未发育完成的年轻恒牙
 - B.是切除炎症牙髓，保留正常牙髓组织的方法
 - C.常选用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 作为盖髓剂
 - D.用锐利挖匙或球钻从根管口处切断牙髓
 - E.将盖髓剂压入根管口下方 1 mm
- 5、（A1 型题）龋病的定义是
- A.牙齿在多种因素的影响下，其组织发生的一种慢性进行性破坏性疾病
 - B.在多种生物因素的共同作用下，牙齿硬组织发生急性严重性破坏的一种病变
 - C.在以细菌为主的多种因素的影响下，牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
 - D.在多种内在因素影响下，牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
 - E.在细菌的影响下，牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病
- 6、（A1 型题）中龋的临床表现为
- A.遭受外界的物理化学刺激无明显反应

- B.龋洞形成，酸甜冷热刺激痛，刺激去除后症状立即消失
C.龋洞形成，冷热刺激痛，自发痛
D.龋洞形成，冷热刺激痛，放射痛
E.龋洞形成，食物嵌入痛，夜间痛
- 7、（A1型题）上颌第一磨牙各面易患龋病的顺序为
A.面，近中面，腭面，颊面，远中面
B.面，颊面，近中面，腭面，远中面
C.面，远中面，腭面，近中面，颊面
D.面，近中面，远中面，腭面，颊面
E.面，远中面，近中面，颊面，腭面
- 8、（A1型题）浅龋应与何种疾病鉴别
A.慢性牙髓炎
B.牙本质过敏
C.四环素牙
D.釉质发育不全
E.楔状缺损
- 9、（A1型题）牙体粘结修复术洞形制备的特点是
A.前牙切角缺损不必磨除正常釉质
B.洞缘的釉质壁不必做短斜面
C.可不作预防性扩展
D.不承受力处，可形成盒状洞形
E.垫底时可过多覆盖牙本质
- 10、（A1型题）意外穿髓，穿髓孔直径
A.间接盖髓术
B.直接盖髓术
C.安抚治疗后永久填充
D.双层垫底后永久填充
E.局部麻醉下开髓引流
- 11、（A1型题）牙本质龋发展过程中，邻近正常牙本质的是
A.透明层
B.脱矿层
C.细菌侵入层
D.表层
E.坏死崩解层
- 12、（A1型题）牙菌斑成熟，细菌数量、种类稳定需要的时间范围是
A.0.5~1天
B.1~2天
C.2~3天

- D.3~4 天
- E.5~7 天

13、（A1 型题）症状比较明显的中龋部位是

- A.面
- B.舌面
- C.颈部
- D.颊面
- E.接触点

14、（A1 型题）窝沟龋的早期表现为

- A.明显龋洞
- B.探诊有酸感
- C.损害部位呈白垩色
- D.损害部位透出墨浸状
- E.损害位于釉牙本质交界处

15、（A1 型题）关于萌出异常的描述，错误的是

- A.早萌多见于上颌乳切牙
- B.恒牙早萌多见于乳牙早脱所致
- C.个别乳牙迟萌可能与外伤或感染有关
- D.恒牙萌出困难，常见于上颌切牙
- E.乳牙很少有异位或萌出困难

16、（A1 型题）两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为

- A.融合牙
- B.结合牙
- C.双生牙
- D.过大牙
- E.畸形中央尖

17、（A1 型题）额外牙最多见的是

- A.上颌第三磨牙
- B.上颌第四磨牙
- C.上颌前磨牙区
- D.正中牙
- E.上颌侧切牙

18、（A1 型题）牙内陷多发生于

- A.上颌中切牙
- B.上颌侧切牙
- C.上颌尖牙
- D.前磨牙
- E.下颌中切牙

- 19、（A1 型题）根折牙临床表现的表述，不正确的是
- A.外伤性纵折很多见
 - B.最常见的根折为根尖 1/3 折断
 - C.多见于牙根完全形成的成人牙齿
 - D.根折恒牙的牙髓坏死率为 20%~24%
 - E.特纳牙
- 20、（A1 型题）牙震荡是指
- A.牙周膜轻度损伤，不伴牙体缺损
 - B.牙周膜轻度损伤，伴有牙体缺损
 - C.牙周膜重度撕裂，不伴牙体缺损
 - D.牙周膜重度撕裂，伴有牙体缺损
 - E.仅有根尖周膜的损伤
- 21、（A1 型题）牙脱位后可以发生各种并发症，除外
- A.牙髓坏死
 - B.髓腔变窄或消失
 - C.牙根外吸收
 - D.边缘性牙槽突吸收
 - E.颞下颌关节紊乱病
- 22、（A1 型题）咬诊主要用于检查
- A.牙髓炎
 - B.根尖周炎
 - C.牙隐裂
 - D.牙本质过敏
 - E.牙周炎
- 23、（A1 型题）前磨牙楔状缺损应选用的最佳充填材料是
- A.玻璃离子粘固粉
 - B.化学固化复合树脂
 - C.磷酸锌粘固粉
 - D.银汞合金
 - E.聚羧酸锌粘固粉
- 24、（A1 型题）牙隐裂好发于
- A.下颌第一磨牙
 - B.上颌第一磨牙
 - C.下颌第二磨牙
 - D.上颌第二磨牙
 - E.上颌前磨牙
- 25、（A1 型题）严重面磨损引起颞颌关节紊乱病的主要原因是

- A. 颌间垂直距离过短，引起关节损伤
B. 边缘嵴和发育沟缺损，导致面外形不完整
C. 不均匀磨损遗留高陡牙尖，造成咬合创伤
D. 牙本质过敏，造成力不足，损害关节
E. 长期的咀嚼使力集中，损害关节
- 26、（A1 型题）测量附着水平正确距离是
A. 龈缘-袋底
B. 牙颈部-袋底
C. 龈缘-釉牙骨质界
D. 釉牙骨质界-袋底
E. 以上全不是
- 27、（A1 型题）用有刻度的牙周探针探测牙周袋时应注意下列几点。除了
A. 支点应稳
B. 探测力量应掌握恰当
C. 探测宽度要角度垂直
D. 探测位置和角度要恰当
E. 按顺序探测
- 28、（A1 型题）龈上菌斑中的优势细菌为
A. 革兰阳性需氧菌和兼性菌
B. 革兰阳性兼性菌
C. 革兰阳性兼性菌和厌氧菌
D. 革兰阴性能动菌
E. 革兰阴性厌氧菌
- 29、（A1 型题）附着性龈下菌斑中的优势细菌为
A. 革兰阳性需氧菌
B. 革兰阳性兼性菌
C. 革兰阳性兼性菌和厌氧菌
D. 革兰阴性能动菌
E. 革兰阴性厌氧菌
- 30、（A1 型题）下列是引起牙齿松动的原因。除外
A. 创伤
B. 牙周袋深部刮治
C. 牙周膜急性炎症
D. 牙周翻瓣术后
E. 牙槽骨吸收达 1/2 以上
- 31、（A1 型题）对牙周组织损伤最大的是
A. 牵引力
B. 斜向力

- C.垂直压力
D.水平压力
E.扭力和旋转力
- 32、（A1 型题）非附着性菌斑中占优势的是
- A.革兰阳性球菌
B.革兰阳性丝状菌
C.革兰阴性能动菌
D.革兰阴性球菌
E.革兰阳性杆菌
- 33、（A1 型题）牙槽骨水平吸收时形成的牙周袋通常为
- A.骨上袋
B.骨下袋
C.复杂袋
D.2 壁骨袋
E.3 壁骨袋
- 34、（A1 型题）牙周炎时的组织破坏特点为
- A.持续性破坏
B.长时间静止，短时间破坏
C.长时间破坏，短时间静止
D.进行性破坏
E.渐进性破坏
- 35、（A1 型题）能产生白细胞毒素的牙周致病微生物是
- A.牙龈卟啉单胞菌
B.伴放线放线杆菌
C.巨核梭杆菌
D.福赛拟杆菌
E.中间普氏菌
- 36、（A1 型题）牙槽骨垂直吸收时伴随的牙周袋多为
- A.龈袋
B.复杂袋
C.骨上袋
D.骨下袋
E.假性牙周袋
- 37、（A1 型题）牙周炎时 X 线片上牙槽骨吸收的最主要表现是
- A.牙槽骨高度降低
B.牙槽骨密度增强
C.根尖区骨密度减低阴影
D.牙周宽度均匀增加

- E.牙槽嵴顶位于釉牙骨质界下 1 mm
- 38、（A1 型题）造成牙龈炎症和牙周破坏的常见原因中不包括
- A.银汞悬突
 - B.深窝沟
 - C.咬合创伤
 - D.食物嵌塞
 - E.边缘不密合的全冠
- 39、（A1 型题）慢性牙龈的临床表现如下，除外
- A.牙龈可呈鲜红或暗红色
 - B.刷牙或咬硬物时牙龈可有出血
 - C.牙龈质地松软脆弱
 - D.龈沟深度增加，形成假性牙周袋
 - E.牙间乳头坏死消失
- 40、（A1 型题）急性坏死性溃疡性牙龈炎的病因与下列哪一项关系最小
- A.精神紧张
 - B.细菌
 - C.创伤
 - D.吸烟
 - E.营养
- 41、（A1 型题）与急性坏死性溃疡性牙龈炎关系最密切的细菌为
- A.梭形杆菌、螺旋体与中间普氏菌
 - B.梭形杆菌与牙龈卟啉单胞菌
 - C.放线杆菌与螺旋体
 - D.黏性放线菌与螺旋体
 - E.伴放线放线杆菌
- 42、（A1 型题）能引起药物性牙龈增生的药物是
- A.苯妥英钠
 - B.苯妥英钠+硝苯地平
 - C.苯妥英钠+环孢素
 - D.硝苯地平+环孢素
 - E.苯妥英钠+硝苯地平+环孢素
- 43、（A1 型题）第二恒磨牙的萌出时间是
- A.2~3 岁
 - B.6~7 岁
 - C.12~13 岁
 - D.18~21 岁
 - E.5~6 岁

- 44、（A1 型题）恒牙咬合建立的关键是
- A. 第一恒磨牙的咬合关系
 - B. 第二恒磨牙的咬合关系
 - C. 保证第一恒磨牙无龋坏
 - D. 保证第二恒磨牙无龋坏
 - E. 及时进行第一、二恒磨牙的窝沟封闭
- 45、（A1 型题）儿童第一恒磨牙因龋坏严重需拔牙的最佳时间为
- A. 6~7 岁
 - B. 8~9 岁
 - C. 10~11 岁
 - D. 12~13 岁
 - E. 13 岁以后
- 46、（A1 型题）下述哪一项不是判断乳牙接近替换期的表现
- A. 牙冠破坏大
 - B. 临床 III 度松动
 - C. 恒牙胚牙根已形成一半
 - D. 恒牙胚位置已接近乳牙根分叉
 - E. 乳牙根吸收已达 1 / 2
- 47、（A1 型题）下列有关年轻恒牙牙髓修复特点叙述中，错误的是
- A. 比成熟恒牙牙髓组织疏松
 - B. 血管丰富，抗病能力和修复功能强
 - C. 牙乳头对感染的抵抗力强
 - D. 髓室内有感染坏死时，部分牙髓或根髓仍有活性
 - E. 根尖孔大、血运丰富，牙髓感染不易向根尖周扩散
- 48、（A1 型题）年轻恒牙冠髓切断术常用药物是
- A. 氢氧化钙糊剂
 - B. 氧化锌丁香油糊剂
 - C. 戊二醛
 - D. 甲醛甲酚
 - E. 碘仿
- 49、（A1 型题）年轻恒牙中最常出现外伤的牙齿是
- A. 上颌中切牙
 - B. 上颌侧切牙
 - C. 上颌中切牙和侧切牙
 - D. 下颌中切牙
 - E. 下颌第一前磨牙
- 50、（A1 型题）对恒牙胚影响较大的乳牙外伤为
- A. 牙齿震荡

- B.全脱出
C.挫入
D.冠折
E.根折
- 51、（A1 型题）乳牙牙髓病及根尖周病治疗中，不宜使用的药物是
A.5%次氯酸钠液
B.三氧化二砷
C.3%双氧水
D.木榴油
E.樟脑酚
- 52、（A1 型题）临床上年轻恒牙异常松动的原因多为
A.牙根未发育完全
B.根尖周病
C.牙髓炎
D.牙龈炎
E.外伤
- 53、（A1 型题）乳牙早失后是否需做功能性间隙保持器主要应考虑
A.患儿年龄和牙列拥挤情况
B.牙齿萌出的先后顺序
C.继承恒牙的发育情况
D.继承恒牙胚是否先天缺失
E.乳磨牙缺失的数目和部位
- 54、（A1 型题）乳牙的大面积龋坏，不但会使牙弓长度减少，还会影响颌间高度，为确保乳牙的正常宽度和高度，对于多个牙面龋坏的牙齿应用
A.不锈钢合金冠修复体
B.远中导板保持器
C.功能性活动保持器
D.局部固定式间隙扩展装置
E.舌弓保持器
- 55、（A1 型题）与病原体侵入机体后是否致病无关的因素有
A.病原体毒力
B.病原体数量
C.入侵途径与机体的适应性
D.龋病
E.机体的抵抗能力
- 56、（A1 型题）不属于感染性疾病的是
A.口腔结核
B.复发性疱疹性口炎

- C.原发性疱疹性口炎
D.鹅口疮
E.天疱疮
- 57、（A1 型题）服用氟康唑适宜治疗
- A.口腔结核
B.带状疱疹
C.球菌性口炎
D.口腔念珠菌病
E.急性疱疹性龈口炎
- 58、（A1 型题）复发性口腔溃疡很少见于
- A.唇
B.颊
C.舌腹、舌缘
D.硬腭
E.软腭、悬雍垂
- 59、（A1 型题）不会发生恶变的有
- A.白斑
B.扁平苔藓
C.慢性盘状红斑狼疮
D.口腔红斑
E.复发性阿弗他溃疡
- 60、（A1 型题）人类口腔念珠菌病的主要致病菌是
- A.热带念珠菌
B.假热带念珠菌
C.白色念珠菌
D.克柔念珠菌
E.近平滑念珠菌
- 61、（A1 型题）急性坏死性龈口炎的临床特征是
- A.牙龈红肿、牙松动、牙周流脓
B.牙龈乳头呈刀削状缺损，疼痛出血，腐败性口臭
C.牙龈黏膜广泛小疱
D.牙龈黏膜出现乳白、微凸小点或斑块
E.牙龈黏膜白色丘疹连成线条或网状
- 62、（A1 型题）慢性盘状红斑狼疮是
- A.感染性疾病
B.黏膜的特异性慢性炎症
C.结缔组织病
D.变态反应性疾病

E.免疫缺陷病

- 63、（A1 型题）口腔黏膜白斑临床上可有下列表现，除了
- A.白色或灰白色的均质斑块或呈皱纸状斑块
 - B.白色不规则隆起伴有乳头状突起
 - C.呈颗粒状红白间杂病损
 - D.在白色斑块的基础上有溃疡形成
 - E.白色凝乳状假膜
- 64、（A1 型题）关于白斑的临床分型下列哪项说法是错误的
- A.分为均质型和非均质型
 - B.非均质型分为疣状型、颗粒型和溃疡型
 - C.均质型表现为均质斑块或表面有皱褶
 - D.疣状型属于非均质型
 - E.非均质型包括疣状型、颗粒型和萎缩型
- 65、（A1 型题）与扁平苔藓发病因素无关的是
- A.神经精神因素
 - B.病毒感染
 - C.过度吸烟饮酒
 - D.免疫学因素
 - E.可能的遗传因素
- 66、（A1 型题）下列疾病中哪个属于自身免疫性疾病
- A.白色念珠菌病
 - B.多形性红斑
 - C.天疱疮
 - D.艾滋病
 - E.单纯疱疹
- 67、（A2 型题）患者，女，28 岁。上颌中切牙近中邻面见色素沉积，表面粗糙，叩诊(-)，探诊(-)，冷(-)，未探及明显龋洞。最可能的诊断是
- A.浅龋
 - B.中龋
 - C.深龋
 - D.静止龋
 - E.继发龋
- 68、（A2 型题）患者，女，20 岁，左下第一磨牙面龋洞，达牙本质浅层，探稍敏感，冷刺激进洞后稍敏感。该患牙的诊断可能为
- A.浅龋
 - B.中龋
 - C.深龋
 - D.可复性牙髓炎

E.慢性牙髓炎

69、（A2型题）患者，男，22岁，左上第二磨牙面龋洞，深达牙本质深层，叩诊(-)，冷刺激龋洞后疼痛剧烈，去除刺激疼痛立即消失，热测同对照牙。该牙诊断可能为

- A.中龋
- B.深龋
- C.可复性牙髓炎
- D.慢性牙髓炎
- E.急性牙髓炎

70、（A2型题）患者，女，17岁，发现右下后牙有洞2年，近2周出现冷热酸甜刺激痛，无自发痛史。临床检查：右下第一磨牙深龋近髓，探诊敏感，冷测试同对照牙，备洞时患者敏感，软龋不能去净。下述处理方法最合理的是

- A.安抚—垫底充填
- B.直接垫底充填
- C.安抚—间接盖髓—垫底充填
- D.间接盖髓—去净软龋、间接盖髓—垫底充填
- E.间接盖髓—垫底充填

71、（A2型题）患者左上第一磨牙缺失，左上第二磨牙近中颈部龋洞，诊断为中龋，其制备的洞形为

- A.邻面的单面洞
- B.邻面洞
- C.邻邻面洞
- D.邻舌面洞
- E.邻颊面洞

72、（A2型题）患者，女，23岁，因全口牙自幼呈黄色，并随年龄加重为深灰色，要求治疗。查：全口牙呈黄至深灰色，由后至前逐渐加重，表面无实质缺损。问诊应重点采集的信息是

- A.幼时居住地
- B.母亲妊娠期间用药史
- C.是否为早产儿
- D.幼时患病用药史
- E.幼时患病史

73、（A2型题）患者，女，26岁，要求上前牙美容修复。临床检查：上下前牙均有程度不同的黄褐色斑块，部分患牙有釉质缺损，质硬。最佳的治疗方案为

- A.牙齿漂白
- B.牙髓治疗后桩冠修复
- C.树脂贴面修复
- D.磨除着色部分
- E.超声波洁治

74、(A2型题)男,20岁,右上2舌侧窝呈囊状深陷,变黑发软,叩痛(-),冷热诊无异常,未穿髓,其诊断和处理是

- A.舌面点隙龋,充填治疗
- B.畸形舌侧窝,预防性填充
- C.牙中牙,间接盖髓
- D.畸形舌侧窝伴深龋,间接盖髓
- E.畸形舌侧窝伴慢性牙髓炎

75、(A2型题)某男性患者,24岁,主诉:近1年来刷牙牙龈有时出血,不伴疼痛。检查:全口PD:2~3mm,未及釉牙骨质界。此患者最可能的诊断是

- A.急性龈乳头炎
- B.青春期龈炎
- C.慢性龈炎
- D.慢性牙周炎
- E.急性坏死性溃疡性龈炎

76、(A2型题)某女性患者,17岁,上前牙刷牙时牙龈易出血,经检查上前牙牙面有较多菌斑堆积,唇侧牙龈肿胀,色暗红,质地松软,诊断为慢性龈炎。关于此患者,以下说法不正确的是

- A.治疗后可消除牙龈炎症,但会遗留附着丧失
- B.患者自行控制菌斑对疾病的治疗意义重大
- C.治疗后牙龈形态仍不恢复者可行手术治疗
- D.定期复查和维护才能保持疗效
- E.此疾病可以预防,也容易复发

77、(A2型题)患者,女,45岁。右下后牙颊侧牙龈肿胀、疼痛3天。检查:右下第一、二磨牙间颊侧牙龈呈卵圆形膨隆,有波动感,右下第一磨牙松动I度,诊断为急性牙周脓肿。若与牙槽脓肿鉴别诊断,不必要的一项检查是

- A.牙髓活力
- B.牙周袋的存在
- C.X线片
- D.是否有龈下牙石
- E.叩痛程度

78、(A2型题)某男性患者,24岁,主诉:近1年来刷牙及咬苹果时牙龈出血,检查:全口PD:2~3mm,如果此病人诊断为慢性龈炎,应符合下列哪一项体征

- A.PD<3mm
- B.无创伤
- C.无附着丧失
- D.炎症只累及边缘龈
- E.牙龈有实质性增生

79、(A2型题)某女性患者,28岁,右上后牙突然自发痛1天,否认咬硬物史。临床检查:未见龋及深牙周袋,X线:牙体未见异常。如果诊断为急性龈乳头炎,口腔检查最可能的发

现是

- A. 龈裂
- B. 牙齿中度磨耗
- C. 牙龈乳头出现坏死
- D. 牙间乳头红肿
- E. 龈缘出现溃疡

80、（A2 型题）某男性患者，16 岁，主诉：刷牙牙龈出血 3 个月余，伴牙龈肿胀。检查：上前牙牙龈边缘及牙龈乳头充血、发亮、呈鲜红色，肿胀明显，龈乳头呈球状突起，仅龈缘有少量菌斑堆积，上唇稍短。试分析造成此患者牙龈炎症较重的原因，除外配套名师课程

- A. 菌斑
- B. 口呼吸
- C. 舔唇习惯
- D. 开唇露齿
- E. 激素水平

81、（A2 型题）患者，男，25 岁。口腔内上下前牙龈乳头消失，并凹陷，呈反波浪形。龈牙间乳头颊舌侧分离。可从牙面翻开，下方有牙石牙垢，血象正常，无坏死。可能的原因是

- A. 疱疹性龈炎
- B. 中性粒细胞缺乏引起龈坏死
- C. 慢性龈缘炎
- D. 慢性坏死性龈炎
- E. 龈乳头炎

82、（A2 型题）患者，男性，38 岁，左上第一磨牙牙髓坏死，初诊拔髓后第 2 日出现左侧面部肿胀，患牙浮出感，剧烈疼痛，不敢咬合。可能的原因是

- A. 血源感染
- B. 器械超出根尖孔，引起急性创伤
- C. 坏死物质推出根尖孔
- D. 药物刺激过强
- E. 免疫反应

83、（A2 型题）患儿，5 岁。上颌前牙冷热痛 1 周，无自发痛及夜间痛史。查：1 近中舌面中龋，探敏感，叩诊(-)，无穿髓点。充填治疗宜选用的材料是

- A. 银汞合金
- B. 玻璃离子水门汀
- C. 复合树脂
- D. 磷酸锌水门汀
- E. 氧化锌丁香油糊剂

84、（A2 型题）患儿，女，2 岁。上前牙近中邻面有表浅龋坏，患儿家长向医生咨询防蛀牙方法。医生的建议中不妥当的是

- A. 家长把纱布套于食指，帮患儿清洁牙齿
- B. 用清水擦洗牙面

- C.选用短刷毛的小牙刷
- D.用含氟牙膏刷牙
- E.涂氟

85、（A2 型题）患儿，8 岁。跌倒致 1 牙冠斜折，即刻来院就诊。口腔检查见穿髓孔大，叩(+)。首选治疗为

- A.活髓切断术
- B.根尖诱导成形术
- C.干髓术
- D.直接盖髓术
- E.根管治疗术

86、（A2 型题）女，50 岁，近口角处颊黏膜白色斑块近 1 年，不能擦去。组织学见上皮增生。内有中性粒细胞浸润和散在微脓肿，角化层有垂直于上皮的 PAS 阳性菌丝，结缔组织内慢性炎细胞浸润。最可能的病理诊断是

- A.白斑
- B.红斑
- C.口腔结核
- D.念珠菌病
- E.慢性盘状红斑狼疮

87、（A2 型题）患儿 1 岁，男。3 天前发热 38.5℃，热退后出现口腔溃疡，哭闹，拒食，流涎。检查见口腔黏膜片状充血，有数十个溃疡，有的互相融合，疱破溃后形成痂壳。最可能的诊断是

- A.球菌性口炎
- B.疱疹性口炎
- C.雪口病
- D.疱疹样口炎
- E.手-足-口病

88、（A2 型题）男性患者，39 岁。口内多处溃疡，疼痛不能进食。检查见唇颊及舌缘黏膜有小米粒的溃疡十余个，散在分布，周围黏膜广泛充血红肿。以往曾有多次类似病史发作。该患者应诊断为

- A.天疱疮
- B.疱疹性龈口炎
- C.白塞病
- D.带状疱疹
- E.疱疹样口疮

89、（A3/A4 型题）女，20 岁。2 周来右上后牙遇冷热过敏。检查发现右上 6 深龋，探之未穿髓，病变组织颜色较浅，质地湿软，易剔除。这种龋齿称为

- A.急性龋
- B.慢性龋
- C.静止龋

- D.继发龋
- E.干性龋

90、（A3/A4 型题）女，20 岁。2 周来右上后牙遇冷热过敏。检查发现右上 6 深龋，探之未穿髓，病变组织颜色较浅，质地湿软，易剔除。作诊断时应与之鉴别的主要疾病是

- A.慢性闭锁性牙髓炎
- B.慢性溃疡性牙髓炎
- C.牙本质过敏
- D.急性牙髓炎
- E.牙隐裂

91、（A3/A4 型题）女，20 岁。2 周来右上后牙遇冷热过敏。检查发现右上 6 深龋，探之未穿髓，病变组织颜色较浅，质地湿软，易剔除。在做鉴别诊断时。比较有价值的检查方法是

- A.X 线检查
- B.冷热诊
- C.探诊
- D.咬诊
- E.叩诊

92、（A3/A4 型题）男，20 岁，下颌第一恒磨牙颊沟浅龋坏，如对龋坏物质进行细菌培养。其中主要的致龋菌可能为

- A.韦永菌
- B.轻链球菌
- C.奈瑟菌
- D.变形链球菌
- E.乳酸杆菌

93、（A3/A4 型题）男，20 岁，下颌第一恒磨牙颊沟浅龋坏，如对龋坏物质进行细菌培养。如此人的龋病未治疗，发展为深龋，再次对龋坏物质进行细菌培养，发现有一种致龋菌的数量大量增加。该细菌可能是

- A.韦永菌
- B.轻链球菌
- C.奈瑟菌
- D.变形链球菌
- E.乳酸杆菌

94、（A3/A4 型题）患者，男，15 岁，左下颌后牙自发痛、夜间痛 1 天。口腔检查：左下第二前磨牙牙冠完整，无明显龋损，牙面可见黑色圆点，温度刺激试验无反应，叩诊(++)，牙周无明显异常。为明确诊断和制定正确的治疗计划还应做的辅助检查是

- A.牙髓活力电测试
- B.咬诊
- C.染色检查
- D.细菌培养
- E.X 线片

95、（A3/A4 型题）患者，男，15 岁，左下颌后牙自发痛、夜间痛 1 天。口腔检查：左下第二前磨牙牙冠完整，无明显龋损，牙面可见黑色圆点，温度刺激试验无反应，叩诊(++)，牙周无明显异常。该患牙可诊断为

- A. 静止龋
- B. 牙隐裂
- C. 畸形中央尖
- D. 釉质发育不全
- E. 磨损

96、（A3/A4 型题）患者，男，15 岁，左下颌后牙自发痛、夜间痛 1 天。口腔检查：左下第二前磨牙牙冠完整，无明显龋损，牙面可见黑色圆点，温度刺激试验无反应，叩诊(++)，牙周无明显异常。X 线片检查可能的结果为

- A. 根尖无明显异常
- B. 根尖牙骨质增生
- C. 根尖与牙槽窝间隙明显增宽
- D. 根尖囊肿
- E. 根尖孔呈喇叭口状

97、（A3/A4 型题）男，60 岁。一年来右侧上后牙痛，疼痛多在傍晚发生，并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查 65 龋深，叩痛(+)，扪痛(-)。为明确诊断必须做的检查是

- A. 牙髓电活力测验
- B. 牙髓温度测验
- C. 耳鼻喉科会诊
- D. X 线片检查
- E. 松动度检查

98、（A3/A4 型题）男，60 岁。一年来右侧上后牙痛，疼痛多在傍晚发生，并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查 65 龋深，叩痛(+)，扪痛(-)。该患者主诉疾病最可能是

- A. 深龋
- B. 慢性鼻窦炎
- C. 急性牙髓炎
- D. 慢性牙髓炎
- E. 可复性牙髓炎

99、（A3/A4 型题）男，60 岁。一年来右侧上后牙痛，疼痛多在傍晚发生，并涉及右眶下部和颞部。患者数年前曾有头痛及流涕史。查 65 龋深，叩痛(+)，扪痛(-)。治疗设计中最重要的是

- A. 垫底充填
- B. 根管治疗
- C. 盖髓治疗
- D. 拔除残根

E.耳鼻喉科就诊

100、（A3/A4 型题）女，50 岁。牙龈增生影响咀嚼 1 年。检查见全口牙龈肥大增生，覆盖牙面约 1/2，结节状。探诊时有出血，个别牙龈增生严重处牙齿有移位。为了有助于诊断，最应注意询问的病史为

- A. 月经状况
- B. 子女情况
- C. 饮食状况
- D. 服药史
- E. 流行病学史

101、（A3/A4 型题）女，50 岁。牙龈增生影响咀嚼 1 年。检查见全口牙龈肥大增生，覆盖牙面约 1/2，结节状。探诊时有出血，个别牙龈增生严重处牙齿有移位。如果该患者进行过肾移植手术，并在一年中一直接受治疗，则最可能的诊断是

- A. 药物性牙龈增生
- B. 牙龈纤维瘤病
- C. 坏死性龈炎
- D. 快速进展性牙周炎
- E. 白血病的牙龈病损

102、（A3/A4 型题）女，50 岁。牙龈增生影响咀嚼 1 年。检查见全口牙龈肥大增生，覆盖牙面约 1/2，结节状。探诊时有出血，个别牙龈增生严重处牙齿有移位。导致该病的主要原因是

- A. 免疫抑制剂环孢素
- B. 遗传因素
- C. 螺旋体
- D. 白细胞大量浸润
- E. 血压过高

103、（A3/A4 型题）男性，45 岁，主诉刷牙时牙龈出血，口腔有异味，双侧后牙及下前牙轻度松动，伴有咬合痛。主要应该进行的检查是

- A. 邻面龋+叩诊
- B. 食物嵌塞
- C. 冷热刺激反应
- D. 早接触+牙齿松动度
- E. 牙周袋探诊+X 线牙片

104、（A3/A4 型题）男性，45 岁，主诉刷牙时牙龈出血，口腔有异味，双侧后牙及下前牙轻度松动，伴有咬合痛。如果拟诊为成人型牙周炎，主要致病菌是

- A. 伴放线放线杆菌
- B. 牙龈类杆菌
- C. 乳酸杆菌
- D. 变形链球菌
- E. 嗜二氧化碳噬纤维菌

105、（A3/A4 型题）男性，45 岁，主诉刷牙时牙龈出血，口腔有异味，双侧后牙及下前牙轻度松动，伴有咬合痛。晚期可能出现的伴发症状

- A. 中度深度牙周袋
- B. 重度牙龈炎症
- C. 急性牙周脓肿
- D. 牙槽骨水平吸收
- E. 牙齿松动咬合痛

106、（A3/A4 型题）男性，45 岁，主诉刷牙时牙龈出血，口腔有异味，双侧后牙及下前牙轻度松动，伴有咬合痛。治疗的基本原则

- A. 控制菌斑+彻底清除牙石
- B. 控制菌斑+拔除松动牙
- C. 松牙固定术
- D. 牙周袋及根面药物处理
- E. 牙周外科手术+全身治疗

107、（A3/A4 型题）女，7 岁。食冷饮时左后牙感到酸痛 2 周，无自发痛史，检查发现 6 颊面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩诊(-)。根据上述临床表现和检查结果，拟诊断为

- A. 慢性根尖周炎
- B. 急性牙髓炎
- C. 急性龋
- D. 慢性龋
- E. 慢性闭锁性牙髓炎

108、（A3/A4 型题）女，7 岁。食冷饮时左后牙感到酸痛 2 周，无自发痛史，检查发现 6 颊面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩诊(-)。治疗方案应考虑为

- A. 间接盖髓术
- B. 活髓切断术
- C. 干髓术
- D. 根管治疗术
- E. 活髓摘除术

109、（A3/A4 型题）女，7 岁。食冷饮时左后牙感到酸痛 2 周，无自发痛史，检查发现 6 颊面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩诊(-)。首次就诊时，对该患牙应做的处理为

- A. 双层垫底即刻充填
- B. 置放失活剂
- C. 氧化锌丁香油糊剂暂封
- D. 活髓切断
- E. 局麻下活髓摘除

110、（A3/A4 型题）女，7 岁。食冷饮时左后牙感到酸痛 2 周，无自发痛史，检查发现 6 颊面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩诊(-)。若充填后远期出现激发痛和自发痛。多由于

- A. 充填物有早接触
- B. 充填物不密合
- C. 继发龋伴发牙髓炎
- D. 充填物形成悬突
- E. 未恢复接触点

111、（A3/A4 型题）患儿，男，1 岁。发病 2 日，起初低热乏力，流涎、拒食。今起口腔黏膜广泛充血且有成簇小水疱及小溃疡，很快形成大面积糜烂。患儿疼痛、哭闹，检查可见病损集中在口腔前部，未累及牙龈。拟诊断为

- A. 复发性口疮
- B. 原发性疱疹性口炎
- C. 多形红斑
- D. 手-足-口病
- E. 带状疱疹

112、（A3/A4 型题）患儿，男，1 岁。发病 2 日，起初低热乏力，流涎、拒食。今起口腔黏膜广泛充血且有成簇小水疱及小溃疡，很快形成大面积糜烂。患儿疼痛、哭闹，检查可见病损集中在口腔前部，未累及牙龈。临床症状分期不包括

- A. 前驱期
- B. 充血期
- C. 水疱期
- D. 糜烂期
- E. 愈合期

113、（A3/A4 型题）患儿，男，1 岁。发病 2 日，起初低热乏力，流涎、拒食。今起口腔黏膜广泛充血且有成簇小水疱及小溃疡，很快形成大面积糜烂。患儿疼痛、哭闹，检查可见病损集中在口腔前部，未累及牙龈。病因为

- A. 真菌感染
- B. HSV II 感染
- C. 柯萨奇 A4 型病毒
- D. HSV I 感染
- E. 柯萨奇 A16 型病毒

114、（A3/A4 型题）患儿，男，1 岁。发病 2 日，起初低热乏力，流涎、拒食。今起口腔黏膜广泛充血且有成簇小水疱及小溃疡，很快形成大面积糜烂。患儿疼痛、哭闹，检查可见病损集中在口腔前部，未累及牙龈。不适当的治疗方法是

- A. 阿昔洛韦
- B. 聚肌胞
- C. 转移因子
- D. 漱口液
- E. 泼尼松

115、（A3/A4 型题）女性患者，43 岁。自觉左颊黏膜粗糙 1 个月，有时伴刺激痛。临床检查见双颊黏膜有网状白色条纹，左颊有黏膜充血。以下哪项对诊断最为重要

- A.直接免疫荧光检查
- B.组织病理检查
- C.脱落细胞涂片检查
- D.病损组织细胞培养
- E.病损组织甲苯胺蓝染色

116、（A3/A4 型题）女性患者，43 岁。自觉左颊黏膜粗糙 1 个月，有时伴刺激痛。临床检查见双颊黏膜有网状白色条纹，左颊有黏膜充血。下列哪项不是患者所患疾病的组织病理表现

- A.胶原纤维变性
- B.出现胶样小体
- C.上皮不全角化
- D.基底细胞液化变化
- E.固有层结缔组织中有密集的淋巴细胞浸润带

117、（A3/A4 型题）女性患者，43 岁。自觉左颊黏膜粗糙 1 个月，有时伴刺激痛。临床检查见双颊黏膜有网状白色条纹，左颊有黏膜充血。与患者所患疾病发病因素无关的是

- A.心理因素
- B.感染因素
- C.创伤因素
- D.免疫因素
- E.遗传因素

118、（B1 型题）主要发生于上前牙唇面新生线处

- A.猛性龋
- B.静止龋
- C.继发龋
- D.潜行性龋
- E.线形牙釉质龋

119、（B1 型题）常见于颌面和颈部接受放射治疗的患者，也称为放射性龋

- A.猛性龋
- B.静止龋
- C.继发龋
- D.潜行性龋
- E.线形牙釉质龋

120、（B1 型题）窝沟龋呈锥形，底部朝牙本质，尖向牙釉质表面，病变早期牙釉质表面无明显破坏

- A.猛性龋
- B.静止龋

- C.继发龋
- D.潜行性龋
- E.线形牙釉质龋

121、（B1 型题）由于病变环境发生改变，龋病不再继续发展，损害仍保持原样

- A.猛性龋
- B.静止龋
- C.继发龋
- D.潜行性龋
- E.线形牙釉质龋

122、（B1 型题）龋病治疗后，充填物边缘牙体组织破裂，产生龋病

- A.猛性龋
- B.静止龋
- C.继发龋
- D.潜行性龋
- E.线形牙釉质龋

123、（B1 型题）前牙邻面白垩色或黄褐色，探诊有粗糙感

- A.四环素牙
- B.氟牙症
- C.釉质发育不全
- D.浅龋
- E.遗传性乳光牙本质根据下列临床表现，可诊断为

124、（B1 型题）全口牙釉质呈现灰黄色，表面光滑，前牙着色重于后牙

- A.四环素牙
- B.氟牙症
- C.釉质发育不全
- D.浅龋
- E.遗传性乳光牙本质根据下列临床表现，可诊断为

125、（B1 型题）同一时期发育的牙面上，云雾状白垩色或黄褐色斑块

- A.四环素牙
- B.氟牙症
- C.釉质发育不全
- D.浅龋
- E.遗传性乳光牙本质根据下列临床表现，可诊断为

126、（B1 型题）釉质表面呈白垩色，并出现带状凹陷

- A.四环素牙
- B.氟牙症
- C.釉质发育不全
- D.浅龋

E.遗传性乳光牙本质根据下列临床表现，可诊断为

127、（B1 型题）侵袭性牙周炎

- A.变形链球菌
- B.伴放线放线杆菌
- C.牙龈类杆菌
- D.中间普氏菌
- E.梭形杆菌、螺旋体与下列牙周疾病相关的致病菌是

128、（B1 型题）妊娠期龈炎

- A.变形链球菌
- B.伴放线放线杆菌
- C.牙龈类杆菌
- D.中间普氏菌
- E.梭形杆菌、螺旋体与下列牙周疾病相关的致病菌是

129、（B1 型题）急性坏死性溃疡性龈炎

- A.变形链球菌
- B.伴放线放线杆菌
- C.牙龈类杆菌
- D.中间普氏菌
- E.梭形杆菌、螺旋体与下列牙周疾病相关的致病菌是

130、（B1 型题）牙龈纤维瘤病

- A.牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 $1/3$ ，很少波及附着龈
- B.牙龈增生覆盖牙冠的 $1/3$ 左右，一般不超过 $2/3$ ，严重者可波及附着龈
- C.牙龈增生常覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，很少波及附着龈
- D.牙龈增生覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，常波及附着龈
- E.牙龈形态基本正常下列疾病牙龈增生的情况为

131、（B1 型题）药物性牙龈增生

- A.牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 $1/3$ ，很少波及附着龈
- B.牙龈增生覆盖牙冠的 $1/3$ 左右，一般不超过 $2/3$ ，严重者可波及附着龈
- C.牙龈增生常覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，很少波及附着龈
- D.牙龈增生覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，常波及附着龈
- E.牙龈形态基本正常下列疾病牙龈增生的情况为

132、（B1 型题）慢性龈炎

- A.牙龈增生覆盖牙冠一般不超过 $1/3$ ，很少波及附着龈
- B.牙龈增生覆盖牙冠的 $1/3$ 左右，一般不超过 $2/3$ ，严重者可波及附着龈
- C.牙龈增生常覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，很少波及附着龈
- D.牙龈增生覆盖牙冠的 $2/3$ 以上，常波及附着龈
- E.牙龈形态基本正常下列疾病牙龈增生的情况为

- 133、（B1 型题）常发生于上颌乳前牙的唇面，较快发展成广泛性龋
- A. 奶瓶龋
 - B. 环状龋
 - C. 猖獗性龋
 - D. 停止性龋
 - E. 急性龋
- 134、（B1 型题）包括涉及下前牙在内的绝大多数牙齿的快速、广泛的龋蚀
- A. 奶瓶龋
 - B. 环状龋
 - C. 猖獗性龋
 - D. 停止性龋
 - E. 急性龋
- 135、（B1 型题）儿童患牙用金属砷
- A. 24~48 小时
 - B. 2~5 天
 - C. 5~7 天
 - D. 7~10 天
 - E. 20~40 分临床用下列失活剂封药的时间是
- 136、（B1 型题）成人患牙用三氧化二砷
- A. 24~48 小时
 - B. 2~5 天
 - C. 5~7 天
 - D. 7~10 天
 - E. 20~40 分临床用下列失活剂封药的时间是
- 137、（B1 型题）多聚甲醛
- A. 24~48 小时
 - B. 2~5 天
 - C. 5~7 天
 - D. 7~10 天
 - E. 20~40 分临床用下列失活剂封药的时间是
- 138、（B1 型题）属于感染性疾病的是
- A. 天疱疮
 - B. 多形渗出性红斑
 - C. 带状疱疹
 - D. 口腔白斑病
 - E. 口腔红斑
- 139、（B1 型题）属于变态反应性疾病的是
- A. 天疱疮

- B.多形渗出性红斑
C.带状疱疹
D.口腔白斑病
E.口腔红斑
- 140、（B1 型题）属于自身免疫性疾病的是
A.天疱疮
B.多形渗出性红斑
C.带状疱疹
D.口腔白斑病
E.口腔红斑
- 141、（B1 型题）腺周口疮的溃疡特点为
A.溃疡孤立存在，表面微凹，少量黄色渗出，周缘充血
B.溃疡深达黏膜下，边缘高起，咽部及口角可见瘢痕
C.溃疡与刺激物相邻，周缘白色水肿及角化
D.溃疡较深，边缘不整，基底有浸润
E.溃疡浅表，基底暗红色桑葚样肉芽肿，边缘鼠啮状
- 142、（B1 型题）轻型口疮的溃疡特点为
A.溃疡孤立存在，表面微凹，少量黄色渗出，周缘充血
B.溃疡深达黏膜下，边缘高起，咽部及口角可见瘢痕
C.溃疡与刺激物相邻，周缘白色水肿及角化
D.溃疡较深，边缘不整，基底有浸润
E.溃疡浅表，基底暗红色桑葚样肉芽肿，边缘鼠啮状
- 143、（B1 型题）结核性口腔溃疡的溃疡特点为
A.溃疡孤立存在，表面微凹，少量黄色渗出，周缘充血
B.溃疡深达黏膜下，边缘高起，咽部及口角可见瘢痕
C.溃疡与刺激物相邻，周缘白色水肿及角化
D.溃疡较深，边缘不整，基底有浸润
E.溃疡浅表，基底暗红色桑葚样肉芽肿，边缘鼠啮状
- 144、（B1 型题）褥疮性溃疡的溃疡特点为
A.溃疡孤立存在，表面微凹，少量黄色渗出，周缘充血
B.溃疡深达黏膜下，边缘高起，咽部及口角可见瘢痕
C.溃疡与刺激物相邻，周缘白色水肿及角化
D.溃疡较深，边缘不整，基底有浸润
E.溃疡浅表，基底暗红色桑葚样肉芽肿，边缘鼠啮状
- 145、（B1 型题）扁平苔藓的好发部位为
A.牙龈
B.颊黏膜
C.上腭

- D.舌背
- E.下唇唇红

146、（B1 型题）类天疱疮的好发部位为

- A.牙龈
- B.颊黏膜
- C.上腭
- D.舌背
- E.下唇唇红

147、（B1 型题）盘状红斑狼疮的好发部位为

- A.牙龈
- B.颊黏膜
- C.上腭
- D.舌背
- E.下唇唇红

148、（B1 型题）慢性唇炎的病因

- A.内分泌失调
- B.舔唇不良习惯
- C.感冒
- D.残根残冠刺激
- E.消化不良

149、（B1 型题）创伤性溃疡的病因

- A.内分泌失调
- B.舔唇不良习惯
- C.感冒
- D.残根残冠刺激
- E.消化不良

150、（B1 型题）扁平苔藓的病因

- A.内分泌失调
- B.舔唇不良习惯
- C.感冒
- D.残根残冠刺激
- E.消化不良

答案

1、正确答案：A

答案解析：髓腔内有金属充填物，根管内有脓血液，根尖尚未形成，根管有穿孔。以上几种情况会使根管长度电测法在下列情况下易发生误差。

2、正确答案：C

答案解析：根管冲洗目的：消毒灭菌，溶解坏死组织，润滑根管，使根管壁牙本质软化。

3、正确答案：A

答案解析：近六个月内患有心肌梗死的患者可能无法耐受牙髓治疗的过程，故暂不适合做牙髓治疗。

4、正确答案：E

答案解析：应将盖髓剂直接盖在暴露的牙髓上。

5、正确答案：C

答案解析：龋病定义：在以细菌为主的多种因素的影响下，牙齿硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病。

6、正确答案：B

答案解析：中龋：龋洞形成，患者对酸甜饮食敏感，过冷过热饮食造成酸痛感，冷刺激较显著，但刺激去除后疼痛立即消失

7、正确答案：A

答案解析：下颌第一磨牙各表面患龋病的顺序为咬合面、颊面、近中面、远中面和舌面；上颌第一磨牙依此为咬合面、近中面、腭面、颊面和远中面；对于上颌侧切牙，舌面较唇面更易患龋。这些差别的形成部分由于形态学的原因所致，如下颌磨牙颊沟、上颌第一磨牙腭沟和上颌侧切牙舌窝形成的滞留区易患龋。

8、正确答案：D

答案解析：釉质发育不全是牙发育过程中，成釉器的某一部分受到损害所致，可造成釉质表面不同程度的实质性缺陷，釉质发育不全时也有变黄或变褐的情况，但探诊时损害局部硬而光滑，病变呈对称性，这些特征均有别于浅龋。

9、正确答案：C

答案解析：因粘结修复的材料与牙体组织有化学粘接力，故在洞型制备时可不作预防性扩展，在不受咬合力处可适当保留无基釉。

10、正确答案：B

答案解析：对于意外穿髓，穿髓孔直径

11、正确答案：A

答案解析：牙本质龋发展过程中，由病损深部向表面分为四层结构，分别为：透明层，脱矿层，细菌侵入层和坏死崩解层。所以临近正常牙本质的是透明层。

12、正确答案：E

答案解析：牙菌斑成熟，细菌数量、种类稳定需要的时间范围是：5~7 天。

13、正确答案：C

答案解析：牙颈部釉质与牙本质较面较薄，故中龋时更易敏感。

14、正确答案：C

答案解析：窝沟龋早期表现为龋损部位色泽变黑，进一步仔细观察可发现黑色素沉着区下方为龋白斑，呈白垩色改变。

15、正确答案：A

答案解析：早萌多见于下颌乳切牙。

16、正确答案：B

答案解析：两个牙根发育完全以后发生粘连的牙称为结合牙。

17、正确答案：D

答案解析：额外牙最多见的是正中牙，位于上颌两中切牙之间。

18、正确答案：B

答案解析：牙内陷多发生于上颌侧切牙。

19、正确答案：A

答案解析：外伤性根折多见于根尖 1/3，折裂线与牙长轴垂直或有一定斜度。外伤性纵折很少见。

20、正确答案：A

答案解析：牙震荡是指牙周膜轻度损伤，不伴牙体缺损。

21、正确答案：E

答案解析：无

22、正确答案：C

答案解析：咬诊主要用于检查牙隐裂。

23、正确答案：B

答案解析：补牙材料常见的有银汞合金、玻璃离子以及复合树脂。银汞合金因为颜色不美观，现在临床上已经逐渐被淘汰掉，而玻璃离子的硬度比较低，也不适合用于补楔状缺损。楔状缺损好发于中年以上的患者的前磨牙，主要发生在牙齿的唇、颊侧，缺损程度由浅到深，可出现不同的并发症。随着缺损深度增加，形成龋洞之后，要尽早的做充填治疗，充填的材料就是复合树脂。

24、正确答案：B

答案解析：牙隐裂好发于上颌磨牙，而上颌第一磨牙明显多于上颌第二磨牙。

25、正确答案：A

答案解析：严重面磨损可导致颌间垂直距离过短，引起关节损伤。

26、正确答案：D

答案解析：附着水平是指釉牙骨质界至袋底的距离，因此 D 正确。

27、正确答案：C

答案解析：用有刻度的牙周探针探测牙周袋时应注意：支点要稳、探测方量恰当、探测位置和角度恰当、按顺序探测，因此 A、B、D、E 均正确。备选答案中只有 C 探测角度要垂直是错误的，因为探入时，探针应与牙体长轴平行，探针要紧贴牙面。所以此题应选 C。

28、正确答案：A

答案解析：龈上菌斑中的优势细菌为毒力较弱的革兰阳性需氧菌和兼性菌。

29、正确答案：C

答案解析：附着性龈下菌斑中的优势细菌为革兰阳性兼性菌和厌氧菌。

30、正确答案：B

答案解析：引起牙齿松动的原因包括：牙槽骨吸收、创伤、牙周膜急性炎症、牙周翻瓣手术后及女性激素水平变化，因此 A、C、D、E 均正确。但牙周袋深部刮治，不会引起牙松动。

31、正确答案：E

答案解析：因为牙周膜没有缓冲扭力和旋转力的纤维，因此这两种力对牙周组织损伤最大。

32、正确答案：C

答案解析：非附着性龈下菌斑附着于龈沟上皮、结合上皮或直接侵入上皮下结缔组织内，优势菌为革兰阴性厌氧菌和能动菌，故选 C。

33、正确答案：A

答案解析：骨上袋为牙周袋底在牙槽嵴顶的上方，牙槽嵴为水平型吸收，高度明显降低导致了骨上袋的形成，故选 A。

34、正确答案：B

答案解析：牙周炎会交替出现静止和破坏，且前者较长。

35、正确答案：B

答案解析：白细胞毒素是伴放线聚集杆菌(Aa)产生的外毒素，属膜损伤毒素，具有溶血性，造成牙周组织破坏。

36、正确答案：D

答案解析：骨下袋的袋底位于牙槽嵴顶的根方，袋壁软组织位于牙根面和牙槽骨之间，即牙槽骨构成了牙周袋壁的一部分，牙槽骨一般呈垂直吸收，所以 D 正确。

37、正确答案：A

答案解析：牙周炎时 X 线片上牙槽骨吸收的最主要表现是牙槽骨高度降低。

38、正确答案：B

答案解析：牙周疾病的局部促进因素包括牙石、解剖因素、错畸形、不良修复体或填充体(银汞悬突、边缘不密合的全冠)、咬合创伤和食物嵌塞等，而深窝沟主要是使龋病易于发生而不会造成牙龈炎症和牙周破坏，所以 B 正确。

39、正确答案：E

答案解析：急性坏死性龈炎以龈乳头和龈缘的坏死为其特发性损害，尤以下前牙多见。

40、正确答案：C

答案解析：无

41、正确答案：A

答案解析：与急性坏死性溃疡性龈炎关系最密切的细菌为梭形杆菌、螺旋体与中间普氏菌。

42、正确答案：E

答案解析：引起药物性牙龈增生的药物主要有苯妥英钠、环孢素、硝苯地平。因此 E 正确。

43、正确答案：C

答案解析：第一磨牙萌出时间 6~7 岁。中切牙萌出时间：7~8 岁。侧切牙萌出时间：8~9 岁。前磨牙萌出时间 10~12 岁。尖牙萌出时间 11~12 岁。第三磨牙萌出时间 17~21 岁。

44、正确答案：A

答案解析：上下第一磨牙的中性关系：上颌第一磨牙的近颊尖正对着下颌第一磨牙的颊面沟，下颌磨牙的近颊尖正对着上颌第一磨牙与第二前磨牙之间的楔状隙。

45、正确答案：B

答案解析：该题考查的知识点是年轻恒牙龋病的治疗特点。第一恒磨牙是龋齿最好发牙齿，因龋损破坏严重需拔牙的最佳时间是 8~9 岁。因为这个时期第二恒磨牙尚未萌出，牙冠虽已形成而牙根尚未形成，牙胚位于第一恒磨牙颈线以下，是拔除龋损破坏严重的第一恒磨牙，让第二恒磨牙移位替代第一恒磨牙的最佳时机。过早地拔除第一恒磨牙，对颌的第一恒磨牙可能在第二恒磨牙未移位之前出现过长而阻碍第二恒磨牙的移位，而且 X 线片检查时尚不能见到第三恒磨牙的牙胚影像；过晚则因第二恒磨牙牙根已大部形成而不易移位替代第一恒磨牙。在临床上应拍摄 X 线片检查第二恒磨牙

46、正确答案：C

答案解析：无

47、正确答案：E

答案解析：由于年轻恒牙牙髓和根尖周组织疏松，血液丰富，一旦发生炎症感染易于扩散，若治疗及时，炎症也易控制和恢复。

48、正确答案：A

答案解析：年轻恒牙冠髓切断术为氢氧化钙切断术。乳牙冠髓切断术可用氢氧化钙、戊二醛、甲醛甲酚。

49、正确答案：A

答案解析：年轻恒牙外伤最常见是上颌中切牙，8~9岁最容易出现外伤。

50、正确答案：C

答案解析：乳牙外伤的治疗一定要考虑外伤对恒牙发育的影响，其中挫入即牙齿嵌入牙槽骨中，乳牙牙根下方就是恒牙胚，恒牙胚周围骨板受到创伤，嵌入的牙根如果朝向恒牙胚有可能影响恒牙发育，造成釉质发育不全、牙根弯曲埋伏阻生等。

51、正确答案：B

答案解析：三氧化二砷和酚醛树脂液不适宜使用于乳牙的牙髓治疗，它们对根尖周组织可造成严重的化学性损伤，有时甚至伤害到恒牙牙胚。

52、正确答案：B

答案解析：临床上年轻恒牙异常松动的原因多为根尖周病。

53、正确答案：E

答案解析：乳牙早失后是否需做功能性间隙保持器主要应考虑乳磨牙缺失的数目和部位。

54、正确答案：A

答案解析：无

55、正确答案：D

答案解析：无

56、正确答案：E

答案解析：天疱疮自身免疫性疾病。

57、正确答案：D

答案解析：氟康唑治疗真菌感染。

58、正确答案：D

答案解析：复发性口腔溃疡常发生于唇、舌、颊、软腭等无角化或角化较差的黏膜。

59、正确答案：E

答案解析：世界卫生组织将白斑和红斑归入癌前病变，口腔扁平苔藓（OLP）WHO 将其列入癌前状态。

60、正确答案：C

答案解析：念珠菌是一种常见的条件致病菌，属于酵母样真菌，条件致病菌中白念珠菌和热带念珠菌致病力最强，引起口腔念珠菌病的主要致病菌为白色念珠菌。因此答案为 C。

61、正确答案：B

答案解析：本病为急性感染性炎症。病原体为梭形杆菌和螺旋体。多见于18~30岁的年轻人。牙龈边缘及龈乳头顶端出现坏死，下前牙唇侧多见。牙龈边缘呈虫蚀状，牙龈乳头消失变平如刀削状、在坏死组织表面可有灰白色的假膜形成，容易擦去，擦去后可见出血的创面。

62、正确答案：C

答案解析：无

63、正确答案：E

答案解析：口腔白斑病是指口腔黏膜上的白色斑块或斑片，不能以临床和组织病理学的方法诊断为其他任何疾病者。

64、正确答案：E

答案解析：非均质型又可分为疣状型、溃疡型和颗粒型。

65、正确答案：C

答案解析：扁平苔藓(OLP)的病因和发病机制目前尚不明确，临床和基础研究结果显示可能与多种致病因素有关，如免疫因素、精神因素、内分泌因素、感染因素、微循环障碍、遗传因素、系统性疾病以及口腔局部刺激因素等。其中细胞介导的局部免疫应答紊乱在OLP的发生发展中具有重要作用。因此本题选C。

66、正确答案：C

答案解析：天疱疮、类天疱疮都属于自身免疫性疾病。

67、正确答案：A

答案解析：浅龋的临床表现为少量色素沉着，无明显龋洞，探诊粗糙，叩诊冷热诊均无反应。

68、正确答案：B

答案解析：中龋的临床表现为：中龋的龋坏已达牙本质浅层，临床检查有明显龋洞，可有探痛，对外界刺激（如冷热、甜、酸和食物嵌入等）可出现疼痛反应当刺激源去除后疼痛立即消失，无自发性痛。患牙符合中龋的临床表现。

69、正确答案：B

答案解析：龋洞，深达牙本质深层，叩诊(-)，冷刺激龋洞后疼痛剧烈，去除刺激疼痛立即消失，热测同对照牙。此为典型的深龋临床表现。

70、正确答案：D

答案解析：软龋无法去净的深龋洞，可选择安抚，间接盖髓后去净软龋，间接盖髓后垫底充填。

71、正确答案：A

答案解析：因左上第一磨牙缺失，故可以直接在龋洞处去腐备洞后垫底充填，无需从面进入，损伤多余的牙体。

72、正确答案：D

答案解析：因全口牙自幼呈黄色，并随年龄加重为深灰色，要求治疗。查：全口牙呈黄至深灰色，由后至前逐渐加重，表面无实质缺损。以上症状怀疑为四环素牙，故应询问幼时患病用药史。

73、正确答案：C

答案解析：牙齿漂白无法修补釉质缺损，牙髓治疗后桩冠修复对牙体损伤太大，着色部分可能为牙本质部，磨除对牙体损伤更大，洁治无法消除着色斑块。故树脂贴面为最理想治疗方法。

74、正确答案：D

答案解析：畸形舌侧窝多发于上颌侧切牙，深龋，并无冷热诊异常和穿髓，故可以间接盖髓后充填。

75、正确答案：C

答案解析：本题考查的是牙龈炎的鉴别诊断。患者 24 岁，牙周正常，出血不伴疼痛。无附着丧失，可诊断为慢性龈炎。

76、正确答案：A

答案解析：本题考查的是牙龈炎的治疗。牙龈炎症不伴有附着丧失。

77、正确答案：D

答案解析：牙周脓肿与牙槽脓肿的鉴别点有感染来源、牙周袋、牙体情况、牙髓活力、脓肿部位、疼痛程度、牙松动度、叩痛、X 线表现以及病程几方面区别，是否有龈下牙石不能加以区别。故本题答案为 D。

78、正确答案：C

答案解析：本题考查的是牙龈炎的诊断。牙龈炎症的区别于牙周炎的主要症状是不伴有附着丧失。

79、正确答案：D

答案解析：本题考查的是急性龈乳头炎的诊断。题中诊断为急性龈乳头炎，故口腔检查应与龈乳头相关，乳头炎初期不会发生龈乳头坏死。

80、正确答案：C

答案解析：此题考查的是牙龈炎及菌斑形成原因，通过口腔中唾液糖蛋白形成获得性膜是菌斑形成的关键，而上前牙区并非菌斑易附着区，通过题干可知上唇稍短，可知患者可能有舔唇习惯。

81、正确答案：D

答案解析：本题反向考查慢性坏死性龈炎的症状。通过题干可知前牙龈乳头消失，并凹陷，呈反波浪形龈牙间乳头，此为坏死性龈炎典型症状。

82、正确答案：C

答案解析：拔髓后两日出现急性根尖炎症状，说明在初诊治疗时可能有坏死物质被推出根尖孔，造成感染。

83、正确答案：B

答案解析：玻璃离子水门汀充填可以磨除较少的牙体组织，对洞型要求不高，并且可是释放氟离子有效防龋。适用于乳牙龋洞充填。

84、正确答案：D

答案解析：无

85、正确答案：A

答案解析：年轻恒牙外伤后露髓，根据穿髓孔大小选择活髓切断术或直接盖髓术进行治疗。穿髓孔大，行活髓切断术。

86、正确答案：D

答案解析：PAS 阳性菌丝有散在微脓肿，可诊断为念珠菌病。

87、正确答案：B

答案解析：疱疹性口炎：原发性感染多见于婴幼儿，潜伏期约 1 周，发烧 38℃~39℃，全身反应较重，口腔黏膜任何部位和口周皮肤出现成簇小水疱。

88、正确答案：E

答案解析：溃疡直径较小，约 2 mm，溃疡数日多可达十几个或几十个，散在分布，似“满天星”为疱疹样口疮的特点。

89、正确答案：A

答案解析：急性龋发展速度快，病变部牙本质质地湿软，用手器械易去除，该患者病变组织颜色较浅，易清除，提示急性龋，故选 A。

90、正确答案：A

答案解析：深龋应与慢性牙髓炎相鉴别，重点是鉴别牙髓状态，慢性闭锁性牙髓炎也存在冷热刺激敏感，但其可有自发痛史，温度测试深龋同对照牙，慢性牙髓炎患牙表现持久的疼痛，故本题选 A。

91、正确答案：B

答案解析：深龋应与慢性牙髓炎相鉴别，重点是鉴别牙髓状态，而温度测试能明确患牙是否存在炎症，故最有价值，选 B。

92、正确答案：D

答案解析：变形链球菌黏附于牙釉质表面，是产酸脱矿引发龋病的主要细菌，故 D 正确。

93、正确答案：E

答案解析：乳酸杆菌在深龋中大量存在，具有较强的发酵力，在加速龋病的发展中可能起主要作用。所以本题应选 E。

94、正确答案：E

答案解析：无

95、正确答案：C

答案解析：无

96、正确答案：E

答案解析：畸形中央尖好发于下颌第二前磨牙，主诉牙症状可以怀疑为畸形中央尖，故通过X线片观察根尖发育情况来选择治疗方式，若为喇叭口形，则需做根尖诱导成形术，若根尖发育完全，可直接行根管治疗术后修复治疗。

97、正确答案：B

答案解析：65 龋深，叩痛阳性，可怀疑有牙髓炎症，需要鉴别可逆性牙髓炎或者牙髓充血或者急性牙髓炎，所以需要做牙髓温度测验，所以 B 正确。

98、正确答案：D

答案解析：此患者疼痛持续一年来，所以应该不是急性牙髓炎，应该为慢性牙髓炎，所以 D 正确，C 错误，深龋不会夜间痛，所以 A 错误，慢性鼻窦炎流鼻涕，上颌窦区压痛，所以 B 错误，可复性牙髓炎没有自发疼痛，所以 E 不符合症状。

99、正确答案：B

答案解析：盖髓治疗用于深龋未穿髓或深龋露髓孔比较小，所以 C 错误，垫底充填是在根管充填之后垫底充填，所以 A 不是最重要的设计，A 错误，此患者牙冠完整，所以不需要拔除残根，D 不选，不需要耳鼻喉科就诊，所以 E 不选，慢性牙髓炎需要进行彻底的根管治疗，去除感染，然后进行严密充填，预防再感染。所以 B 正确。

100、正确答案：D

答案解析：本题考查的是牙龈炎的鉴别。通过题干可知：年龄 50 岁可排除 A，BCE 与牙龈炎的诊断无直接关系。而上述检查均与 D 符合。

101、正确答案：A

答案解析：通过题干可知进行过肾移植手术，并在一年中一直接受治疗，故为药物性牙龈增生。

102、正确答案：A

答案解析：患者进行过肾移植，为防止引起排异，故需服用免疫抑制剂。

103、正确答案：E

答案解析：本题考查的是的牙周炎的诊断。通过牙出血、轻度松动、咬合痛，患者可能患有根尖周炎和牙龈炎，故 E。

104、正确答案：B

答案解析：成人型牙周炎即为慢性牙周炎。伴放线放线杆菌是侵袭性牙周炎的主要致病菌，

因此 A 错误。乳酸杆菌在龋病的发展中起作用，因此 C 错误。变形链球菌是龋病的主要致病菌，因此 D 错误。嗜二氧化碳噬纤维菌与青少年牙周炎关系密切，因此 E 错误。应选 B。

105、正确答案：C

答案解析：本题考查的是牙周炎的伴发症状。ABD 为牙周炎的症状，E 为根尖周炎的症状。熟记牙周炎的伴发症状。

106、正确答案：A

答案解析：慢性牙周炎的治疗。

107、正确答案：C

答案解析：无

108、正确答案：A

答案解析：无

109、正确答案：C

答案解析：无

110、正确答案：C

答案解析：食冷饮时左后牙感到酸痛 2 周，无自发痛史，检查发现 6 颊面深龋，龋蚀范围稍广，腐质软而湿润，易挖除，但敏感。测牙髓活力同正常牙，叩诊(-)，根据病情可诊断为急性龋；深龋质软可间接盖髓治疗；首次就诊因较敏感，可以氧化锌丁香油糊剂安抚；充填后远期出现激发痛自发痛说明是继发龋导致的牙髓炎。

111、正确答案：B

答案解析：无

112、正确答案：B

答案解析：无

113、正确答案：D

答案解析：无

114、正确答案：E

答案解析：原发性疱疹性口炎最常见的由 I 型单纯疱疹病毒引起的口腔病损。以 6 岁以下儿童较多见，尤其是 6 个月至 2 岁更多。6 个月前有来自母体的被动免疫。禁忌使用激素。

115、正确答案：B

答案解析：无

116、正确答案：A

答案解析：无

117、正确答案：C

答案解析：双颊黏膜有网状白色条纹疑为扁平苔藓，需要病理确定。病因与创伤无关。扁平苔藓病理：(1)上皮不全角化或无角化。(2)棘层增生，少数萎缩。(3)上皮钉突不规则延长，少数呈锯齿状。(4)基底层液化变性形成上皮下疱(诊断标志)。(5)固有层淋巴细胞浸润带。(不达到黏膜下层)(6)上皮棘层、基底层、固有层可见胶样小体。

118、正确答案：E

答案解析：无

119、正确答案：A

答案解析：无

120、正确答案：D

答案解析：无

121、正确答案：B

答案解析：无

122、正确答案：C

答案解析：线性牙釉质龋好发于上前牙唇面新生线处；猛性龋常见于颌面和颈部接受放射治疗的患者，也称为放射性龋；潜行性龋窝沟龋呈锥形，底部朝牙本质，尖向牙釉质表面，病变早期牙釉质表面无明显破坏；静止龋为由于病变环境发生改变，龋病不再继续发展，损害仍保持原样；龋病治疗后，充填物边缘牙体组织破裂，产生龋病称为继发龋。

123、正确答案：D

答案解析：无

124、正确答案：A

答案解析：无

125、正确答案：B

答案解析：无

126、正确答案：C

答案解析：遗传性乳光牙本质：牙冠呈微黄色半透明，光照下呈现乳光；浅龋：前牙邻面白垩色或黄褐色，探诊有粗糙感；四环素牙：全口牙釉质呈现灰黄色，表面光滑，前牙着色重于后牙；氟牙症：同一时期发育的牙面上，云雾状白垩色或黄褐色斑块；釉质发育不全：釉质表面呈白垩色，并出现带状凹陷。

127、正确答案：B

答案解析：无

128、正确答案：D

答案解析：无

129、正确答案：E

答案解析：无

130、正确答案：D

答案解析：病因不明确，有的患者有家族史累及全口牙龈缘、龈乳头和附着龈，增生牙龈颜色正常，组织坚韧，表面光滑，不易出血。

131、正确答案：B

答案解析：有服药史，龈乳头实质性增生，球状突起，可覆盖大部分或全部牙冠，不易出血。

132、正确答案：A

答案解析：菌斑等局部刺激因素，自觉症状，牙龈色形质改变，龈沟深度、探诊出血、龈沟液增多，没有其它特殊因素存在。

133、正确答案：A

答案解析：无

134、正确答案：C

答案解析：无

135、正确答案：C

答案解析：无

136、正确答案：A

答案解析：无

137、正确答案：D

答案解析：儿童患牙用金属砷封药时间 5~7 天；成人患牙用三氧化二砷封药时间 24~48 小时；多聚甲醛封药时间 7~10 天。

138、正确答案：C

答案解析：无

139、正确答案：B

答案解析：无

140、正确答案：A

答案解析：感染性疾病包括单纯疱疹、带状疱疹；变态反应包括药疹、接触性口炎、多形性红斑；自身免疫性疾病包括天疱疮、类天疱疮。

141、正确答案：B

答案解析：无

142、正确答案：A

答案解析：无

143、正确答案：E

答案解析：无

144、正确答案：C

答案解析：无

145、正确答案：B

答案解析：无

146、正确答案：A

答案解析：无

147、正确答案：E

答案解析：无

148、正确答案：B

答案解析：无

149、正确答案：D

答案解析：无

150、正确答案：A

答案解析：无





金英杰医学
JINYINGJIE.COM

医学培训领导品牌
致力于建立完整的医学服务产业链



金鹰直播课



王牌直播课



北京金英杰医考课程

金英杰直播，让学习更容易

全国免费咨询热线：**400-900-9392** 客服及投诉电话：**400-606-1615**

地址：北京市海淀区学清路甲38号金码大厦B座22层