

## 2021 年 5 月临床执业医师月度考试（第四单元）

1、（A1 型选择题）治疗骨肉瘤应首选

A.肿瘤切除术+化学治疗

B.局部整块切除

C.化学治疗

D.放射治疗

E.根治性切除+术前术后化疗

2、（A1 型选择题）脓尿患者，一般抗炎治疗无效，普通培养无细菌生长，首先考虑

A.肾盂肾炎

B.膀胱肿瘤

C.间质性膀胱炎

D.泌尿系结核

E.泌尿系结石

3、（A1 型选择题）损伤出现明显血尿的是

A.肾部分裂伤，肾盂肾盏黏膜破裂

B. 肾动脉血栓形成

C. 肾盂广泛裂伤

D. 输尿管断裂或被血块阻塞

E. 肾蒂血管断裂

4、（A1 型选择题）急性血源性骨髓炎好发年龄应该是

A. 少年

B. 婴幼儿

C. 青年

D. 中壮年

E. 老年

5、（A1 型选择题）关于精索静脉曲张的治疗，下列哪项是错误的

A. 无症状或症状轻者，可穿紧身内裤或用阴囊托带

B. 手术方式为高位结扎精索内静脉

C. 症状较重，或精液异常排除其他疾病时可以考虑手术

D. 腹腔镜手术可以同时结扎双侧曲张静脉

E. 对儿童Ⅲ度曲张患者可以观察

6、（A1 型选择题）hCG 妊娠期间分泌量达高峰的时间是

- A.妊娠 4~6 周
- B.妊娠 12~14 周
- C.妊娠 8~10 周
- D.妊娠 16~18 周
- E.妊娠 20~22 周

7、（A1 型选择题）底蜕膜的作用是

- A.构成胎盘母体面
- B.排泄胎儿代谢产物
- C.合成激素和酶
- D.产生孕激素
- E.构成胎盘的胎儿部分

8、（A1 型选择题）后尿道损伤最常见的后期并发症为

- A.尿道直肠瘘
- B.直肠损伤
- C.尿外渗

D.阳痿

E.尿道狭窄

9、（A1 型选择题）腹股沟部隐睾最常见的并发症为

A.腹股沟疝

B.恶变

C.疼痛

D.精索静脉曲张

E.睾丸鞘膜积液

10、（A1 型选择题）前列腺增生最重要的症状是

A.排尿困难

B.尿频

C.尿失禁

D.尿潴留

E.尿流中断

11、（A1 型选择题）睾丸肿瘤主要临床表现

A.腹股沟淋巴结肿大

B. 睾丸疼痛

C. 血尿

D. 发热

E. 睾丸肿大，有沉重感

12、（A1 型选择题）月经来潮后子宫内膜再生来自

A. 致密层

B. 海绵层

C. 黏膜层

D. 功能层

E. 基层层

13、（A1 型选择题）线形骨折最常合并的颅内血肿是

A. 硬膜下血肿

B. 硬膜外血肿

C. 脑内血肿

D. 脑室内血肿

E. 迟发性外伤性血肿

14、（A2 型选择题）患者，女，28 岁，已婚。漏服避孕药 3 天后，停经 48 天，阴道流血 7 天，略少于月经量，伴有腹痛，下列处理较为合理的是

- A.测血 hCG 值
- B.口服避孕药止血
- C.诊断性刮宫
- D.卧床休息，同时长期服用苯巴比妥
- E.口服雌激素修复内膜止血

15、（A1 型选择题）孕妇尿中检出的激素，与胎儿胎盘功能关系最密切的是

- A.孕二醇
- B.皮质醇
- C.雌三醇
- D.雌二醇
- E.醛固酮

16、（A1 型选择题）下列提示有脑干损伤的是

- A.中间清醒期

B. Battle 征

C. 脑脊液耳漏

D. 头痛、呕吐、视神经盘水肿

E. 去大脑强直

17、（A1 型选择题）防止子宫下垂最主要的韧带是

A. 子宫圆韧带

B. 子宫阔韧带

C. 腹股沟韧带

D. 子宫骶韧带

E. 子宫主韧带

18、（A1 型选择题）晚期胚泡透明带消失后，相当于受精后第几日开始着床

A. 2~3 天

B. 4~5 天

C. 8~9 天

D. 6~7 天

E.10~11 天

19、（A1 型选择题）下列不是枕骨大孔疝的特点的是

- A.颈项强直
- B.强迫头位
- C.突发呼吸骤停
- D.意识障碍、一侧瞳孔散大
- E.剧烈头痛、频繁呕吐

20、（A1 型选择题）确诊前列腺癌最有帮助的检查是

- A.直肠指诊
- B.经直肠超声
- C.血 PSA
- D.CT
- E.前列腺穿刺活检

21、（A1 型选择题）不能通过输血传播的病原是

- A.HIV
- B.EB 病毒

C.巨细胞病毒

D.肝炎病毒

E.单纯疱疹病毒

22、（A1 型选择题）卵巢肿瘤最常见的并发症是

A.感染

B.破裂

C.囊性变

D.恶变

E.蒂扭转

23、（A1 型选择题）2 岁儿童检查苯丙酮尿症应做

A.Guthrie 细菌生长抑制试验

B.血清苯丙氨酸浓度测定

C.尿三氯化铁

D.尿甲苯胺蓝试验

E.苯丙氨酸耐量试验

24、（A1 型选择题）一侧肾癌主要治疗方法是

- A.肾肿瘤切除术
- B.单纯肾切除
- C.肾输尿管全切除
- D.根治性肾切除术
- E.化疗

25、（A1 型选择题）乳腺癌中，一般分化低，预后较差的病理类型是

- A.黏液腺癌
- B.髓样癌
- C.小管癌
- D.乳头状癌
- E.浸润性小叶癌

26、（A1 型选择题）无排卵性功能失调性子宫出血患者诊断性刮宫的病理结果不可能出现的是

- A.增生性子宫内膜
- B.单纯性增生
- C.复杂性增生

D.萎缩型子宫内膜

E.分泌期和增生期内膜并存

27、（A1 型选择题）用羊水指数法表示，大于多少考虑羊水过多

A.10cm

B.12cm

C.25cm

D.14cm

E.22cm

28、（A1 型选择题）关于产力，胎头在完成内旋转时，除了子宫收缩力之外，还有下述哪组肌肉参与

A.膈肌

B.腹肌

C.胎儿躯干肌肉

D.四肢骨骼肌

E.肛提肌

29、（A1 型选择题）疱疹性咽峡炎的最常见的病原体是

- A.流感病毒
- B.副流感病毒
- C.单纯疱疹病毒
- D.柯萨奇病毒
- E.腺病毒

30、（A1 型选择题）有助于判断中骨盆狭窄的重要指标是

- A.骶耻外径
- B.髂嵴间径
- C.髂棘间径
- D.坐骨切迹宽度
- E.坐骨结节间径

31、（A1 型选择题）早期先兆流产最先出现的症状是

- A.停经
- B.子宫停止增大
- C.少量阴道流血
- D.阵发性腹痛

E.妊娠试验由阳性转为阴性

32、（A1 型选择题）妇女一生各阶段中，持续时间最长的是

A.新生儿期

B.儿童期

C.青春期

D.围绝经期

E.性成熟期

33、（A1 型选择题）心脏病孕妇妊娠期间，最危险的时期是

A.妊娠 34~35 周

B.妊娠 28~31 周

C.妊娠 24~27 周

D.妊娠 32~34 周

E.产褥期 7 天后

34、（A1 型选择题）卵巢分泌的甾体激素，下列错误的是

A.雌激素

B.孕激素

C.雄激素

D.甲状腺素

E.甾体激素属于类固醇激素

35、（A1 型选择题）引起胎盘早剥的主要病因是

A.叶酸缺乏

B.胎动活跃

C.全身水肿

D.羊水过少

E.妊娠高血压疾病

36、（A1 型选择题）妊娠早期心脏病患者，决定是否继续妊娠的主要依据是

A.患者年龄

B.孕前的体重

C.胎儿大小

D.病变发生部位

E.心脏病种类

37、（A1 型选择题）出现先兆子宫破裂时应立即

- A.吸氧
- B.补液
- C.行产钳术
- D.行穿颅术
- E.抑制宫缩剖宫产

38、（A1 型选择题）确诊前置胎盘首选

- A.产后检查胎膜破口距胎盘边缘 5cm
- B.腹部正位片，子宫体部无胎盘影
- C.窥器检查宫颈未见病变
- D.阴道穹隆扪诊可发现宫颈口周围有软组织
- E.妊娠晚期 B 型超声检查可见胎盘覆盖宫颈内口

39、（A1 型选择题）初产妇，急产一体重 4000g 新生儿，胎儿娩出后较多量持续性鲜红色阴道出血，出血原因最可能是

- A.宫缩乏力
- B.子宫破裂

C.胎盘剥离不全

D.凝血功能障碍

E.软产道损伤

40、（A1 型选择题）细菌性阴道病最常见的病原体是

A.金黄色葡萄球菌

B.溶血性链球菌

C.大肠埃希菌

D.沙眼衣原体

E.加德纳菌

41、（A1 型选择题）中央性前置胎盘大出血的治疗方法正确的是

A.人工破膜

B.催产素引产阴式分娩

C.胎头吸引

D.为臀位行牵引术

E.剖宫产

42、（A1 型选择题）口服避孕药后月经第 9 天不规则出血，正确的处理方

法是

- A.加倍服药
- B.需立即停药
- C.加服少量孕激素
- D.加服少量雄性激素
- E.加服少量雌激素

43、（A1 型选择题）病理性缩复环最常见于

- A.男性骨盆
- B.高张性宫缩乏力
- C.软产道损伤
- D.枕后位
- E.先兆子宫破裂

44、（A1 型选择题）关于胎膜早破患者阴道流液的 pH 说法正确的是

- A.pH4.5
- B.pH4.5~5.5
- C.pH5.5~6.0

D.pH $\geq$ 6.5

E.pH6.0~6.5

45、（A1 型选择题）部分性葡萄胎核型常是

A.三倍体

B.二倍体

C.单倍体

D.四倍体

E.五倍体

46、（A1 型选择题）下列药物不属于支气管扩张剂的是

A.特布他林

B.噻托溴铵

C.多索茶碱

D.沙丁胺醇

E.布地奈德

47、（A1 型选择题）维持阴道正常酸性环境的主要菌群是

A.葡萄球菌

- B. 肠球菌
- C. 大肠埃希菌
- D. 棒状杆菌
- E. 乳酸杆菌

48、（A1 型选择题）羊水栓塞 DIC 的早期，首选的处理是

- A. 输新鲜血
- B. 止血药
- C. 肝素治疗
- D. 输纤维蛋白原
- E. 肌注双嘧达莫

49、（A1 型选择题）治疗具有严重细胞免疫缺陷患者的唯一有效措施是

- A. 保护性隔离
- B. 抗生素预防性治疗
- C. 输新鲜血
- D. 免疫球蛋白替代疗法
- E. 免疫重建

50、（A1 型选择题）子宫肌瘤红色变性常发生在

- A.肌瘤扭转时
- B.性功能活跃时
- C.分娩期
- D.妊娠期
- E.月经期经量多时

51、（A1 型选择题）绒癌最常见的转移部位依次是

- A.肺、脑、肝、阴道
- B.阴道、肺、肝、脑
- C.肝、心、脑、肺
- D.肺、阴道、肝、脑
- E.肝、肺、阴道、脑

52、（A1 型选择题）与子宫肌瘤的临床表现无明显相关的是

- A.不孕
- B.反复早期流产
- C.排便困难

D.贫血

E.尿频尿急尿痛

53、（A1 型选择题）关于哮喘的治疗下列错误的是

A.避免接触过敏原

B.清除感染灶

C.去除各种诱发因素

D.不需抗炎治疗

E.解除支气管痉挛

54、（A1 型选择题）在麻疹的并发症中，错误的是

A.喉炎

B.肺炎

C.心肌炎

D.脑炎

E.肾炎

55、（A1 型选择题）支气管淋巴结核出现声嘶是由于肿大的淋巴结压迫

A.迷走神经

B.右侧颈静脉

C.左侧颈静脉

D.喉返神经

E.肺动脉

56、（A1 型选择题）小儿化脓性脑膜炎最易出现的并发症为

A.脑积水

B.脑瘫

C.癫痫

D.脑性低钠血症

E.硬膜下积液

57、（A1 型选择题）结核性脑膜炎的脑神经损害不包括下列哪对

A.VII

B.III

C.IV

D.V

E.VI

58、（A1 型选择题）临床常用药物流产方法是

- A.米非司酮
- B.卡孕栓
- C.米非司酮+米索前列醇
- D.环磷酰胺
- E.卡孕栓+米索前列醇

59、（A1 型选择题）法洛四联症较少合并以下哪种疾病

- A.脑缺氧发作
- B.感染性心内膜炎
- C.脑脓肿
- D.脑栓塞
- E.肺炎

60、（A1 型选择题）不引起肠黏膜损伤的腹泻致病菌是

- A.空肠弯曲菌
- B.难辨梭状芽孢杆菌
- C.隐球菌

D.轮状病毒

E.痢疾杆菌

61、（A1 型选择题）肾病综合征诊断标准中，24 小时尿蛋白总量临界值应

A. > 4.5g/d

B. > 4g/d

C. > 3.5g/d

D. > 3.0g/d

E. > 2.5g/d

62、（A1 型选择题）反映缺铁性红细胞生成的最佳指标是

A.血清铁蛋白

B.血清铁

C.转铁蛋白饱和度

D.总铁结合力

E.红细胞游离原卟啉

63、（A1 型选择题）小儿出生后多久中性粒细胞与淋巴细胞所占比例相等

A.1~2 天，1~2 个月

B.4~6 天, 2~3 个月

C.2~4 个月, 4~6 岁

D.1~2 个月, 2~3 岁

E.4~6 天, 4~6 岁

64、(A1 型选择题) 营养性缺铁性贫血选用的治疗, 最恰当的是

A.硫酸亚铁加叶酸

B.维生素 C 加叶酸

C.维生素 B12 加高蛋白饮食

D.硫酸亚铁加维生素 C 加高蛋白饮食

E.以上都不是

65、(A1 型选择题) 早产儿的定义是

A.胎龄 < 28 周

B.胎龄 > 37 周至 < 40 周的新生儿

C.体重 < 2500g 的婴儿

D.体重 < 1500g 的婴儿

E.胎龄 > 28 周至 < 37 周的婴儿

66、（A1 型选择题）新生儿 ABO 溶血病发生在

- A.母血型“A”，子血型“O”
- B.母血型“AB”，子血型“O”
- C.母血型“O”，子血型“AB”
- D.母血型“O”，子血型“A”或“B”
- E.母血型“B”，子血型“O”

67、（A1 型选择题）新生儿黄疸于生后 24 小时内出现者首先考虑

- A.新生儿肺炎
- B.新生儿败血症
- C.新生儿肝炎
- D.先天性胆道闭锁
- E.新生儿溶血症

68、（A1 型选择题）新生儿败血症的发生，从感染途径分析，以哪一项最常见

- A.羊水穿刺感染
- B.产前感染

- C.产时感染
- D.产后感染
- E.宫内输血消毒不严

69、（A1 型选择题）男婴足月顺产，出生体重 3200g，生后 48 小时血清总胆红素 297.5 $\mu$ mol/L。在检查黄疸原因时，首选治疗方法是

- A.输血浆
- B.换血
- C.口服苯巴比妥
- D.清蛋白输注
- E.光照疗法

70、（A1 型选择题）左向右分流型的先天性心脏病多见的并发症是

- A.心律失常
- B.脑栓塞
- C.肺炎
- D.喉返神经麻痹
- E.亚急性细菌性心内膜炎

71、（A1 型选择题）我国使用的围生期概念是

- A.妊娠 20 周～产后 1 周
- B.妊娠 26 周～产后 4 周
- C.妊娠 28 周～产后 4 周
- D.妊娠 28 周～产后 1 周
- E.妊娠 24 周～产后 1 周

72、（A1 型选择题）先心病中最常见的类型是

- A.动脉导管未闭
- B.房间隔缺损
- C.室间隔缺损
- D.法洛四联症
- E.肺动脉狭窄

73、（A1 型选择题）我国法定传染病中甲类传染病有

- A.天花和鼠疫
- B.狂犬病和天花
- C.霍乱和副霍乱

D.艾滋病与霍乱

E.鼠疫和霍乱

74、（A1 型选择题）母体免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿的是

A.IgM

B.IgA

C.IgE

D.IgD

E.IgG

75、（A2 型选择题）1 岁男孩，股骨中段斜行骨折，短缩移位 2.5cm，其治疗最好采用

A.手法复位，小夹板固定

B.手法复位，髓人字石膏固定

C.垂直悬吊皮牵引

D.用布朗架行持续骨牵引

E.切开复位内固定

76、（A2 型选择题）男，29 岁，发作性左腰区疼痛 1 周，每次疼痛数小

时，腹部 X 线平片可见左侧腹部有一高密度阴影，在肾下极下 2cm，直径为 1.1cm，诊断考虑是左输尿管结石，目前首选治疗方案为

- A.大量饮水
- B.输尿管镜取石
- C.解痉、抗感染
- D.体外冲击波碎石术
- E.以上都不是

77、（A2 型选择题）男，36 岁。10 岁时因右侧隐睾行睾丸固定术，近 1 个月以来右侧阴囊肿大伴疼痛，查体：右侧阴囊下垂明显；皮温不高，睾丸肿大，质硬，有明显沉重感，透光试验阴性。应初诊为

- A.右睾丸炎
- B.右附睾炎
- C.右睾丸肿瘤
- D.右睾丸鞘膜积液
- E.右睾丸结核

78、（A2 型选择题）男，31 岁，1.5 小时前被自行车撞到腰部。血压 100/65mmHg，尿常规：红细胞 30~40/高倍视野，最可能的诊断是

- A. 肾蒂裂伤
- B. 肾盂裂伤
- C. 肾挫伤
- D. 肾皮质深部裂伤
- E. 肾碎裂伤

79、（A2 型选择题）老年患者，无明显外伤史，渐进性头痛及左侧肢体无力 4 周。CT 示右侧额颞顶新月形低密度影，脑室受压，中线向左移位，最可能的诊断是

- A. 急性硬膜下血肿
- B. 亚急性硬膜下血肿
- C. 亚急性硬膜外血肿
- D. 急性硬膜外血肿
- E. 慢性硬膜下血肿

80、（A2 型选择题）一颅脑外伤患者，来院已昏迷，一侧瞳孔散大，紧急处理首选

- A. X 线检查
- B. 脑血管造影

C.脑室穿刺外引流

D.快速静点甘露醇

E.钻孔探查

81、（A2 型选择题）风湿性心脏病，心功能Ⅲ级的妇女，患异位妊娠，左侧输卵管妊娠破裂，手术应行

A.右附件切除

B.右附件切除+左输卵管结扎

C.左输卵管切除+右输卵管结扎

D.子宫次全切除术+右附件切除

E.右输卵管切除

82、（A2 型选择题）45 岁女性，接触性阴道流血 5 个月，查宫颈重度糜烂状，宫体前位，正常大小，宫旁主韧带增厚感，未达盆壁。为确定诊断应作哪项检查

A.宫颈刮片细胞学检查

B.阴道镜检查

C.碘试验

D.宫颈锥形切除术

## E. 宫颈活组织检查

83、（A2 型选择题）初产妇，25 岁，停经 49 天，阵发性腹痛伴阴道流血 3 天，妇科检查：宫颈口开大 1cm，有羊膜囊堵塞子宫口，子宫孕 49 天大小。最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 过期流产
- C. 完全流产
- D. 难免流产
- E. 习惯性流产

84、（A2 型选择题）女性，30 岁，已婚，放置宫内节育器 2 年，停经 48 天，少量阴道出血 3 天，突然右下腹剧烈撕裂样疼痛，血压 80/40mmHg，右下腹压痛，反跳痛明显，但肌紧张不明显。妇科检查：后穹隆饱满，宫颈举痛（+），宫口闭，子宫正常大小，呈漂浮感，双附件触诊不满意，本病例最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 黄体破裂
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 输卵管妊娠破裂

## E.急性阑尾炎

85、（A2 型选择题）肾病综合征患儿开始应用泼尼松治疗，口服泼尼松后，4 周尿蛋白已经转阴，并且已经开始隔日顿服，突发上呼吸道感染，尿蛋白又（+++），经常规抗炎治疗后，尿蛋白仍（+++），下一步治疗应采用

- A.治疗不变，泼尼松仍然隔日顿服
- B.应用环磷酰胺
- C.泼尼松重新开始起始治疗量每日三次口服
- D.应用激素+环磷酰胺
- E.以上均不对

86、（A2 型选择题）3 个月婴儿，腹泻 3 天，大便每天 10 多，呈蛋花汤样，伴呕吐，尿少，精神萎靡，拒奶，面色苍白，前囟、眼窝凹陷，口唇樱红，皮肤弹性差。除诊断婴儿腹泻、中度脱水外，还应考虑

- A.低血容量休克
- B.代谢性碱中毒
- C.低镁血症
- D.低钙血症
- E.代谢性酸中毒

87、（A2 型选择题）女，18 岁，未婚。原发性闭经，乳房发育正常，外阴无异常，子宫略小于正常，两侧附件正常，首先应如何处理

- A. 氯米芬
- B. 雌激素试验
- C. 人工周期
- D. hCG
- E. 孕激素试验

88、（A2 型选择题）35 岁已婚妇女，白带多伴有外阴痒 2 周。查外阴皮肤有抓痕，检查见阴道后穹隆处有多量稀薄泡沫状分泌物，阴道黏膜有多处多个散在红色斑点最可能的诊断是

- A. 外阴阴道假丝酵母菌病
- B. 细菌性阴道病
- C. 老年性阴道炎
- D. 滴虫阴道炎
- E. 慢性宫颈炎

89、（A2 型选择题）8 岁男孩，常有活动后心悸、气促，心脏听诊于胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及 II~III 级喷射性收缩期杂音，肺动脉瓣区第二心音亢进

和固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A.肺动脉狭窄
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.房间隔缺损

90、（A2 型选择题）2 岁男婴，发现双下肢青紫 1 个月。查体：胸骨左缘第 2 肋间可闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音，诊断考虑

- A.房室隔缺损
- B.室间隔缺损
- C.肺动脉狭窄
- D.法洛四联症
- E.动脉导管未闭

91、（A2 型选择题）7 个月小儿出现低钙性手足抽搐，应怎样处理

- A.补钙—止抽
- B.止抽，补钙

C.维生素 D2—止抽—补钙

D.止抽—补钙—维生素 D2

E.补钙—维生素 D2—止抽

92、（A2 型选择题）7 个月小儿，咳喘 3 天，体温 37.8℃，喘憋较明显，查体：双肺可闻及散在喘鸣音，本例最可能的病原体感染是

A.腺病毒

B.肺炎支原体

C.巨细胞病毒

D.肺炎链球菌

E.呼吸道合胞病毒

93、（A2 型选择题）男性，30 岁。车祸后半小时，血压 90/50mmHg，心率 121 次/分，下腹膨隆，不能自排小便，尿道口有少量流血，X 线提示骨盆骨折，尿道造影提示后尿道断裂，最佳处理是

A.立即导尿

B.耻骨上穿刺排尿

C.后尿道修补术

D.抗休克治疗后耻骨上膀胱造瘘术

## E.尿道会师术

94、（A2型选择题）男婴,30天。过期产，出生体重4500g,母亲无糖尿病病史。生后人工喂养，常鼻塞，时有呼吸困难，吃奶差。哭声弱、反应差、便秘，体检： $T35^{\circ}\text{C}$ ， $P90$ 次/分，皮肤轻度黄染。血象： $\text{Hb}90\text{g/L}$ ， $\text{RBC}3.6\times 10^{12}/\text{L}$ ， $\text{WBC}11\times 10^9/\text{L}$ 。对该患儿最主要的治疗是

- A.保肝、利胆、退黄
- B.应用抗生素抗感染
- C.服用甲状腺制剂
- D.保暖给氧，支持呼吸
- E.不需用药，继续观察

95、（A2型选择题）29岁妇女，停经44天，有早孕反应，妇科检查：宫颈呈紫蓝色，子宫体正常大小，双侧附件正常，首选的处理方法是

- A.B型超声检查
- B.黄体酮肌内注射
- C.保胎治疗
- D.尿妊娠试验
- E.基础体温测定

96、（A2 型选择题）女，6 岁，高度水肿，血浆蛋白 34g/L，清蛋白 16g/L，尿蛋白（+++），血压 95/62mmHg，治疗中首先选择的措施是

- A.输清蛋白
- B.输全血
- C.使用环磷酰胺
- D.使用利尿合剂
- E.使用糖皮质激素

97、（A2 型选择题）孕 3 产 1。因停经 7 个月，阴道流血 4 天，增多 1 小时，急诊入院，查血压 90/60mmHg，P115 次/分，宫底剑突下三横指，臀先露 LSA，胎心 136 次/分，有不规律宫缩。为进一步确诊首选的检查是

- A.颈管内指诊
- B.肛诊
- C.阴道检查
- D.B 超检查
- E.腹部平片

98、（A2 型选择题）28 岁，女性，患卵巢肿瘤伴甲亢 1 年，如疑甲亢由卵巢肿瘤引起，应为

- A. 颗粒性细胞瘤
- B. 无性细胞瘤
- C. 卵泡膜细胞瘤
- D. 高度特异性畸胎瘤
- E. 纤维瘤

99、（A2 型选择题）4 岁患儿，发热、干咳 10 天，体温 39℃，双眼疱疹性结膜炎，颈部可触及成串肿大的淋巴结，右肺呼吸音稍低，少许干啰音，PPD 硬结直径 18mm。诊断考虑

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 右侧胸膜炎
- D. 原发型结核
- E. 支气管炎合并结膜炎

100、（A1 型选择题）能引起子宫内膜增生过长的卵巢肿瘤是

- A. 成熟囊性畸胎瘤
- B. 内胚窦瘤

C.内膜样肿瘤

D.卵泡膜细胞瘤

E.浆液性囊腺瘤

101、（A2 型选择题）胎龄为 36 周的新生儿，生后 7 小时皮肤出现黄染，生后 3 天出现抽搐，体检：一般状态差、前囟平、皮肤及巩膜重度黄染，心肺正常，腹软，四肢张力增强，血胆红素  $342\mu\text{mol/L}$ ，血钙  $2.0\text{mmol/L}$ ，此患儿最可能患

A.低钙

B.化脑

C.核黄疸

D.低血糖

E.癫痫

102、（A2 型选择题）3 岁小儿患金葡菌肺炎，突然呼吸困难，发甜烦躁，体温  $40^{\circ}\text{C}$ ，左侧呼吸运动及呼吸音减弱，叩之不浊，心率 162 次/分，肝肋下 2.5cm，本例最大可能并发

A.肺气肿

B.心包炎

- C.心肌炎
- D.呼吸衰竭
- E.张力性气胸

103、（B1 型选择题）男，65 岁，走路滑倒后左手掌着地，X 线片示为 Colles 骨折，首选的治疗方案是

- A.手法复位石膏外固定
- B.闭合复位外固定支架固定
- C.持续性骨牵引
- D.切开复位内固定
- E.持续性皮肤牵引

104、（B1 型选择题）女，20 岁，从高处坠落，颈部挫伤，出现不完全性截瘫，X 线片显示，颈 5 椎体骨折并向前脱位约 30%，首选的治疗方案是

- A.手法复位石膏外固定
- B.闭合复位外固定支架固定
- C.持续性骨牵引
- D.切开复位内固定

E.持续性皮肤牵引

105、（B1 型选择题）21-三体综合征

A.嗜睡、腹胀、便秘

B.高腭弓、通贯手

C.智力正常

D.尿有鼠尿味

E.四肢细长

106、（B1 型选择题）先天性甲状腺功能减低症

A.嗜睡、腹胀、便秘

B.高腭弓、通贯手

C.智力正常

D.尿有鼠尿味

E.四肢细长

107、（B1 型选择题）苯丙酮尿症

A.嗜睡、腹胀、便秘

B.高腭弓、通贯手

- C.智力正常
- D.尿有鼠尿味
- E.四肢细长

108、（B1 型选择题）育龄妇女阴道 pH 升高时容易发生

- A.萎缩性阴道炎
- B.阿米巴阴道炎
- C.滴虫性阴道炎
- D.外阴阴道假丝酵母菌病
- E.细菌性阴道病

109、（B1 型选择题）阴道分泌物镜检可见线索细胞， $\text{pH} > 4.5$ ，加入 10% 氢氧化钾溶液后可产生烂鱼肉样腥臭气体

- A.萎缩性阴道炎
- B.阿米巴阴道炎
- C.滴虫性阴道炎
- D.外阴阴道假丝酵母菌病
- E.细菌性阴道病

110、（B1 型选择题）糖尿病患者及长期使用广谱抗生素患者易发生

- A. 萎缩性阴道炎
- B. 阿米巴阴道炎
- C. 滴虫性阴道炎
- D. 外阴阴道假丝酵母菌病
- E. 细菌性阴道病

111、（B1 型选择题）LOA 是指

- A. 胎头在脐左上，胎心在脐上
- B. 胎头位于母体左侧，胎心位于母体腹前壁靠近脐下
- C. 胎头在脐右上，胎心靠脐上
- D. 胎头位于宫底部，胎心位于脐右下方
- E. 胎头位于耻骨上方，胎心位于脐左下方

112、（B1 型选择题）LSA 是指

- A. 胎头在脐左上，胎心在脐上
- B. 胎头位于母体左侧，胎心位于母体腹前壁靠近脐下
- C. 胎头在脐右上，胎心靠脐上

D.胎头位于宫底部，胎心位于脐右下方

E.胎头位于耻骨上方，胎心位于脐左下方

113、（B1 型选择题）RSA 是指

A.胎头在脐左上，胎心在脐上

B.胎头位于母体左侧，胎心位于母体腹前壁靠近脐下

C.胎头在脐右上，胎心靠脐上

D.胎头位于宫底部，胎心位于脐右下方

E.胎头位于耻骨上方，胎心位于脐左下方

114、（B1 型选择题）黄体萎缩不全

A.月经周期正常，经期延长

B.月经周期规律，但周期短

C.月经周期无规律

D.突然大量出血，并发痛经

E.周期、经期、经量都不正常

115、（B1 型选择题）黄体发育不全

A.月经周期正常，经期延长

B.月经周期规律，但周期短

C.月经周期无规律

D.突然大量出血，并发痛经

E.周期、经期、经量都不正常

116、（B1 型选择题）化脓性脑膜炎

A.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白升高、糖降低、氯化物降低

B.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白降低、糖正常、氯化物正常

C.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白稍高、糖正常、氯化物正常

D.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白正常、糖降低、氯化物正常

E.细胞数  $1200 \times 10^6/L$ 、蛋白增高、糖降低、氯化物降低

117、（B1 型选择题）结核性脑膜炎

A.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白升高、糖降低、氯化物降低

B.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白降低、糖正常、氯化物正常

C.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白稍高、糖正常、氯化物正常

D.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白正常、糖降低、氯化物正常

E.细胞数  $1200 \times 10^6/L$ 、蛋白增高、糖降低、氯化物降低

118、（B1 型选择题）病毒性脑膜炎

- A.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白升高、糖降低、氯化物降低
- B.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白降低、糖正常、氯化物正常
- C.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白稍高、糖正常、氯化物正常
- D.细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白正常、糖降低、氯化物正常
- E.细胞数  $1200 \times 10^6/L$ 、蛋白增高、糖降低、氯化物降低

119、（B1 型选择题）关于羊水的功能错误的是

- A.润滑和冲洗阴道，减少感染机会
- B.防止胎体畸形
- C.不利于胎儿体液平衡
- D.保持羊膜腔内恒温
- E.胎儿不受挤压

120、（B1 型选择题）破膜后羊水起的作用是

- A.润滑和冲洗阴道，减少感染机会
- B.防止胎体畸形
- C.不利于胎儿体液平衡

D.保持羊膜腔内恒温

E.胎儿不受挤压

121、（A3/A4 型选择题）6 个月健康小儿，体重为 6 kg，用牛奶人工喂养。如采用 8%的牛奶，每天应给多少毫升

A.500ml

B.550ml

C.660ml

D.600ml

E.700ml

122、（A3/A4 型选择题）6 个月健康小儿，体重为 6 kg，用牛奶人工喂养。除牛奶外，还应给予多少毫升水

A.200ml

B.240ml

C.280ml

D.350ml

E.300ml

123、（A3/A4 型选择题）6 个月健康小儿，体重为 6 kg，用牛奶人工喂养。每天需要的总能量应为

- A.450kcal
- B.500kcal
- C.550kcal
- D.660kcal
- E.600kcal

124、（A3/A4 型选择题）6 个月健康小儿，体重为 6 kg，用牛奶人工喂养。现在该小儿可以添加的辅食,除外

- A.菠菜泥
- B.白菜泥
- C.米粉
- D.苹果泥
- E.肉末

125、（A3/A4 型选择题）患儿，7 岁，眼睑及双下肢明显水肿，少尿 1 周。查体:精神状态尚可，眼睑水肿，双下肢呈凹陷性水肿，血压 90/60mmHg，心肺正常。尿常规:蛋白（+++），红细胞 0~3/HP。血浆总蛋白 45g/L，白蛋白

22g/L, 抗“O”正常, C3 补体正常, 胆固醇 11.2mmol/L;肌酐 46 $\mu$ mol/L。尿素氮 1.56mmol/L。胸片示:少许胸腔积液。该患儿最可能的诊断为

- A.急性肾炎
- B.急进性肾病
- C.肾炎性肾病
- D.单纯性肾病
- E.病毒性肾病

126、(A3/A4 型选择题) 患儿, 7 岁, 眼睑及双下肢明显水肿, 少尿 1 周。查体:精神状态尚可, 眼睑水肿, 双下肢呈凹陷性水肿, 血压 90/60mmHg, 心肺正常。尿常规:蛋白(+++), 红细胞 0~3/HP。血浆总蛋白 45g/L, 白蛋白 22g/L, 抗“O”正常, C3 补体正常, 胆固醇 11.2mmol/L;肌酐 46 $\mu$ mol/L。尿素氮 1.56mmol/L。胸片示:少许胸腔积液。该患儿病理性类型最可能为

- A.膜性肾病
- B.系膜增生性
- C.局灶性阶段性肾小球硬化
- D.微小病变型
- E.膜性增生性肾炎

127、（A3/A4 型选择题）3 岁男孩，生后即发现有青紫现象，久站喜蹲踞，心脏听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及Ⅱ级喷射性杂音，肺动脉第二心音减低。该患儿最可能的诊断是

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 肺动脉狭窄
- E. 法洛四联症

128、（A3/A4 型选择题）3 岁男孩，生后即发现有青紫现象，久站喜蹲踞，心脏听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及Ⅱ级喷射性杂音，肺动脉第二心音减低。一般首选哪项检查以进一步明确诊断

- A. 心电图
- B. 胸部 X 线检查
- C. 磁共振成像
- D. 心血管造影
- E. 多普勒彩色血流显像

129、（A3/A4 型选择题）3 岁男孩，生后即发现有青紫现象，久站喜蹲

踞，心脏听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及Ⅱ级喷射性杂音，肺动脉第二心音减低。如行胸部 X 线检查，最可能的改变是

- A.右房、右室大，肺动脉段凸出，肺野充血
- B.左房、左室大，肺动脉段凹陷，肺野充血
- C.左室、右室大，肺动脉段凸出，肺野充血
- D.右室大，肺动脉段凹陷，肺野清晰
- E.右室大，肺动脉段凸出，肺野清晰

130、（A3/A4 型选择题）3 岁男孩，生后即发现有青紫现象，久站喜蹲踞，心脏听诊可在胸骨左缘第 2 肋间闻及Ⅱ级喷射性杂音，肺动脉第二心音减低。若患儿突发偏瘫，检查血常规示白细胞  $12.6 \times 10^9/L$ ，红细胞  $5.7 \times 10^{12}/L$ ，则可能并发了

- A.亚急性细菌性心内膜炎
- B.脑积水
- C.病毒性脑炎
- D.脑脓肿、脑栓塞
- E.艾森门格综合征

131、（A3/A4 型选择题）经产妇，45 岁。近 6 年痛经并逐渐加重，伴经量

增多及经期延长，需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕 12 周，质硬，有压痛，血红蛋白 75g/L。痛经逐渐加重的原因，最可能的是

- A. 功能性痛经
- B. 子宫腺肌病
- C. 子宫内膜结核
- D. 子宫黏膜下肌瘤
- E. 子宫肌瘤

132、（A3/A4 型选择题）经产妇，45 岁。近 6 年痛经并逐渐加重，伴经量增多及经期延长，需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕 12 周，质硬，有压痛，血红蛋白 75g/L。最需要的辅助检查是

- A. 诊断刮宫
- B. 子宫输卵管碘油造影
- C. 输卵管通液术
- D. 宫腔镜检查
- E. B 超检查

133、（A3/A4 型选择题）经产妇，45 岁。近 6 年痛经并逐渐加重，伴经量增多及经期延长，需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕 12 周，质硬，有压痛，

血红蛋白 75g/L。本例确诊后的处置应选择

- A.镇痛药物治疗
- B.雌激素治疗
- C.手术治疗
- D.化学药物治疗
- E.放射治疗

134、（A3/A4 型选择题）10 个月女婴，不能独坐，尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动，经常便秘，进食少。查体:表情呆板，前囟未闭，头大，颈短，眼距宽，眼睑水肿，舌大常伸出口外，头发稀少，心率 86 次/分，心音稍低钝，腹部膨隆，腹胀明显。该患儿最可能的诊断是

- A.佝偻病
- B.先天愚型
- C.先天性甲状腺功能减低症
- D.先天性巨结肠
- E.黏多糖病

135、（A3/A4 型选择题）10 个月女婴，不能独坐，尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动，经常便秘，进食少。查体:表情呆板，前囟未闭，头大，颈

短，眼距宽，眼睑水肿，舌大常伸出口外，头发稀少，心率 86 次/分，心音稍低钝，腹部膨隆，腹胀明显。应进行何项检查以明确诊断

A.血钙、磷及碱性磷酸酶测定

B.染色体检查

C.腹部 B 超

D.骨骼 X 线片

E.血 T3、T4、TSH

136、（A3/A4 型选择题）10 个月女婴，不能独坐，尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动，经常便秘，进食少。查体：表情呆板，前囟未闭，头大，颈短，眼距宽，眼睑水肿，舌大常伸出口外，头发稀少，心率 86 次/分，心音稍低钝，腹部膨隆，腹胀明显。该患儿的治疗药物首选

A.维生素 D

B.钙剂

C.特殊饮食疗法

D.甲状腺素

E.胃肠动力药

137、（A3/A4 型选择题）50 岁女性，孕 5 产 5，绝经 3 年，阴道不规则流

血 1 个月。妇科检查:外阴阴道正常, 宫颈肥大、糜烂、触之易出血, 子宫后屈、稍大, 双侧附件未见异常。该患者绝经后最可能的出血原因是

- A. 子宫颈炎
- B. 子宫内膜炎
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫颈尖锐湿疣
- E. 子宫颈癌

138、(A3/A4 型选择题) 50 岁女性, 孕 5 产 5, 绝经 3 年, 阴道不规则流血 1 个月。妇科检查:外阴阴道正常, 宫颈肥大、糜烂、触之易出血, 子宫后屈、稍大, 双侧附件未见异常。进一步确诊时需做

- A. B 型超声检查
- B. 宫颈涂片细胞学检查
- C. 子宫颈碘试验
- D. 宫颈活组织检查
- E. 阴道镜检查

139、(A3/A4 型选择题) 50 岁女性, 孕 5 产 5, 绝经 3 年, 阴道不规则流血 1 个月。妇科检查:外阴阴道正常, 宫颈肥大、糜烂、触之易出血, 子宫后

屈、稍大，双侧附件未见异常。若以上检查未发现可疑病灶，下一步最恰当的处理是

- A. 子宫镜+子宫内膜活检
- B. 分段刮宫
- C. 宫颈激光
- D. 宫颈锥切术
- E. 3~6 个月后复查

140、（A3/A4 型选择题）患者，女,63 岁，绝经 13 年，近 3 个月阴道出血 2 次，每次持续 4 天，妇科检查:外阴、阴道无萎缩，宫颈光滑，子宫前位，正常大小，右侧附件区 10cm×5cm×3cm 肿物，质地中等，光滑、实性，活动良好，无腹水，全身淋巴结无转移。最可能的诊断为

- A. 子宫内膜癌
- B. 卵巢畸胎瘤
- C. 卵巢颗粒细胞瘤
- D. 卵巢无性细胞瘤
- E. 卵巢睾丸母细胞瘤

141、（A3/A4 型选择题）患者，女,63 岁，绝经 13 年，近 3 个月阴道出血

2次，每次持续4天，妇科检查：外阴、阴道无萎缩，宫颈光滑，子宫前位，正常大小，右侧附件区10cm×5cm×3cm肿物，质地中等，光滑、实性，活动良好，无腹水，全身淋巴结无转移。可能有变化的肿瘤标记物是

- A.β-hCG
- B.CA125
- C.性激素
- D.AFP
- E.CA19-9

142、（A3/A4型选择题）患者，女，63岁，绝经13年，近3个月阴道出血2次，每次持续4天，妇科检查：外阴、阴道无萎缩，宫颈光滑，子宫前位，正常大小，右侧附件区10cm×5cm×3cm肿物，质地中等，光滑、实性，活动良好，无腹水，全身淋巴结无转移。辅助治疗应加用

- A.孕激素治疗
- B.放疗
- C.雌激素治疗
- D.化疗
- E.雄激素治疗

143、（A3/A4 型选择题）男性,63 岁,尿频,排尿迟缓 4 年,间歇肉眼血尿 1 年。B 超检查可见膀胱壁毛糙,可见 1.5cm×2.0cm×2.0cm 大小强回声光团伴声影,前列腺 4.2cm×4.0cm×5.0cm 大小,残余尿 100ml。该患者主要的诊断是

- A.前列腺增生
- B.前列腺增生合并膀胱血块
- C.膀胱肿瘤
- D.慢性膀胱炎合并膀胱结石
- E.前列腺增生合并膀胱结石

144、（A3/A4 型选择题）男性,63 岁,尿频,排尿迟缓 4 年,间歇肉眼血尿 1 年。B 超检查可见膀胱壁毛糙,可见 1.5cm×2.0cm×2.0cm 大小强回声光团伴声影,前列腺 4.2cm×4.0cm×5.0cm 大小,残余尿 100ml。该患者宜采用下列哪种治疗

- A.膀胱切开取石术
- B.抗感染
- C.膀胱肿瘤电切术
- D.膀胱内碎石术
- E.前列腺电切术及膀胱碎石术

145、（A3/A4 型选择题）男性,63 岁,尿频,排尿迟缓 4 年,间歇肉眼血尿 1 年。B 超检查可见膀胱壁毛糙,可见 1.5cm×2.0cm×2.0cm 大小强回声光团伴声影,前列腺 4.2cm×4.0cm×5.0cm 大小,残余尿 100ml。膀胱结石的典型症状是

- A.肉眼血尿
- B.排尿中断
- C.中药排石
- D.会阴部下坠感
- E.剧烈腰痛

146、（A3/A4 型选择题）男性,63 岁,尿频,排尿迟缓 4 年,间歇肉眼血尿 1 年。B 超检查可见膀胱壁毛糙,可见 1.5cm×2.0cm×2.0cm 大小强回声光团伴声影,前列腺 4.2cm×4.0cm×5.0cm 大小,残余尿 100ml。诊断膀胱结石最可靠的方法是

- A.有尿线中断史
- B.膀胱刺激症状
- C.B 超检查
- D.膀胱区平片检查
- E.直肠指检

147、（A3/A4 型选择题）患者，女，32 岁，停经 35 天，以突发左下腹撕裂样痛 1 小时就诊，现腹痛渐加重，发冷，BP80/40mmHg，P120 次/分，全腹压痛、反跳痛阳性，移动浊音阳性。妇科检查：宫颈举痛，子宫稍大、软，漂浮感，双附件区压痛，左侧明显，未触及包块。最简便又最能帮助迅速确立诊断的检查方法是

- A. B 型超声
- B. 妊娠试验
- C. 腹腔镜检查
- D. 后穹窿穿刺
- E. 诊断性刮宫

148、（A3/A4 型选择题）患者，女，32 岁，停经 35 天，以突发左下腹撕裂样痛 1 小时就诊，现腹痛渐加重，发冷，BP80/40mmHg，P120 次/分，全腹压痛、反跳痛阳性，移动浊音阳性。妇科检查：宫颈举痛，子宫稍大、软，漂浮感，双附件区压痛，左侧明显，未触及包块。此患者最可能的诊断是

- A. 流产合并感染
- B. 急性输卵管炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 输卵管妊娠破裂

## E.完全流产

149、（A3/A4 型选择题）患者，女，32 岁，停经 35 天，以突发左下腹撕裂样痛 1 小时就诊，现腹痛渐加重，发冷，BP80/40mmHg，P120 次/分，全腹压痛、反跳痛阳性，移动浊音阳性。妇科检查:宫颈举痛，子宫稍大、软，漂浮感，双附件区压痛，左侧明显，未触及包块。对于该患者，最恰当的处理方法是

- A.纠正休克后手术
- B.纠正休克同时手术
- C.立即进行开腹探查
- D.输血
- E.中药活血化瘀治疗

150、（A3/A4 型选择题）患者，女，32 岁，停经 35 天，以突发左下腹撕裂样痛 1 小时就诊，现腹痛渐加重，发冷，BP80/40mmHg，P120 次/分，全腹压痛、反跳痛阳性，移动浊音阳性。妇科检查:宫颈举痛，子宫稍大、软，漂浮感，双附件区压痛，左侧明显，未触及包块。若该患者行保守手术，术后 12 日血 HCG 未下降，再次出现出血，腹痛。考虑是什么原因

- A.腹部炎症
- B.术后出血

C.持续异位妊娠

D.卵巢囊肿

E.绒毛膜癌



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 答案

1、正确答案：E

答案解析：骨肉瘤的治疗是以手术为主的综合治疗，即术前化疗+手术+术后化疗。

2、正确答案：D

答案解析：

3、正确答案：A

答案解析：肾挫伤仅限于部分肾实质，形成肾瘀斑和被膜下血肿，损伤涉及集合系统时可有少量血尿，肾裂伤，如肾盂肾盏黏膜破裂，则可有明显的血尿，故选 A

4、正确答案：A

答案解析：解析：急性血源性骨髓炎多发生于儿童及青少年，以胫骨上段和股骨下段最多见，其次为肱骨与髌骨，脊柱与其他四肢骨骼都可以发病，肋骨和颅骨少见。故选 A。

5、正确答案：E

答案解析：

6、正确答案：C

答案解析：解析：受精后第 6 日受精卵滋养层形成时，开始分泌微量 hCG。着床后用特异  $\beta$ -hCG 抗血清能在母血中检测出 hCG。于妊娠早期分泌量增加很快，约 2 日增长 1 倍，至妊娠 8~10 周血清浓度达最高峰，为 50~100kU/L，持续 10 日左右迅速下降，至妊娠中晚期血清浓度仅为峰值的 10%，持续至分娩。分娩后若无胎盘残留，于产后 2 周消失。

7、正确答案：A

答案解析：记忆

8、正确答案：E

答案解析：记忆

9、正确答案：A

答案解析：理解记忆

10、正确答案：A

答案解析：前列腺增生症最为典型和显著的表现之一就是排尿困难,患者开始排尿时延缓,排尿的射程延长

11、正确答案：E

答案解析：理解记忆

12、正确答案：D

答案解析：子宫内壁表面 2/3 能发生周期性变化称功能层，从青春期开始功能层内膜受卵巢激素的影响发生周期性变化剥脱出血形成月经

13、正确答案：B

答案解析：理解记忆

14、正确答案：A

答案解析：

15、正确答案：C

答案解析：

16、正确答案：E

答案解析：

17、正确答案：E

答案解析：解析：主韧带防止下垂，阔韧带防止往两边倒，圆韧带和骶韧带保持前倾

18、正确答案：D

答案解析：受精后第6~7日，晚期胚泡透明带消失后逐渐埋入并被子宫内膜覆盖的过程，称受精卵着床。

19、正确答案：D

答案解析：早期出现一侧瞳孔散大是小脑幕切迹疝的临床特点,而且是它和枕骨大孔疝的鉴别点之一。

20、正确答案：E

答案解析：癌症最有帮助的就是组织穿刺活检

21、正确答案：E

答案解析：解析：输血传播的疾病，最常见而严重的是输血引起的肝炎，主要有乙型肝炎和丙型肝炎。艾滋病、疟疾、梅毒、巨细胞病毒感染、黑热病、回归热和布氏杆菌病等，均可通过输血传播。单纯疱疹病毒不通过血液传播。

22、正确答案：E

答案解析：解析：并发症包括：蒂扭转为常见的妇科急腹症，约10%卵巢肿瘤可发生蒂扭转；破裂，约3%卵巢肿瘤会发生破裂；感染，较少见，多继发

于肿瘤扭转或破裂；恶变肿瘤迅速生长尤其双侧性，应考虑有恶变可能，诊断后应尽早手术；钙化。

23、正确答案：C

答案解析：理解记忆

24、正确答案：D

答案解析：解析:根治性肾切除术是肾癌最主要的治疗方法；。

25、正确答案：E

答案解析：浸润非特殊型癌包括浸润性小叶癌、浸润导管癌、单纯癌、髓样癌、硬癌和腺癌。分化低，预后较差，是乳腺癌最常见的类型，占 80%。

26、正确答案：E

答案解析：解析:分泌期与增生期内膜交替出现；。

27、正确答案：C

答案解析：

28、正确答案：E

答案解析：理解记忆

29、正确答案：D

答案解析：

30、正确答案：D

答案解析：

31、正确答案：C

答案解析：

32、正确答案：E

答案解析：

33、正确答案：D

答案解析：妊娠时血液总量增加约 30~40%，尤其是妊娠 32~34 周达最高峰，此时心脏负担亦最重。

34、正确答案：D

答案解析：

35、正确答案：E

答案解析：记忆

36、正确答案：E

答案解析：解析：根据心脏代偿功能、病因、病变范围等考虑能否妊娠。

心功能 I、II 级者，一般可以妊娠；心功能 III 级以上或有心衰史，均不适宜妊娠。

37、正确答案：E

答案解析：

38、正确答案：E

答案解析：

39、正确答案：E

答案解析：

40、正确答案：E

答案解析：记忆

41、正确答案：E

答案解析：；解析：中央型和部分型前置胎盘终止妊娠应行剖宫产。

42、正确答案：E

答案解析：

43、正确答案：E

答案解析：病理性缩复环是先兆子宫破裂的特征性体征

44、正确答案：D

答案解析：记忆

45、正确答案：A

答案解析：解析：部分性葡萄胎核型常是三倍体，80%为（69，XXY），其余是（69，XXX）或（69，XYY），来自一个正常卵子与双精子受精，由此带来一套多余的父方染色体成分；也可由于一个正常的单倍体卵子（或精子）与减数分裂失败的二倍体配子结合所致。

46、正确答案：E

答案解析：

47、正确答案：E

答案解析：记忆理解

48、正确答案：C

答案解析：解析：肝素钠在羊水栓塞出现 DIC 时,用于治疗羊水栓塞早期的高凝状态,尤其在发病后 10 分钟内使用效果更佳。

49、正确答案：E

答案解析：

50、正确答案：D

答案解析：子宫肌瘤红色变性多发生于妊娠中期，以浆膜下肌瘤为常见，肉眼见肌瘤剖面呈暗红色，无光泽，质软如变质的牛肉。

51、正确答案：D

答案解析：解析：转移性滋养细胞肿瘤：大多为绒癌，主要经血行播散。最常见的转移部位是肺（80%），其次是阴道、盆腔、脑和肝等。

52、正确答案：E

答案解析：

53、正确答案：D

答案解析：

54、正确答案：E

答案解析：

55、正确答案：D

答案解析：解析：支气管淋巴结核当胸内淋巴结高度肿大时，可产生一系列压迫症状：压迫气管分叉处可出现类似百日咳样痉挛性咳嗽，压迫支气管使其部分阻塞时可引起喘鸣，压迫喉返神经可致声嘶；压迫静脉可致胸部一侧或双侧静脉怒张。

56、正确答案：E

答案解析：理解记忆

57、正确答案：D

答案解析：

58、正确答案：C

答案解析：记忆

59、正确答案：E

答案解析：记忆

60、正确答案：D

答案解析：解析：轮状病毒主要引起小肠黏膜代谢紊乱引起腹泻，不引起肠黏膜损伤。

61、正确答案：C

答案解析：肾病综合征临床具有四大特点：①大量蛋白尿，24小时尿蛋白总量超过3.5g/d；②低白蛋白血症，血清白蛋白小于30g/L；③高脂血症；④水肿。其中前两项为必备的条件，大量蛋白尿为本病的最基本特征。

62、正确答案：E

答案解析：

63、正确答案：E

答案解析：记忆

64、正确答案：D

答案解析：

65、正确答案：E

答案解析：妊娠满 28 周至 37 周间分娩者称为早产,此时娩出的新生儿称为早产儿。

66、正确答案：D

答案解析：新生儿溶血病是指：母婴血型不合时，母体血液中的 IgG 免疫抗体通过胎盘进入胎儿血液循环，引起的同组被动免疫性溶血性疾病。其中以 ABO 血型不合最为常见，约占 83%，而新生儿 ABO 溶血病又常发生于母亲血型为“O”型、婴儿血型为“A”或“B”型这一特定人群中。

67、正确答案：E

答案解析：解析：选 E，生后 24 小时出现黄疸，首先考虑病理性黄疸。败血症一般表现为生理性黄疸延长或加重。新生儿肝炎生后 1~3 周出现黄疸或更晚。胆道闭锁一般生后 2 周出现黄疸。新生儿溶血病轻型者，出生时与正常新生儿无异，1~2 天后逐渐出现黄疸和贫血、程度日益加深，或稍有嗜睡拒食，这种病例甚易误诊为生理性黄疸。

68、正确答案：D

答案解析：

69、正确答案：E

答案解析：

70、正确答案：C

答案解析：解析：左向右分流的先天性心脏病，血液从左向右分流，肺循环充血，故易反复发生呼吸道感染及支气管肺炎。

71、正确答案：D

答案解析：解析：围生期是指产前、产时和产后的一段时间。目前我国采用的围生期是指孕满 28 周至出生后 1 周。

72、正确答案：C

答案解析：解析：室间隔缺损是小儿先天性心脏病中最常见的类型。在小儿各类先天性心血管畸形的发病率中居第一位，男多于女。法洛三联症是在 1 岁以后存活的婴幼儿中最常见的青紫型先天性心脏病，约占所有先天性心脏病的 10%。

73、正确答案：E

答案解析：解析：1.甲类传染病是指：鼠疫、霍乱。2.乙类传染病是指：传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血热、狂犬病、流行性乙型脑炎、登革热、炭疽、细菌性

和阿米巴性痢疾、肺结核、伤寒和副伤寒、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生儿破伤风、猩红热、布鲁氏菌病、淋病、梅毒、钩端螺旋体病、血吸虫病、疟疾。

74、正确答案：E

答案解析：解析:胎儿通过胎盘从母体获得的免疫球蛋白是 IgG。

75、正确答案：C

答案解析：

76、正确答案：D

答案解析：

77、正确答案：C

答案解析：

78、正确答案：C

答案解析：

79、正确答案：E

答案解析：

80、正确答案：D

答案解析：

81、正确答案：C

答案解析：

82、正确答案：E

答案解析：

83、正确答案：D

答案解析：

84、正确答案：D

答案解析：解析：该患者有短期停经史，阴道不规则流血，突发右下腹剧烈疼痛；右下腹压痛反跳痛，有休克表现；妇科检查：后穹窿饱满，宫颈举痛(+)，宫口闭，子宫正常大小，呈飘浮感。符合输卵管妊娠表现。

85、正确答案：C

答案解析：

86、正确答案：E

答案解析：

87、正确答案：E

答案解析：

88、正确答案：D

答案解析：

89、正确答案：E

答案解析：

90、正确答案：E

答案解析：

91、正确答案：D

答案解析：

92、正确答案：E

答案解析：

93、正确答案：D

答案解析：

94、正确答案：C

答案解析：

95、正确答案：D

答案解析：

96、正确答案：E

答案解析：

97、正确答案：D

答案解析：

98、正确答案：D

答案解析：解析：患者有甲状腺功能亢进症状，如怀疑是由卵巢肿瘤引起，应为高度特异性畸胎瘤的卵巢甲状腺肿，分泌甲状腺激素，可引起甲状腺功能亢进。

99、正确答案：D

答案解析：

100、正确答案：D

答案解析：

101、正确答案：C

答案解析：

102、正确答案：E

答案解析：

103、正确答案：A

答案解析：

104、正确答案：C

答案解析：

105、正确答案：B

答案解析：

106、正确答案：A

答案解析：

107、正确答案：D

答案解析：

108、正确答案：C

答案解析：

109、正确答案：E

答案解析：

110、正确答案：D

答案解析：

111、正确答案：E

答案解析：

112、正确答案：A

答案解析：

113、正确答案：C

答案解析：

114、正确答案：A

答案解析：

115、正确答案：E

答案解析：

116、正确答案：E

答案解析：

117、正确答案：A

答案解析：

118、正确答案：C

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：A

答案解析：

121、正确答案：D

答案解析：

122、正确答案：E

答案解析：

123、正确答案：E

答案解析：

124、正确答案：E

答案解析：

125、正确答案：D

答案解析：

126、正确答案：D

答案解析：

127、正确答案：E

答案解析：

128、正确答案：E

答案解析：

129、正确答案：D

答案解析：

130、正确答案：D

答案解析：

131、正确答案：E

答案解析：

132、正确答案：E

答案解析：

133、正确答案：C

答案解析：

134、正确答案：C

答案解析：

135、正确答案：E

答案解析：

136、正确答案：D

答案解析：

137、正确答案：E

答案解析：

138、正确答案：D

答案解析：

139、正确答案：B

答案解析：

140、正确答案：C

答案解析：

141、正确答案：C

答案解析：

142、正确答案：D

答案解析：

143、正确答案：E

答案解析：

144、正确答案：E

答案解析：

145、正确答案：B

答案解析：

146、正确答案：C

答案解析：

147、正确答案：D

答案解析：

148、正确答案：D

答案解析：

149、正确答案：B

答案解析：

150、正确答案：C

答案解析：

