



金英杰直播学院

中西医专业

中西医妇科

高频 100 考点

整理教辅:茯苓



1. 骨盆的骨骼包括骶骨、尾骨及左右两块髌骨。
 2. 骨盆的关节包括耻骨联合、低髻关节和骶尾关节。
 3. 骶棘韧带宽度即坐骨切迹宽度,是判断中骨盆是否狭窄的重要标志。
 4. 骨盆腔前壁为耻骨联合、耻骨支,后壁为骶骨与尾骨,两侧壁为坐骨坐骨棘、骶棘韧带。
 5. 女型骨盆入口呈横椭圆形,最多见。
 6. 大阴唇皮下为疏松结缔组织和脂肪组织,含丰富的血管、淋巴管和神经,外伤后易形成血肿。
 7. 在正常情况下不能触及前庭大腺,若腺管口闭塞,易形成脓肿或囊肿。
 8. 子宫位于骨盆腔中央,前方为膀胱,后方为直肠,呈倒置的梨形,为空腔器官,约重 50g,长 7~8 cm,宽 4~5 cm,厚 2~3 cm,容量约有 5 mL。
 9. 宫腔为上宽下窄的三角形。在宫体与宫颈之间形成最狭窄的部分称为子宫峡部。
 10. 子宫韧带有圆韧带、阔韧带、主韧带和宫骶韧带 4 对韧带,其作用是与骨盆底肌及筋膜共同维持子宫的正常位置。
- JINTINGJIELOM
11. 宫体壁由外向内分为浆膜层(即脏层腹膜)、肌层和子宫内膜层。
 12. 输卵管为一对细长而弯曲的管状器官,内侧与宫角相连,外端游离,长 8~14cm。可分为间质部峡部、壶腹部伞部 4 部分。
 13. 输卵管伞部有“拾卵”作用。
 14. 输卵管壁由浆膜层、平滑肌层和黏膜层组成。
 15. 子宫又称为女子胞、胞宫、胞脏、子脏、子处、血室。中医认为,子宫具有主行月经孕育

胎儿的功能。

16.阴道又称子肠、产道，宫颈外口被称为子门、子户。子门是排出月经和娩出胎儿的关口。

17.女性内、外生殖器官的血液供应主要来自卵巢动脉、子宫动脉、阴道动脉和阴部内动脉。

18.外生殖器官主要由阴部神经支配,内生殖器官主要由交感神经与副交感神经支配。

19.初潮年龄多在 13~14 岁之间,可提前或延迟 2 岁。

20.月经血一般呈暗红色,不凝,出血多时可有血凝块。

21.月经一个月经周期,一般是 21~35 日,平均 28 日。每次月经持续天数称经期,一般为 2~7 日,多为 3~5 日。

22.卵巢合成及分泌的性激素主要有雌激素、孕激素和少量雄激素。

23.子宫内膜分为基底层和功能层。基底层不受卵巢激素周期性变化的影响,在月经期不发生脱落;功能层由基底层再生而来,受卵巢性激素的影响呈现周期性变化,若未受孕功能层则坏死脱落形成月经。

24.妇女身体无特殊不适而定期两个月来潮一次者,称为“并月”;三个月一潮者称为“居经”,亦名“季经”;一年一行者称为“避年”;终生不潮而能受孕者称为“暗经”。

25.生理性带下是润泽于阴户和阴道的无色透明、黏而不稠、无特殊气味的液体。有时略呈白色,也称白带。

26.受精发生在排卵后 12 小时内,整个受精过程约需 24 小时。受精后第 6~7 日受精卵着床。

27.胎儿附属物是指胎儿以外的组织,包括胎盘、胎膜、脐带和羊水。

28.妊娠早期的羊水主要是母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液。妊娠中期的羊水主要

来自胎儿尿液。妊娠晚期胎肺参与羊水的生成。

29.若妊娠期间羊水量超过 2000mL 称为羊水过多,妊娠晚期羊水量少于 300mL 者称羊水过少。

30.胎盘内进行物质交换的部位主要是血管合体膜。

31. 自孕 13 周起平均每周体重增加不超过 350g,直至孕足月时体重约增加 12.5kg。

32. B 型超声检查是检查早期妊娠快速而准确的方法。

33.预产期推算:从末次月经第 - - 日算起,月份减 3 或加 9,日数加 7(农历日数加 14)。

34.'髌棘间径:孕妇取伸腿仰卧位,测量两髌前上棘外缘的距离。正常值为 23~26cm。

35.B 型超声检查妊娠第 5 周即可见到妊娠囊;超声多普勒法最早在妊娠第 7 周能探测到胎心音。

36.胎心率- -过性变化是判断胎儿安危的重要指标。

37.枕颈径:又称大斜径,颈椎下方中央至后凶顶部之间的距离,是胎头最大径线,足月胎儿平均值约 13.3 cm。

38.在临产前 24~48 小时,因宫颈内口附近的胎膜与该处的子宫壁分离,毛细血管破裂经阴道排出少许血液,与宫颈黏液相混排出,称见红,是分娩即将开始比较可靠的征象。

39.临产调护《达生编》提出了“睡、忍痛、慢临盆”的临产调护六字要诀。

40.冲、任、督、带损伤和胞宫、胞脉、胞络受损,是妇产科疾病的基本病机和最终病位,是妇

产科疾病与其他科疾病相区别的重要病机。

41.产后病的辨证应注重“产后三审”,即- -审小腹痛与不痛,以辨恶露有无停滞;二审大便通与不通,以验津液之盛衰;三审乳汁与饮食多少,以察胃气的强弱。

42.补肾益气适用于肾气不足引起的月经失调、崩漏、闭经、先兆流产、滑胎、子宫脱垂等。

代表方如寿胎丸补肾固冲丸。

43.滋肾益阴适用于肾阴不足或肾精亏损所致的月经失调、绝经综合征、先兆流产、不孕症。代表方剂如六味地黄丸、左归丸、养精种玉汤等。

44.疏肝解郁适用于肝郁气滞,疏泄失常导致的月经失调、痛经、闭经、经行乳房胀痛、妊娠腹痛、妊娠肿胀、妊娠期高血压疾病、缺乳、不孕症等。

45.养血柔肝适用于肝阴不足,肝血衰少引起的月经失调、闭经、绝经前后诸证等。

46.健脾益气适用于脾胃虚弱,化源不足,血海不盈所致的月经后期、月经过少、闭经、胎漏胎动不安、胎萎不长、胎死腹中、缺乳等。代表方剂如四君子汤等。

47.妊娠剧吐主要发病机理是冲气上逆,胃失和降。病因病机有脾胃虚弱、肝胃不和。

48.妊娠剧吐以调气和中,降逆止呕为大法。用药时需照顾胎元,如有胎元不固,酌加安胎之品。

49.妊娠不足 28 周,胎儿体重少于 1000g 而终止者称流产。其中发生在妊娠 12 周前者称早期流产;发生于妊娠 12~28 周者称晚期流产。

50.妊娠 12 周内胚胎自然殒堕者,称“堕胎”。妊娠 12~28 周内胎儿已成形而自然殒堕者,称为“小产”或“半产”。

51.先兆流产指妊娠 28 周前出现少量阴道流血,下腹痛或腰背痛。

52.连续 3 次或 3 次以上自然流产者称为习惯性流产。每次流产往往发生于同一妊娠月份,其流产过程与一般流产相同,中医称“滑胎”。

53.引起胎漏、胎动不安的常见病因病机有肾虚、气血虚弱、血热和血瘀,若病势进一步发展,可引起堕胎、小产。

54.导致滑胎的病因病机主要有肾虚和气血虚弱。

55.输卵管妊娠流产多见于输卵管壶腹部妊娠,一般发生在 8~12 周。

56. 输卵管妊娠破裂多见于峡部妊娠, 一般发生在 6~8 周。
57. 血 β -hCG 测定是早期诊断异位妊娠的重要方法。
58. 前置胎盘是指妊娠 28 周后, 胎盘附着于子宫下段, 甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口, 其位置低于胎先露部。是妊娠期严重的并发症, 是妊娠晚期阴道流血的主要原因。
59. 胎盘早剥是指妊娠 20 周后或分娩期正常位置的胎盘在胎儿娩出前部分或全部从子宫壁剥离。本病是妊娠晚期严重的并发症。
60. 胎盘早剥常见并发症: ①弥散性血管内凝血(DIC); ②产后出血; ③急性肾衰竭; ④胎儿宫内死亡; ⑤孕妇休克。
61. 围生儿死亡率是正常妊娠的 2~3 倍。
62. 尿路感染又称泌尿系感染, 是妊娠常见的合并症, 可造成早产、败血症, 甚至诱发急性肾功能衰竭。其中以急性肾盂肾炎最常见。本病属中医“子淋”范畴。
63. 出口横径加后矢状径 <15 cm, 足月胎儿不能经阴道分娩, 需行剖宫产。
64. 胎位异常包括: 胎头位置异常臀先露, 肩先露, 复合先露。
65. 胎动 <10 次/12 h 为胎动减少, 是胎儿缺氧的重要表现。
66. 急性胎儿窘迫应左侧卧位, 吸氧, 纠正脱水、酸中毒及电解质紊乱。
67. 产后出血指胎儿娩出后 24 小时内失血量超过 500mL, 居我国孕产妇死亡原因的首位。
68. 产后出血病因有子宫收缩乏力、胎盘因素、软产道裂伤和凝血功能障碍。其中子宫收缩乏力是最常见的。
69. 先兆子宫破裂临床表现是病理缩复环、下腹部压痛、胎心率的变化及血尿。
70. 子宫破裂临床表现: 在先兆子宫破裂的基础上突然发生剧烈腹痛, 有休克及明显的腹部体征。
71. 一旦发生羊水栓塞, 应立即抢救。早期阶段以抗过敏, 纠正呼吸循环功能衰竭和改善

低氧血症、抗休克为主。

72.产后三冲是指产后败血.上冲,冲心、冲胃、冲肺。

73.产后三急指产后呕吐、盗汗、泄泻,三者并见必危。

74.产后三病指产后病痉、病郁冒、大便难。

75.产后病的治疗原则为“勿拘于产后,亦勿忘于产后”的原则

76.产后用药“三禁”,即禁大汗,以防亡阳;禁峻下,以防亡阴;禁通利小便,以防亡津液。

77.晚期产后出血是指分娩 24 小时后,在产褥期内发生的子宫大量出血。以产后 1~2 周发病最常见。

78.产褥感染是指分娩及产褥期生殖道受病原体侵袭而引起局部或全身感染。是导致孕产妇死亡的四大原因(产褥感染、产科出血、妊娠合并心脏病、子痫)之一。

79.产褥感染选择抗生素是首选青霉素类和头孢类药物,同时加用甲硝唑,青霉素过敏可选用林可霉素或红霉素。

80.产后缺乳常见病因病机是气血虚弱和肝郁气滞。

81.产后关节痛常见病因病机有血虚、血瘀和外感。

82.产后尿潴留的主要病机是膀胱气化不利。常见病因病机有气虚、肾虚、血瘀、气滞。

83.产后小便频数与失禁的主要病因病机气虚、肾虚。

84.外阴炎常见病因病机包括湿热下注、湿毒浸渍和肝肾阴虚。

85.滴虫阴道炎病原体为阴道毛滴虫引起。有直接传播间接传播、医源性传播。

86.外阴阴道假丝酵母菌病以假丝酵母菌为致病菌。感染途径为内源性传染、性交、衣物传染。

87.萎缩性阴道炎为卵巢功能减退,阴道上皮糖原减少,抵抗力下降,致病菌过度繁殖。

88.滴虫阴道炎的临床表现为白带多,呈灰黄色稀薄泡沫状。

- 89.急性宫颈炎多无症状或阴道分泌物增多呈黏液脓性,伴有外阴瘙痒及灼热感。
- 90.子宫脱垂分为 3 度 I 度:轻型,宫颈外口距处女膜缘 <4 cm,未达处女膜缘。重型,宫颈已达处女膜缘,阴道口可见宫颈。
- II 度:轻型,宫颈脱出阴道口,宫体仍在阴道内。重型,宫颈及部分宫体脱出阴道口,子宫颈及部分子宫体脱出于阴道口外。
- I 度:宫颈与宫体全部脱出于阴道口外。
- 91.月经病发生的主要机理是脏腑功能失常、气血失调,导致冲任二脉的损伤。
- 92.月经病治本大法有补肾健脾、疏肝、调理气血等,常以补肾健脾为要。
- 93.垂体泌乳素肿瘤以溴隐亭治疗为首选
- 94.内分泌性不孕的治疗,以氯米芬为首选促排卵药,适于体内有一定雌激素水平者。
- 95.宫颈癌的筛查应在 21 岁开始。对于年龄 70 岁的女性,如果宫颈结构完整 10 年内至少连续 3 次正规细胞学检查结果无异常可考虑终止筛查。
- 96.宫颈刮片细胞学检查是宫颈癌筛查的主要方法。
- 97.宫颈和宫颈管活组织检查为确诊宫颈癌及宫颈癌前病变的最可靠依据。
- 98.卵巢恶性肿瘤早期常无症状。晚期主要症状为腹胀、下腹肿块或腹水等。
- 99.手术治疗主要用于早期宫颈癌。
- 100.宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处是宫颈癌的好发部位。

