

临床执业医师资格考试同步真题之解剖学的运动系统

1. 骶管麻醉时，用以确定骶管裂孔的标志是

- A. 骶岬
- B. 骶正中嵴
- C. 骶粗隆
- D. 骶后孔
- E. 骶角

2. 膈的主动脉裂孔位置高度为

- A. 平第 8 胸椎
- B. 平第 9 胸椎
- C. 平第 10 胸椎
- D. 平第 11 胸椎
- E. 平第 12 胸椎

3. 可使肩关节外展的肌是

- A. 大圆肌
- B. 三角肌
- C. 小圆肌
- D. 肩胛下肌
- E. 冈下肌

4. 颏舌肌正确的是

- A. 是成对的舌内肌
- B. 两侧收缩可拉舌向后上

C. 单侧收缩，使伸舌时尖偏向对侧

D. 起于颏隆凸，止于舌两侧

E. 受舌神经支配

5. 鼻旁窦积液最不易引流的是

A. 额窦

B. 上颌窦

C. 蝶窦

D. 筛窦前中群

E. 筛窦后群

答案：

1. 【答案】E

【解析】本题测验体表标志，两侧髁角之间正对髁管裂孔，是临床髁管内麻醉进针标志。此外，胸骨角正对第二肋，是前面判断肋骨序数标志。肩胛下角正对第七肋，是后面判断肋骨序数标志。

2. 【答案】E

【解析】膈有三个裂孔，其中的主动脉裂孔平第12胸椎，食管裂孔平第10胸椎，腔静脉孔平第8胸椎。

3. 【答案】B

【解析】三角肌是肩关节强有力的展肌。背阔肌使肩关节内收、内旋、后伸。

4. 【答案】C

【解析】 颏舌肌属于成对的舌外肌，起于颏棘，止于舌中线两侧；两侧收缩拉舌向前；单侧收缩，使伸舌时尖偏向对侧；受舌下神经支配。

5. **【答案】** B

【解析】 上颌窦开口于中鼻道，开口位置高于窦底，故积液最不易引流。且临近上牙槽，故牙源性感染也容易侵犯上颌窦。