

# 中医妇科学

## 月经病

### 一、月经先期

月经提前 7 天以上——甚至 10 余日一行——连续两个周期以上

#### 证型

##### (1) 气虚证

脾气虚证——神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，纳少便溏——补中益气汤

肾气虚证——腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗或有暗斑——固阴煎

##### (2) 血热证

阳盛血热证——心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结——清经散

阴虚血热证——两颧潮红，手足心热，咽干口燥——两地汤

肝郁血热证——经行不畅，脉弦数——丹栀逍遥散



### 二、月经后期

月经周期错后 7 天以上——甚至 3~5 个月——连续出现 2 个周期以上

#### 证型

##### (1) 肾虚证——腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗或面部暗斑——当归地黄饮

##### (2) 血虚证——头晕眼花，心悸少寐，面色苍白或萎黄——大补元煎

##### (3) 血寒证

虚寒证——月经质清稀，小腹隐痛，喜暖喜按——温经汤（《金匮要略》）

实寒证——月经色暗有块，小腹冷痛拒按，得热痛减——温经汤（《妇人大全良方》）

##### (4) 气滞证——精神抑郁，胸胁乳房胀痛，脉弦——乌药汤

##### (5) 痰湿证——头晕体胖，心悸气短，脘闷恶心，带下量多——苍附导痰丸

### 三、月经先后无定期

月经周期或提前或延后 7 天以上——连续 3 个周期以上者

#### 证型

##### (1) 肝郁证——胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，嗳气食少——逍遥散

##### (2) 肾虚证——月经量少，质清，色淡暗，或腰骶酸痛，或头晕耳鸣——固阴煎

### 四、月经过多

经量较正常明显增多——周期基本正常——30~80ml 为适宜，超过 100ml 为月经过多

#### 证型

##### (1) 气虚证——神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，面色㿠白——举元煎

##### (2) 血热证——伴口渴心烦，尿黄便结——保阴煎加地榆、茜草

##### (3) 血瘀证——经行腹痛，或平时小腹胀痛——失笑散加益母草、三七、茜草

### 五、月经过少

月经周期正常——经量明显减少——或行经时间不足 2 天——甚或点滴即净者——少于 20ml 为月经过少。

#### 证型

##### (1) 肾虚证——腰膝酸软，头晕耳鸣，足跟痛——归肾丸

- (2) 血虚证——小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄——滋血汤
- (3) 血瘀证——小腹胀痛，排除血块后疼痛减轻，舌紫暗——桃红四物汤
- (4) 痰湿证——形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻——苍附导痰丸

## 六、经期延长

月经周期基本正常——行经时间超过 7 天以上——甚或淋沥半月方净者

### 证型

- (1) 气虚证——倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠，面色㿠白——举元煎加阿胶、炒艾叶、乌贼骨
- (2) 虚热证——咽干口燥，或潮热颧红，或手足心热——两地汤合二至丸
- (3) 血瘀证——经色紫暗，有块，经行小腹疼痛，拒按——桃红四物汤合失笑散加味

## 七、经间期出血

月经周期基本正常——在两次月经之间氤氲之时——发生周期性出血者

### 证型

- (1) 肾阴虚证——头晕腰酸，夜寐不宁，五心烦热，便艰尿黄——两地汤合二至丸或加减一阴煎
- (2) 脾气虚证——神疲体倦，气短懒言，食少腹胀——归脾汤
- (3) 湿热证——胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤——清肝止淋汤去阿胶、红枣，加小茴、茯苓
- (4) 血瘀证——月经色黑有块，少腹一侧或双侧胀痛或刺痛，情志抑郁，胸闷烦躁——逐瘀止血汤



## 八、崩漏

经血非时暴下不止或淋沥不尽——崩漏是经乱无期

### 证型

- (1) 脾虚证——面色㿠白，神疲气短，四肢不温，纳呆便溏——固本止崩汤
- (2) 肾虚证  
肾气虚证——面色晦暗，眼眶暗，小腹空坠，腰脊酸软——加减苁蓉菟丝子丸加党参、黄芪、阿胶  
肾阳虚证——面色晦暗，肢冷畏寒，腰膝酸软，小便清长，夜尿多——右归丸加党参、黄芪
- (3) 血热证  
虚热证——面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥——上下相资汤  
湿热证——口渴烦热，便秘溺黄——清热固经汤  
血瘀证——经色暗，有血块，小腹疼痛，舌质紫暗或尖边有瘀点——逐瘀止血汤

## 九、闭经

女子年逾 16 周岁，月经尚未来潮，或月经周期已建立后又中断 6 个月以上者。

### 证型

- (1) 气血亏虚证——神疲肢倦，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄——人参养荣汤

- (2) 肾气亏损证——腰腿酸软，头晕耳鸣，倦怠乏力，夜尿频多——加减苁蓉菟丝子丸加淫羊藿、紫河车
- (3) 阴虚血燥证——五心烦热，颧红唇干，盗汗甚至骨蒸劳热，干咳或咳嗽唾血——加减一阴煎加丹参、黄精、女贞子、制香附
- (4) 气滞血瘀证——乳房胀痛，精神抑郁，少腹胀痛拒按，烦躁易怒——学府逐瘀汤
- (5) 痰湿阻滞证——形体肥胖，胸闷泛恶，神疲倦怠，纳少，痰多——苍附导痰丸
- (6) 寒凝血瘀证——小腹冷痛拒按，得热则缓，形寒肢冷，面色青白——温经汤（《妇人大全良方》）

## 十、痛经

经期或经行前后——小腹疼痛或痛引腰骶

### 证型

- (1) 气滞血瘀证——乳房胀痛，胸闷不舒——膈下逐瘀汤
- (2) 寒凝血瘀证——面色青白，肢冷畏寒——少腹逐瘀汤
- (3) 湿热瘀阻证——带下量多，色黄质稠有臭味，小便黄赤，苔黄腻——清热调血汤加车前子、薏苡仁、败酱草或银甲丸
- (4) 气血虚弱证——面色无华，头晕心悸，神疲乏力——圣愈汤
- (5) 肾气亏损证——头晕耳鸣，面色晦暗，健忘失眠——益肾调经汤或调肝汤
- (6) 阳虚内寒证——小腹冷痛，得温则舒，经色暗淡，腰腿酸软，小便清长——温经汤（《金匮要略》）加附子、艾叶、小茴香

## 十一、经行乳房胀痛

行经前后，或正值经期——乳房作胀，或乳头胀痒疼痛——甚至不能触衣者

### 证型

- (1) 肝气郁结证——经行不畅，血色暗红，小腹胀痛，精神抑郁——柴胡疏肝散
- (2) 肝肾亏虚证——两目干涩，咽干口燥，五心烦热——一贯煎
- (3) 胃虚痰滞证——胸闷痰多，食少纳呆，带下量多，色白稠黏——四物汤合二陈汤去甘草

## 十二、经行头痛

经期或行经前后——出现头痛——经后辄止者

### 证型

- (1) 肝火旺——烦躁易怒，口苦咽干——羚角钩藤汤
- (2) 血瘀证——小腹疼痛拒按，胸闷不舒——通窍活血汤
- (3) 痰湿中阻证——形体肥胖，胸闷泛恶，带下多且黏腻——半夏白术天麻汤加葛根、丹参
- (4) 血虚证——心悸少寐，神疲乏力——八珍汤加首乌、蔓荆子

## 十三、经行感冒

经行前后或正值经期——出现感冒症状——经后逐渐缓解者

### 证型

- (1) 风寒证——恶寒、无汗、鼻流清涕，苔薄白，脉浮紧——荆穗四物汤
- (2) 风热证——鼻塞咳嗽，痰稠，口渴欲饮，舌红，苔黄，脉浮数——桑菊饮加当归、川芎

(3) 邪入少阳证——口苦咽干，心烦欲呕，默默不欲饮食——小柴胡汤

## 十四、经行身痛

经行前后或经期——以身体疼痛为主症

### 证型

- (1) 血虚证——肢体麻木，经量少，面色无华——当归补血汤加白芍、鸡血藤、丹参、  
玉竹  
(2) 血瘀证——月经推迟，经色暗，或有血块，舌紫暗——趁痛汤

## 十五、经行泄泻

行经前后或经期——大便溏薄，甚或水泻，日解数次——经净自止者。

### 证型

- (1) 脾虚证——脘腹胀满，神疲肢软，或面浮肢肿——参苓白术散  
(2) 肾虚证——腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷——健固汤合四神丸



## 十六、经行浮肿

经行前后，或正值经期——头面四肢浮肿

### 证型

- (1) 脾肾阳虚证——腹胀纳减，腰膝酸软，大便溏薄——肾气丸合苓桂术甘汤  
(2) 气滞血瘀证——经血色暗有块，脘闷胁胀，善叹息——八物汤加泽泻、益母草

## 十七、经行吐衄

经行前后，或正值经期——周期性吐血或衄血者——常伴经量减少——好像是月经倒行  
逆上

### 证型

- (1) 肝经郁火证——心烦易怒，或两胁胀痛，口苦咽干，头晕耳鸣，尿黄便结——清肝引经汤  
(2) 肺肾阴虚证——头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，潮热咳嗽，咽干口渴——顺经汤

## 十八、经行口糜（助理不考）

经前或经行时——口舌糜烂，如期反复发作——经后渐愈者

### 证型

- (1) 阴虚火旺证——五心烦热，尿少色黄——知柏地黄汤  
(2) 胃热熏蒸证——口干喜饮，尿黄便结——凉膈散

## 十九、经行风疹块（助理不考）

临经时或行经期间——周身皮肤突起红疹，或起风团，瘙痒异常——经净渐退者。

### 证型

- (1) 血虚证——月经多推迟，量少色淡，面色不华，肌肤枯燥——当归饮子  
(2) 风热证——口干喜饮，尿黄便结——清风散

## 二十、经行发热（助理不考）

经期或行经前后——出现以发热为主症者



### 证型

- (1) 肝肾阴虚证——两颧红赤，五心烦热，烦躁少寐——蒿芩地丹四物汤
- (2) 血气虚弱证——神疲肢软，少气懒言——补中益气汤
- (3) 瘀热壅阻证——经色紫暗，夹有血块，舌暗或尖边有瘀点——血府逐瘀汤加丹皮

## 二十一、经行情志异常

行经前后，或正值经期——出现烦躁易怒，悲伤啼哭，或情志抑郁，喃喃自语，或彻夜不眠，甚或狂躁不安——经后复如常人者

### 证型

- (1) 心血不足证——精神恍惚，心神不宁，无故悲伤，心悸失眠——甘麦大枣汤合养心汤去川芎、半夏曲
- (2) 肝经郁热证——烦躁易怒，抑郁不乐，头晕目眩，口苦咽干——丹栀逍遥散酌加川楝子、生龙齿、代赭石
- (3) 痰火上扰证——精神狂躁，烦乱不安，语无伦次，舌质红，苔黄腻，脉滑数有力——生铁落饮加郁金、川连

## 二十二、绝经前后诸证

绝经前后——出现烘热面赤，进而汗出，精神倦怠，烦躁易怒，头晕目眩，耳鸣口悸，失眠健忘，腰酸背痛，手足心热或伴有月经紊乱与绝经有关的症状

### 证型

- (1) 肾阴虚证——头晕目眩，耳鸣，烘热汗出，五心烦热，腰膝酸痛，足跟痛——左归丸
- (2) 肾阳虚证——精神萎靡，面色晦暗，腰背冷痛，小便清长，夜尿频多——右归丸
- (3) 肾阴阳俱虚证——乍寒乍热，烘热汗出，头晕耳鸣，健忘，腰背冷痛——二仙汤
- (4) 心肾不交证——心烦失眠，心悸易惊，情志失常，头晕健忘，腰酸乏力——天王补心丹

## 二十三、经断复来（助理不考）

绝经期妇女月经停止1年及1年以上，又再出现子宫出血

### 证型

- (1) 脾虚肝郁证——气短懒言，神疲肢倦，胁肋胀满——安老汤
- (2) 肾阴虚证——腰膝酸软，潮热盗汗，头晕耳鸣，口干舌燥——知柏地黄丸加阿胶、龟甲
- (3) 湿热下注证——外阴及阴道瘙痒，口苦咽干，疲惫无力，纳谷不馨，大便不爽，小便短赤——易黄汤加黄芩、茯苓、泽泻、侧柏叶、大小蓟
- (4) 血热证——经血色深红，质稠，带下多，色黄，口苦口干，小便短赤，大便秘结——益阴煎加生牡蛎、茜根、地榆
- (5) 湿毒瘀结证——有小腹疼痛，低热起伏，神疲，形体消瘦——萆薢渗湿汤合桂枝茯苓丸去滑石，加三七、黄芪

## 带下病

### 一、带下过多

带下量明显增多——色、质、气味异常——或伴有局部及全身症状者

### 证型



- (1) 脾虚证——面色㿠白或萎黃，四肢倦怠，腕胁不舒，納少便溏，或四肢浮肿——完帶湯
- (2) 肾陽虛證——腰酸如折，畏寒肢冷，小腹冷感，面色晦暗，小便清長或夜尿多——內補丸
- (3) 阴虛夾濕證——腰酸腿軟，頭暉耳鳴，五心煩熱，咽干口燥——知柏地黃湯
- (4) 濕熱下注證——小腹作痛，口苦口膩，胸悶納呆，小便短赤——止帶方
- (5) 热毒蘊結證——小腹疼痛，腰骶酸痛，煩熱頭暉，口苦咽干，小便短赤，大便干結——五味消毒飲加土茯苓、敗醬草、魚腥草、薏苡仁

## 二、帶下過少

帶下量明顯減少——導致陰中干澀痙攣——甚至陰部明顯萎縮者

### 證型

- (1) 肝腎亏损證——頭暉耳鳴，腰膝酸軟，烘熱汗出，煩熱胸悶，夜寐不安——左歸丸加知母、肉苁蓉、紫河車、麥冬
- (2) 血枯瘀阻證——帶下過少，甚至全無，陰中干澀，舌質暗，脈細澀——小營煎加丹參、桃仁、牛膝

## 妊娠病



### 一、妊娠惡阻

妊娠早期——恶心嘔吐、頭暉厭食——甚至食入即吐

### 證型

- (1) 脾胃虛弱證——口淡、嘔吐清涎，頭暉體倦，腕脾腹脹——香砂六君子湯
- (2) 肝胃不和證——口干口苦，頭脹而暉，胸滿脅痛，嗳氣叹息——橘皮竹茹湯或芍葉黃連湯加姜半夏、枇杷葉、竹茹、烏梅
- (3) 痰滯證——胸膈滿悶，不思飲食，口中淡膩，頭暉目眩，心悸氣短——青竹茹湯

### 二、異位妊娠

#### 證型

- (1) 未破損期——下腹一側有隱痛，附件有軟性包塊，有壓痛——宮外孕Ⅱ號方加蜈蚣、全蝎、紫草
- (2) 已破損期

休克型——面色蒼白，四肢厥逆，脈微欲絕或細數无力——生脈散合宮外孕Ⅰ號方

不穩定型——腹部有壓痛及反跳痛，但逐漸減輕，可觸及界線——宮外孕Ⅰ號方

包塊型——腹腔血腫包塊形成，腹痛減輕，有下腹墜脹或便意感——宮外孕Ⅱ號方

### 三、胎漏、胎動不安

妊娠期間陰道少量出血——時出時止，或淋漓不斷——而無腰酸、腹痛、小腹下墜者

#### 證型

- (1) 腎虛證——頭暉耳鳴，夜尿多，眼眶暗黑或有面部暗斑——壽胎丸
- (2) 血熱證——口苦咽干、心煩少寐，溲黃便結——保陰煎
- (3) 氣血虛弱證——腰酸、面色㿠白，心悸氣短，神疲肢倦——胎元飲
- (4) 跌仆傷胎證——妊娠外傷——聖愈湯合壽胎丸
- (5) 癥瘕傷胎證——腰酸下墜，皮膚粗糙，口干不欲飲——桂枝茯苓丸合壽胎丸



#### 四、堕胎、小产（助理不考）

妊娠 12 周内胚胎自然殒堕——堕胎

妊娠 12~28 周内胎儿已成形而自然殒堕——小产或半产

##### 证型

(1) 胎堕难留证——妊娠早期阴道流血增多，妊娠中晚期小腹疼痛——脱花煎或生化汤加益母草。

(2) 胎堕不全证——胎陨后，尚有组织部分残留于子宫——脱花煎加人参、益母草、炒蒲黄。

#### 五、滑胎

堕胎或小产——连续发生 3 次或 3 次以上者

##### 证型

(1) 肾虚证

肾气不足证——孕后腰酸膝软，头晕耳鸣，夜尿频多，面色晦暗——补肾固冲丸

肾阳亏虚证——畏寒肢冷，小便清长，夜尿频多，大便溏薄——肾气丸去泽泻，加菟丝子、杜仲、白术

肾精亏虚证——头晕耳鸣，手足心热，两颧潮红，大便秘结——育阴汤

(2) 气血虚弱证——头晕目眩，神疲乏力，面色㿠白，心悸气短——泰山磐石散

(3) 血热证——面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄——保阴煎合二至丸加白术

(4) 血瘀证——素有癥瘕之疾，肌肤无华——桂枝茯苓丸合寿胎丸

#### 六、胎萎不长（助理不考）

妊娠 4~5 个月后——孕妇腹形与宫体增大明显小于正常妊娠月份——胎儿存活而生长迟缓

##### 证型

(1) 气血虚弱证——面色萎黄或㿠白，身体羸弱，头晕心悸，少气懒言——胎元饮

(2) 脾肾不足证——腰膝酸软，纳少便溏，或形寒畏冷，手足不温——寿胎丸合四君子汤

(3) 血寒宫冷证——形寒怕冷，腰腹冷痛，四肢不温——长胎白术散加巴戟天、艾叶

#### 七、子满（助理不考）

妊娠 5~6 月后出现腹大异常——胸膈满闷——甚则遍身俱肿，喘息不得卧者，

##### 证型

(1) 本虚标实证——妊娠中后期，腹部增加异常，胸膈满闷，呼吸短促，神疲体倦——鲤鱼汤或当归芍药散

#### 八、子肿

妊娠中晚期——肢体面目肿胀者

##### 证型

(1) 脾虚证——面色黄白无华，神疲气短懒言，口淡而腻，脘腹胀满，食欲不振——白术散加砂仁

(2) 肾虚证——腰酸乏力，下肢逆冷，小便不利——真武汤或肾气丸

(3) 气滞证——胸闷胁胀，头晕胀痛——天仙藤散或正气天香散

## 九、子晕（助理不考）

妊娠期——头晕目眩，状若眩冒——甚或眩晕欲厥

### 证型

- (1) 阴虚肝旺证——耳鸣失眠，心中烦闷，颜面潮红——杞菊地黄丸加石决明、龟甲、钩藤、白蒺藜、天麻
- (2) 脾虚肝旺证——胸闷心烦，呕逆泛恶，面浮肢肿，倦怠嗜睡——半夏白术天麻汤加钩藤、丹参、蔓荆子
- (3) 气血虚弱证——心悸健忘、少寐多梦，神疲乏力，气短懒言——八珍汤加首乌、钩藤、石决明

## 十、子痫（助理不考）

妊娠晚期或临产前及新产后——突然发生眩晕倒仆，昏不知人，两目上视，牙关紧闭，四肢抽搐，全身强直，须臾醒，醒复发——甚至昏迷不醒者

## 十一、妊娠小便淋痛

妊娠期间——尿频、尿急、淋沥涩痛等症

### 证型

- (1) 阴虚津亏证——午后潮热，手足心热，大便干结，颧赤唇红——知柏地黄丸加麦冬、五味子、车前子
- (2) 心火偏亢证——面赤心烦，渴喜冷饮，甚者口舌生疮——导赤散加玄参、麦冬
- (3) 湿热下注证——小便短赤，小腹坠胀，胸闷食少，带下黄稠量多——加味五苓散

## 十二、妊娠小便不通（助理不考）

妊娠期间——小便不通——甚至小腹胀急疼痛，心烦不得卧

### 证型

- (1) 肾虚证——腰膝酸软，畏寒肢冷——肾气丸去丹皮、附子，加巴戟天、菟丝子
- (2) 气虚证——面色㿠白，神疲倦怠，头重眩晕——益气导溺汤

## 产后病

### 一、产后血晕（助理不考）

#### 急症处理

- (1) 当产后血晕发生休克时，应首先抗休克，促其复苏。
- (2) 采用头低脚高的仰卧体位，保温。

### 二、产后发热

产褥期内——出现发热持续不退——或突然高热寒战，并伴有其他症状者

### 证型

- (1) 感染邪毒证——恶露色紫如败酱，气臭秽，心烦口渴，尿黄，大便燥结——五味消毒饮合失笑散加减或解毒活血汤加减
- (2) 外感证——鼻流清涕，头痛，肢体酸痛，无汗——荆防四物汤加减
- (3) 血瘀证——恶露不下或下亦甚少，色暗有块，小腹疼痛拒按——生化汤加味或桃红消瘀汤
- (4) 血虚证——恶露色淡质稀，自汗，头晕心悸——八珍汤

### 三、产后腹痛

产妇在产褥期内——分娩或产褥有关的小腹疼痛

#### 证型

- (1) 气血两虚证——面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结——肠宁汤
- (2) 瘀滞子宫证——面色青白，四肢不温，或伴胸胁胀痛——生化汤加益母草

### 四、产后身痛

产妇在产褥期内——肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着者

#### 证型

- (1) 血虚证——面色萎黄，头晕心悸——黄芪桂枝五物汤加当归、秦艽、丹参、鸡血藤
- (2) 外感证——关节疼痛伴恶寒怕风——独活寄生汤
- (3) 血瘀证——恶露量少，色紫暗夹血块，小腹疼痛，拒按——身痛逐瘀汤加毛冬青、忍冬藤、益母草、木瓜
- (4) 肾虚证——头晕耳鸣，夜尿多——益荣壮肾汤加秦艽、熟地黄

### 五、产后恶露不绝

产后血性恶露持续 10 天以上——仍淋沥不尽者

#### 证型

- (1) 气虚证——面色㿠白，神疲懒言，四肢无力，小腹空坠——补中益气汤加艾叶、阿胶、益母草
- (2) 血瘀证——小腹疼痛拒按，舌紫暗或边有瘀点——生化汤加益母草、炒蒲黄
- (3) 血热证——面色潮红，口燥咽干——保阴煎加益母草、七叶一枝花、贯众

### 六、缺乳

哺乳期——乳汁甚少或全无者

#### 证型

- (1) 气血虚弱证——面色少华，倦怠乏力——通乳丹
- (2) 肝郁气滞证——胸胁胀满，情志抑郁，食欲不振——下乳涌泉散
- (3) 痰浊阻滞证——形体肥胖，胸闷痰多，纳少便溏，或食多乳少——苍附导痰丸合漏芦散

### 七、产后抑郁（助理不考）

产后抑郁——产妇在分娩后——情绪低落、精神抑郁

#### 证型

- (1) 心脾两虚证——神疲乏力，面色萎黄，纳少便溏，脘闷腹胀——归脾汤
- (2) 瘀血内阻证——恶露淋沥日久，色紫暗有块，面色晦暗——调经汤或芎归泻心汤
- (3) 肝郁气结证——胸闷纳呆，善太息——逍遥散加首乌藤、合欢皮、磁石、柏子仁

### 八、产后小便不通（助理不考）

新产后产妇——排尿困难，小便点滴而下——甚则闭塞不通，小腹胀急疼痛者

#### 证型

- (1) 气虚证——倦怠乏力，少气懒言，语音低微，面色少华——补中益气汤去升麻，加桔梗、茯苓、通草
- (2) 肾虚证——面色晦暗，腰膝酸软——济生肾气丸或金匮肾气丸
- (3) 血瘀证——尿色略浑浊带血丝，小腹胀满疼痛——加味四物汤或小蓟饮子

## 九、产后小便淋痛（助理不考）

产后——尿频、尿急、淋沥涩痛

### 证型

- (1) 湿热蕴结证——尿黄赤或浑浊，口渴不欲饮，心烦——加味五淋散加益母草，或八正散，或分清饮
- (2) 肾阴亏虚证——伴腰膝酸软，头晕耳鸣，手足心热——知柏地黄汤
- (3) 肝经郁热证——情志抑郁或心烦易怒，小腹胀满，甚或两胁胀痛，口苦而干——沉香散

# 妇科杂病

## 一、癥瘕

妇人下腹结块——伴有或胀、或痛、或满、或异常出血者

### 证型

- (1) 气滞血瘀证——精神抑郁，胸闷不舒，面色晦暗，肌肤甲错——香棱丸或大黄䗪虫丸
- (2) 痰湿瘀结证——胸脘痞闷，腰腹疼痛——苍附导痰丸合桂枝茯苓丸
- (3) 湿热瘀阻证——身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤——大黄牡丹汤
- (4) 肾虚血瘀证——经行腹痛较剧，经色紫暗有块，腰酸膝软，头晕耳鸣——补肾祛瘀方或益肾调经汤

## 二、盆腔炎

女性内生殖器及周围的结缔组织，盆腔腹膜发生的炎症

### 证型

#### 急性盆腔炎

- (1) 热毒炽盛证——咽干口苦，大便秘结，小便短赤——五味消毒饮合大黄牡丹汤
- (2) 湿热瘀结证——热势起伏，寒热往来，舌红有瘀点，苔黄腻——仙方活命饮加薏苡仁、冬瓜仁

#### 慢性盆腔炎

- (1) 湿热瘀结证——低热起伏，胸闷纳呆，口干不欲饮，大便溏或秘结，小便黄赤——银甲丸或当归芍药散加丹参、毛冬青、忍冬藤、田七
- (2) 气滞血瘀证——经行情志抑郁，乳房胀痛——膈下逐瘀汤
- (3) 寒湿凝滞证——神疲乏力，腰骶冷痛，小便频数，婚后不孕——少腹逐瘀汤
- (4) 气虚血瘀证——精神不振，疲乏无力，食少纳呆——理冲汤

## 三、不孕症

女子婚后未避孕，有正常性生活1年——未受孕者；  
或曾有过妊娠，而后未避孕，又连续1年——未再受孕者。

### 证型

- (1) 肾虚证

肾气虚证——头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦，小便清长——毓麟珠  
肾阳虚证——头晕耳鸣，腰膝酸软，夜尿多，眼眶暗，面色暗斑，或环唇暗——温胞饮或右归丸

肾阴虚证——形体消瘦，头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，失眠多梦，眼花心悸——养精种玉汤

- (2) 肝气郁结证——胸胁乳房胀痛，精神抑郁，善太息——开郁种玉汤
- (3) 瘀滞胞宫证——经色紫暗，有血块，舌质紫暗——少腹逐瘀汤
- (4) 痰湿内阻证——头晕心悸，胸闷泛恶，面目虚浮或㿠白——苍附导痰丸

#### 四、阴养

妇女外阴及阴道瘙痒——甚则痒痛难忍，坐卧不宁——或伴带下增多  
证型

- (1) 肝经湿热证——心烦易怒，胸胁满痛，口苦口腻，食欲不振——龙胆泻肝汤或萆薢渗湿汤，外用蛇床子散
- (2) 脾肾阴虚证——眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮——知柏地黄汤加当归、栀子、白鲜皮

#### 五、阴疮

- 妇人外阴部结块红肿——或溃烂成疮，黄水淋沥，局部疼痛——甚则溃疡如虫蚀者  
证型
- (1) 热毒证——全身见身热心烦，口干纳少，便秘尿黄——龙胆泻肝汤
  - (2) 寒湿证——面色㿠白，精神不振，疲乏无力，畏寒肢冷，食少纳呆——阳和汤或托里消毒散

#### 六、阴挺（助理不考）

子宫从正常位置沿阴道下降，宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出于阴道口以外

证型

- (1) 气虚证——身倦懒言，面色不华，四肢乏力，小便频数，带下量多——补中益气汤加金樱子、杜仲、续断
  - (2) 肾虚证——腰膝酸软冷痛，小腹下坠，小便频数，入夜尤甚——大补元煎加黄芪
- I 度      轻型：宫颈外口距处女膜缘<4cm，未达处女膜缘。  
              重型：宫颈已达处女膜缘，阴道口可见子宫颈。
- II 度     轻型：宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内。  
              重型：部分宫体脱出阴道口。
- III度    宫颈与宫体全部脱出阴道口外。

