

# 2020年口腔执业（助理）医师资格考试

考场试题网友回忆版（助理）



山东金英杰医学公众号

1. 继承恒牙迟迟不萌出，乳牙保留在恒牙列内，X线片上未见恒牙胚，应诊断为

- A. 恒牙迟萌
- B. 牙齿固连
- C. 乳牙滞留
- D. 异位萌出
- E. 恒牙阻生

正确答案： C

2. 点隙的定义

- A. 龋病的好发部位
- B. 副沟相交而成凹陷部位
- C. 牙冠上不规则的凹陷部位
- D. 三条或三条以上发育沟相交处的凹陷
- E. 钙化不良而形成的凹陷

正确答案： D

3. 咀嚼效率是指

- A. 在一定时间内咀嚼磨细食物的数量
- B. 咀嚼磨细一定量食物所需的时间
- C. 在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度
- D. 在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度
- E. 咀嚼磨细食物的能力的能力

正确答案： D

4. 一次局部麻醉应用利多卡因的最大剂量是

- A. 3. 3mg/kg
- B. 2. 2mg/kg
- C. 4. 4/kg
- D. 8. 8mg/kg
- E. 7. 7mg/kg

正确答案: C

5. 髓腔增龄性变化的描述，错误的是

- A. 髓腔体积随年龄增大而不断缩小
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
- C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
- E. 随着磨耗，髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

正确答案: E

6. 纤维囊壁内出现腺体的是

- A. 含牙囊肿
- B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿
- D. 根尖周囊肿
- E. 甲状腺囊肿

正确答案: E

7. 转移发生较迟且少见的口腔癌是

- A. 唇癌
- B. 舌癌
- C. 口底癌
- D. 颊癌
- E. 牙齶癌

正确答案： A

8. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前颌突过度生长，出生后应尽早行
- A. 咽成形术
  - B. 正畸治疗
  - C. 唇裂整复术
  - D. 牙槽突裂植骨术
  - E. 腭裂整复术

正确答案： B

9. 单侧下颌角骨折的最佳固定方法是
- A. 单颌结扎
  - B. 颅颌绷带固定
  - C. 坚固内固定
  - D. 钢丝内固定
  - E. 颌间结扎

正确答案： C

10. 治疗三叉神经痛首选

- A. 地西洋
- B. 呋塞米
- C. 苯妥英钠
- D. 卡马西平
- E. 阿司匹林

正确答案:D

11. 牙槽骨吸收处的 Howship 腺窝内的细胞是

- A. 破骨细胞
- B. 成牙骨质细胞
- C. 成纤维细胞
- D. 间质细胞
- E. 未分化的间充质

正确答案: A

12. 下面哪项属于复发性口腔溃疡分型

- A. 均质型、非均质型
- B. 糜烂型、非糜烂型
- C. 假膜型、红斑型、增殖型
- D. 轻型、重型、口炎型
- E. 原发性、复发性

正确答案: D

13. 冠修复第二前磨牙、第一磨牙间的接触区多在

- A. 邻面颊 1/3
- B. 邻面颊 1/3 和中 1/3 交点处
- C. 邻面舌 1/3 和中 1/3 交点处
- D. 邻面舌 1/3 处
- E. 邻面中 1/3 处

正确答案:B

14. 活动性出血用下列哪个止血方法

- A. 结扎止血
- B. 指压止血
- C. 填塞止血
- D. 包扎止血
- E. 药物止血

正确答案: A

15. 有关口腔流行病学的描述，不正确的是

- A. 制定口腔疾病的诊疗常规
- B. 研究口腔健康及其影响因素
- C. 为探讨口腔疾病的病因和流行因素
- D. 研究口腔疾病发生、发展和分布规律
- E. 为选择防止策略提供依据

正确答案:A

16. WHO 推荐口腔流行病学调查的牙周健康调查

- A. 牙龈指数
- B. 社区牙周指数

- C. 龈沟出血指数
- D. 简化口腔卫生指数
- E. 菌斑指数

正确答案:B

17. 不适合作做可摘义齿修复的是

- A. 咽炎
- B. 肝炎
- C. 智能障碍
- D. 偏头痛
- E. 牙周病

正确答案:C

18. 牙周炎的全身促进因素不包括

- A. 骨折疏松症
- B. 艾滋病
- C. 冠心病
- D. 糖尿病
- E. 精神压力

正确答案:C

19. 成簇的粟粒状淡黄色小颗粒，即福代斯斑见于

- A. 舌黏膜
- B. 颊黏膜
- C. 软腭黏膜
- D. 牙槽黏膜

E. 口底黏膜

正确答案: B

20. 口腔修复时，外耳道前壁触诊检查的目的是确定

- A. 是否存在关节弹响
- B. 下颌运动异常
- C. 正中关系位与牙尖交错位是否协调
- D. 垂直距离是否过高或过低
- E. 髁突是否退回到正中关系

正确答案: E

21. 关于牙菌斑生物膜的描述，正确的是

- A. 约 7 天菌斑发展成熟达高峰
- B. 邻近水性通道的细菌为厌氧菌
- C. 菌斑形成首先为获得性膜形成
- D. 菌斑形成后 6 小时即可被菌斑显示剂着色
- E. 菌斑生物膜可被漱掉

正确答案:C

22. 局部可摘义齿戴用后咬舌的原因是

- A. 下颌后牙排列偏颊侧
- B. 下颌后牙排列咬合面过低
- C. 颊部软组织向内凹陷
- D. 上颌后牙颊侧覆盖过小
- E. 上颌后牙覆盖过大

正确答案: B



23. 引起妊娠期龈炎的直接病因是

- A. 咬合创伤
- B. 菌斑微生物
- C. 牙石刺激
- D. 妊娠本身
- E. 营养不良

正确答案:B

24. 口角的正常位置相当于

- A. 第二前牙与第一磨牙之间
- B. 第一前磨牙与第二前磨牙之间
- C. 第一磨牙与第二磨牙之间
- D. 尖牙与第一前磨牙之间
- E. 侧切牙与尖牙之间

正确答案:D

25. 义齿修复前对口腔软组织的处理不包括

- A. 黏膜病的治疗
- B. 黏膜瘢痕组织的修整
- C. 松软牙槽嵴的修整
- D. 咀嚼肌功能训练
- E. 唇、舌系带的修整

正确答案:D

26. 牙龈炎患者基础治疗后采取的菌斑控制措施中错误的是

- A. 使用电动牙刷刷牙
- B. 使用牙间隙刷
- C. 用软毛牙刷刷牙
- D. 用冲牙器清除软垢
- E. 使用牙线

正确答案: B

27. 排在我过口腔癌之首的

- A. 牙槽黏膜癌
- B. 颊黏膜癌
- C. 唇癌
- D. 牙龈癌
- E. 舌癌

正确答案:E

28. 可摘局部义齿模型观测的目的不包括

- A. 指导模型设计
- B. 排列人工牙
- C. 确定组织倒凹
- D. 指导基牙预备
- E. 描绘观测线

正确答案:B

29. 模型观测时，不随模型倾斜方向变化的是

- A. 倒凹深度
- B. 外形高点线

C. 导线

D. 就位道

E. 观测线

正确答案：B

30. 急性浆液性根尖周炎的病理变化时

A. 少量中性粒细胞浸润

B. 根尖部牙槽骨增生

C. 病变内间增生的鳞状上皮条索

D. 病变中大量肉芽组织形成

E. 根尖部牙骨质吸收

正确答案：A

31. 可作为判断牙周组织炎症的临床指标

A. 牙齿松动

B. 牙龈退缩

C. 探诊深度

D. 探诊出血

E. 附着丧失

正确答案:D

32. 在口腔健康教育计划中，确定与口腔健康有关的问题不包括

A. 确定有关的社会行为问题

B. 确定有关口腔健康的管理问题

C. 确定口腔健康教育的问题

D. 分析流行病学调查资料

E. 调查有关的法律法规问题

正确答案:E

33. 下列解剖形态特点有利于全口义齿固位的是

- A. 颌弓狭窄
- B. 系带附着近牙槽嵴顶
- C. 牙槽嵴低平
- D. 黏膜松软
- E. 后堤区较宽

正确答案:E

34. 有关社区口腔卫生服务的基本原则不正确的是

- A. 因地制宜、分类指导、以点带面
- B. 社区口腔卫生服务与社区发展相结合
- C. 以区域卫生规划为指导，引进竞争机制
- D. 治疗为主，提供综合性口腔卫生服务
- E. 政府领导、各部位协同、社会广泛参与

正确答案:D

35. 义齿蛤支托与支托凹成球凹接触关系的目的是

- A. 加强义齿固位
- B. 抵抗义齿侧向力
- C. 减少基牙预备量
- D. 减少基牙收到扭力
- E. 保持支托与基牙位置稳定

正确答案: E

36. 与全口义齿的稳定无关的是

- A. 磨光面形态
- B. 平衡殆
- C. 人工牙龈缘位置
- D. 人工牙排列位置
- E. 咬合关系

正确答案： C

37. 传递固定桥咬合力至基牙的结构是

- A. 固位体
- B. 牙槽骨
- C. 桥体
- D. 连接体
- E. 黏膜

正确答案： A

38. 恒牙嵌入性脱位复位后并发症最常见的

- A. 牙髓坏死
- B. 牙内吸收
- C. 牙髓钙化
- D. 牙根外吸收
- E. 边缘性牙槽突吸收

正确答案： A

39. 正常龈沟探诊深度最大上限是

A. 0.5mm

B. 1mm

C. 2mm

D. 3mm

E. 4mm

正确答案: D

40. 与吸烟饮酒关系最为密切的口腔黏膜疾病是

A. 口腔扁平苔藓

B. 黏膜类天疱疮

C. 黏膜下纤维性变

D. 口腔白斑病

E. 白色海绵状斑痣

正确答案:D

41. 内源性酸蚀症主要引起牙体缺损的部位是

A. 舌侧尖

B. 前牙唇面

C. 边缘嵴

D. 中央窝

E. 颊侧尖

正确答案:A

42. 地西泮临床应用为首选用于

A. 癫痫大发作

B. 抑郁症

C. 精神病

D. 慢性疼痛

E. 催眠

正确答案:E

43. 用于弯制磨牙卡环的钢丝直径

A. 0. 9–1. 0mm

B. 0. 3–0. 5mm

C. 0. 6–0. 8mm

D. 1. 1–1. 2mm

E. 1. 3–1. 5mm

正确答案:A

44. 有关牙酸蚀症，描述不正确的是

A. 用含氟牙膏刷牙可以预防

B. 一种多因素的疾病

C. 有细菌参与

D. 增强牙对酸的抵抗力可以预防

E. 慢性病理性的牙体硬组织丧失

正确答案: C

45. 固定义齿修复中，基牙及周围组织能承担额外 犹力来补偿缺失牙功能的生理基础

A. 患者的适应能力

B. 基牙的整体运动

C. 牙槽嵴黏膜的角化程度

- D. 基牙牙冠形态
- E. 基牙的牙周储备力

正确答案： E

46. 舌系带修整术的适宜年龄

- A. 1岁
- B. 1.5岁
- C. 2岁
- D. 大于3个月
- E. 3岁

正确答案: C

47. 腭裂临床表现不包括

- A. 卷舌音不清
- B. 进食时乳汁从鼻孔溢出
- C. 听力障碍
- D. 上颌骨发育不足
- E. 牙列紊乱和牙弓异常

正确答案： A

48. 主要通过接触传播的疾病是

- A. 疱疹
- B. 结核
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 风疹

正确答案:A

49. 固定义齿的特点不包括

- A. 咀嚼效率高
- B. 修复软组织缺损
- C. 稳固耐用
- D. 犁力由牙周组织承担
- E. 舒适美观

正确答案:B

50. 弹性模量与牙本质接近的桩是（超纲）

- A. 纤维桩
- B. 预成钛合金
- C. 金合金铸造桩
- D. 氧化锆桩
- E. 镍铬合金铸造桩

正确答案:A

51. 铸造金属合金全冠用金合金的特点不包括

- A. 硬度和天然牙接近
- B. 耐腐蚀性强
- C. 有利于修复体边缘的密合
- D. 生物相容性好
- E. 延展性差

正确答案:E

52. 有关口腔致龋菌，描述正确的是

- A. 乳杆菌是牙本质龋的初级致龋菌
- B. 轻链球菌是牙菌斑中最常分离到的
- C. 变异链球菌代谢的终末产物是葡萄糖
- D. 丝状菌是最早定植在牙面上的细菌
- E. 放线菌合成的多糖有高度致龋性

正确答案:B

53. 根管预备器械中旋转易折断的是

- A. 拔髓针
- B. H 锉
- C. C+锉
- D. K 型扩大针
- E. K 锉

正确答案:B

54. 舌下腺囊肿手术治疗的关键是

- A. 吸净囊液
- B. 同时切除舌下腺 猫囊壁
- C. 完成切除舌下腺
- D. 囊肿摘除囊壁
- E. 术后局部加压包扎

正确答案: C

55. 颜面部疖痈的病原菌主要是

- A. 溶血性链球菌

B. 金黄色葡萄球菌

C. 肺炎双球菌

D. 变形杆菌

E. 大肠杆菌

正确答案:B

56. 普鲁卡因不适用于

A. 阻滞麻醉

B. 冷冻麻醉

C. 表面麻醉

D. 雾化吸入

E. 浸润麻醉

正确答案:C

57. 拔除上颌第三磨牙，牙挺安放的位置

A. 近中牙槽嵴

B. 远中牙槽嵴

C. 颊侧骨板

D. 腭侧骨板

E. 第二磨牙和第三磨牙之间

正确答案:A

58. 有吹风样杂音的是

A. 动静脉畸形

B. 静脉畸形

C. 微静脉畸形

D. 囊性水瘤

E. 血管瘤

正确答案: A

59. 牙周基础治疗后，牙周袋深度还在 5mm 以上，行牙周手术的时间最早在

A. 1 年

B. 1 周

C. 2 周

D. 4 周

E. 3 月

正确答案:D

60. 正确的乳牙萌出顺序是

A. I II III IV V

B. I II III V IV

C. I II IV III V

D. I II IV V III

E. I II V III IV

正确答案:C

61. WHO 推荐捷径调查年龄组不包括

A. 5 岁

B. 35-44 岁

C. 45-54 岁

D. 12 岁

E. 65-74 岁

正确答案： C

62. 医护人员个人防护措施不包括

- A. 护手霜
- B. 手套
- C. 工作服
- D. 口罩
- E. 帽子

正确答案:A

63. 正常开口度是

- A. 2. 0-2. 9cm
- B. 3. 0-3. 6cm
- C. 1. 0-1. 9cm
- D. 3. 7-5. 0cm
- E. 4. 9-6. 5cm

正确答案： D

64. 只需要消毒不需要灭菌的器械是

- A. 洁牙机
- B. 机头加车针
- C. 橡皮障和打孔器
- D. 拔牙钳
- E. 根锉

正确答案： C

65. 牙石覆盖牙面 2/3 以上

- A. (±)
- B. (+)
- C. (++)
- D. (+++)
- E. (++++)

正确答案: D

66. 咀嚼周期的速度变化是

- A. 开口慢，最大开口时快，闭口慢，咬合接触快
- B. 开口慢，最大开口时快，闭口快，咬合接触慢
- C. 开口快，最大开口时慢，闭口慢，咬合接触快
- D. 开口快，最大开口时慢，闭口快，咬合接触慢
- E. 开口时慢，闭口时快

正确答案:D

67. 下述关于翼丛的叙述中哪项是错误的

- A. 分布于颞肌及翼内肌、翼外肌之间
- B. 凡与上颌动脉分支伴行的静脉均参与此丛的构成
- C. 其血液主要汇入面静脉
- D. 该丛与颅内、外静脉有广泛的交通
- E. 施行上牙槽后神经阻滞麻醉时应注意避免刺破翼丛发生血肿

正确答案:C

68. 预防性树脂充填，描述正确的是

- A. C 型暴露的牙本质不需要垫底
- B. C 型仅用流动树脂材料充填
- C. A 型不需要进行酸蚀
- D. A 型用不含填料的封闭剂充填
- E. B 型仅用复合树脂材料充填

正确答案:D

69. 最易引起边缘性颌骨骨髓炎:

- A. 颞下间隙感染
- B. 颞间隙感染
- C. 咬肌间隙感染
- D. 眶下间隙感染
- E. 下颌下间隙感染

正确答案:C

70. 最小号圆钻去预防充填几型

- A. A 型
- B. B 型
- C. C 型
- D. I 型
- E. II 型

正确答案: A

71. 关于正中联合部双发骨折，描述不正确的是

- A. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，下颌牙弓变窄
- B. 骨折线两侧肌群牵引力量相等，常无明显移位

- C. 正中骨折段可因降颌肌群的作用而向下后方移位
- D. 两侧骨折段受下颌舌骨肌的牵引可向中线移位
- E. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，可使舌后坠甚至窒息

正确答案：B

72. 药物性牙龈肥大的临床特征为

- A. 牙龈肿胀增生以后牙区为重
- B. 牙龈肿胀增生始于龈缘
- C. 牙龈肿胀增生可发生于无牙区
- D. 严重增生的牙龈可将牙挤压移位
- E. 牙龈肿胀增生只发生于前牙区

正确答案:D

73. 用于铸造金属全冠的镍铬合金中，铬所占的比例约为

- A. 20-29%
- B. 40%-49%
- C. 30-39%
- D. 7-19%
- E. 2-6%

正确答案：D

74. 游离端可摘局部义齿末端基牙上 RPI 卡环邻面板的特点不包括

- A. 控制义齿就位道方向
- B. 与基牙远中邻面接触
- C. 防止义齿脱位和食物嵌塞
- D. 对颊侧卡环臂起对抗作用

E. 咬合时与导平面位置关系恒定

正确答案:A

75. 可摘局部义齿修复后牙非游离缺失， 龈平面水平时， 缺隙远中基牙颊侧为Ⅱ型观测线。为将观测线调整为Ⅰ型， 模型倾斜方向

A. 向下

B. 向后

C. 向前

D. 向左

E. 向右

正确答案:B

76. 女，21岁。刷牙出血3个月，检查牙龈红肿，PD:2-4mm，无牙龈退缩，为明确检查

A. 上颌前部龈片

B. 曲面体层片

C. 龈翼片

D. CT

E. 上颌后部龈片

正确答案: C

77. 全口义齿需要平衡 龈的原因

A. 义齿稳定性要求

B. 使龈接触面积广

C. 预防偏侧咀嚼

D. 提高咀嚼效率

E. 美观效果

正确答案:A

78. 牙槽骨修整在拔牙后

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 6 个月

正确答案:A

79. 男, 48 岁, 行左下 6 拔除, 1 个月后下唇麻木。不正确的处理

- A. 拔牙窝刮除
- B. 理疗
- C. 针灸
- D. 吃维生素 B12
- E. 吃维生素 B1

正确答案:A

80. 全口义齿的前牙要排列成浅覆 牽、浅覆盖, 前牙不接触的目的是为了

- A. 美观
- B. 排牙方便
- C. 易于取得前伸 牵平衡
- D. 发音清晰
- E. 与天然牙一致

正确答案:C

81. 唇裂，唇红至鼻底未完全裂开属于

- A. I 度
- B. II 度
- C. III度
- D. IV度
- E. V 度

正确答案:B



82. 菌斑控制药物不包括

- A. 氯己定
- B. 三氯生
- C. 氟化亚锡
- D. 香精油
- E. 碱性品红

正确答案:E



83. 女，36岁，开口困难伴疼痛一个月，检查：自然开口30mm，被动开口30mm，开口偏向患侧，诊断为

- A. 关节盘附着松弛
- B. 关节盘后区损伤
- C. 不可复性关节盘前移位
- D. 翼外肌功能亢进
- E. 可复性盘前移位

正确答案：C

84. 女，68岁。戴用全口义齿1年后复查，主诉咀嚼压力，经常口角发炎，最可能的原因

- A. 磨关系有误
- B. 垂直距离过低
- C. 人工牙为无尖牙
- D. 患者全身状态不佳
- E. 颞下关节功能紊乱

正确答案:B

85. 男，11岁，主诉：右下后牙自发性阵痛1个月。检查5|中央牙本质颈状缺损，探诊（-），叩诊（+++），牙松动Ⅱ度，移行沟变浅，牙周膜增宽，处理为

- A. 根管治疗
- B. 牙髓切断术
- C. 根尖诱导成形术
- D. 牙拔除远中导板固定
- E.

正确答案:C

86. 男，2岁。患有唇裂。行修补手术时，需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为

- A. 眶下缘中点下1.5cm，鼻翼至耳屏连线的中点
- B. 眶下缘中点下0.5cm，鼻尖至耳屏连线的中点
- C. 眶下缘中点下1.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点
- D. 眶下缘中点下0.5cm，鼻尖至睑外侧连线的中点
- E. 眶下缘中点下0.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点

正确答案:D

87. 患者女性，21岁，在拔牙前采用2%普鲁卡因进行局麻，注射局麻药物后，患者出现心悸、头晕、胸闷、面色苍白、全身冷汗，四肢厥冷无力，脉搏快而弱，血压快速下降，该患者的情况属于

- A. 癔病
- B. 晕厥
- C. 中毒
- D. 过敏反应
- E. 肾上腺素反应

正确答案:B

88. 患者  $\text{L}_2$  缺失，间隙4mm， $\text{L}_3$  近中有龋坏缺损，牙根条件好，对颌局部可摘义齿，最理想的治疗方案

- A.  $\text{L}_2$  种植
- B.  $\text{L}_{23}$  单端固定桥
- C.  $\text{L}_{123}$  双端固定桥
- D.
- E.

正确答案:B

89. 男，50岁。全口四环素牙，着色深，严重影响美观，要求美学修复，与修复无关的检查内容是

- A. 面部皮肤颜色
- B. 全口牙周状况
- C. 口唇外侧、唇齿关系

D. 颞下颌关节活动度

E. 舌系带附着位置

正确答案:E

90. 男, 50岁。左上颌后牙肿瘤1周, 开口困难3天。检查: L7残冠, 叩诊(++) ,

颊侧前沟稍肿, 有深压痛, 开口受限(一横指)。最可能的诊断是

A. 颊间隙感染

B. 颞下间隙感染

C. 眶下间隙感染

D. 颞间隙感染

E. 翼下颌间隙感染

正确答案:B

A. 唇裂修复术

B. 膛成形术

C. 牙槽突裂植骨术

D. 咽成形术

E. 正畸矫治治疗

1. 唇腭裂患者恢复上唇正常生理功能及形态的治疗方法是

2. 通过唇肌生理运动的压迫作用, 促使牙槽突裂隙逐渐闭合。能实现此目的的治疗方法是

3. 以增进腭咽闭合为主的治疗方法是

正确答案:ACD

A. 甲状腺舌管囊肿

- B. 含牙囊肿
  - C. 根尖周囊肿
  - D. 鳃裂囊肿
  - E. 黏液囊肿
1. 衬里上皮类似于缩余釉上皮的是
  2. 由牙髓感染所引起的是
- 正确答案:BC



- A. 乳白色豆渣样
  - B. 黄白色角化物
  - C. 草黄，草绿色，含胆固醇
  - D. 棕褐色
  - E. 白色凝乳状
1. 根尖周囊肿的穿刺囊液
  2. 皮样囊肿的穿刺囊液
  3. 牙源性角化囊性瘤穿刺囊液
- 正确答案:CAB

- A. 前牙和后均没有接触
  - B. 非工作侧多个后牙接触
  - C. 工作侧多个后牙接触
  - D. 工作侧和非工作侧均没有接触
  - E. 工作侧和非工作侧均有接触
1. 双侧平衡殆的咬合接触是指
  2. 组牙功能殆的咬合接触是指

正确答案:EC

- A. 福代斯斑
  - B. 牙源性囊肿
  - C. 上皮剩余
  - D. 侧支根管
  - E. 牙颈部牙本质敏感症
1. 上皮根鞘在牙本质形成后让不断裂会引起
  2. 上皮根鞘残留在牙周膜中称为
  3. 上皮根鞘连续性破坏形成

正确答案:ECD

- A. 远中导板式间隙保持器
  - B. 舌弓式间隙保持器
  - C. 带环丝圈式间隙保持器
  - D. Nance 膝弓间隙保持器
  - E. 可摘式间隙保持器
1. 单侧第一乳磨牙早失，首选的间隙保持器为
  2. 下颌双侧多个乳磨牙早失，第一恒磨牙萌出不全时，首选的间隙保持器

正确答案:CE

- A. 中龋
- B. 可复性牙髓炎
- C. 慢性牙髓炎

D. 楔状缺损

E. 牙隐裂

1. 患牙病损探软，冷测正常，应考虑的疾病是：

2. 患牙冷测迟缓痛，应考虑的疾病是：

正确答案：AC

A. 丁卡因

B. 利多卡因

C. 氯乙烷

D. 普鲁卡因

E. 麻卡因

1. 临床冷冻麻醉用的药物是

2. 临床用来阻滞麻醉的药物是

3. 临床常用的表面麻醉的药物是

正确答案:CBA



A. 口腔扁平苔藓

B. 口腔白斑病

C. 慢性非特异性唇炎

D. 手足口病

E. 口腔单纯疱疹

1. 损害可同时累及口腔黏膜、皮肤和指甲的疾病是

2. 皮肤黏膜出现成簇小水泡的疾病是

正确答案:AE

A. 直接固位体

B. 间接固位体

C. 基托

D. 犁支托

E. 连接体

1. 有防止义齿翘动、摆动、旋转下沉作用的可摘局部义齿组成的部分称为

2. 可摘局部义齿起主要固位作用的部分是

3. 可摘义齿主要起支持作用，传导给力至基牙的是

正确答案:BAD

A. 防止贮存期间固体与液体成分分离

B. 降低表面张力，乳化软垢等

C. 防止细菌生长，延长贮存期限

D. 保持湿润，防止膏体硬化

E. 使牙面光洁，去除色素沈着、菌斑

1. 牙膏中胶粘剂的作用是

2. 牙膏中摩擦剂的作用是

3. 牙膏中洁净剂的作用是

正确答案:AEB

A. 合理局部用氟

B. 对龋病引起牙髓炎治疗

C. 及时修复牙齿缺失

D. 不能保留的牙及时拔除

E. 发现早期龋及时充填

1. 龋病的一级预防



## 2. 龋病的二级预防

正确答案: AE

- A. 颞下颌关节侧位片
- B. 根尖片
- C. 曲面体层片
- D. CT 片
- E. MRI

1. 7654—57 缺失，8—8 部分萌出。1 年前曾行右下后牙区囊肿刮治手术。修复前的检查是

2. F3—5—7 固定桥修复后基牙松动，最适合的检查是

正确答案: CB

- A. 嵌体
- B. 部分冠
- C. 全冠
- D. 桩核冠
- E. 高嵌体

1. RCT 后的牙体缺损患牙不宜用

2. 残冠最常用修复方式

正确答案: AD

男，25岁，左下后牙戴冠后出现咬合疼痛，持续数日。检查 F6 烤瓷全冠修复，边缘密合，近远中边缘嵴平齐于邻牙边缘嵴，F6 间可见大量纤维状食物，接触点松，未见咬合高点，叩痛（+），不松动，牙龈红肿，X线片示 F6 根充恰填，

根尖无病变。

1. 患者咬合痛的原因是

- A. 咬合高
- B. 初戴不适
- C. 残髓炎
- D. 根尖周炎
- E. 牙龈乳头炎

正确答案: E



2. 处理方法是

- A. 调磨左下 67
- B. 拔除左下 7
- C. 树脂加接触
- D. 调磨对 犁牙牙尖
- E. 拆除全冠重做

正确答案:E

左下后牙夜间痛 1 周，冷热刺激疼痛加剧。患侧长期咀嚼无力伴食物嵌塞。7-4

7-4 未见明显龋坏。76 7-4 左下后牙夜间痛 1 周，冷热刺激疼痛加剧。患侧长期咀嚼无力伴食物嵌塞。7-4 7-4 未见明显龋坏。76 7-4 犁面轻度磨损，7-4 松动 II 度，叩痛(±)，X 线 7-4 牙槽骨水平吸收至根尖 1/3

1. 确定主诉牙最有意义的是

- A. 牙周袋探针
- B. 牙髓电活力测试
- C. 咬合检查

D. CBCT

E. 牙髓温度测试

正确答案:E



2. 病因

A. 食物嵌塞

B. 理化刺激

C. 咬合创伤

D. 牙周感染

E. 胎面磨耗

正确答案:D

女,4岁。**L**D 颊面及近中 胎面大面积龋坏达牙本质浅层,探诊不敏感,叩痛(-),不松动,牙龈未见异常

1. 诊断

A. 中龋

B. 浅龋

C. 深龋

D. 急性牙髓炎

E. 可复性牙髓炎

正确答案:A

2. **L**D 首选的治疗方法是

A. 复合树脂充填

B. 预成冠修复

C. 药物治疗

D. 间接牙髓治疗

E. 银汞合金充填

正确答案:B

女, 71岁。8765| 缺失, 缺牙区牙槽嵴丰满, 余留牙唇颊侧牙槽骨隆突。拟行可摘局部义齿修复。

1. 4| 最适合选用的卡环类型是

A. PRI 卡环

B. 三臂卡

C. 对半卡环

D. 连续卡环

E. RPA 卡环

正确答案:E

2. 义齿左侧可采用的卡环是

A. 回力卡环

B. RPA 卡环

C. 间隙卡环

D. 连续卡环

E. RPI 卡环

正确答案:C

男, 8岁。左下后牙表面发黑就诊。一年前右下后牙因浅龋在口腔诊所接受过充填治疗。检查 |6 蛀面深窝沟, 可以卡住探针, 窝沟内有黑色沉着, 质地硬, 无软化。6| 蛀面, 银汞合金充填物完好, 牙龈正常, 叩诊(-), 无松动, |6 蛀

面深窝沟，可以插入探针，釉质脱矿呈白垩色。

1. **16** 最适合的治疗措施是

- A. 银汞充填
- B. 树脂充填
- C. 观测随访
- D. 窝沟封闭
- E. 非创伤性修复

正确答案:D

2. **61** 接受龋齿充填治疗属于龋病的

- A. 病因预防
- B. 一级预防
- C. 临床预防
- D. 三级预防
- E. 二级预防

正确答案:E



150. 患者出了车祸，颌面部损伤，20分钟昏迷史，醒来想不起来发生什么事情，下颌弓变窄，有呼吸困难。

1. 诊断

- A. 脑挫伤
- B. 脑震荡
- C. 颅底骨折
- D.
- E

正确答案:B



女，性

诊断：

皮肤表现是：扁平苔藓

丘疹



成釉细胞瘤有鳞状化生，角化珠的是：**棘皮瘤型**

化脓性牙髓炎病理：**大量中性粒浸润**

下颌铰链运动范围：**18-25mm**

慢性牙髓炎组织病理特点：**肉芽组织形成**

组织病理学有大量中性粒细胞：**急性化脓性牙髓炎**

上 6 有什么窝：**中央窝+远中窝**

876—56 缺失，肯式分类：二类一亚类

恶性肿瘤手术的治疗原则：综合治疗

环状龋多于哪个牙：上颌前牙

上6有几条发育沟：颊沟，近中沟，远中舌沟

上6的髓腔形态：颊舌径>近远中径>髓室高度

麻醉上6的麻醉的注射方式有：

上牙槽后、近中颊根局部浸润，腭前神经

慢性期智齿拔除，切除瘘管后：缝合

成釉细胞瘤有鳞状化生，角化珠的是：棘皮瘤型

化脓性牙髓炎病理：大量中性粒浸润

下颌铰链运动范围：18-25mm

垂直距离恢复过小：

骨膜下脓肿首选治疗措施：切开引流

颤支受损：额纹消失

颤支受损：眼睑不能闭合

冷测正常，入洞一过性疼痛：深龋

恒牙嵌入性脱位外伤复位后多久做根管治疗：2周

慢性复发性腮腺炎造影：末梢导管点球状扩张

慢性唇炎：干燥脱屑型

男，18岁，患有癫痫病，牙石（++），牙龈增生至牙面一半，PD4-6mm，未探及

釉牙骨质界：药物性牙龈肥大

颧骨骨折拍什么片：华特位片

上颌骨骨折拍什么片：华特位片

成釉细胞瘤的诊断（锯齿状）

龈沟出血指数：0正常1不出2点出3内4外5自出

缝合过程中，避免创缘内卷和外翻的目的是：防止瘢痕

局限性侵袭行牙周炎有两题：**累及的牙**

30岁，6跟切牙有问题 别的没问题 是啥病：**侵袭性牙周炎**

孕期描述不正确的是：**口腔就诊时机无特殊规定**

工地吃饭 中毒30多人，中毒，急诊诊治，需要向上级报告的时间为：**2小时**

**牙槽突骨折**，大题意思是一动全动

慢性牙髓炎组织病理特点：**肉芽组织形成**


组织病理学有大量中性粒细胞：**急性化脓性牙髓炎**

检查耳屏前方触诊：**下颌运动，髁突动度**

牙冠试戴咬合合适，边缘密合，粘固后咬合高点。冠边缘距龈原0.5mm，边缘不密合，原因：**未完全就位**

根尖周肉芽肿：看图





可复性牙髓炎、慢性龈炎、妊娠期龈炎

原发性疱疹病毒：HSV-1

血糖患者：**空腹血糖控制< 8.88mmol/L**

舌发育异常：**分叉舌**

牙髓炎最有效止痛：**牙髓摘除术**

牙本质龋的致龋菌：

最早在牙面定植菌：**球菌**

颞下颌关节脱位拍片：**许勒位片**

WHO 简化口腔卫生指数：**CI-S**

颞下、颞、翼下颌间隙感染处理：**翼下颌韧带内侧**

淋巴结转移：**舌缘癌**

口腔健康教育

意外穿髓：**直接盖髓**

上牙槽神经阻滞麻醉：**进针 3.5cm**

上颌骨骨折 I 型：**梨状孔到上颌结节**

牙体缺损并做过 RCT：**部分冠**

全口义齿吸附力主要靠：**组织面密合**

边缘封闭区不包括：**舌骨嵴**

口角标志：**尖牙和第一前磨牙之间**

年轻恒牙深龋治疗

备洞时意外穿髓时

吃卡马西平五年，然后牙龈肿，诊断什么病，做什么治疗，  
药物性牙龈增生 基础手术后多久切除牙龈。

窝沟封闭错误的是：**酸蚀达牙尖斜面 1/3**

1. 蛋白质变性的结果是

- A. 溶解度增加
- B. 化学性不便
- C. 生物活性丧失
- D. 氨基酸序列重排
- E. 肽键断裂

正确答案:C

2. 地县级卫生局向上级医疗卫生机构报告在多长时间

A. 4 小时

B. 6 小时

C. 12 小时

D. 24 小时

E. 2 小时

正确答案:E

3. 属于糖皮质激素不良反应的表现是

A. 支气管哮喘

B. 消化性溃疡

C. 低血糖

D. 低血压

E. 高血钾

正确答案: B

4. 发生医疗事故的医务人员应当承担的法律责任不包括

A. 吊销执业证书

B. 警告

C. 罚款

D. 刑事责任

E. 暂停执业活动

正确答案:C

5. 根据沙赫特有关情绪研究的观点，对个体情绪的兴趣和程度

起决定性作用的是

A. 人格的特点

- B. 社会支持程度
- C. 认知的方式
- D. 心理应对方式
- E. 智力的水平

正确答案:C

6. 处于正氮平衡状态的人群是

- A. 正常成人
- B. 大面积烧伤患者
- C. 消耗性疾病患者
- D. 生长期儿童
- E. 急性创伤患者

正确答案:B

7. 吗啡急性中毒致死的主要原因是

- A. 急性肾功能衰竭
- B. 休克
- C. 心肌梗死
- D. 惊厥
- E. 呼吸麻痹

正确答案:E

8. 中医典籍中有“天人合一”，“天人相应”

- A. 生物医学模式
- B. 生物-心理-社会医学模式

- C. 整体医学模式
- D. 神灵主义医学模式
- E. 自然哲学医学模式

正确答案:E

9. 依法责令违反技术操作规范造成严重后果的医师应警告或者责令暂停执业活动

- A. 2 年以上 3 年以下
- B. 3 个月以上 6 个月以下
- C. 1 个月以上 3 个月以下
- D. 1 年以上 2 年以下
- E. 6 个月以上 1 年以下

正确答案:E

10. 氨基糖苷类抗菌药物的主要不良反应是

- A. 心脏毒性
- B. 消化性溃疡
- C. 二重感染
- D. 肝脏毒性
- E. 耳毒性

正确答案:E

11. 肝内胆固醇代谢主要转变的物质是

- A. 维生素 D3
- B. 胆汁酸

C. 类固醇激素

D. 二氢胆固醇

E. 胆固醇酯

正确答案:B

12. 首关消除主要发生在

A. 静脉注射

B. 皮下注射

C. 肌肉注射

D. 吸入给药

E. 口服给药

正确答案:E

13. 患者因高热、咳嗽 3 天到医院就诊，确诊为上呼吸道感染，急诊科医师为其开具了处方。患者到药房取药时，药房药师以处方书写不符合要求拒绝调剂。该处方不符合书写要求的情形是

A. 诊断：上呼吸感染

B. 用法：遵医嘱

C. 空白处划一斜线以示处方完毕

D. 年龄 48 岁

E. 药品名称：复方氨酚烷胺片

正确答案:B

A. 维生素 D

B. 维生素 C

C. 维生素 B6

D. 维生素 A

E. 维生素 K

1. 具有抗氧化作用的维生素是

2. 与转氨基作用直接相关的维生素是

正确答案:BC

A. 奎尼丁

B. 硝酸甘油

C. 布洛芬

D. 阿托伐他汀

E. 头孢氨苄

1. 高胆固醇血症可选用的药物是

2. 可用于缓解拔牙后疼痛的药物是

正确答案:DC

A. 耐心倾听、正确引导

B. 尊重患者，心正无私

C. 严谨求实，防止差错

D. 对症下药，剂量安全

E. 尊重患者，知情同意

1. 医师在询问病史过程中应遵循的主要伦理要求是

2. 男医师给女患者进行妇科治疗检查时需有护士或其他医务人员在场的规定  
要求是

正确答案:AB

临床诊断要遵循的伦理要求

(1) 询问病史的伦理要求

**举止端庄，态度热情；全神贯注，语言得当；耐心倾听，正确引导。**

(2) 体格检查的伦理要求

**全面系统，认真细致；关心体贴中公医考|网编辑整理，减少痛苦；尊重患者，心正无私。**

(3) 辅助检查的伦理要求

**对于医生：综合考虑确定检查项目，目的纯正；患者知情同意，医生尽职尽责；综合分析检查结果，切忌片面性。**

1 继承恒牙迟迟不萌出，乳牙保留在恒牙列内，X线片上未见恒牙胚，应诊断为

- A. 恒牙迟萌 B. 牙齿固连
- C. 乳牙滞留 D. 异位萌出 E. 恒牙阻生

正确答案:C

2. 裂隙的定义：

- A. 龋病的好发部位
- B. 副沟相交而成凹陷部位
- C. 牙冠上不规则的凹陷部位
- D. 三条或三条以上发育沟相交处的凹陷
- E. 钙化不良而形成的凹陷

2. 【答案】E。

3. 咀嚼效率是指:

- A. 在一定时间内咀嚼磨细食物的数量
- B. 咀嚼磨细一定量食物所需的时间
- C. 在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度
- D. 在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度
- E. 咀嚼磨细食物的能力

3. 【答案】D。

4. 一次局部麻醉应用利多卡因的最大剂量是:

- A. 3. 3mg/kg B. 2. 2mg/kg
- C. 4. 4mg/kg D. 8. 8mg/kg
- E. 7. 7mg/kg

4. 【答案】C。

5. 髓腔增龄性变化的描述, 错误的是:

- A. 髓腔体积随年龄增大而不断缩小
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
- C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
- E. 随着磨耗, 髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

5. 【答案】E。

6. 纤维囊壁内出现腺体的是:

- A. 含牙囊肿 B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿 D. 根尖周囊肿
- E. 甲状舌管囊肿

6. 【答案】E。

7. .转移发生较迟且少见的口腔癌是:

- A. 唇癌 B. 舌癌
- C. 口底癌 D. 颊癌
- E. 牙龈癌

7. 【答案】A。

8. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前额突过度生长, 出生后应尽早行:

- A. 咽成型术 B. 正畸治疗
- C. 唇裂整复术 D. 牙槽突裂植骨术
- E. 腭裂整复术

8. 【答案】B。

9. 单侧下颌角骨折的最佳固定方法是:

- A. 单颌结扎
- B. 颅颌绷带固定
- C. 坚固内固定
- D. 钢丝内固定
- E. 颌间结扎

9. 【答案】C。

10. 男, 50岁。左上颌后牙肿瘤1周, 开口困难3天。检查: L7残冠, 叩诊(++) , 颊侧前庭沟稍肿, 有深压痛, 开口受限(一横指)。最可能的诊断是:

- A. 颊间隙感染
- B. 颞下间隙感染

C. 眶下间隙感染

D. 颞间隙感染

E. 翼下颌间隙感染

10. 【答案】A。

11. 关于正中联合部双发骨折，描述不正确的是：

A. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，下颌牙弓变窄

B. 骨折线两侧肌群牵引力量相等，常无明显移位

C. 正中骨折段可因降颌肌群的作用而向下后方移位

D. 两侧骨折段受下颌舌骨肌的牵引可向中线移

E. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损，可使舌后坠甚至窒息

11. 【答案】B。

12. 急性浆液性根尖周炎的病理变化时：

A. 少量中性粒细胞浸润

B. 根尖部牙槽骨骨质增生

C. 病变内间增生的鳞状上皮条索

D. 病变中大量肉芽组织形成

E. 根尖部牙骨质吸收

12. 【答案】A。

13. 男，2岁。患有唇裂。行修补手术时，需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为：

A. 眶下缘中点下1.5cm，鼻翼至耳屏连线的中点

B. 眶下缘中点下0.5cm，鼻尖至耳屏连线的中点

C. 眶下缘中点下1.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点

- D. 眶下缘中点下 0.5cm，鼻尖至睑外侧连线的中点
- E. 眶下缘中点下 0.5cm，鼻翼至睑外侧连线的中点

13. 【答案】E。

- A. 前牙和后均没有接触
- B. 非工作侧多个后牙接触
- C. 工作侧多个后牙接触
- D. 工作侧和非工作侧均没有接触
- E. 工作侧和非工作侧均有接触

14. 双侧平衡殆的咬合接触是指：

14. 【答案】E。

15. 组牙功能殆的咬合接触是指：

15. 【答案】C。

- A. 福代斯斑
- B. 牙源性囊肿
- C. 上皮剩余
- D. 侧支根管
- E. 牙颈部牙本质敏感症

16. 上皮根鞘在牙本质形成后断裂会引起：

16. 【答案】E。

17. 上皮根鞘存留在牙周膜上称为：

17. 【答案】C。

18. 上皮根鞘连续性破坏形成：

18. 【答案】D。

19. 三叉神经痛的，临床表现剧烈的是：**一侧面颊部上、下颌及舌部**

20. 唇裂，从嘴唇到鼻底间属于：**三度**

21. 下列对菌斑控制无太大作用的是：

A. 牙线 B. 软毛牙刷

C. 电动牙刷 D. 间隙刷

E. 冲牙器

21. 【答案】E。

22. 有个后牙用的卡环是多大尺寸：**1.2**

23. 成釉细胞瘤中囊性变常发生于肿瘤间质内的是：**丛状型**

24. 慢性硬性下颌下腺炎中，较多的浆细胞表达：逆行感染。

25. 牙接触向前上方滑动约1mm能够到达牙尖交错位的颌位是：**后退接触位与牙尖交错位从后退接触位。**

26. 对触压觉敏感的部位是：**舌尖、硬腭前部**

27. 引起细菌性痢疾的病原菌是：**痢疾杆菌。**

28. 直接影响活动效率，使活动顺利完成的个性心理特征称为：**能力。**

29. 与人的生物学素质有关的，典型的稳定的心理特征称为：**性格**

30. 与生成尿素直接相关的代谢途径：**尿素循环**

31. 与能量物质储存有关的代谢途径：**ATP**

32. 首关消除主要发生在：**口服给药。**

33. 上颌第一磨牙髓室顶最凹处约平齐：**颈缘。**

34. 翼下颌间隙感染一般不累及：**眶下间隙。**

35. 病理表现为血管周围上皮样细胞，淋巴细胞及浆细胞呈结节样聚集的是：**肉芽肿性唇炎。** 36. 不属于急性牙髓炎病理变化的是：**急性牙髓炎早期具有浆液性炎症的特征，可见血管扩张充血，通透性增加，液体渗出、组织水肿。后期**

是化脓性的炎症。

37. DIGEORGE 综合征的免疫学表现（）缺陷：T 细胞缺陷。
38. 什么是劣药：《药品管理法》规定，药品成分的含量不符合国家药品标准的为劣药。有下列情形之一的药品，按劣药论处：（1）未标明有效期或者更改有效期的；（2）不注明或者更改生产批号的；（3）超过有效期的；（4）直接接触药品的包装材料和容器未经批准的；（5）擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的；（6）其它不符合药品标准规定的。
39. NADPH+H 的主要功能：主要功能有：①促进脂肪的合成；②促进胆固醇合成；③作为谷胱甘肽还原酶的辅酶；④参与生物转化作用。
40. 下降软腭的肌肉：软腭是硬腭或骨性上颌后方的延伸构造。
41. 苯妥英钠造成的牙龈增生，主要增生的组织是：固有层胶原纤维。
42. 根尖周脓肿的胆固醇结晶来源于：（1）病灶内红细胞的分解；（2）病灶内淋巴细胞、浆细胞和巨噬细胞分解；（3）循环中的血浆脂质。在根尖周病灶内浓缩和晶体化，形成胆固醇结晶。
43. 拔除智齿出现颊漏怎么处理：多为残根或者牙根的根尖部发炎，及时处理牙根或者拔除残根，然后冲洗瘘管，通过 3% 双氧水、生理盐水反复多次冲洗及放置湿盐水纱布条引流，个别辅以甲硝唑冲洗，经多次换药待瘘口减小及瘘道内脓性分泌物减少后，再行搔刮瘘道严重者做瘘管清创修补术、瘘管搔刮术。
44. 口腔癌患病率的计数单位常用：根据权威部门的统计数据，口腔癌的发病率 为 1/10 万—10/10 万（即每十万人中最多可有 10 人患病），个别国家可达到 15 —30/10 万（最多达到每十万人有 30 人患病，即万分之三）。
45. 糖尿病患者血糖控制在多少时可考虑拔牙
- A. 120mg/dl B. 150mg/dl  
C. 180mg/dl D. 8.88mmol/L

E. 6. 10mmol/L

45 【答案】D

46. 下列对菌斑控制无太大作用的是

- A 牙线 B 软毛牙刷
- C 电动牙刷 D 间隙刷
- E 冲牙器

46. 【答案】E。

47. 框下神经阻滞麻醉的方向

- A. 垂直向后 B. 向后外
- C. 向后内 D. 向后上外
- E. 向后上内

47. 【答案】D。

48. 瘢痕切除植皮术，术后植皮区拆线及跟换敷料的时间

- A. 术后 3~5 天 B. 术后 5~7 天
- C. 术后 8—10 天 D. 术后 2 周
- E. 术后 1 个月

48. 【答案】C。

49. 影响种植体骨结合的因素：1. 手术创伤 2. 患者自身条件 3. 种植体材料的生物相容性 4. 种植体外形设计 5. 种植体的应力分布 6. 种植体的早期负载。

50. 显微细小血管的外径：显微血管一般分为三类：显微小血管（血管外径 3~1.1mm）、显微细小血管（血管外径 1~0.6mm）、显微微小血管（血管外径 0.5~

0.15mm)。

51. 很少发生骨膜成骨的颌骨病变：颌骨放射性骨坏死。

52. 慢性牙周炎占牙周炎的百分之多少：95%

53. 可摘义齿，导致面部酸痛的原因和咀嚼无力的原因：垂直距离恢复过高，同时临床所见上下唇闭合时肌肉稍紧张可以证明这一判断。

54. 老年人 6 牙易发生楔缺原因：1、不良刷牙方法，这是发生楔状缺损的主要原因，有人将之称为刷牙磨损，牙刷毛过硬、用力横刷等均易致楔状缺损；2、酸的作用，牙龈沟内的酸性渗出物、唾液酸性环境的作用导致牙齿硬组织脱钙；3、牙颈部结构薄弱，易被磨去，有利于缺损的发生；4、牙体组织的疲劳，牙齿颊侧的牙颈部是咬合应力集中区，长期的咀嚼咬合力，使牙体组织疲劳，于应力集中区出现破坏。

55. 妊娠期龈炎得主要病因：妊娠期龈炎与牙菌斑和患者的性激素水平升高有关。妊娠本身不会引起牙龈炎症，只是由于妊娠时性激素水平的改变，使原有的牙龈炎症加重。因此，妊娠期龈炎的直接病因仍然是牙菌斑，此外与妊娠期妇女全身内分泌改变即体内性激素水平的变化有关。临床主要分为妊娠期龈炎和妊娠期龈瘤两类。

56. 捷径检查那个那个年龄段：捷径调查所查的年龄组是 5 岁、12 岁、15 岁、35~44 岁、65~74 岁。

57. 侧舌隆突来自什么

- A 中鼻突
- B 侧鼻突
- C 联合突
- D 上颌突
- E 下颌突

【答案】E

57. 翼下颌间隙感染不会影响哪个间隙：眶下间隙。

59. 咬合力大小

60. 分解后生成乙酰 coA 物质的是

61. 慢性硬性下颌下腺炎中，较多的浆细胞表达：逆行感染。

62. 对诊断腺泡细胞癌有意义的是肿瘤细胞中含有

63. 通过病畜或带菌动物传染给人的病原体不包括

- A. 结核分枝杆菌
- B. 布鲁菌
- C. 梅毒螺旋体
- D. 鼠疫耶尔森菌
- E. 炭疽芽孢杆菌

【答案】C

64. 依法责令违反技术操作规范造成严重后果的医师暂停执业活动的期限

65. 恒牙殆力的大小顺序：第一磨牙>第二磨牙>第三磨牙>第一前磨牙>尖牙>中切牙>侧切牙。

66. 牙接触向前上方滑动约 1mm 能够到达牙尖交错位的颌位是：牙尖交错位与下颌后退接触位之间有 1mm 左右的距离，为长正中。下颌后退接触位可自如的

向前滑动 1mm, 达到完全咬合。

67. 上颌第一磨牙最高的髓角

- A. 近中舌侧 B. 近中颊侧
- C. 远中颊侧 D. 远中舌侧
- E. 第五牙尖处

67. 【答案】：B. 近中颊侧。

68. 治疗高血压的基础药物

共用题干. 女, 25岁, 刷牙出血, 牙龈肿胀, 牙松动, 皮肤有瘀斑  
缺乏什么

- A. VA B. VC
- C. VD D. 叶酸
- E. VB1

69. 【答案】B。

70. 应多摄入

- A. 粮谷类 B. 乳类
- C. 蛋类 D. 内脏
- E. 蔬菜水果

70. 【答案】E。

1. 牙龈炎患者基础治疗后采取的菌斑控制措施中错误的是

- A. 使用电动牙刷刷牙
- B. 使用牙间隙刷
- C. 用软毛牙刷刷牙

D. 用冲牙器清除软垢

E. 使用牙线

答案：B

2. 主要通过接触性传播的疾病是

A. 风疹

B. 疱疹

C. 结核

D. 水痘

E. 麻疹

答案：B

3. 排在我国口腔癌之首的是

A. 牙槽粘膜癌

B. 颊粘膜癌

C. 唇癌

D. 牙龈癌

E. 舌癌

答案：E

4. 复发性阿弗他溃疡常用的临床分型是

A. 糜烂型、非糜烂型

B. 轻型、重型、疱疹样型

C. 均质型、非均质型

D. 速发型、迟发型

E. 假膜型、红斑型、萎缩型

答案：B

5. 弹性模量与牙本质接近的桩是

A. 纤维桩

- B. 镍铬合金铸造桩
- C. 金合金铸造桩
- D. 氧化锆桩
- E. 预成钛合金桩

答案：A

6. 用于弯制磨牙卡环的钢丝直径是

- A. 0.9~1.0mm
- B. 1.3~1.5mm
- C. 0.6~0.8mm
- D. 0.3~0.5mm
- E. 1.1~1.2mm

答案：A

(7~8题共用题干)

男，8岁，左下后牙表面发黑就诊。一年前右下后牙因浅龋在口腔诊所接受过充填治疗。检

查：左下6合面深窝沟，可以卡住探针，窝沟内有黑色沉着，质地硬，无软化，右下6合面

银汞充填物完好，牙龈正常，叩诊（—），无松动，右上6合面深窝沟，可以插入探针，釉质脱矿呈白垩色。

7. 左下6最适合的治疗措施是

- A. 银汞充填
- B. 树脂充填
- C. 观察随访
- D. 窝沟封闭
- E. 非创伤性修复

答案：D

8. 右下 6 接受龋齿充填治疗属于龋病的

- A. 病因预防
- B. 一级预防
- C. 临床预防
- D. 三级预防
- E. 二级预防

答案：E

(9~11 题共用备选答案)

- A. 合支托.
- B. 连接体
- C. 间接固位体
- D. 基托
- E. 直接固位体

9. 有防止义齿翘动、摆动、旋转、下沉作用的可摘局部义齿组成部分是

10. 可摘局部义齿起主要固位作用的部分是

11. 可摘局部义齿主要起支持作用，传导合力至基牙的是

答案：CEA

(12~14 题共用备选答案)

- A. 80%
- B. 20%~60%
- C. 10%~60%
- D. 17%
- E. 95%

12. 慢性牙周炎约占牙周炎患者的比例是

13. 侧支根管以根尖 1/3 处最多，占总牙数的比例是

14. 根分叉区有副根管的比例是

答案：EDB

中等证据——螺旋体

种植体周围炎——菌斑

口腔修复前——冠延长术

下 6 近中接触区——颊 1/3~中 1/3

种植体成功标准——骨吸收小于 0.5

早起牙周炎——颌翼片

就位困难——人工牙无关

容易产生无基釉的冠修复体边缘形式——凹槽

印模材料精准度差的是——藻酸盐

桥体弯曲的变形量与桥体长度立方正比

牙体缺损的描述错误的是颜色的改变

溃疡的首选治疗是曲安奈德

粘结力的描述正确是接触面积大

附着龈的宽度正确是龈沟底到膜龈联合

牙体缺损固位力不包括吸附力

1. 面部疖痈病原菌：金黄色葡萄球菌

2. 根管预备器械旋转运动易折断：H 锉

3. 拔牙后出血多久是明显出血 30 分钟

4. 出现脑脊液鼻耳漏是哪个 三型

5. 不能用于表面麻醉的药物 普鲁卡因

6. Howship 陷窝 是破骨细胞

7. 成釉细胞瘤 角化珠形成 棘皮瘤型

8 舌下腺囊肿残留囊壁不致复发， 口外型根治摘除舌下腺， 吸

## 净囊液

- 9 考口腔癌的发病率：十万分之一
- 10 中老年人楔缺原因 刷牙方式不对，应力疲劳，
11. 上 6 , 3 条发育沟
12. 福代斯斑 - 颊部
13. 伴发脑脊液漏的是 LE FORT III 型骨折
14. 梨状孔水平、牙槽突上方是 LE FORT I 型骨折（金英杰押题原题）
15. 降低相对有效率=对照组龋齿数-试验组龋齿数 / 对照组
16. 预防性树脂充填 B 型：流动树脂材料
18. 根尖周囊肿 穿刺 - 褐色 胆固醇晶体

## 皮脂腺囊肿 穿刺 - 白色凝乳状

牙源性角化囊性瘤 - 黄白色角蛋白 黄白液体

19. 缺牙多于两个乳磨牙、两侧缺失多于一个乳磨牙，或伴有前牙缺失 - 可摘式功能性保持器
20. 单侧或双侧单个乳磨牙早失 - 带环（全冠）丝圈保持器（金英杰押题原题）
21. 听诊吹风样杂音 - 动静脉畸形
22. 隐形唇裂 - 皮肤黏膜无裂开，肌层未联合或错位联合
23. 糖尿病血糖 8.88mmol/L 以内且无酸中毒可以拔牙
24. 三叉神经痛的性质是阵发性痛
25. 摩擦剂（去除色素沉着、菌斑 碳酸钙、二氧化硅）
26. 洁净剂（降低表面张力 月桂醇硫酸钠，十二烷基）
27. 胶黏剂（防止固体 液体分离，羧甲基纤维素钠）
28. 牙石覆盖 2/3 以上，计分为 CI-S 3

29. 以下哪项是接触传染：病毒性肝炎

30. I 型单纯疱疹病毒引起：原发性疱疹性口炎

31. 窝沟封闭酸蚀面积：牙尖斜度 2/3

1. 牙槽骨修整术的手术时间应选择在拔牙后 E

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 6 个月

E. 1~3 个月

2. 某氟病区的病人，其症状可见牙微黄，并有部分人牙缺损，骨关节疼痛感，四肢僵直，进而行动困难。化验：尿氟、发氟均增高，该地氟中毒流行类型最有可能是 B

A. 食源性

B. 饮水型

C. 饮茶型

D. 煤烟型

E. 空气型

3 氟中毒的机理主要在于 B

A. 氟磷灰石被取代

B. 破坏了钙磷代谢

C. 碱性磷酸酶活性被抑制

D. 钙质在骨内过多沉积

E. 骨钙被取代

4 口角的正常位置相当于 (D) 。

A . 第二前磨牙与第一磨牙之间

B . 第一前磨牙与第二前磨牙之间

C . 第一磨牙与第二磨牙之间

D . 尖牙与第一前磨牙之间

E . 侧切牙与尖牙之间

5 施舌系带矫正术的合适年龄是 (C)

A . 6 个月

B . 1 岁

C . 1.5 岁

D . 2 岁后

E . 5 岁后、

6 义齿修复前 对口腔软组织的处理不包括 D

A. 粘膜病的治疗

B. 粘膜瘢痕组织的修整

C. 松软牙槽嵴的修整

D. 咀嚼肌功能训练

E. 唇、舌系带的修整

7. 女, 45 岁, 幽门梗阻行持续胃肠减压半月余, 每日补 10% 葡萄糖 2500ml, 5% 葡萄糖盐水 1000 ml, 10% 氯化钾 30ml。2 天前开始出现全腹膨胀, 无压痛及反跳痛, 肠鸣音消失, 每日尿量

1500ml 左右, 最可能的原因是

A. 低钾血症

B. 低钠血症

C. 高钾血症

D. 高钠血症

E. 低钙血症

答案:

A

8. 继承恒牙迟迟不萌出，乳牙保留在恒牙列内，X 线片上未见恒牙胚，应诊断为 C

A. 恒牙迟萌

B. 牙齿固连

C. 乳牙滞留

D. 异位萌出

E. 恒牙阻生

9 裂隙的定义 E

A. 龋病的好发部位

B. 副沟相交而成凹陷部位

C. 牙冠上不规则的凹陷部位

D. 三条或三条以上发育沟相交处的凹陷

E. 钙化不良而形成的凹陷

10 咀嚼效率是指 D

A. 在一定时间内咀嚼磨细食物的数量

B. 咀嚼磨细一定量食物所需的时间

C. 在一定时间内的食物咀嚼磨细的程度

D. 在一定时间内对定量食物咀嚼磨细的程度

E. 咀嚼磨细食物的能力

11. 一次局部麻醉应用利多卡因的最大剂量是 C

A. 3. 3mg/kg

B. 2. 2mg/kg

C. 4. 4mg/kg

D. 8. 8mg/kg

E. 7. 7mg/kg

12. 髓腔增龄性变化的描述，错误的是

E

- A. 髓腔体积随年龄增大而不断缩小
- B. 青少年恒牙的髓腔比老年者大
- C. 外伤、龋病的刺激使髓腔缩小加快
- D. 乳牙的髓腔比恒牙相对大
- E. 随着磨耗，髓室顶、髓角和髓室底均不断降低

13. 纤维囊壁内出现腺体的是 e

- A. 含牙囊肿
- B. 牙源性角化囊肿
- C. 鳃裂囊肿
- D. 根尖周囊肿
- E. 甲状腺囊肿

14. 转移发生较迟且少见的口腔癌是 a

- A. 唇癌
- B. 舌癌
- C. 口底癌
- D. 颊癌
- E. 牙龈癌

15. 为避免先天性双侧唇腭裂患儿前突过度生长，出生后应尽早行

- A. 咽成形术
- B. 正畸治疗
- C. 唇裂整复术
- D. 牙槽突裂植骨术
- E. 腭裂整复术

16. 单侧下颌角骨折的最佳固定方法是

- A. 单颌结扎
- B. 颅颌绷带固定
- C. 坚固内固定
- D. 钢丝内固定
- E. 颌间结扎

正确答案: C

17. 男, 50岁。左上颌后牙肿瘤1周, 开口困难3天。检查: 7 残冠, 叩诊(++)。颊侧前庭沟稍肿, 有深压痛, 开口受限(一横指)。最可能的诊断是

- A. 颊间隙感染
- B. 颞下间隙感染
- C. 眶下间隙感染
- D. 颞间隙感染
- E. 翼下颌间隙感染

正确答案: A

18. 关于正中联合部双发骨折, 描述不正确的是

- A. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损, 下颌牙弓变窄
- B. 骨折线两侧肌群牵引力量相等, 常无明显移位
- C. 正中骨折段可因降颌肌群的作用而向下后方移位
- D. 两侧骨折段受下颌舌骨肌的牵引可向中线移位
- E. 如为粉碎性骨折或有骨质缺损, 可使舌后坠甚至窒息

19. 急性浆液性根尖周炎的病理变化时

- A. 少量中性粒细胞浸润
- B. 根尖部牙槽骨增生
- C. 病变内间增生的鳞状上皮条索
- D. 病变中大量肉芽组织形成

E. 根尖部牙骨质吸收

正确答案: A

20. 男, 2岁。患有唇裂。行修补手术时, 需加用眶下神经阻滞麻醉。麻醉的进针点应为

- A. 眶下缘中点下 1.5cm, 鼻翼至耳屏连线的中点
- B. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻尖至耳屏连线的中点
- C. 眶下缘中点下 1.5cm, 鼻翼至睑外侧连线的中点
- D. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻尖至睑外侧连线的中点
- E. 眶下缘中点下 0.5cm, 鼻翼至睑外侧连线的中点

正确答案: D

- A. 前牙和后均没有接触
- B. 非工作侧多个后牙接触
- C. 工作侧多个后牙接触
- D. 工作侧和非工作侧均没有接触
- E. 工作侧和非工作侧均有接触

21. 双侧平衡希的咬合接触是指

正确答案: E

22. 组牙功能的咬合接触是指

正确答案: C

- A. 福代斯斑
- B. 牙源性囊肿
- C. 上皮剩余
- D. 侧支根管余
- E. 牙颈部牙本质敏感症

23. 上皮根鞘在牙本质形成后让不断裂会引起

正确答案: E

24 上皮根鞘残留在牙周膜中称为

正确答案： C

25. 上皮根鞘连续性破坏形成

正确答案： D

26. 变性蛋白质的主要特点是

- A. 不易被蛋白酶水解
- B. 分子量降低
- C. 溶解增加
- D. 生物学活性降低
- E. 共价键被破坏

27 以下属于医务人员个人保护

- A. 手套
- B. 口罩
- C. 防护镜
- D. 保护性工作服
- E. 以上均是

答案： E

28. 女 36 岁 开口困难伴疼痛一个月，检查：自然开口 30mm，被动开口 30mm，

开口偏向患侧，诊断为 C

- A 关节盘附着松弛
- B 关节盘后区损伤
- C 不可复性盘前移位
- D 翼外肌功能亢进
- E 可复性盘前移位