

2023 年执业/助理医师资格考试

# 笔试高频精选真题

中西医执业医师精选 600 题

金英杰中医药研究院

1.(B型题)有机整体的"中心"是

- A.脑
- B.肝
- C.心
- D.五脏
- E.经络

答案: D

解析: 五脏一体观, 即构成人体的脏腑、形体、官窍等各个组成部分, 通过经络的沟通联络作用, 构成以五脏为中心的五个生理病理系统, 系统之间在结构与功能上是完整统一的。

2.(B型题)有机整体的"五脏六腑之大主"是

- A.
- B.肝
- C.心
- D.五脏
- E.经络

答案: C

解析: 中医学认为人体是一个以心为主宰、五脏为中心的有机整体。故本题选 C。

3.(B型题)异病同治是

- A.相同的疾病用相同的方法治疗
- B.不同的疾病用不同的方法治疗
- C.相同的疾病, 不同的证就用不同的方法治疗
- D.不同的疾病, 相同的证就用相同的方法治疗
- E.相同的疾病, 不同的症状用不同的方法治疗

答案: D

解析: 异病同治, 是指不同的疾病, 在其发展过程中, 由于出现了相同的病机和相同的证, 因而也可采用相同的方法治疗。

4.(A2型题)患者急性发病, 壮热, 烦渴, 面红目赤, 尿黄, 便干, 舌苔黄。其病机是

- A.阳盛格阴
- B.阳损及阴
- C.阳热偏盛
- D.阳盛伤阴
- E.阴盛格阳

答案: C

解析: 患者急性发病, 壮热, 烦渴, 面红目赤, 尿黄, 便干, 舌苔黄, 因外感火热阳邪, 或过服辛辣温热之品, 或体内阳热之气过盛所致, 病势急骤, 属阳热偏盛, 故本题选 C。

5.(A2型题)患者久病, 畏寒喜暖, 形寒肢冷, 面色胱白, 倦卧, 小便清长, 下利清谷, 偶见小腿浮肿, 按之凹陷如泥, 舌淡脉迟。其病机是

- A.阳气亡失
- B.阳盛格阴
- C.阳损及阴
- D.阳气偏衰
- E.阳盛耗阴

答案: D

解析：■患者畏寒喜暖，形寒肢冷，面色胱白均为阳气虚衰，不能温煦的表现；倦卧亦属阳气虚衰，鼓动无力的表现；小便清长，下利清谷是脾肾阳虚，固摄无权，运化无力的表现；阳虚水泛又可见小腿浮肿，按之凹陷如泥。故本题选 D。

6.(B 型题)根据阴阳互根确定的治法是

- A.阳中求阴
- B.阳病治阴
- C.阴阳双补
- D.阴病治阳
- E.阴病治阴

答案：A

解析：此题暂无解析

7.(B 型题)"阴病治阳"的病理基础是

- A.阴虚
- B.阳虚
- C.阴胜
- D.阳胜
- E.阴阳两虚

答案：B

解析：此题暂无解析

8.(B 型题)"阳病治阴"的病理基础是

- A.阴虚
- B.阳虚
- C.阴胜
- D.阳胜
- E.阴阳两虚

答案：A

解析：此题暂无解析

9.(B 型题)阴偏衰所致的证候是

- A.实热证
- B.虚热证
- C.实寒证
- D.虚寒证
- E.寒热错杂证

答案：B

解析：此题暂无解析

10.(B 型题)以脏腑部位及功能划分阴阳，则肾属

- A.阳中之阳
- B.阴中之阴
- C.阳中之阴

- D.阴中之阳
- E.阴中之至阴

答案：B

解析：此题暂无解析

11.(B型题)阳偏衰所致的证候是

- A.实热证
- B.虚热证
- C.实寒证
- D.虚寒证
- E.寒热错杂

答案：D

解析：此题暂无解析

12.(B型题)上述选项适用于阴盛的治法是

- A.热者寒之
- B.阴中求阳
- C.寒者热之
- D.阳病治阳
- E.阴病治阳

答案：C

解析：此题暂无解析

13.(A1型题)哪项与肾藏精有关

- A.视物清晰
- B.皮毛润泽
- C.头发乌黑光泽
- D.面色红润
- E.肌肉丰满

答案：C

解析：此题暂无解析

14.(A1型题)人体阳气的根本是

- A.心阳
- B.卫阳
- C.肾阳
- D.胃阳
- E.脾阳

答案：C

解析：此题暂无解析

15.(A1型题)下列被称为“元神之府”的是

- A.
- B.髓

C.骨

D.脉

E.胆

答案：A

解析：■脑为“元神之府”。故本题选 A。

16.(B 型题)行于脉外之气是指

A.元气

B.宗气

C.营气

D.卫气

E.中气

答案：D

解析：此题暂无解析

17.(B 型题)血行脉中，不逸出脉外依靠气的

A.推动作用

B.温煦作用

C.防御作用

D.中介作用

E.固摄作用

答案：E

解析：此题暂无解析

18.(B 型题)宗气的分布是

A.上出息道，下走气街

B.熏于肓膜，散于胸腹

C.通过三焦，流行全身

D.上荣头目，达于周身

E.与血同行，环周不休

答案：A

解析：此题暂无解析

19.(A2 型题)患者，男，32岁，患肺结核多年，形体消瘦，2天前因受凉后出现恶寒发热，

咽喉疼痛，咳嗽，痰少，脉浮数。此患者可见到的舌象是

A.红绛舌，黄燥苔

B.红瘦舌，薄白苔

C.绛舌，黄白苔

D.红舌，苍老滑苔

E.淡白舌，黄裂苔

答案：B

解析：此题暂无解析

20.(A2 型题)患者，男，24岁。病人发热数天，现症见，身热夜甚，口渴不欲饮，心烦嗜睡，

时有谵语，脉细数。其舌色表现应为

- A.淡红舌
- B.红舌
- C.绛舌
- D.青紫舌
- E.绛紫舌

答案：C

解析：此题暂无解析

21.(B型题)肝在舌上分属部位是

- A.舌尖
- B.舌中
- C.舌根
- D.舌边
- E.舌底

答案：D

解析：此题暂无解析

22.(B型题)气血不足可见

- A.类剥苔
- B.黄腻苔
- C.薄黄苔
- D.灰黑而润苔
- E.灰黑而干苔

答案：A

解析：此题暂无解析

23.(B型题)食积内停者可见

- A.花剥苔
- B.黄腻苔
- C.白厚腻苔
- D.灰黑而润苔
- E.灰黑而干苔

答案：C

解析：此题暂无解析

24.(B型题)舌苔不规则脱落，边缘突起，界限清楚的是

- A.燥苔
- B.类剥苔
- C.花剥苔
- D.糙苔
- E.地图舌

答案：E

解析：此题暂无解析

25.(B型题)动脉属于

- A.浮脉类
- B.沉脉类
- C.迟脉类
- D.数脉类
- E.虚脉类

答案：D

解析：此题暂无解析

26.(B型题)寻法是

- A.医师手指用力从轻到重，按至肌肉，并调节适当指力左右推寻
- B.医师用轻取的指法取脉
- C.用一指定三关的方法诊脉
- D.三指同时用力的诊脉方法
- E.手指用力较重，甚至按到筋骨体察脉象

答案：A

解析：此题暂无解析

27.(B型题)革脉的主病是

- A.失血伤阴
- B.亡血失精
- C.惊恐疼痛
- D.寒证痛证
- E.邪闭痛极

答案：B

解析：此题暂无解析

28.(B型题)食积内停的脉象是

- A.滑脉
- B.弦脉
- C.洪脉
- D.沉脉
- E.濡脉

答案：A

解析：此题暂无解析

29.(A1型题)用何种方法可以诊断疼痛的虚实

- A.痛时姿势
- B.疼痛的部位
- C.痛处喜按或拒按
- D.痛处的颜色
- E.痛处皮肤温度

答案：C

解析：此题暂无解析

30.(A1型题)虚里按之其动微弱的临床意义是

- A.心阳不足
- B.心肺气绝
- C.宗气内虚
- D.外感热邪
- E.惊恐所致

答案：C

解析：此题暂无解析

31.(B型题)初期见高热、口渴、汗多、脉洪数，后期神疲嗜睡、食少、咽干、舌嫩红无苔、脉细数，属于

- A.真假虚实
- B.实证转虚
- C.真虚假实
- D.虚证转实
- E.虚实夹杂

答案：B

解析：此题暂无解析

32.(B型题)阳盛格阴证指

- A.真热假寒
- B.热证转寒
- C.寒证转热
- D.真寒假热
- E.阴阳两虚

答案：A

解析：此题暂无解析

33.(B型题)畏寒，痰、涎、涕清稀，舌淡，苔白而润，脉紧属于

- A.热证
- B.寒证
- C.阳证
- D.阴证
- E.实证

答案：B

解析：此题暂无解析

34.(A1型题)下列各项，不属于真寒假热证临床表现的是

- A.四肢凉厥冷
- B.面色浮红
- C.小便清长
- D.躁扰不宁

E. 疲乏无力

答案：A

解析：此题暂无解析

35.(A1型题)下列各项，不属于真寒假热证临床表现的是

- A.自觉发热反欲盖衣被
- B.面色浮红如妆
- C.口渴而喜饮
- D.咽痛而不红肿
- E.脉浮大或数按之无力

答案：C

解析：此题暂无解析

36.(A1型题)阳虚证最主要的表现是

- A.舌质淡白苔薄白
- B.口不渴或少饮
- C.面色白而无华
- D.脉沉细无力
- E.经常畏寒肢凉

答案：E

解析：●阳虚则外寒，温煦功能下降，所以经常畏寒肢凉是阳虚的主症；舌质淡白苔薄白，口不渴或少饮正常人或表证患者也会出现；面色白而无华是血虚的表现；脉沉细无力可以是阳虚，也可以是气虚。

37.(A1型题)湿热积滞结肠腑证代表方剂的药物组成是

- A.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄芩、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- B.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、麦芽、连翘、紫草、木通、生甘草
- C.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、紫草、木通、生甘草
- D.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、银花、紫草、木通、生甘草
- E.枳实、生锦纹、山楂、槟榔、厚朴、黄连、神曲、连翘、丹皮、木通、生甘草

答案：C

解析：此题暂无解析

38.(A1型题)上述证型的代表方剂是

- A.三仁汤
- B.至宝丹
- C.麻杏石甘汤
- D.银翘散
- E.王氏连朴饮

答案：A

解析：此题暂无解析

39.(A1型题)贝壳、甲壳、化石等类药物入汤剂的用法是

- A.先煎

- B.后下
- C.布包煎
- D.另煎
- E.烊化兑服

答案：A

解析：此题暂无解析

40.(A1型题)宜饭后服用的药物是

- A.峻下逐水药
- B.对胃肠有刺激性的药
- C.驱虫药
- D.安神药
- E.截疟药

答案：B

解析：此题暂无解析

41.(A1型题)辛夷入汤剂宜

- A.烊化
- B.冲服
- C.后下
- D.包煎
- E.先煎

答案：D

解析：◎辛夷有毛，易刺激咽喉，故入煎宜包煎。

42.(A1型题)钩藤入汤剂宜

- A.先煎
- B.后下
- C.包煎
- D.另煎
- E.烊化

答案：B

解析：■有效成分不耐煎煮，久煎容易破坏的药（如青蒿、大黄、番泻叶、臭梧桐、麦芽、谷芽、神曲、白芥子、杏仁、钩藤等）所以入汤剂宜后下。故本题选B。二、

43.(B型题)番泻叶的功效是

- A.泻下通便，行水消胀
- B.泻下通便，清肝，杀虫
- C.泻下逐水，杀虫
- D.行气利水，杀虫
- E.泻下逐水，消肿

答案：A

解析：此题暂无解析

44.(B型题)具有润燥软坚功效的药物是

- A.大黄
- B.芒硝
- C.番泻叶
- D.芦荟
- E.火麻仁

答案：B

解析：此题暂无解析

45.(B型题)芒硝的功效是

- A.通便泻火，解毒祛瘀
- B.泻水逐饮，祛痰止咳，杀虫疗疮
- C.泻下逐饮，消肿散结
- D.泻下攻积，润燥软坚，清热消肿
- E.泻热通便，杀虫疗疳

答案：D

解析：此题暂无解析

46.(B型题)郁李仁的主治病证是

- A.寒积便秘
- B.热积便秘
- C.阳虚便秘
- D.肠燥便秘
- E.虫积便秘

答案：D

解析：此题暂无解析

47.(A1型题)治疗寒积便秘，应选用的药物是

- A.甘遂
- B.大黄
- C.芒硝
- D.巴豆
- E.牵牛子

答案：D

解析：此题暂无解析

48.(A1型题)下列各项，不宜与牵牛子配伍的药物是

- A.芒硝
- B.五灵脂
- C.硫黄
- D.巴豆
- E.郁金

答案：D

解析：此题暂无解析

49.(A1型题)治疗胃肠实热积滞的高热、神昏谵语，应选用的药物是

- A.甘遂
- B.火麻仁
- C.郁李仁
- D.牵牛子
- E.大黄

答案：E

解析：此题暂无解析

50.(A1型题)治疗肠燥便秘，水肿腹满者，应选用的药物是

- A.火麻仁
- B.杏仁
- C.桃仁
- D.郁李仁
- E.松子仁

答案：D

解析：此题暂无解析

51.(A1型题)下列各项，多制成霜使用的药物是

- A.火麻仁
- B.郁李仁
- C.巴豆
- D.牵牛子
- E.大黄

答案：C

解析：此题暂无解析

52.(A1型题)"十九畏"中，与巴豆相畏的是

- A.甘草
- B.朴硝
- C.藜芦
- D.牵牛子
- E.郁金

答案：D

解析：此题暂无解析

53.(A1型题)下列各项，不属攻下药适应证的是

- A.饮食积滞
- B.虚寒泻痢
- C.血热妄行
- D.冷积便秘
- E.大肠燥热

答案：B

解析：此题暂无解析

54.(A1型题)甘遂、京大戟、芫花均有毒，内服时的用法是

- A.久煎
- B.醋制
- C.酒制
- D.后下
- E.姜汁制

答案：B

解析：此题暂无解析

55.(A1型题)泻下药中有效成分不溶于水，宜入丸散的药物是

- A.芒硝
- B.番泻叶
- C.火麻仁
- D.牵牛子
- E.甘遂

答案：E

解析：此题暂无解析

56.(A1型题)下列各项，不属大黄功效的是

- A.泻下攻积
- B.软坚润燥
- C.逐瘀通经
- D.凉血解毒
- E.清热泻火

答案：B

解析：此题暂无解析

57.(A1型题)芒硝入汤剂的用法是

- A.先煎
- B.后下
- C.包煎
- D.冲服
- E.另煎

答案：D

解析：此题暂无解析

58.(A1型题)具有祛痰止咳功效的药物是

- A.牵牛子
- B.芫花
- C.商陆
- D.甘遂
- E.大戟

答案：B

解析：此题暂无解析

59.(A1型题)具有凉血解毒功效的药物是

- A.大黄
- B.芒硝
- C.芦荟
- D.火麻仁
- E.桃仁

答案：A

解析：◎A项功效为泻下攻积，清热泻火，凉血止血，解毒，活血祛瘀，清泄湿热。B项功效为泻下，软坚，清热。C项功效为泻下，清肝，杀虫。D项功效为润肠通便。E项功效为活血祛瘀，润肠通便，止咳平喘。

60.(A1型题)具有消肿散结功效的药物是

- A.芫花
- B.巴豆
- C.甘遂
- D.牛子
- E.芦荟

答案：C

解析：■芫花泻下逐饮、祛痰止咳、外用杀虫疗疮。巴豆泻下冷积、逐水退肿、祛痰利咽。甘遂泻下逐饮、消肿散结。牛子泻下、逐水、去积、杀虫。芦荟泻下凉肝、杀虫。故本题选C。

61.(B型题)川楝子的功效是

- A.行气止痛，温肾纳气
- B.行气止痛，杀虫，解毒消肿
- C.行气止痛，杀虫疗癣
- D.行气止痛，温肾纳气，降逆调中
- E.行气止痛，温肾散寒

答案：C

解析：此题暂无解析

62.(A1型题)具有行气止痛、杀虫疗癣功效的药物是

- A.乌药
- B.沉香
- C.川楝子
- D.荔枝核
- E.薤白

答案：C

解析：此题暂无解析

63.(A1型题)具有行气止痛、温肾散寒功效的药物是

- A.乌药
- B.沉香
- C.川楝子
- D.木香
- E.薤白

答案：A

解析：此题暂无解析

64.(B型题)荔枝核的功效是

- A.行气止痛，化痰调中
- B.行气止痛，健脾消食
- C.行气杀虫，解毒消肿
- D.行气散结，散寒止痛
- E.行气调中，温肾纳气

答案：D

解析：此题暂无解析

65.(A1型题)陈皮的主要功效是

- A.疏肝解郁，化湿止呕
- B.理气健脾，燥湿化痰
- C.温肺化痰，行气止痛
- D.温经散寒，行气活血
- E.理气调中，温肾纳气

答案：B

解析：此题暂无解析

66.(A1型题)治疗寒郁气滞之胸闷胁痛，肾阳不足之遗尿、尿频，应选用的药物是

- A.木香
- B.沉香
- C.乌药
- D.丁香
- E.小茴香

答案：C

解析：此题暂无解析

67.(A1型题)下列各项，不属木香主治病证的是

- A.三焦气滞
- B.肺气阻滞
- C.肝胆气郁
- D.脾胃气滞
- E.大肠气滞

答案：B

解析：此题暂无解析

68.(A1型题)下列各项，不属陈皮功效的是

- A.理气
- B.健脾
- C.燥湿
- D.疏肝
- E.化痰

答案：D

解析：此题暂无解析

69.(A2型题)患者，女，26岁。产后20天，乳房胀痛，乳漏不止，要求回乳，用药应选用的药物是

- A.炒麦芽
- B.炒稻芽
- C.炒神曲
- D.炒山楂
- E.炒槟榔

答案：A

解析：此题暂无解析

70.(B型题)山楂的功效是

- A.消食化积，行气散瘀
- B.消食化积，杀虫止痒
- C.消食化积，发散风寒
- D.消食化积，固精止遗
- E.消食和中，健脾开胃

答案：A

解析：此题暂无解析

71.(B型题)善消肉食积滞的药物是

- A.莱菔子
- B.鸡内金
- C.山楂
- D.麦芽
- E.神曲

答案：C

解析：此题暂无解析

72.(B型题)稻芽的功效特点是

- A.消食兼能散瘀
- B.消食兼能回乳
- C.消食兼能疏肝
- D.消食兼能化痰
- E.消食兼能和中

答案：E

解析：此题暂无解析

73.(B型题)胆结石兼消化不良，应选用的药物是

- A.莱菔子
- B.麦芽
- C.鸡内金
- D.山楂
- E.使君子

答案：C

解析：此题暂无解析

74.(B型题)消食药配伍补脾调胃药，可治疗的病证是

- A.食滞中焦，脾胃气滞
- B.宿食积滞，郁而化热
- C.食积不化，湿浊中阻
- D.脾胃虚弱，运化无力
- E.食滞不化，寒凝中焦

答案：D

解析：此题暂无解析

75.(B型题)鸡内金的功效特点是

- A.消食兼能杀虫
- B.消食兼能发表
- C.消食兼能疏肝
- D.消食兼能化石
- E.消食兼能化痰

答案：D

解析：此题暂无解析

76.(A1型题)治疗食积腹痛，疝气痛，应选用的药物是

- A.麦芽
- B.稻芽
- C.神曲
- D.山楂
- E.鸡内金

答案：D

解析：此题暂无解析

77.(A1型题)善化油腻肉食积滞的药物是

- A.莱菔子
- B.山楂
- C.木香
- D.麦芽
- E.陈皮

答案：B

解析：此题暂无解析

78.(A1型题)治疗外感表证兼有食积者，宜选用的药物是

- A.神曲
- B.麦芽
- C.青皮
- D.莪术
- E.山楂

答案：A

解析：◎A项长于消食化积、健脾和胃，略建有解表之功，对伤食发热泄泻，或食滞兼外感者尤适宜。B项为食积腹满之良药，又善治米面类食滞不化者，又用于断乳或乳溢及肝郁气滞或肝胃不和。C项长于疏肝胆、破结气。又兼入胃经能消积化滞。D项功善破血行气、消积止痛，为破血消癥要药。有治宿食不消之脘腹胀痛等症。E项善于消食化积，可治诸般食积停滞，尤为消油腻肉积之要药，又善活血化瘀常治产后瘀滞腹痛、经闭、痛经及瘀滞胸胁痛等症，炒炭后可治泻痢腹痛。

79.(A2型题)患者小便短数，灼热刺痛，色黄赤，舌苔黄腻，脉濡数。治疗应选用

- A.大蓟
- B.地榆
- C.槐花
- D.白茅根
- E.侧柏叶

答案：D

解析：●白茅根除了有凉血止血的功效外，还有清热利尿的功效，可用于治疗热淋，因此对本题所描述的病证，最为适宜。地榆为味苦性寒凉之品，有凉血止血、解毒的功效，用于血热所致的出血病证，同时还有敛疮的功效，可用于烫伤、湿疹和疮疡肿毒等证。槐花、侧柏叶都可凉血止血，用于血热所致的出血诸病证，同时槐花还可清肝火；侧柏叶还可化痰止咳。

80.(B型题)白及具有的功效是

- A.凉血止血
- B.收敛止血
- C.化瘀止血
- D.温经止血
- E.补虚止血

答案：B

解析：此题暂无解析

81.(B型题)血余炭的功效是

- A.收敛止血，化瘀利尿
- B.温经止血，散寒调经，安胎
- C.温中止血，止呕止泻
- D.凉血止血，化瘀乌发
- E.凉血止血，活血祛瘀

答案：A

解析：此题暂无解析

82.(B型题)梔子的功效是

- A.散瘀解毒消痈
- B.清热安胎
- C.祛痰止咳
- D.泻火除烦
- E.泻下通便

答案：D

解析：此题暂无解析

83.(B型题)艾叶治疗的胎动不安是

- A.血虚胎动不安
- B.热盛胎动不安
- C.血瘀胎动不安
- D.气虚胎动不安
- E.寒客胞宫胎动不安

答案：E

解析：此题暂无解析

84.(B型题)具有疏肝解郁、宁心安神功效的药物是

- A.石菖蒲
- B.远志
- C.龙骨
- D.酸枣仁
- E.合欢皮

答案：E

解析：此题暂无解析

85.(B型题)既能活血散瘀，又能镇惊安神的药物是

- A.合欢皮
- B.酸枣仁
- C.远志
- D.琥珀
- E.磁石

答案：D

解析：◎A项功效为安神解郁、活血消肿。B项功效为养心益肝、安神、敛汗。C项宁心安神、祛痰开窍、消散痈肿。D项功效为镇惊安神、活血散瘀、利尿通淋。E项功效为镇惊安神、平肝潜阳、聪耳明目、纳气气喘。

86.(A1型题)具有镇惊安神、利尿通淋功效的药物是

- A.朱砂
- B.琥珀

- C.龙骨
- D.柏子仁
- E.远志

答案：B

解析：此题暂无解析

87.(A1型题)磁石入汤剂的用法是

- A.后下
- B.包煎
- C.烊化
- D.冲服
- E.先下

答案：E

解析：此题暂无解析

88.(A1型题)治疗痰阻心窍所致的癫痫抽搐、惊风发狂者，应选用的药物是

- A.磁石
- B.朱砂
- C.龙骨
- D.远志
- E.琥珀

答案：D

解析：此题暂无解析

89.(A1型题)治疗血不养心引起的虚烦不眠、惊悸怔忡之证，应选用的药物是

- A.酸枣仁、柏子仁
- B.菖蒲、远志
- C.牡蛎、龙骨
- D.朱砂、磁石
- E.珍珠母、磁石

答案：A

解析：此题暂无解析

90.(B型题)牡蛎的功效是

- A.平肝潜阳，清肝明目
- B.软坚散结，平肝潜阳
- C.软坚散结，利水
- D.软坚散结，滋阴潜阳
- E.软坚散结，活血止痛

答案：B

解析：此题暂无解析

91.(B型题)治疗肝阳上亢，胃痛吐酸，应选用的药物是

- A.天麻

- B.羚羊角
- C.代赭石
- D.地龙
- E.牡蛎

答案：E

解析：此题暂无解析

92.(B型题)治疗惊痫抽搐，热毒发斑，应选用的药物是

- A.半夏
- B.天南星
- C.天麻
- D.羚羊角
- E.地龙

答案：D

解析：此题暂无解析

93.(B型题)治疗急慢惊风，应选用的药物是

- A.羚羊角
- B.天麻
- C.全蝎
- D.石决明
- E.僵蚕

答案：B

解析：此题暂无解析

94.(B型题)治疗中风痰壅、口眼喰斜，破伤风之证者，应选用的药物是

- A.羚羊角
- B.天南星
- C.天麻
- D.地龙
- E.白芥子

答案：B

解析：此题暂无解析

95.(B型题)蜈蚣的功效是

- A.祛风止痉，燥湿化痰，解毒散结
- B.息风镇痉，攻毒散结，通络止痛
- C.祛风定惊，化痰散结
- D.息风止痉，平肝潜阳，祛风除痹
- E.息风止痉，解毒散结，通络利尿

答案：B

解析：此题暂无解析

96.(B型题)代赭石的功效是

- A.息风止痉
- B.重镇降逆
- C.清肝明目
- D.软坚散结
- E.清热解毒

答案：B

解析：此题暂无解析

97.(A1型题)具有平肝疏肝功效的药物是

- A.钩藤
- B.薄荷
- C.柴胡
- D.刺蒺藜
- E.沙苑子

答案：D

解析：此题暂无解析

98.(A1型题)治疗痰热阻闭心窍之神昏、口噤等症，应选用的药物是

- A.黄连
- B.梔子
- C.玄参
- D.牛黄
- E.连翘

答案：D

解析：此题暂无解析

99.(A2型题)患者，女，47岁。五心烦热，潮热盗汗，腰酸腿软，行走无力，舌质

- A.龟甲
- B.牡蛎
- C.知母
- D.黄柏
- E.地骨皮

答案：A

解析：此题暂无解析

100.(A2型题)患者，男，47岁。腰膝酸软，头晕耳鸣，肢冷畏寒，阳事无力，夜尿频数，舌质淡，脉弱无力。用药应首选的药物是

- A.鹿茸
- B.淫羊藿
- C.仙茅
- D.熟地黄
- E.杜仲

答案：A

解析：此题暂无解析

101.(A2型题)患者，男，42岁。发热1周经治疗，热势已减，现身倦乏力，面色萎黄，大便秘结，舌红少苔，脉细弱。用药应首选的药物是

- A.人参、当归
- B.芒硝、甘草
- C.附子、干姜、麻黄
- D.生地黄、玄参
- E.厚朴、枳实

答案：A

解析：此题暂无解析

102.(A2型题)患者，男，43岁。口渴咽干，心烦失眠，舌红少津，脉细数。用药应首选的药物是

- A.黄连
- B.朱砂
- C.远志
- D.柏子仁
- E.麦冬

答案：E

解析：此题暂无解析

103.(A2型题)患者，男，50岁。时有咳嗽，动则气喘，阳事无力，用药应首选的药物是

- A.西洋参
- B.白果
- C.蛤蚧
- D.五味子
- E.杏仁

答案：C

解析：此题暂无解析

104.(A2型题)患者，男，54岁。1个月前患肺炎，曾发烧咳嗽2周，现已经初愈，但仍气短懒言，食欲不振，口干欲饮，舌红少苔，脉细无力。用药应首选的药物是

- A.人参
- B.党参
- C.太子参
- D.西洋参
- E.北沙参

答案：D

解析：此题暂无解析

105.(B型题)白术的功效是

- A.补脾益气，托毒生肌
- B.补脾益气，益卫固表
- C.滋阴润肺，生津养胃

- D. 补脾益气，养血安神
- E. 补脾益气，止汗安胎

答案：E

解析：此题暂无解析

106.(A1型题)当归的功效是

- A. 活血
- B. 柔肝
- C. 润肺
- D. 敛阴
- E. 益髓

答案：A

解析：此题暂无解析

107.(B型题)天冬的主治病证是

- A. 热病伤阴、虚风内动
- B. 心烦失眠、烦躁不安
- C. 脾胃虚弱、食欲不振
- D. 热病伤阴、津亏消渴
- E. 阴虚阳亢、虚风内动

答案：D

解析：此题暂无解析

108.(B型题)墨旱莲的功效是

- A. 解毒敛疮，凉血止血
- B. 散瘀消痛，凉血止血
- C. 活血化瘀止血，通经
- D. 解毒消痈，凉血止血
- E. 滋补肝肾，凉血止血

答案：E

解析：此题暂无解析

109.(B型题)黄芩的主治病证是

- A. 妊娠恶阻，胎动不安
- B. 妊娠胎漏下血，胎动欲坠
- C. 妊娠胎热，胎动不安
- D. 妊娠肝肾亏虚，胎动不安
- E. 妊娠脾虚气弱，胎动不安

答案：C

解析：此题暂无解析

110.(A2型题)患者，男，42岁。小便频数，夜尿尤多，阳事无力，用药应首选的药物是

- A. 鸡内金
- B. 桑螵蛸

C.海螵蛸

D.乌药

E.益智仁

答案：B

解析：此题暂无解析

111.(B型题)海螵蛸的功效是

A.宁心安神

B.生津安蛔

C.固精缩尿

D.收敛止血

E.下气利咽

答案：D

解析：此题暂无解析

112.(B型题)治疗胃痛吐酸、湿疮湿疹，应选用的药物是

A.覆盆子

B.海螵蛸

C.金樱子

D.芡实

E.山茱萸

答案：B

解析：此题暂无解析

113.(B型题)治疗肝肾亏虚诸证，应选用的药物是

A.五倍子

B.五味子

C.山茱萸

D.莲子

E.椿皮

答案：C

解析：此题暂无解析

114.(B型题)肉豆蔻的功效是

A.温中行气，涩肠止泻

B.益肾固精，健脾止泻，除湿止带

C.涩肠止泻，生肌敛疮

D.清热燥湿，收敛止带，止泻，止血

E.涩肠止泻，固精缩尿止带

答案：A

解析：此题暂无解析

115.(B型题)治疗虚寒气滞，久泻不止，应选用的药物是

A.芡实

- B.赤石脂
- C.莲子
- D.浮小麦
- E.肉豆蔻

答案：E

解析：此题暂无解析

116.(B型题)治疗久咳虚喘，久泻久痢，遗精滑精，自汗盗汗，崩漏下血，应选用的药物是

- A.诃子
- B.乌梅
- C.五味子
- D.五倍子
- E.龙骨

答案：D

解析：此题暂无解析

117.(B型题)具有益肾固精，养心安神功效的药物是

- A.枸杞子
- B.五倍子
- C.莲子
- D.诃子
- E.金樱子

答案：C

解析：■枸杞子补肝肾阴，益精，补血，明目。五倍子止泻，止血，敛汗，涩精，化痰止咳。莲子益肾固精，补脾止泻，养心安神。诃子熟诃子：止泻；生诃子：清肺止咳，利咽开音，止血。金樱子固精，缩尿，止带，止泻。故两题均选C。

118.(A1型题)五味子的主治病证是

- A.肺燥咳嗽
- B.肺热咳嗽
- C.外感咳嗽
- D.肺虚久咳
- E.肺寒咳嗽

答案：D

解析：此题暂无解析

119.(A1型题)治疗脾肾阳虚，五更泄泻，补骨脂常配伍的药物是

- A.黄连
- B.肉豆蔻
- C.槟榔
- D.莲子
- E.乌梅

答案：B

解析：此题暂无解析

120.(A1型题)治疗湿疮肿毒，便血痔血，应选用的药物是

- A.山茱萸
- B.五味子
- C.桑螵蛸
- D.五倍子
- E.海螵蛸

答案：D

解析：此题暂无解析

121.(A1型题)具有健脾止泻、除湿止带、益肾固精功效的药物是

- A.白术
- B.五倍子
- C.秦皮
- D.莲子
- E.乌梅

答案：D

解析：此题暂无解析

122.(A1型题)具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心功效的药物是

- A.乌梅
- B.浮小麦
- C.麻黄根
- D.山茱萸
- E.五味子

答案：E

解析：此题暂无解析

123.(A1型题)具有固表止汗，益气除热功效的药物是

- A.麻黄根
- B.浮小麦
- C.麻黄
- D.五味子
- E.山茱萸

答案：B

解析：●麻黄根、浮小麦均有敛肺止汗的功效，用于自汗盗汗，但同时浮小麦还有益气除热的功效，可用于治疗骨蒸劳热。五味子为酸涩收敛之品，有敛肺涩肠、生津的功效，可用于治疗久咳虚喘、津伤口渴及消渴等病证，同时五味子还有敛汗、滋肾、涩精、宁心安神等功效，用于自汗盗汗，遗精滑精和心悸失眠多梦等病证。而麻黄为辛温解表剂，治疗表实无汗证；山茱萸为滋补肝肾之品。

124.(A1型题)治疗久泻久痢，久咳失音，应选用的药物是

- A.蝉蜕
- B.白术

C.桔梗

D.诃子

E.薄荷

答案：D

解析：此题暂无解析

125.(A1型题)麻黄根与浮小麦具有的共同功效是

A.止泻

B.止咳

C.止遗

D.止汗

E.止血

答案：D

解析：此题暂无解析

126.(A1型题)具有固精缩尿止带兼能涩肠止泻功效的药物是

A.金樱子

B.桑螵蛸

C.覆盆子

D.赤石脂

E.乌梅

答案：A

解析：此题暂无解析

127.(A1型题)五倍子与五味子具有的共同功效是

A.清肺降火

B.益气生津

C.宁心安神

D.敛肺止汗

E.理气止痛

答案：D

解析：此题暂无解析

128.(B型题)治疗阳痿，疥癣湿疹，应选用的药物是

A.硫黄

B.白鲜皮

C.秦皮

D.土茯苓

E.乌梅

答案：A

解析：此题暂无解析

129.(B型题)雄黄入丸散，成人每次用量是

A.0.5~1g

B.0.05~0.1g

C.0.001~0.01g

D.1.5~3g

E.2~10g

答案：B

解析：此题暂无解析

130.(A1型题)硫黄的功效是

A.杀虫补血

B.杀虫通便

C.杀虫止痒，燥湿，温肾壮阳

D.解毒利咽

E.杀虫涌吐

答案：B

解析：此题暂无解析

131.(A1型题)主治疥癣湿疹，虚寒冷哮，应选用的药物是

A.雄黄

B.芡实

C.乌梅

D.硫黄

E.白矾

答案：D

解析：此题暂无解析

132.(A1型题)内服宜与豆腐同煮的药物是

A.雄黄

B.硫黄

C.蛇床子

D.白矾

E.蜂房

答案：B

解析：此题暂无解析

133.(A1型题)硫黄的功效是

A.收湿止痒

B.祛风止痒

C.杀虫止痒

D.凉血止痒

E.燥湿止痒

答案：C

解析：此题暂无解析

134.(A1型题)外用内服均具有收敛止血功效的药物是

- A.白矾
- B.雄黄
- C.降香
- D.蜂房
- E.硫黄

答案：A

解析：此题暂无解析

135.(A1型题)可解毒杀虫，补火助阳，通便的药物是

- A.砒石
- B.轻粉
- C.雄黄
- D.硫磺
- E.升药

答案：D

解析：■硫磺的功效可解毒杀虫，补火助阳，通便。故本题选 D。二、

136.(B型题)具有攻毒杀虫、祛痰平喘功效的药物是

- A.砒石
- B.炉甘石
- C.硫黄
- D.硼砂
- E.莲子

答案：A

解析：此题暂无解析

137.(B型题)升药与煅石膏的用量比例为 1:9 者称

- A.九转丹
- B.五五丹
- C.九一丹
- D.七三丹
- E.轻粉

答案：C

解析：此题暂无解析

138.(A1型题)具有清热解毒、清肺化痰功效的药物是

- A.黄连
- B.苦参
- C.硼砂
- D.乌梅
- E.土茯苓

答案：C

解析：此题暂无解析

139.(A1型题)升药的功效是

- A.清热解毒
- B.杀虫止痒
- C.拔毒去腐
- D.敛疮生肌
- E.消肿散结

答案：C

解析：此题暂无解析

140.(B型题)大黄牡丹汤的功用是

- A.攻下冷积，温补脾阳
- B.润肠泄热，行气通便
- C.温里散寒，通便止痛
- D.泻热破瘀，散结消肿
- E.泄热通便，补益气血

答案：D

解析：此题暂无解析

141.(B型题)济川煎的功用是

- A.温肾益精，润肠通便
- B.滋阴增液，通便泻热
- C.润肠泄热，行气通便
- D.养阴清热，润肠通便
- E.滋阴养血，润肠通便

答案：A

解析：此题暂无解析

142.(A1型题)功用为泻热逐水的方剂是

- A.十枣汤
- B.大承气汤
- C.大陷胸汤
- D.济川煎
- E.大黄牡丹汤

答案：C

解析：此题暂无解析

143.(A1型题)麻子仁丸适用于

- A.阴虚便秘
- B.血虚便秘
- C.阳虚便秘
- D.气虚便秘
- E.燥热伤津便秘

答案：E

解析：此题暂无解析

144.(A1型题)不属于麻子仁丸组成药物的是

- A.芍药
- B.杏仁
- C.大黄
- D.厚朴
- E.甘草

答案：E

解析：●该方由麻子仁、枳实、芍药、大黄、厚朴、杏仁组成，方中不含甘草，主治脾约证。

145.(A1型题)黄龙汤的组成药物除大黄、芒硝、枳实、厚朴、桔梗外，其余的是

- A.生地玄参麦冬
- B.人参当归甘草
- C.人参当归牛膝
- D.当归芍药麦冬
- E.生地海参玄参

答案：B

解析：此题暂无解析

146.(A1型题)小柴胡汤的组成是

- A.柴胡黄芩干姜人参茯苓甘草大枣
- B.柴胡黄芩半夏枳实干姜人参甘草
- C.柴胡黄芩半夏人参炙甘草生姜大枣
- D.柴胡黄连半夏人参甘草生姜大枣
- E.柴胡黄芩黄芪半夏甘草生姜大枣

答案：C

解析：此题暂无解析

147.(A1型题)柴葛解肌汤与大柴胡汤的组成药物中均含有的是

- A.枳实、芍药
- B.桔梗、芍药
- C.黄芩、半夏
- D.黄芩、桔梗
- E.黄芩、芍药

答案：E

解析：◎柴葛解肌汤的药物组成方歌为“亲差高举枪，白要姜枣草根”，大柴胡汤的组成方歌是“人抄大实药”。

148.(B型题)金铃子散主治

- A.肝郁气滞胁痛
- B.肝郁化火胁痛
- C.肝郁血虚胁痛
- D.肝郁阴虚胁痛
- E.肝胆实火胁痛

答案：B

解析：此题暂无解析

149.(A1型题)以养阴透热为主要功用的方剂是

- A.清胃散
- B.犀角地黄汤
- C.竹叶石膏汤
- D.青蒿鳖甲汤
- E.清营汤

答案：E

解析：此题暂无解析

150.(A1型题)由石膏、熟地、麦冬、知母、牛膝组成的方剂是

- A.玉女煎
- B.泻白散
- C.白虎汤
- D.清胃散
- E.麦门冬汤

答案：A

解析：此题暂无解析

151.(A1型题)下列各项中，不属于竹叶石膏汤组成药物的是

- A.人参粳米
- B.石膏麦冬
- C.知母生地
- D.甘草半夏
- E.竹叶麦冬

答案：C

解析：此题暂无解析

152.(A1型题)由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是

- A.犀角地黄汤
- B.凉膈散
- C.普济消毒饮
- D.仙方活命饮
- E.清营汤

答案：E

解析：此题暂无解析

153.(A1型题)治疗紫癜血热伤络证，应首选

- A.茜根散
- B.归脾汤
- C.泻心汤
- D.龙胆泻肝汤

E.犀角地黄汤

答案：E

解析：◎犀角地黄汤主治热入血分证。表现为热伤血络，斑色紫黑。热扰心神，身热谵语

154.(A1型题)阴虚火旺，发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，便结溲黄，舌红，脉数者，治疗应选用

A.大补阴丸

B.知柏地黄丸

C.六味地黄丸

D.当归六黄汤

E.牡蛎散

答案：D

解析：■当归六黄汤主治发热，盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数。大补阴丸的主治阴虚火旺，潮热盗汗，咳嗽咯血，耳鸣遗精。知柏地黄丸的主治阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。六味地黄丸的主治头晕耳鸣，腰膝酸软，遗精盗汗。六味地黄丸用于用于头晕耳鸣，腰膝酸软，遗精盗汗。牡蛎散的主治自汗，盗汗。常自汗出，夜卧更甚，心悸惊惕，短气疲倦，舌淡红，脉细弱。故本题选 D。

155.(A1型题)具有解毒消痈，化痰散结，活血祛瘀功用的方剂是

A.四妙勇安汤

B.犀黄丸

C.仙方活命饮

D.大黄牡丹汤

E.苇茎汤

答案：B

解析：犀黄丸清热解毒，化痰散结，活血消肿，祛瘀止痛，主治乳岩、横痃、瘰疬、痰核、流注、肺痈、小肠痈等病。故本题选 B。

156.(B型题)感受暑湿，身热烦渴，小便不利或大便泄泻者，治宜选用

A.藿香正气散

B.香薷饮

C.参苓白术散

D.六一散

E.桂苓甘露散

答案：D

解析：此题暂无解析

157.(B型题)新加香薷饮的功效是

A.祛暑解表，化湿和中

B.祛暑解表，清热化湿

C.清暑解热，化气利湿

D.清暑化湿，理气和中

E.祛暑化湿；健脾和中

答案：B

解析: ■香薷散祛暑解表, 化湿和中, 主治夏月伤于寒湿之阴暑证。故选 A。新加香薷饮祛暑解表, 清热化湿, 主治暑湿复感于寒湿证。故选 B。

158.(A1型题)清暑益气汤的功用是

- A.清暑除烦, 益气和胃
- B.清暑益气, 养阴生津
- C.清暑利湿, 益气和胃
- D.清暑益气, 和胃止呕
- E.益气养阴, 清透暑热

答案: B

解析: 此题暂无解析

159.(A1型题)治疗暑湿袭表证之高热, 应首选:

- A.银翘散
- B.麻杏石甘汤
- C.甘露消毒丹
- D.新加香薷饮
- E.清骨散

答案: D

解析: ■A 辛凉解表、清热解毒, 主治温病初起, 温邪初犯肺卫证。B 辛凉宣泄, 清肺平喘, 主治表邪未解, 肺热壅盛证。C 利湿化浊, 清热解毒, 主治湿温时疫之湿热并重证。D 祛暑解表, 清热化湿, 主治暑温夹湿, 复感于寒证。E 清虚热, 退骨蒸, 主治骨蒸潮热之证。故本题选 D。二、

160.(B型题)理中丸主证病机涉及的主要脏腑是

- A.肝脾
- B.肝胃
- C.脾胃
- D.肝肾
- E.脾肾

答案: C

解析: 此题暂无解析

161.(A1型题)四逆汤与四逆散两方组成中均含有的药物是

- A.柴胡
- B.枳实
- C.干姜
- D.芍药
- E.甘草

答案: E

解析: 此题暂无解析

162.(A1型题)吴茱萸汤和理中丸两方组成中均含有的药物是

- A.吴茱萸

- B.人参
- C.干姜
- D.大枣
- E.白术

答案：B

解析：此题暂无解析

163.(A1型题)四逆汤和理中丸两方组成中均含有的药物是

- A.附子
- B.人参
- C.桂枝
- D.干姜
- E.白术

答案：D

解析：此题暂无解析

164.(A1型题)不适宜用吴茱萸汤治疗的病证是

- A.胃中虚冷，症见食欲呕者
- B.肝寒上逆，症见头痛、干呕、吐涎沫者
- C.肾阳不足，寒气内甚，症见吐利、手足逆冷者
- D.肝寒犯胃，症见脘腹冷痛、呕吐酸水者
- E.脾胃阳虚，阴寒上乘，症见胸满而痛，甚至胸痛彻背者

答案：E

解析：此题暂无解析

165.(A1型题)温经汤的君药是

- A.当归、川芎
- B.当归、肉桂
- C.当归、吴茱萸
- D.吴茱萸、桂枝
- E.当归、桂枝

答案：D

解析：◎其中吴茱萸、桂枝温经散寒，通利血脉，共为君药。当归、川芎活血祛瘀，养血调经；牡丹皮活血散瘀，清血分虚热，共为臣药。阿胶养血止血，滋阴润燥；白芍养血敛阴，柔肝止痛；麦冬养阴清热；人参、甘草益气健脾，以资生化之源；半夏、生姜通降胃气；生姜温胃气以助生化，以上均为佐药。甘草尚能调和诸药，兼为使药。

166.(A1型题)下列各项，不属理中丸主治范围的是

- A.阳虚失血
- B.脾胃虚寒之腹痛
- C.中焦虚寒之小儿慢惊风
- D.肝胃虚寒之胃脘痛
- E.脾胃虚寒之胸痹

答案：D

解析：■理中丸主治：①脾胃虚寒证。脘腹绵绵作痛，喜温喜按，呕吐，大便稀溏，脘痞食少，畏寒肢冷，口不渴，舌淡苔白润，脉沉细或沉迟无力。②阳虚失血证。便血、吐血、衄血或崩漏等，血色暗淡，质清稀。③脾胃虚寒所致的胸痹；或病后多涎唾；或小儿慢惊等。故本题选 D。

167.(A1型题)组成中无白芍的方剂是：

- A.逍遥散
- B.蒿芩清胆汤
- C.大柴胡汤
- D.痛泻要方
- E.四逆散

答案：B

解析：此题暂无解析

168.(A1型题)患者见往来寒热，腹痛便秘，舌红苔黄，脉弦数。治宜选方

- A.银翘散
- B.麻杏甘石汤
- C.防风通圣散
- D.大柴胡汤
- E.桑菊饮

答案：D

解析：此题暂无解析

169.(A1型题)大柴胡汤的功效是：

- A.透邪解郁，疏肝理脾
- B.和解少阳，内泻热结
- C.疏肝补脾，胜湿止泻
- D.疏风解表，清热通便
- E.和解少阳

答案：B

解析：此题暂无解析

170.(A1型题)下列除哪项外，均是防风通圣散主治病证的临床表现

- A.憎寒壮热
- B.头目眩晕
- C.目赤睛痛
- D.大便秘结
- E.抑郁微烦

答案：E

解析：◎防风通圣散主治的症状有憎寒壮热，目赤睛痛，头目眩晕，大便秘结等症状，但是没有抑郁而烦之证。

171.(B型题)玉屏风散和补中益气汤均可用治

- A.脾肺气虚，自汗易感者

- B.脾胃气虚，食少脘胀者
- C.气血不足，心悸怔忡者
- D.脾阳不足，吐衄便血者
- E.肝肾不足，腰膝酸软者

答案：A

解析：此题暂无解析

172.(B型题)肾气丸和地黄饮子两方组成药物中均含有

- A.炮附子山茱萸
- B.炮附子肉桂
- C.枸杞子菟丝子
- D.山茱萸牛膝
- E.鹿角胶龟板胶

答案：A

解析：此题暂无解析

173.(B型题)属于大补阴丸主治特征的是

- A.牙痛齿摇
- B.骨蒸盗汗
- C.烦渴欲饮
- D.腰膝酸软
- E.食少便溏

答案：B

解析：此题暂无解析

174.(B型题)一贯煎和六味地黄丸两方的治病机理均涉及

- A.滋水涵木
- B.扶土御木
- C.培土生金
- D.清金制木
- E.补火生土

答案：A

解析：此题暂无解析

175.(B型题)肉豆蔻在四神丸中的作用是

- A.温经散寒
- B.温肾暖脾
- C.温肾纳气
- D.温脾暖胃
- E.温肾暖肝

答案：D

解析：此题暂无解析

176.(B型题)功能敛肺止咳的方剂是

- A.止嗽散
- B.九仙散
- C.固经丸
- D.一贯煎
- E.右归丸

答案：B

解析：此题暂无解析

177.(A1型题)身常汗出，夜卧尤甚，久而不止，心悸惊惕，短气烦倦者，治疗应选用

- A.牡蛎散
- B.归脾汤
- C.补中益气汤
- D.四物汤
- E.黄土汤

答案：A

解析：此题暂无解析

178.(A1型题)牡蛎散中功专收敛止汗的药物是

- A.煅牡蛎
- B.麻木黄根
- C.生黄芪
- D.小麦
- E.白术

答案：B

解析：此题暂无解析

179.(A1型题)九仙散的组成药物中含有

- A.乌药生枳壳
- B.知母密蒙花
- C.人参桑白皮
- D.山药五倍子
- E.诃子炙黄芪

答案：C

解析：此题暂无解析

180.(A1型题)属于固涩剂适应范围的病证是

- A.血热崩漏
- B.肺虚久咳
- C.火动遗精
- D.伤食泄泻
- E.热病多汗

答案：B

解析：此题暂无解析

181.(A1型题)四神丸的组成药物中含有

- A.草豆蔻
- B.白豆蔻
- C.肉豆蔻
- D.砂仁
- E.厚朴

答案：C

解析：◎四神丸组成药物有肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。

182.(B型题)肝血不足，虚热内扰而心悸失眠者，治宜选用

- A.归脾汤
- B.酸枣仁汤
- C.天王补心丹
- D.朱砂安神丸
- E.甘麦大枣汤

答案：B

解析：此题暂无解析

183.(B型题)肝血不足而虚烦不眠者，治宜选用

- A.酸枣仁汤
- B.天王补心丹
- C.归脾汤
- D.磁朱丸
- E.甘麦大枣汤

答案：A

解析：此题暂无解析

184.(B型题)心肾两虚，水火不济而尿频健忘者，治宜选用

- A.六味地黄丸
- B.天王补心丹
- C.桑螵蛸散
- D.金锁固精丸
- E.大补阴丸

答案：C

解析：此题暂无解析

185.(B型题)天王补心丹的功用是

- A.补肾宁心，益智安神
- B.养血安神，清热除烦
- C.滋阴清热，养血安神
- D.镇心安神，泻火养阴
- E.养心安神，和中缓急

答案：C

解析：此题暂无解析

186.(A1型题)酸枣仁汤的组成药物中含有

- A.知母
- B.茯神
- C.远志
- D.柏子仁
- E.龙眼肉

答案：A

解析：此题暂无解析

187.(A1型题)天王补心丹中配伍茯苓意义

- A.健脾
- B.宁心
- C.渗湿
- D.利水
- E.消痰

答案：B

解析：此题暂无解析

188.(A1型题)朱砂安神丸组成中含有的药物是

- A.梔子
- B.黃连
- C.石膏
- D.竹叶
- E.知母

答案：B

解析：◎朱砂安神丸组成中含有的药物有朱砂、黃连、甘草、当归、生地黄。

189.(A1型题)甘麦大枣汤除养心安神，和中缓急外，还具有的功用是

- A.补心血
- B.补脾气
- C.益肝血
- D.滋肾水
- E.益脾阴

答案：B

解析：◎甘麦大枣汤的功用有养心安心，和里缓急和补脾气的功用，所以甘麦大枣汤除养心安神，和中缓急外，还具有的功用是补脾气。

190.(B型题)紫雪长于

- A.清热解毒
- B.息风止痉
- C.化浊开窍
- D.行气止痛
- E.通便散结

答案：B

解析：此题暂无解析

191.(A1型题)下列哪项不属于安宫牛黄丸的辨证要点

- A.高热烦躁
- B.神昏谵语
- C.斑疹吐衄
- D.舌红或降
- E.脉数

答案：C

解析：此题暂无解析

192.(B型题)柴胡疏肝散的功用是

- A.疏肝行气，活血止痛
- B.降气平喘，祛痰止咳
- C.降气快膈，化痰消食
- D.清热化痰，理气止咳
- E.宣肺降气，清热化痰

答案：A

解析：此题暂无解析

193.(B型题)暖肝煎的组成药物中含有

- A.木通
- B.当归
- C.厚朴
- D.木香
- E.梔子

答案：B

解析：此题暂无解析

194.(B型题)天台乌药散的功用是

- A.疏肝泄热，活血止痛
- B.行气疏肝，散寒止痛
- C.温补肝肾，行气止痛
- D.行气上痛，软坚散结
- E.行气除满，温中燥湿

答案：B

解析：此题暂无解析

195.(B型题)主治胸痹的方剂是

- A.十枣汤
- B.大陷胸汤
- C.苇茎汤
- D.泻白散

E.枳实薤白桂枝汤

答案：E

解析：此题暂无解析

196.(A1型题)下列各项中，不属于苏子降气汤组成药物的是

- A.生姜苏叶
- B.前胡甘草
- C.杏仁白前
- D.半夏厚朴
- E.当归肉桂

答案：C

解析：此题暂无解析

197.(A1型题)半夏厚朴汤配伍苏叶的意义不包括

- A.行气
- B.理肺
- C.舒肝
- D.散郁
- E.散寒

答案：E

解析：此题暂无解析

198.(A1型题)下列何药不是天台乌药散的组成药物

- A.木香
- B.青皮
- C.槟榔
- D.香附
- E.巴豆

答案：D

解析：此题暂无解析

199.(A1型题)越鞠丸中以行气为主的药物是

- A.木香
- B.沉香
- C.香附
- D.枳壳
- E.厚朴

答案：C

解析：●越鞠丸由苍术、香附、川芎、神曲、栀子组成，有行气解郁的功用，治疗气郁所致的胸膈痞闷，脘腹胀满，嗳腐吞酸，恶性呕吐，饮食不消等病证。本方重于行气解郁，气机流畅，则痰、火、湿、食诸郁自解。香附行气解郁为君，以治气郁，川芎治血郁，栀子治火郁，苍术治疗湿郁，神曲治食郁，均为辅助药物。本方重于行气解郁，用香附以行气解郁，以治气郁，为主要药物。

200.(A1型题)旋覆花、代赭石在旋复代赭汤中的配伍意义是

- A.温胃化痰止呕
- B.平冲降逆止呕
- C.祛痰降逆和胃
- D.镇冲逆除噫气
- E.化痰消食和胃

答案：D

解析：◎旋覆花善于下气，化顽痰，重用下气化痰为君药；代赭石质重降逆，助君降逆化痰，半夏祛痰和胃，生姜温胃化痰，散寒止呕，共为臣药；人参、大枣、炙甘草健脾养胃，温中益气，为佐药；甘草调和诸药为使。

201.(A1型题)属于天台乌药散组成药物的是

- A.川楝子
- B.陈皮
- C.草豆蔻
- D.肉桂
- E.厚朴

答案：A

解析：◎天台乌药散组成药物有天台乌药、木香、小茴香、青皮、高良姜、槟榔、川楝子、巴豆、甘草。天台乌药散组成药物的是川楝子。

202.(A1型题)实脾散的功用是

- A.健脾和胃，消食止泻
- B.益气健脾，渗湿止泻
- C.健脾和胃，消痞除满
- D.温阳健脾，行气利水
- E.燥湿运脾，行气和胃

答案：D

解析：◎实脾散温阳健脾，行气利水。主治脾肾阳虚，水气内停之阴水

203.(A1型题)二妙散的功用是

- A.清热利水
- B.清热燥湿
- C.清热养阴
- D.利湿消肿
- E.解毒化湿.

答案：B

解析：■二妙散清热燥湿止痒。故本题选 B。

204.(A1型题)胸胁支满，目眩心悸，短气而咳，舌苔白滑，脉弦滑者，治宜选用

- A.十枣汤
- B.五苓散
- C.真武汤
- D.五皮散

E.苓桂术甘汤

答案：E

解析：■A攻逐水饮，主治悬饮、实水。B利水渗湿，温阳化气，主治伤寒太阳膀胱蓄水证、水湿内停之水肿、痰饮内停证。C温阳利水，主治脾肾阳虚，水饮内停证。D利水消肿，行气祛湿，主治水停气滞之皮水证。E温化痰饮，健脾利湿，主治中阳不足之痰饮，症见：形体消瘦，胸脘胀满，纳呆呕吐，胃中振水音或肠鸣漉漉，便溏或背部寒冷，头昏目眩，心悸气短。舌苔白润，脉弦滑等。故本题选E。二、

205.(B型题)活动期湿热痹阻证的中医治法是

- A.清热利湿，祛风通络
- B.养阴清热，祛风通络
- C.祛风散寒，清热化湿
- D.益肝肾，补气血，祛风湿，通经络
- E.活血化瘀，祛痰通络

答案：A

解析：此题暂无解析

206.(B型题)诊断类风湿关节炎最有价值的检查是

- A.血沉增快
- B.类风湿因子阳性
- C.补体C3增高
- D.白细胞计数减少
- E.血常规正常

答案：B

解析：此题暂无解析

207.(B型题)瘀热痹阻证，治疗应首选的方剂是

- A.玉女煎合增液汤
- B.济生肾气丸
- C.八珍汤
- D.犀角地黄汤
- E.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散

答案：D

解析：此题暂无解析

208.(B型题)治疗类风湿性关节炎肾虚寒凝证，应首选

- A.蠲痹汤
- B.三痹汤
- C.独活寄生汤
- D.六味地黄丸
- E.虎潜丸

答案：C

解析：此题暂无解析

209.(B型题)治疗系统性红斑狼疮阴虚内热证，应首选

- A.清瘟败毒饮
- B.犀角地黄汤
- C.玉女煎合增液汤
- D.茵陈蒿汤合柴胡疏肝散
- E.葶苈大枣泻肺汤合泻白散

答案：C

解析：■治疗系统性红斑狼疮气营热盛证，应首选清瘟败毒饮。治疗系统性红斑狼疮阴虚内热证，应首选玉女煎合增液汤。故选A，选C。B用于郁热痹阻证。D用于郁热伤肝证，E用于热郁积饮证。

210.(A1型题)系统性红斑狼疮属中医学中的

- A.风寒湿痹
- B.风湿热痹
- C.肚痹
- D.鹤膝风
- E.蝶疮流注

答案：E

解析：●根据系统性红斑狼疮典型的临床表现特点：面部蝶形红斑，皮疹，口腔黏膜水泡、溃疡，游走性、多发性关节红肿热痛等，与中医的“蝶疮流注”表现相似。

211.(A1型题)对诊断尪痹最有意义的实验室检查是

- A.血沉
- B.类风湿因子
- C.补体C3
- D.抗核抗体
- E.肾功能

答案：B

解析：●血沉无特异性。类风湿因子见于约70%尪痹患者血清中。抗核抗体及补体C3降低有助于系统性红斑狼疮的诊断。肾功能异常无特异性，只能说明有肾脏损害。

212.(B型题)安眠药中毒的机制是

- A.缺氧
- B.麻醉和抑制作用
- C.局部作用
- D.干扰细胞膜或细胞器生理功能
- E.抑制酶活力

答案：B

解析：●有机磷农药能抑制许多酶，但对人的毒性主要表现在抑制胆碱酯酶。安眠药对中枢神经系统的抑制随剂量的增加，由镇静、催眠到麻痹，以至延髓中枢麻痹。

213.(B型题)重度急性有机磷杀虫药中毒时胆碱酯酶活性是

- A.100%
- B.90%～70%

C.70%~50%

D.50%~30%

E.30%以下

答案：E

解析：此题暂无解析

214.(B型题)糖尿病酮症酸中毒时，有诊断意义的是

A.呼吸抑制

B.呼出气有蒜味

C.呼出气有烂苹果味

D.呼出气有苦杏仁味

E.呼出气有氨味

答案：C

解析：此题暂无解析

215.(A1型题)尽快纠正急性一氧化碳中毒组织缺氧应首选的治疗措施是

A.采用高浓度氧气面罩

B.注射呼吸兴奋剂

C.撤离中毒现场

D.人工呼吸

E.高压氧舱

答案：E

解析：此题暂无解析

216.(A1型题)轻度有机磷杀虫药中毒时，瞳孔的变化是

A.缩小

B.扩大

C.两侧大小不等

D.形状不规则

E.呈乳白色

答案：A

解析：此题暂无解析

217.(A1型题)诊断有机磷杀虫药中毒时，全血胆碱酯酶活性应是

A.<100%

B. $\leqslant$ 90%

C. $\leqslant$ 80%

D. $\leqslant$ 75%

E. $\leqslant$ 70%

答案：E

解析：此题暂无解析

218.(A1型题)有机磷杀虫药中毒的主要机制是

A.促使乙酰胆碱水解

- B.抑制胆碱酯酶活性
- C.兴奋交感神经系统
- D.抑制心血管运动中枢
- E.抑制呼吸中枢

答案：B

解析：此题暂无解析

219.(A1型题)服毒后最好几小时内洗胃

- A.1
- B.3
- C.6
- D.12
- E.24

答案：C

解析：●一般在服毒后6小时内洗胃有效，因服毒物在6小时内胃中尚有残留，洗胃可以清除未被吸收的毒物。

220.(A1型题)属于胆碱酯酶复活剂的药物是

- A.阿托品
- B.地塞米松
- C.双复磷
- D.西地兰
- E.尼可刹米

答案：C

解析：此题暂无解析

221.(A1型题)下列各项，不是阿托品化指标的是

- A.抽搐消失
- B.颜面潮红
- C.瞳孔较前增大
- D.心率增快
- E.口干、皮肤干燥

答案：A

解析：◎阿托品化指征为瞳孔较前扩大、口干、皮肤干燥、心率增快(90~100次/分)和肺湿啰音消失。此时，应减少阿托品剂量或停用。如出现瞳孔明显扩大、神志模糊、烦躁不安、抽搐、昏迷和尿潴留等为阿托品中毒，立即停用阿托品。

222.(B型题)患者突然昏倒，不知人事，呼吸气粗，口噤握拳，舌苔薄白，脉伏。其证候是

- A.气厥实证
- B.气厥虚证
- C.血厥实证
- D.血厥虚证
- E.痰厥

答案：A

解析：此题暂无解析

223.(B型题)提出以虚实论治厥证的医著是

- A.《医门法律》
- B.《第三节伤寒论》
- C.《医林改错》
- D.《医学入门》
- E.《景岳全书》

答案：E

解析：此题暂无解析

224.(B型题)突然昏仆，不省人事，但发作时间短暂，且发作时常伴有号叫、抽插、口吐涎沫、两目上视、小便失禁等，常反复发作，每次症状均相类似，苏醒缓解后可如常人。此为

- A.痫病
- B.眩晕
- C.厥证
- D.昏迷
- E.中风

答案：A

解析：此题暂无解析

225.(B型题)不寐，心烦胸闷，泛恶，嗳气，头重目眩，口苦，舌红，苔黄腻，脉滑数，治疗宜选

- A.朱砂安神丸
- B.龙胆泻肝汤
- C.黄连温胆汤
- D.半夏秫米汤
- E.归脾汤

答案：C

解析：此题暂无解析

226.(B型题)胸闷泛恶，彻夜不寐，大便秘结者，当用

- A.礞石滚痰丸
- B.半夏秫米汤
- C.琥珀多寐丸
- D.保和丸
- E.天王补心丹

答案：A

解析：此题暂无解析

227.(B型题)痰厥治法宜首选

- A.行气豁痰
- B.补气回阳醒神
- C.平肝潜阳，理气通瘀

D.开窍顺气解郁

E.开窍化痰

答案：A

解析：此题暂无解析

228.(A1型题)治疗气厥虚证，应首选

A.安宫牛黄丸

B.补中益气汤

C.四味回阳饮

D.四君子汤

E.通瘀煎

答案：C

解析：●气厥虚证应补气、回阳、醒神，故用四味回阳饮益气回阳。

229.(A1型题)不寐之痰热扰心证，其治疗首选方剂是

A.龙胆泻肝汤

B.黄连温胆汤

C.归脾汤

D.六味地黄丸合交泰丸

E.安神定志丸合酸枣仁汤

答案：B

解析：此题暂无解析

230.(A1型题)失眠患者心烦、心悸、梦遗失精者，加用肉桂的目的是

A.温补肾阳

B.健脾和胃

C.温经散寒

D.温通心阳

E.引火归原

答案：E

解析：此题暂无解析

231.(A1型题)发病前有明显的情绪紧张、恐惧、疼痛或站立过久等诱发因素，发作时眩晕昏仆，面色苍白，呼吸微弱，汗出肢冷，舌淡，脉沉细微。治宜选

A.开窍顺气解郁

B.开窍化痰解郁

C.补气养血活血

D.开窍活血顺气

E.补气回阳醒神

答案：E

解析：此题暂无解析

232.(A2型题)患者，女，53岁。腹中可及积块，软而不坚，固着不移，胀痛并见，舌苔薄，脉弦。其证候是

- A.肝气郁滞
- B.瘀血内结
- C.气滞血阻
- D.气滞痰阻
- E.气虚血瘀

答案：C

解析：●积块-积证；胀痛并见，脉弦-气滞，软而不坚，固着不移-瘀血，故诊断为气滞血阻证，治法：理气消积，活血散瘀。

233.(A2型题)病人腹部胀大3个月余，胁下胀痛不适，纳食欠佳，食后腹胀，小便短少，下肢微肿，面色晦暗，周身皮肤发黄，腹胀大，胁下可触及包块，双下肢按之微肿，苔白腻，脉弦细，应诊断为

- A.水肿
- B.胁痛
- C.黄疸
- D.积聚
- E.鼓胀

答案：E

解析：此题暂无解析

234.(A2型题)某男，46岁，脘腹坚满，青筋显露，胁下癥结痛如针刺，面色晦暗黧黑，面颈胸臂出现血痣，口干不欲饮水，大便色黑，舌质紫黯，有紫斑，脉细涩。证属

- A.胁痛之瘀血停着证
- B.鼓胀之瘀结水留证
- C.积聚之瘀血内结证
- D.鼓胀之水热蕴结证
- E.鼓胀之正虚瘀结证

答案：B

解析：此题暂无解析

235.(A2型题)男，36岁。平素性情急躁，有胃溃疡病史。昨天因大怒，诱发呕血，吐血色红，伴有口苦咽干，胸胁疼痛，舌质红绛，脉象弦数。方剂宜选用

- A.泻心汤合十灰散
- B.龙胆泻肝汤合十灰散
- C.化肝煎合十灰散
- D.犀角地黄汤
- E.玉女煎

答案：B

解析：此题暂无解析

236.(A2型题)女，病由抑郁而起，症见腹部结块，或左或右，走窜不定，按之略痛，脘胁胀闷不舒，嗳气频频，便艰纳呆，苔薄，脉弦，证属

- A.聚证-肝气郁结
- B.聚证-食滞痰阻

- C.积证-气结血瘀
- D.积证-气郁血阻
- E.积证-瘀血内结

答案：A

解析：此题暂无解析

237.(A2型题)女，腹中积块，按之觉硬，痛处不移，面暗消瘦，体倦乏力，纳食减少，时有寒热，经闭不行，舌质青紫，脉涩。辨证属于

- A.肝郁气滞型
- B.食滞痰阻型
- C.气郁血阻型
- D.瘀血内结型
- E.正虚痰结型

答案：D

解析：此题暂无解析

238.(B型题)瘀结水留型鼓胀的主症是

- A.腹大胀满，脉络怒张
- B.腹大胀满，如囊裹水
- C.腹大胀满，早宽暮急
- D.腹大胀满，脘腹撑急
- E.脘腹坚满，痛如针刺

答案：E

解析：此题暂无解析

239.(B型题)正虚瘀结之积证的代表方首选

- A.八珍汤合化积丸
- B.逍遥散、木香顺气散
- C.六君子汤合化积丸
- D.柴胡疏肝散合失笑散
- E.膈下逐瘀汤、鳖甲煎丸合六君子汤

答案：A

解析：此题暂无解析

240.(B型题)肾精不足型“眩晕”的特点为

- A.眩晕头重如蒙
- B.眩晕动则加剧
- C.眩晕耳鸣，头痛且胀
- D.眩晕且精神委靡
- E.眩晕头痛

答案：D

解析：此题暂无解析

241.(B型题)将鼓胀称为“膨膝”、“蜘蛛蛊”的医著是

- A.《丹溪心法》
- B.《证治要诀》
- C.《医宗必读》
- D.《诸病源候论》
- E.《景岳全书》

答案：B

解析：此题暂无解析

242.(B型题)治疗胁痛瘀血停着证，应首选

- A.龙胆泻肝汤
- B.柴胡疏肝散
- C.旋复花汤
- D.一贯煎
- E.茵陈蒿汤

答案：C

解析：此题暂无解析

243.(B型题)瘀血阻络证胁痛代表方是

- A.柴胡疏肝散
- B.龙胆泻肝汤
- C.血府逐瘀汤
- D.六味地黄丸
- E.一贯煎

答案：C

解析：此题暂无解析

244.(B型题)胁痛肝郁气滞证治疗首选方剂是

- A.葛根芩连汤
- B.柴胡疏肝散
- C.四神丸
- D.一贯煎
- E.藿香正气散加减

答案：B

解析：此题暂无解析

245.(B型题)湿热砂石阻滞胆道所致胁痛方选

- A.血府逐瘀汤合鳖甲丸
- B.一贯煎合金铃子散
- C.复元活血汤合硝石矾石散
- D.乌梅丸合大柴胡汤
- E.龙胆泻肝汤合硝石矾石散

答案：E

解析：此题暂无解析

246.(A1型题)鼓胀病名最早见于

- A.《第二节金匮要略》
- B.《诸病源候论》
- C.《第一节内经》
- D.《医宗必读》
- E.《丹溪心法》

答案：C

解析：此题暂无解析

247.(A1型题)服用十枣汤或舟车丸治疗鼓胀，药后会出现除下列哪项外的副作用

- A.泛恶
- B.呕吐
- C.泻下
- D.腹痛
- E.头晕

答案：C

解析：此题暂无解析

248.(A1型题)积聚的病位主要在

- A.肺肾
- B.肝肾
- C.肝脾
- D.肝胆
- E.脾肾

答案：C

解析：此题暂无解析

249.(A1型题)首先提出积聚的病名的医著是

- A.《杂病广要》
- B.《第二节金匮要略》
- C.《第一节内经》
- D.《难经》
- E.《诸病源候论》

答案：C

解析：此题暂无解析

250.(A1型题)下列除哪项外，均为眩晕的治法

- A.平肝潜阳，清火熄风
- B.补养气血，健运脾胃
- C.活血化瘀，养心安神
- D.燥湿祛痰，健脾和胃
- E.补肾滋阴或补肾助阳

答案：C

解析：此题暂无解析

251.(A1型题)积证气滞血阻型治疗应予

- A.失笑散
- B.逍遥散
- C.柴胡疏肝散合失笑散
- D.五积散
- E.化积丸

答案：C

解析：此题暂无解析

252.(A2型题)男，21岁，长期偏食，晨起头面部肿甚一年，动则下肢肿胀，能食而疲乏无力，纳可，便溏，小便多，舌淡胖大有齿痕苔薄腻，脉软弱。治以何方加减

- A.真武汤
- B.参苓白术散
- C.实脾饮
- D.己椒苈黄丸
- E.五皮饮合葶苈大枣泻肺汤

答案：B

解析：此题暂无解析

253.(A2型题)慢性肾功能不全患者表现为全身水肿，有胸腔积液、腹水。治疗应首选的方剂是

- A.黄连温胆汤
- B.五皮饮或五苓散
- C.六君子汤
- D.济生肾气丸
- E.二妙丸

答案：B

解析：◎全身水肿，有胸腔积液、腹水阳水为水湿浸渍证，代表方剂为五皮饮合胃苓散。

254.(B型题)水肿湿热壅盛证，治疗应首选的方剂是

- A.越婢加术汤
- B.麻黄连翘赤小豆汤
- C.实脾饮
- D.五皮饮合胃苓汤
- E.疏凿饮子

答案：E

解析：此题暂无解析

255.(B型题)属于水肿脾败不治的是

- A.面肿苍黑
- B.掌肿无纹理
- C.阴肿不起
- D.腰肿无纹理

E. 脘满反肿

答案：E

解析：此题暂无解析

256.(A1型题)治疗水肿风水泛滥证，应首选的方剂是

A. 越婢加术汤

B. 麻黄连翘赤小豆汤

C. 麻黄汤

D. 五皮饮

E. 胃苓汤

答案：A

解析：此题暂无解析

257.(A1型题)治疗水肿水湿浸渍型的主方是

A. 实脾饮

B. 真武汤

C. 五皮散合胃苓汤

D. 越婢加术汤

E. 疏凿饮子

答案：C

解析：此题暂无解析

258.(A1型题)水肿病肾阳久衰，阳损及阴，应补肾阴兼利水湿，方用

A. 右归丸加生地、泽泻

B. 左归丸加泽泻、茯苓、冬葵子

C. 济生肾气丸

D. 六味地黄丸

E. 己椒苈黄丸

答案：B

解析：此题暂无解析

259.(A2型题)患者发热，热势或低或高，常在劳累后发作，乏力气短，自汗，食少便溏，舌

质淡，苔薄白，脉细弱。治疗应首选

A. 清骨散

B. 归脾汤

C. 金匮肾气丸

D. 补中益气汤

E. 中和汤

答案：D

解析：●患者发热，热势或低或高-发热；乏力气短，自汗，便溏-气虚，治以益气健脾，甘温除热为法，补中益气汤主之。

260.(A2型题)患者，女，43岁。每于劳累后即出现低热，头晕乏力，自汗，食少便溏，舌淡苔白、脉弱，治疗应首选

A.血府逐瘀汤

B.补中益气汤

C.小柴胡汤

D.清骨散

E.归脾汤

答案：B

解析：此题暂无解析

261.(A2型题)患者痰多胸闷，心烦口苦，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

A.黄连温胆汤

B.导痰汤

C.六磨汤

D.胃苓汤

E.二陈汤

答案：A

解析：●痰多胸闷，苔腻，脉滑-痰证，心烦口苦，舌苔黄，脉数-热象。除 A 之外，余方均无清热作用，故选之。

262.(A2型题)患者发热，多为低热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少，舌红，苔黄，脉弦数。其中医证型是

A.痰湿郁热证

B.血瘀发热证

C.气郁发热证

D.阴虚发热证

E.阳虚发热证

答案：C

解析：此题暂无解析

263.(A2型题)患者低热，午后热甚，心内烦热，胸闷脘痞，不思饮食，渴不欲饮，呕恶，大便稀薄，舌苔白腻，脉濡数。其中医治法是

A.燥湿化痰，清热和中

B.疏肝理气，解郁泻热

C.温补阳气，引火归原

D.益气健脾，甘温除热

E.滋阴清热，发汗解表

答案：A

解析：此题暂无解析

264.(A2型题)患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，胸胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，脉弦数。其诊断是

A.肺痛阴虚火旺证

B.咳血肝火犯肺证

C.喘证肺气郁痹证

D.肺痈成痈期

E.咳嗽痰热郁肺证

答案：B

解析：●咳逆阵作，痰中带血-咳血，胸胁胀痛，口苦咽干，尿黄便秘，舌红苔薄黄，脉弦数-木火刑金，肺络受损之征，故诊断为B。

265.(A2型题)患者胸胁疼痛，咳唾引痛，咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满，舌苔白，脉沉弦。其治法是

- A.攻下逐饮
- B.和解宣利
- C.理气和络
- D.泻肺祛饮
- E.发表化饮

答案：D

解析：●咳逆气喘，息促不能平卧，喜向右侧偏卧，右侧肋间胀满-饮邪，胸胁疼痛-部位为胸胁，诊断为悬饮饮停胸胁，当泻肺祛饮，方予椒目瓜蒌汤合十枣汤或控涎丹加减。

266.(A2型题)男，36岁。平素性格内向，近日情志不遂，精神抑郁，情绪不宁，善太息，胸胁胀痛，痛无定处，脘闷嗳气，腹胀纳呆，大便时软时干，苔薄腻，脉弦。辨证属何证

- A.肝气郁结
- B.气郁化火
- C.气滞痰郁
- D.心脾两虚
- E.忧郁伤神

答案：A

解析：此题暂无解析

267.(A2型题)男，69岁，平素体弱多病。现症见腰酸背痛，小便失禁，畏寒肢冷，下利清谷，舌质淡胖，苔白，脉沉迟。此时辨证属于

- A.肾阳虚
- B.脾阳虚
- C.肾阴虚
- D.脾气虚
- E.肝血虚

答案：A

解析：此题暂无解析

268.(A2型题)患者头痛，眩晕，耳鸣，目干畏光，视物不明，急躁易怒，舌红少津，脉弦细数。治疗应首选的方剂是

- A.补肝汤
- B.丹栀逍遥散
- C.天王补心丹
- D.知柏地黄丸
- E.左归丸

答案：A

解析：此题暂无解析

269.(A2型题)患者低热，头晕眼花；心悸不宁，面白少华，唇甲淡白，舌质淡，脉细。其治法是

- A.益气养血
- B.益气健脾
- C.滋阴清热
- D.活血化瘀
- E.疏肝清热

答案：A

解析：◎根据题干所述，可以明确诊断为内伤发热，证型为营血亏虚证。营血亏虚，阴不配阳，故可出现上述症状。治疗宜选用益气养血之法。益气健脾适用于气虚发热证。滋阴清热适用于阴虚发热证。活血化瘀适用于瘀血发热证。疏肝清热适用于气郁发热证。

270.(B型题)虚劳心阴虚证，治疗应首选的方剂是

- A.四物汤
- B.沙参麦冬汤
- C.天王补心丹
- D.益胃汤
- E.养心汤

答案：C

解析：此题暂无解析

271.(B型题)对瘀血发热的治疗作较多论述并提出相应方剂的医家是

- A.钱乙
- B.朱丹溪
- C.李东垣
- D.张景岳
- E.王清任

答案：E

解析：此题暂无解析

272.(B型题)气郁化火型治法宜

- A.疏肝理气解郁
- B.清肝泻火，解郁和胃
- C.养心安神
- D.健脾养心，益气补血
- E.滋阴清热，镇心安神

答案：B

解析：此题暂无解析

273.(B型题)在虚证的治疗中，重视肝肾，善用滋阴降火的医家是

- A.张仲景
- B.李东垣

C.朱丹溪

D.张景岳

E.李中梓

答案：C

解析：此题暂无解析

274.(B型题)治疗悬饮邪犯胸肺证宜选用

A.柴枳半夏汤

B.香附旋覆花汤

C.椒目瓜蒌汤合十枣汤

D.沙参麦冬汤合泻白散

E.苓桂术甘汤合小半夏加茯苓汤

答案：A

解析：此题暂无解析

275.(B型题)治疗虚劳肾阴虚证，应首选

A.附子理中丸

B.济生肾气丸

C.都气丸

D.左归丸

E.右归丸

答案：D

解析：●虚劳脾阳虚证治当温中健脾，方用附子理中汤；虚劳肾阳虚证治当温补肾阳，方予右归丸。

276.(A1型题)治痿慎用

A.清热药

B.滋阴药

C.风药

D.健脾药

E.活血药

答案：C

解析：此题暂无解析

277.(A1型题)下列不是外感腰痛的致病病邪的是

A.风

B.寒

C.湿

D.热

E.燥

答案：E

解析：此题暂无解析

278.(A1型题)除下列哪项外，均为形成痿证的病理

- A.肺热伤津
- B.湿热浸淫
- C.脾胃虚寒
- D.肝肾亏虚
- E.肝火犯肺

答案：E

解析：此题暂无解析

279.(A1型题)肢体困重，萎软无力，下肢痿弱为甚，手足麻木，扪之微热，喜凉恶热，胸脘痞闷，治疗该证的代表方为

- A.三仁汤
- B.茵陈蒿汤
- C.加味二妙散
- D.胃苓汤
- E.藿香正气散

答案：C

解析：此题暂无解析

280.(A1型题)腰痛发病的关键是

- A.寒湿
- B.湿热
- C.肾虚
- D.气滞
- E.血瘀

答案：C

解析：此题暂无解析

281.(A1型题)痿证见手足痿弱，形体瘦削，肌肤甲错者为瘀血久留，可用

- A.补阳还五汤
- B.圣愈汤送服大黄廑虫丸
- C.身痛逐瘀汤
- D.桃红四物汤
- E.六味地黄丸

答案：B

解析：此题暂无解析

282.(A1型题)肢体筋脉弛缓，软弱无力，日久因不能随意运动而肌肉萎缩的病证是

- A.痓证
- B.痹证
- C.痿证
- D.厥证
- E.痫证

答案：C

解析：此题暂无解析

283.(A1型题)外感所致腰痛，总离不开下列哪种邪气为患?

- A.寒邪
- B.湿邪
- C.热邪
- D.风邪
- E.火邪

答案：B

解析：此题暂无解析

284.(A1型题)夹脊入腰中的经脉是

- A.足少阴经
- B.足太阳经
- C.足厥阴经
- D.手太阳经
- E.手少阳经

答案：B

解析：此题暂无解析

285.(B型题)口腔黏膜消毒，应首选

- A.甲醛
- B.石炭酸
- C.0.1%新洁尔灭
- D.0.5%亚硝酸钠
- E.2.5%碘酊

答案：C

解析：此题暂无解析

286.(A1型题)采用化学消毒剂消毒时，甲醛主要适用的是

- A.刀片
- B.剪刀
- C.纱布
- D.被服
- E.导尿管

答案：E

解析：●甲醛气体熏蒸法主要适用于不能浸泡且不耐高热的器械和物品的消毒；如丝线、纤维内窥镜、精密仪器、手术视野照明灯、电线等。刀片、剪刀为锐利器械适用于药物浸泡消毒如戊二醛消毒；纱布、被服耐高温高压，适用于高压蒸气消毒。故选 E。

287.(A1型题)手术时对患者手术区皮肤消毒，以下正确的是

- A.常用消毒剂是 25%碘酊和 70%乙醇
- B.消毒范围应包括手术切口周围 10cm 的区域
- C.对婴儿、口腔、肛门、外生殖器、面部皮肤等处可以使用碘酊消毒
- D.消毒步骤应该自上而下，自外周向切口中心

E.对感染伤口或肛门等处手术，应自手术区外周逐渐涂向感染伤口或会阴肛门处消毒

答案：E

解析：此题暂无解析

288.(A1型题)婴儿面部的皮肤消毒，应采取

- A.2.5%碘酊擦涂2次
- B.0.75%碘酊擦涂2次
- C.0.1%新洁尔灭擦涂2次
- D.0.2%洗必泰酊擦涂1次
- E.70%酒精擦涂1次

答案：C

解析：●对婴儿、面部皮肤、口腔、肛门、外生殖器等部位不能使用碘酊消毒者，可选用刺激性小的0.1%洗必泰、0.1%硫柳汞酊、0.75%聚烯吡酮碘、0.1%新洁尔灭等擦涂2~3次，以免刺激皮肤或黏膜。故选C。

289.(A1型题)关于煮沸灭菌，下列哪项说法不当

- A.持续煮沸20分钟可杀灭一般细菌
- B.要杀灭带芽胞的细菌需持续煮沸1小时
- C.一般压力锅的最高温度可达124℃
- D.水中加入碳酸氢钠是因为碱性化学作用有助于杀灭细菌
- E.在2%碳酸氢钠溶液中煮沸灭菌有防止金属器械生锈的作用

答案：D

解析：◎提高灭菌效果可加入可加入抑菌剂，如三氯叔丁醇、甲酚、氯甲酚等。

290.(B型题)对于颈部强直、颈椎骨折、脱臼等颈部活动受限者应选用

- A.经鼻盲探插管法
- B.经鼻腔明视插管法
- C.经口盲探气管内插管法
- D.清醒气管内插管法
- E.双腔支气管导管(DLT)插管术

答案：C

解析：此题暂无解析

291.(B型题)苯巴比妥属于

- A.镇静安定药
- B.催眠药
- C.麻醉性镇痛药
- D.抗胆碱类药
- E.稳定血流动力学药

答案：B

解析：此题暂无解析

292.(B型题)吸入麻醉，应首选

- A.普鲁卡因

- B.乙醚
- C.利多卡因
- D.硫贲妥钠
- E.布比卡因

答案：B

解析：此题暂无解析

293.(A1型题)拔管后病人应采取的体位是

- A.平卧位
- B.侧卧位
- C.俯卧位
- D.头高位
- E.头转向一侧

答案：E

解析：此题暂无解析

294.(A1型题)下列不属于硬膜外麻醉禁忌证的是

- A.糖尿病
- B.严重休克
- C.血液凝固障碍性疾病
- D.低血压或严重高血压
- E.脊柱畸形或脊柱类风湿性关节炎

答案：A

解析：此题暂无解析

295.(A1型题)局麻药内加肾上腺素的主要目的是

- A.预防过敏反应
- B.延缓药物吸收，延长作用时间
- C.使局部血管收缩，减少出血
- D.预防术中血压下降
- E.预防术中脉搏减慢

答案：B

解析：此题暂无解析

296.(A1型题)下列各项，不属局部麻醉的是

- A.局部浸润麻醉
- B.静脉麻醉
- C.表面麻醉
- D.区域阻滞麻醉
- E.神经阻滞麻醉

答案：B

解析：●麻醉方法包括针刺镇痛与辅助麻醉、局部麻醉、椎管内麻醉、全身麻醉及复合麻醉。局部麻醉是指应用局部麻醉药作用于机体的某一部位使感觉神经传导功能暂时被阻滞，从而达到麻醉镇痛的效果。它包括：表面麻醉、局部浸润麻醉、区域阻滞麻醉、神经阻滞麻醉。

故选 B。

297.(A1 型题)下列除哪项外，其它均属于腰麻(蛛网膜下腔阻滞)术后的并发症

- A.尿潴留
- B.呼吸抑制
- C.颅神经麻痹
- D.马尾丛综合征
- E.化脓性脑脊髓膜炎

答案：E

解析：■蛛网膜下腔阻滞时，局麻要选择性透过软膜直接作用于脊神经根，部分直接作用于脊髓表面。对生理的影响主要表现在循环、呼吸、自主神经系统三方面，其影响程度与麻醉阻滞范围关系密切。常见的术后并发症为头痛、尿潴留、神经系统损害、背痛等。故本题选 E。二、

298.(B 型题)肠内营养糖代谢紊乱可发生

- A.吸入性肺炎
- B.鳞状脱屑、脱发
- C.全身感染
- D.高渗性非酮性昏迷
- E.胆囊结石、胆汁淤积

答案：D

解析：此题暂无解析

299.(B 型题)肠外营养本身可发生

- A.误吸
- B.腹胀、腹泻
- C.微量元素缺乏
- D.高渗性非酮性昏迷
- E.胆囊结石、胆汁淤积

答案：E

解析：此题暂无解析

300.(B 型题)高钾血症的常见病因是

- A.急性肠梗阻
- B.感染性休克
- C.肺炎高热
- D.慢性十二指肠瘘
- E.挤压综合征

答案：E

解析：●低渗性脱水常见病因为：1 胃肠道消化液长期丧失；2 大面积创伤渗液；3 大量应用排钠利尿剂时，未注意补充适量钠盐；4 急性肾衰竭多尿期、失盐性肾炎、肾小管酸中毒、Addison 病等导致肾脏排钠增多，又补充了水分。故选 D。2.代谢性酸中毒常见病因：1 碱性物质丢失过多，如腹泻、肠瘘等；2 酸性物质过多，如休克、乙醇中毒、抽搐、心搏骤停、剧烈运动时引起组织缺氧、糖酵解增加等；3 肾功能不全。故选 B。3.高钾血症常见病因：1

进入体内的钾太多，如口服或静脉输钾；2 肾排钾功能减退，如急性、慢性肾衰竭；3 细胞内钾释出或外移，如溶血、大面积烧伤、急性酸中毒、组织损伤（如挤压综合征）等。故选 E。

301.(A1 型题)下列高钾血症的治疗原则中，哪项是错误的

- A.立即停止钾盐摄入
- B.积极防治心律失常
- C.降低血钾浓度
- D.恢复肾脏功能
- E.补充血容量

答案：E

解析：此题暂无解析

302.(A1 型题)呼吸性酸中毒应最先解决的问题是

- A.肺部感染，使用大量抗生素
- B.进行人工呼吸
- C.应用呼吸中枢兴奋剂
- D.解除呼吸道梗阻，改善肺换气功能
- E.给予碱性液体

答案：D

解析：此题暂无解析

303.(A1 型题)血清钾浓度大于 mmol/L 称高钾血症

- A.3.5
- B.4
- C.4.5
- D.5
- E.5.5

答案：E

解析：此题暂无解析

304.(A2 型题)患者，男，30岁。输血后 4~5min.即出现寒战，高热，头痛，腰背剧痛，心前区压迫感，全身有散在性荨麻疹，血压为 II / 8kPa(80 / 60mmHg)，血浆呈粉红色。应首先考虑的是

- A.发热反应
- B.过敏反应
- C.溶血反应
- D.细菌污染反应
- E.橡酸盐中毒

答案：C

解析：■输血后发热反应主要表现为畏寒、寒战和高热，体温可上升至 39—40℃，同时伴有头痛、出汗、恶心、呕吐及皮肤潮红。多发于输血开始后 15min — 2h 内，症状持续 30min 至 2h 后逐渐缓解。过敏反应主要表现为皮肤局限性或全身性瘙痒或荨麻疹。溶血反应典型的表现为输血后，立即出现沿输血静脉的红肿及疼痛，伴寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、

头痛、胸闷，心率加快甚至血压下降、休克，随之出现血红蛋白尿和溶血性黄疸，继而出现少尿、无尿及急性肾衰竭。细菌污染反应轻者仅有发热反应，重者可出现内毒素性休克和 DIC。表现为烦躁、寒战、高热呼吸困难、恶心、呕吐、发绀和腹痛。也可以出现血红蛋白尿、急性肾衰竭、肺水肿，甚至死亡。故本题选 C。三、

305.(B型题)针对输血的细菌污染反应，应采取

- A.停止输血，积极抗休克，维持循环功能，保护肾功能和防治弥散性血管内凝血
- B.保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作
- C.主要措施为抗休克、抗感染
- D.立即停止输血，半坐位，吸氧和利尿
- E.立即减慢输血速度，严重者停止输血

答案：C

解析：此题暂无解析

306.(B型题)在短时间内输入所需血量者，适用于

- A.大出血
- B.中度缺水
- C.纠正贫血和低蛋白血症
- D.严重感染
- E.凝血异常

答案：A

解析：●输血的速度应根据患者的具体情况决定，大量出血、失血性休克抢救或动脉输血时速度要快。一般情况一次输血不应超过 4 小时，为避免室温下引起细菌繁殖每次以 200~400ml 为宜；急性大出血时应加压、快速输入所需血量以纠正血压。

307.(A1型题)下列哪项不属于输血适应证

- A.凝血机制异常和出血性疾病
- B.重症感染
- C.黄疸
- D.器官移植
- E.低蛋白血症

答案：C

解析：此题暂无解析

308.(B型题)患者阑尾切除术后 5 天，体温一直在 38.5℃~39.2℃，并出现腹泻 10 次/日，伴里急后重，应考虑的诊断是

- A.切口裂开
- B.手术后出血
- C.盆腔脓肿
- D.尿路感染
- E.切口感染

答案：C

解析：此题暂无解析

309.(B型题)肝脾破裂出血应选择

- A.紧急手术
- B.急诊手术
- C.限期手术
- D.择期手术
- E.分期手术

答案：A

解析：此题暂无解析

310.(A1型题)术后常见循环系统并发症不包括

- A.高血压
- B.心搏骤停
- C.严重心律失常
- D.心绞痛
- E.低血压

答案：E

解析：此题暂无解析

311.(A1型题)鼻胃管的作用不包括

- A.减轻由于手术、麻醉、术后胃肠运动抑制所引起的胃肠胀气
- B.促使术后胃肠蠕动的恢复
- C.早期发现吻合口出血、急性胃黏膜病变等
- D.辅助呼吸
- E.补充丢失的胃肠液

答案：D

解析：此题暂无解析

312.(A1型题)术后一般监测不包括

- A.心电监测
- B.肾功能监测
- C.血容量监测
- D.呼吸功能监测
- E.体温监测

答案：C

解析：此题暂无解析

313.(A1型题)下列关于术后腹胀的处理不正确的是

- A.持续胃肠减压，放置肛管
- B.高渗液低压灌肠
- C.大多需要手术治疗
- D.新斯的明做足三里封闭
- E.胃管注入大承气汤

答案：C

解析：◎腹胀是胃肠道功能受抑制、肠腔内积气过多所致。胃肠道功能恢复后可自行缓解。

术后数日仍有腹胀不排气、无肠鸣音或减弱，可能是肠麻痹所致；如腹胀伴有阵发性绞痛、肠鸣音亢进，或闻及气过水声，多是肠粘连或其他原因所致的机械性肠梗阻。处理：持续性胃肠减压、肛管排气、高渗盐水灌肠等。有时需手术治疗。如为非胃肠道手术者，可以给新斯的明肌内注射。二、

314.(B型题)持续痛，影响休息的疼痛属于

- A.0度(无痛)
- B.I度(轻度疼痛)
- C.II度(中度疼痛)
- D.III度(重度疼痛)
- E.IV度(严重疼痛)

答案：C

解析：此题暂无解析

315.(A1型题)下列属于神经破坏性药物的是

- A.阿米替林
- B.哌替啶
- C.芬必得
- D.酚甘油
- E.地西洋

答案：D

解析：此题暂无解析

316.(A1型题)若疼痛剧烈，伴有植物神经功能紊乱，严重干扰睡眠，被动体位，必须依靠止痛治疗，按主诉分级法，属于

- A.0级:无痛
- B.1级:轻度疼痛
- C.2级:中度疼痛
- D.3级:重度疼痛
- E.4级:严重疼痛

答案：D

解析：此题暂无解析

317.(A1型题)重症胰腺炎的手术治疗原则中不包括

- A.胰腺穿刺
- B.规则性胰腺切除术
- C.坏死组织清除术
- D.胰周引流术
- E.三腔造口

答案：A

解析：◎重症胰腺炎的手术治疗原则：规则性胰腺切除术、坏死组织清除术、胰周引流术、三腔造口。

318.(A1型题)下列各项，适用采取“补法”的是

- A.蜂窝织炎中期，热毒炽盛
- B.初期肿疡
- C.溃疡后期，疮口难敛
- D.蜂窝织炎已成脓
- E.溃疡早期

答案：C

解析：■中医外科内治原则包括消法、托法和补法。消法适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病及各种皮肤疾病。托法适用于外疡中期及成脓期。补法适用于溃疡后期，此期毒势已去，精神衰疲，血气虚弱，创口难敛。C为溃疡后期，可用补法。故本题选C。

319.(B型题)属于血管损伤的是

- A.腹腔内缺血
- B.戳孔疝
- C.腹壁坏死性筋膜炎
- D.肝外胆管损伤
- E.肠系膜血管损伤

答案：E

解析：此题暂无解析

320.(B型题)属于CO<sub>2</sub>气腹相关的并发症是

- A.腹腔内缺血
- B.戳孔疝
- C.腹壁坏死性筋膜炎
- D.肝外胆管损伤
- E.肠系膜血管损伤

答案：A

解析：此题暂无解析

321.(A1型题)下列哪项目前不属于腹腔镜手术适应证

- A.胆囊切除术
- B.肝叶切除术
- C.淋巴结清扫术
- D.结肠切除术
- E.疝修补术

答案：B

解析：此题暂无解析

322.(A1型题)目前仍在探索的腹腔镜手术不包括

- A.胃切除术
- B.Whipple手术
- C.门静脉转流术
- D.门静脉断流术
- E.解剖性肝切除术

答案：A

解析：此题暂无解析

323.(A1型题)下列哪项为腹腔镜术后 CO<sub>2</sub> 气腹相关并发症

- A.肠粘连
- B.胆漏
- C.内出血
- D.下肢静脉淤血和血栓形成
- E.腹壁血肿

答案：D

解析：此题暂无解析

324.(A1型题)下列各项，不属腹腔镜检查禁忌证的是

- A.盆腹腔粘连严重者
- B.腹腔内出血较多
- C.高血压、冠心病
- D.急性盆腔炎
- E.严重呼吸系统疾病

答案：D

解析：◎急性盆腔炎一般表现为下腹痛、寒战、高热、头痛、纳差、阴道分泌物多、经量增多、经期延长；以抗生素治疗为主，一般不给予腹腔镜手术治疗。

325.(A2型题)患者，男，50岁，发现乙肝8年，黑便半个月，胃镜检查发现食道、胃底静脉曲张。其门脉高压阻塞部位在

- A.窦后
- B.窦内
- C.窦前
- D.肝前
- E.肝后

答案：B

解析：此题暂无解析

326.(A2型题)患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，发生大量呕血，考虑食道胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

- A.三腔二囊管压迫
- B.胃内注射或口服去甲肾上腺素
- C.胃管注入冰水
- D.使用生长抑素
- E.内镜治疗

答案：D

解析：此题暂无解析

327.(A2型题)患者，男，56岁，患肝病反复发作20余年，近日出现乏力、嗜睡、厌食、脾肿大、脾功能亢进、腹水，应首先考虑的诊断是

- A.急性肝炎

- B.肝硬化
- C.黑热病
- D.门脉高压症
- E.肝性脑病

答案：D

解析：此题暂无解析

328.(A1型题)门静脉高压的手术治疗方法不包括

- A.分流术
- B.断流术
- C.转流术
- D.脾切除术
- E.肝叶切除术

答案：E

解析：此题暂无解析

329.(A1型题)门脉高压时的主要病理改变不包括

- A.门-体静脉开放，交通支扩张
- B.腹水
- C.脾肿大、脾功能亢进
- D.肝脏肿大
- E.肝性脑病

答案：D

解析：此题暂无解析

330.(A1型题)下列除哪项外均为门脉高压症的临床表现

- A.外周静脉压升高
- B.腹壁静脉扩张
- C.腹水
- D.食管静脉曲张
- E.脾肿大

答案：A

解析：此题暂无解析

331.(A1型题)门静脉与腔静脉之间的交通支不包括

- A.前腹壁交通支
- B.直肠上端交通支
- C.腹膜后交通支
- D.直肠下端肛管交通支
- E.胃底、食管下段交通支

答案：B

解析：此题暂无解析

332.(A1型题)门静脉压力正常值为

- A.0.27~1.36kPa
- B.0.36~1.27kPa
- C.1.27~2.36kPa
- D.1.36~2.27kPa
- E.2.27~3.36kPa

答案：C

解析：此题暂无解析

333.(A2型题)患者，男，27岁。患右腹股沟斜疝2个月，今早剧烈运动后，肿块不能回纳，伴腹痛，呕吐，腹胀。应首先考虑的是

- A.难复性疝
- B.滑动性疝
- C.嵌顿性疝
- D.可复性疝
- E.肠管壁疝

答案：C

解析：●可复性疝腹股沟区有肿块，偶有胀痛，可回纳入腹腔内；难复性疝胀痛稍重，肿块不能回纳或不能完全回纳入腹腔内；滑动性斜疝也属难复性疝，疝块除了不能完全回纳外，尚有消化不良和便秘等症状，多发生于右侧；嵌顿性疝常发生在强力劳动或排便等腹内压骤增时，包块变硬无弹性，触痛明显，不能回纳；肠管壁疝嵌顿的内容物为部分肠管，系膜侧肠壁及其系膜并未进入疝囊，肠腔并未完全梗阻。患者肿物不能回纳，且伴有消化不良症状，故选C。

334.(A2型题)患者，男性，78岁，双侧腹股沟部出现圆形肿物，不降入阴囊，平卧时可消失，应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.难复性疝
- E.嵌顿疝

答案：A

解析：此题暂无解析

335.(A2型题)患者，男，30岁。右侧腹股沟可复性肿物1个月，压住内环不能复出。应首先考虑的诊断是

- A.睾丸鞘膜积液
- B.股疝
- C.腹股沟直疝
- D.腹股沟斜疝
- E.隐睾

答案：D

解析：●睾丸鞘膜积液包块仅限于阴囊内，从不能回纳或消失，透光试验多阳性；腹股沟斜疝多见于儿童和青中年男性，包块由腹股沟管突出，由外上向内下前斜行进入阴囊，疝块回纳后压住内环口，不再突出；腹股沟直疝多见于年老体弱男性，包块位于腹股沟内侧和耻骨

结节的外上方，不进入阴囊，易回纳，回纳后指压内环不能阻止其出现；股疝中年及以上妇女易发，疝囊经股管向卵圆窝突出；隐睾肿块较小，挤压时可出现特有的胀痛感觉，患侧阴囊内睾丸缺如。故选 D。

336.(A2 型题)患者，男，3岁，啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块，平卧时可自行回纳。应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.脐疝
- E.切口疝

答案：B

解析：此题暂无解析

337.(A2 型题)患者，男性，60岁，腹股沟部出现可复性肿物1个月，可降入阴囊，应首先考虑的诊断是

- A.腹股沟直疝
- B.腹股沟斜疝
- C.股疝
- D.难复性疝
- E.嵌顿疝

答案：B

解析：此题暂无解析

338.(A2 型题)男性，72岁。右侧腹股沟可复性，肿块3个月，肿块肿硬而冷，肿块牵引睾丸疼痛，喜暖恶寒，舌苔白腻，脉弦紧。其治法是

- A.疏肝理气，舒筋止痛
- B.温化寒湿，疏肝理气
- C.补中益气，升提举陷
- D.清热燥湿，调和气血
- E.益气健脾，除湿升阳

答案：B

解析：◎此患者以喜暖、肿块冷硬等寒湿证为主，且伴有睾丸牵引痛等肝经气滞的症状，故治以温化寒湿，疏肝理气。

339.(A2 型题)男性，20岁，阴囊结块，肿硬而冷，牵引睾丸疼痛，喜暖畏寒；苔白腻，脉弦紧。治疗应首选

- A.天台乌药散
- B.右归丸
- C.补中益气汤
- D.香连化滞丸
- E.附子理中汤

答案：A

解析：此题暂无解析

340.(A2型题)患者：男，72岁。右侧腹股沟可复性，肿块三个月，肿块肿硬而冷，肿块牵引睾丸疼痛，喜暖恶寒；舌苔白腻，脉弦紧。其治法是

- A.疏肝理气，舒筋止痛
- B.温化寒湿，疏肝理气
- C.补中益气，升提举陷
- D.清热燥湿，调和气血
- E.益气健脾，除湿升阳

答案：B

解析：■患者肿块为可复性，肿块冷，牵引睾丸出现疼痛，喜暖恶寒，舌苔白腻，脉弦紧。可诊断为寒湿气滞为患，治疗应遵循温阳化湿兼理气的治法。故本题应选B。三、

341.(B型题)腹股沟斜疝时，精索在疝囊

- A.左方
- B.右方
- C.前方
- D.后方
- E.内部

答案：D

解析：此题暂无解析

342.(B型题)腹股沟直疝时，精索在疝囊

- A.左方
- B.右方
- C.前方
- D.后方
- E.内部

答案：C

解析：此题暂无解析

343.(B型题)腹股沟管的上壁是

- A.皮肤，皮下组织
- B.腹膜与腹横筋膜，内侧的1/3尚有联合腱
- C.腹内斜肌和腹横肌下缘
- D.腹股沟韧带和腔隙韧带
- E.腹外斜肌腱膜

答案：C

解析：此题暂无解析

344.(B型题)腹股沟管的下壁是

- A.皮肤，皮下组织
- B.腹膜与腹横筋膜，内侧的1/3尚有联合腱
- C.腹内斜肌和腹横肌下缘
- D.腹股沟韧带和腔隙韧带

E.腹外斜肌腱膜

答案: D

解析: ◎A、E 项是腹股沟管的前壁, B 项是腹股沟管的后壁, C 项是腹股沟管的上壁, D 项是腹股沟管的下壁。

345.(A1 型题)下列哪项不是腹外疝的临床类型

A.易复性疝

B.难复性疝

C.溃疡性疝

D.嵌顿性疝

E.绞窄性疝

答案: C

解析: ◎腹股沟疝的分型:腹外疝有易复性、难复性、嵌顿性、绞窄性等类型。

346.(A1 型题)典型的腹外疝不包括

A.疝环

B.疝囊

C.疝内容物

D.疝外被盖

E.疝外壁

答案: E

解析: 此题暂无解析

347.(A1 型题)疝囊壁部分由腹内脏器构成的腹外疝属

A.易复性疝

B.难复性疝

C.滑动性疝

D.嵌顿性疝

E.绞窄性疝

答案: C

解析: 此题暂无解析

348.(A1 型题)疝内容物经回纳后, 压住腹股沟管内环, 肿块不出现的是

A.股疝

B.腹股沟直疝

C.腹股沟斜疝

D.脐疝

E.切口疝

答案: C

解析: ◎A 项易发生在中年妇女, 极易出现嵌顿和绞窄。B 项疝块回纳后压住内环, 疝块仍突出, C 项疝块回纳后压住内环, 疝块不突出。D 项多见于婴幼儿, 包块多能自行回纳, 很少发生嵌顿和绞窄。若发生在成人则易发生嵌顿。E 项可见切口处有包块, 包块回纳后可清楚扪及疝环边缘。

349.(A2型题)患者，女，33岁。孕2个月，家务劳动后感心悸，气短，胸闷。心率119次/分，呼吸22次/分，心尖区有三级收缩期杂音，肺底部有湿啰音，下肢水肿(+)。应首选的治疗措施是

- A.饮食中限制食盐的摄入
- B.加强整个孕期监护
- C.心衰控制后行人工流产
- D.立即入院终止妊娠
- E.心衰控制后，继续妊娠

答案：C

解析：此题暂无解析

350.(A2型题)女性，33岁。孕2个月，家务劳动后感心悸，气短，胸闷。心率119次/分，呼吸22次/分，心尖区有三级收缩期杂音，肺底部有湿啰音，下肢水肿(+)。应首选的治疗措施是

- A.饮食中限制食盐的摄入
- B.加强整个孕期监护
- C.心力衰竭控制后行人工流产
- D.立即入院终止妊娠
- E.心力衰竭控制后，继续妊娠

答案：C

解析：◎根据症状可以选择心力衰竭控制后行人工流产。其余选择不合题意。

351.(A2型题)经产妇，28岁。妊娠17周余，现出现全身皮肤瘙痒，巩膜及尿液黄染2周，初孕时有同样病史，产后黄疸自行消退，本次入院化验SGPT147U，胆红素68.4mmol/L，应首先考虑的诊断是

- A.急性病毒性肝炎
- B.药物性肝损害
- C.妊娠肝内胆汁淤积症
- D.妊娠期脂肪肝
- E.妊娠期高血压疾病性肝损害

答案：C

解析：此题暂无解析

352.(B型题)易引起静脉栓塞的疾病是

- A.妊娠合并急性病毒性肝炎
- B.妊娠合并糖尿病
- C.尿路感染
- D.妊娠合并心脏病
- E.妊娠合并甲亢

答案：D

解析：此题暂无解析

353.(B型题)易引起巨大儿的疾病是

- A.妊娠合并急性病毒性肝炎

- B.妊娠合并糖尿病
- C.尿路感染
- D.妊娠合并心脏病
- E.妊娠合并甲亢

答案：B

解析：此题暂无解析

354.(A1型题)妊娠合并心脏病的孕妇最危险的时期是

- A.妊娠35~36周
- B.妊娠32~34周
- C.妊娠24~27周
- D.妊娠28~31周
- E.产褥期7天后

答案：B

解析：此题暂无解析

355.(A1型题)妊娠合并心脏病的孕妇死亡的主要原因是

- A.心脏病病程长
- B.未经产前检查
- C.孕妇年龄大
- D.心衰与感染
- E.孕周过大

答案：D

解析：此题暂无解析

356.(A1型题)治疗妊娠期高血压脾虚证，应首选

- A.天仙藤散
- B.白术散
- C.真武汤
- D.肾气丸
- E.四苓散

答案：B

解析：◎妊娠期高血压脾虚证治以健脾利水，方用白术散。

357.(A1型题)下列各项，不属妊娠合并心脏病主要症状的是

- A.心悸
- B.腹痛
- C.水肿
- D.气短
- E.乏力

答案：B

解析：◎心悸、水肿、气短、乏力均可以是心脏功能下降引起的并发症，惟独B选项不是，而是一个与消化道关系更为密切的症状。

358.(A1型题)与妊娠期高血压疾病发生关系最密切的是

- A.心、脾、肾功能失调、
- B.肺、脾、肾功能失调
- C.肝、脾、肾功能失调
- D.肝、脾、肺功能失调
- E.心、肝、肾功能失调

答案：C

解析：■妊娠期高血压疾病肝、脾、肾功能失调最为密切。故本题选C。

359.(A1型题)治疗妊娠期高血压疾病，首选的解痉药是

- A.安定
- B.654—2
- C.硫酸镁
- D.阿托品
- E.冬眠合剂

答案：C

解析：■妊娠期高血压疾病，首选的解痉药是硫酸镁，可作为抗惊厥药.常用于妊娠高血压降低血压。故本题选C。

360.(A1型题)下列各项，不属妊娠合并心脏病主要症状的是

- A.心悸
- B.腹痛
- C.浮肿
- D.气短
- E.乏力

答案：B

解析：■妊娠合并心脏病:①妊娠期出现心悸、气促，心动过速，有时夜间难以平卧；②体力活动受到限制；③听诊心前区可闻及舒张期杂音，III级以上的收缩期杂音，或严重的心律失常，如心房颤动或扑动，房室传导阻滞，室上性心动过速。④X线胸部摄片显示心界扩大。⑤心电图示心肌劳损、心律失常。故本题选B。

361.(A1型题)下列妊娠期急性肾盂肾炎的治疗，错误的是

- A.首选氨苄西林、头孢菌素类药物
- B.无症状性菌尿2周为1疗程
- C.有症状性肾盂肾炎4周为1疗程
- D.症状重者两药联合静滴效果佳
- E.选用喹诺酮类药物

答案：E

解析：■喹诺酮类药物是孕妇禁忌药物。故本题选E。

362.(A2型题)初产妇，23岁。32周妊娠，阴道流水1小时入院，检查:无宫缩，胎心率130次/分，胎头先露，未入盆，阴道液pH值呈碱性，考虑胎膜早破。错误的处理措施是

- A.卧床，抬高床尾
- B.注意胎心率变化

- C.OCT 试验
- D.注意观察体温，测血常规
- E.注意保持会阴部清洁

答案：C

解析：此题暂无解析

363.(A2 型题)初孕妇，29岁。足月妊娠，上午8时始开始阵发宫缩，10时胎膜破裂，下午16时肛门检查：宫口已开全，胎头先露，胎位LOA，胎头颅骨最低点在坐骨棘水平以下3cm，胎心率100次/分，羊水呈草绿色，黏稠。首先应考虑的诊断是

- A.滞产
- B.宫缩乏力
- C.胎儿窘迫
- D.胎膜早破
- E.可疑头盆不称

答案：C

解析：此题暂无解析

364.(B 型题)初产妇，28岁。41周妊娠，产程进展过程中因潜伏期行人工破膜术，宫口扩张2cm，胎头位于坐骨棘水平上2cm，羊水III度混浊，量5ml，胎心率150次/分。应首选的处理措施是

- A.观察
- B.吸氧
- C.立即剖宫产
- D.注射哌替啶
- E.静滴催产素

答案：C

解析：此题暂无解析

365.(A1 型题)下列关于胎动次数的叙述，属胎儿窘迫的是

- A.胎动<10次/12小时
- B.胎动<15次/12小时
- C.胎动<20次/12小时
- D.胎动<25次/12小时
- E.胎动<30次/12小时

答案：A

解析：此题暂无解析

366.(A1 型题)下列各项，不属胎儿窘迫临床表现的是

- A.胎心率100次/分
- B.胎动减弱，次数减少
- C.头位临产后羊水有胎粪污染
- D.臀位临产后羊水有胎粪污染
- E.胎儿头皮血pH值7.15

答案：D

解析：此题暂无解析

367.(A1型题)下列各项，属导致慢性胎儿窘迫原因是

- A.脐带受压
- B.胎盘早剥
- C.孕妇休克
- D.胎盘功能不全
- E.宫缩过强或持续时间过长

答案：D

解析：此题暂无解析

368.(A1型题)下列各项，不属剖宫产的适应证的是

- A.胎儿窘迫
- B.珍贵儿
- C.宫缩乏力
- D.产妇要求
- E.前置胎盘

答案：D

解析：◎剖宫产的适应证为胎儿窘迫、异常分娩、宫缩乏力和前置胎盘等。而产妇要求不属于上述范畴。

369.(A1型题)下列各项，不属胎儿窘迫临床表现的是

- A.胎心率 100 次 / 分
- B.胎动减弱，次数减少
- C.头位临产后羊水有胎粪污染
- D.臀位临产后羊水有胎粪污染
- E.胎儿头皮血 pH7.15

答案：D

解析：◎胎儿窘迫临床表现为胎动频繁继而胎动减少或消失；胎心异常。胎心>160 次/分，尤其>180 次/分，为胎儿缺氧后胎心率初期表现。胎心率<120 次/分，尤其<100 次/分，为胎儿危险征象。电子胎心及子宫收缩监护仪检查——缩宫素激惹试验(OCT)时反复出现变异减速或连续 3 次以上的胎心晚期减速，胎动后无胎心率改变。羊水胎粪污染；胎儿头皮血气分析——血 pH<7.20(正常值 7.25~7.35)。

370.(A1型题)下列关于胎动次数的叙述，属胎儿窘迫的是

- A.胎动<10 次 / 12 小时
- B.胎动<15 次 / 12 小时
- C.胎动<20 次 / 12 小时
- D.胎动<25 次 / 12 小时
- E.胎动<30 次 / 12 小时

答案：A

解析：◎一般胎动<10 次 / 12 小时，可考虑为胎儿窘迫。二、

371.(A2型题)女性，25岁，已婚。以往月经正常，50天前行人工流产吸宫术，出血少，现

月经未潮，3天来感觉小腹胀痛，肛门坠胀，妇科检查：子宫后位，稍大而软，有明显压痛，双附件无异常，尿妊娠试验(—)。应首先考虑的是

- A.闭经
- B.早孕
- C.妊娠腹痛
- D.宫颈宫腔粘连
- E.子宫内膜炎

答案：D

解析：◎宫颈宫腔粘连是在人工流产过程中，由于吸宫或刮宫过度，损伤了子宫颈管和子宫内膜，随后引起宫颈粘连阻塞或宫腔粘连缩小，症状有：人工流产后出现月经过少或闭经伴周期性下腹痛。宫颈举痛，宫体可稍饱满且有压痛等。此患者症状与之相符

372.(A2型题)患者，女，40岁，已婚。3天来带下量多，呈灰黄色泡沫状，伴外阴及阴道口瘙痒，尿频、尿痛。应首先考虑的是

- A.霉菌性阴道炎
- B.滴虫性阴道炎
- C.老年性阴道炎
- D.非特异性阴道炎
- E.急性外阴炎

答案：B

解析：■白带增多及外阴瘙痒滴虫阴道炎的主要症状是稀薄的泡沫状白带增多及外阴瘙痒，若有其他细菌混合感染则排出物呈脓性，可有臭味，瘙痒部位主要为阴道口及外阴，间或有灼热、疼痛、性交痛等。若尿道口有感染，可有尿频、尿痛，有时可见血尿。检查时可见阴道粘膜充血，严重者有散在的出血斑点，后穹窿有多量白带，呈灰黄色、黄白色稀薄液体或为黄绿色脓性分泌物，常呈泡沫状。故本题选B。

373.(A2型题)患者，女，45岁，已婚。接触性阴道流血2个月；宫颈重度糜烂伴颗粒样增生，宫颈脱落细胞检查巴氏III级。为了明确诊断，提高活检的准确性，应作的检查是

- A.宫颈活组织检查
- B.阴道镜与宫颈检查
- C.外阴活组织检查
- D.阴道活组织检查
- E.子宫内膜活组织检查

答案：A

解析：■防癌涂片用巴氏染色，结果分5级I级正常，II级炎症引起，III级可疑，IV级可疑阳性，V级阳性。III、IV、V级涂片者应重复刮片检查并行宫颈活组织检查，II级涂片需先按炎症处理后重复涂片进一步检查。本患者达到标准，故本题选A。三、

374.(B型题)生殖器结核常见的症状是

- A.高热，白带增多，子宫及附件区压痛，WBC升高
- B.停经，下腹痛，阴道出血
- C.腹痛由脐周开始，后转移至右下腹麦氏点
- D.不孕，消瘦，输卵管碘油造影呈串珠状
- E.卵巢囊肿病史，运动后突发一侧下腹痛，B超检查囊肿消失，盆腔有少量积液

答案: D

解析: ◎急性盆腔炎常见的症状是高热、寒战、阴道分泌物增多,常呈脓性,下腹痛,压痛及反跳痛明显,血白细胞总数及中性粒细胞增高。生殖器结核常见的症状是不孕,消瘦,输卵管碘油造影呈串珠状。而腹痛由脐周开始,后转移至右下腹麦氏点为急性阑尾炎的症状。E项为卵巢囊肿破裂的症状。

375.(B型题)短效避孕药的主要作用机制是

- A.抑制排卵,不利于精子穿透
- B.阻止精子进入宫腔
- C.杀灭精子
- D.不利孕卵着床
- E.杀灭卵子

答案: A

解析: 此题暂无解析

376.(A1型题)下列各项,不属避孕方法的是

- A.输卵管结扎术
- B.人工流产
- C.安全期避孕
- D.宫内节育器的放置
- E.药物避孕

答案: B

解析: 此题暂无解析

377.(A1型题)下列各项,最早提倡节育、晚婚的古籍是

- A.《广嗣纪要》
- B.《诸病源候论》
- C.《褚氏遗书》
- D.《逐月养胎法》
- E.《十产论》

答案: C

解析: 此题暂无解析

378.(A1型题)除去下列哪一项其他均为中度脱水的临床表现

- A.烦躁不安或精神萎靡
- B.眼窝及前囟明显凹陷
- C.皮肤弹性差
- D.四肢厥冷
- E.尿量明显减少

答案: D

解析: 此题暂无解析

379.(A1型题)小儿喜伏卧者,其病因多是

- A.乳食内积

- B. 盘肠吊痛
- C. 痰饮内伏
- D. 久病体虚
- E. 胸胁疼痛

答案：A

解析：此题暂无解析

380.(A1型题)卫气营血辨证与三焦辨证常用于治疗的疾病是

- A. 心理性疾病
- B. 急性传染病
- C. 营养性疾病
- D. 结缔组织病
- E. 肠寄生虫病

答案：B

解析：此题暂无解析

381.(A1型题)小儿前囟闭合的正常时间是

- A. 4~6个月
- B. 8~10个月
- C. 12~18个月
- D. 18~20个月
- E. 20~22个月

答案：C

解析：◎囟门分为前囟、后囟，前囟的测量以对边中点连线为难，出生时为1.5~2cm。后随颅骨发育而增大，6个月后逐渐骨化而变小，在1~1.5岁时闭合，后囟出生时部分已闭合，或出生后2~4个月闭合。

382.(A1型题)下列关于母乳喂养优点的叙述，错误的是

- A. 含饱和脂肪酸多，利于消化吸收
- B. 钙磷比例适宜，较少发生低钙血症
- C. 含优质蛋白质，必需氨基酸多
- D. 有提高婴儿免疫力的作用
- E. 哺乳可促进子宫收缩，利于母亲早日康复

答案：A

解析：◎母乳含不饱和脂肪酸较多，以乳清蛋白为主，又含有较多解脂酶，有利于消化吸收。必需氨基酸含量较多，免疫球蛋白种类、含量多，可提高婴儿免疫力。人乳中钙含量虽低，但钙磷比例较适宜。哺乳可刺激子宫收缩，利于母亲早日康复。还可减少乳母乳腺癌、卵巢癌的发生率。

383.(A1型题)小儿开始更换恒牙的年龄范围是

- A. 2~3岁
- B. 4~5岁
- C. 6~7岁
- D. 8~9岁

E.10岁

答案：C

解析：◎2岁以内乳牙的数目为月龄减4~6。6~7岁乳牙开始脱落换恒牙，17~30岁恒牙出齐，共28~32个。小儿6岁左右开始萌出第一颗恒牙，自7~8岁，乳牙按萌出先后脱落，代之以恒牙。

384.(A1型题)婴儿啼哭，可视为常态的是

- A.哭而无泪，哭而绵长
- B.哭而有泪，哭声洪亮
- C.哭声绵长，作吮乳状
- D.突然大哭，声高气急
- E.哭声嘶哑，呼吸不利

答案：B

解析：此题暂无解析

385.(A1型题)中医学称小儿为“纯阳之体”，其含义是

- A.纯阳无阴
- B.发育迅速
- C.阳常有余
- D.肝常有余
- E.阴虚阳亢

答案：B

解析：■“纯阳”指小儿先天禀受的元阴元阳未曾耗散，因而成为后天生长发育的动力，使儿童显示出蓬勃的生机，迅速地发育成长。“纯阳”，是我国古代医家关于小兒生理特点的学说之一。不能将“纯阳”理解成正常小儿为有阳无阴或阳亢阴亏之体。故本题选B。

386.(A1型题)下列关于母乳喂养优点的叙述，错误的是

- A.含饱和脂肪酸多，利于消化吸收
- B.钙磷比例适宜，较少发生低钙血症
- C.含优质蛋白质，必需氨基酸多
- D.有促进婴儿免疫力的作用
- E.哺乳可促进子宫收缩，利于母亲早日康复

答案：A

解析：■关于母乳中脂肪酸的正确表述是：含不饱和脂肪酸的脂肪较多，供给丰富的必须脂肪酸，脂肪颗粒小，又含较多解脂酶，有利于消化吸收。故本题选A。

387.(A1型题)母乳喂养，增加半固体和固体辅食最适宜的时间是

- A.2~3个月
- B.3~4个月
- C.4~5个月
- D.5~6个月
- E.半岁后

答案：C

解析：■小儿自4~5个月起，月乳牙萌出，咀嚼能力增强，已可以适应半固体和固体食物，

故可以添加一些辅助食品，以补充小儿营养，又为断奶作准备。故本题选 C。二、

388.(A1型题)肺炎喘嗽痰热闭肺证的首选方剂是

- A.沙参麦冬汤
- B.麻杏石甘汤
- C.五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- D.定喘汤
- E.银翘散合麻杏石甘汤

答案：C

解析：此题暂无解析

389.(A1型题)治疗小儿暑邪感冒，应首选

- A.荆防败毒散
- B.新加香薷饮
- C.银翘散
- D.三拗汤
- E.桑菊饮

答案：B

解析：◎暑邪感冒方药新加香薷饮加减。三拗汤、荆防败毒散主要针对风寒型，银翘散、桑菊饮主要针对风热型。

390.(A1型题)小儿感冒容易出现兼证，多见

- A.挟火、挟痰、挟湿
- B.挟火、挟痰、挟滞
- C.挟风、挟痰、挟滞
- D.挟惊、挟痰、挟滞
- E.挟湿、挟惊、挟滞

答案：D

解析：◎小儿感冒容易出现兼证为夹痰、夹滞、夹惊。

391.(A1型题)肺炎喘嗽区别于支气管炎的重要体征是

- A.双肺固定的细湿啰音
- B.双肺呼吸音减弱
- C.双肺呼吸音增粗
- D.双肺哮鸣音
- E.双肺管状呼吸音

答案：A

解析：◎支气管肺炎的临床特点：肺部体征早期不明显或呼吸音粗糙，以后可听到较固定的中、细湿啰音，啼哭或深吸气末更为明显。

392.(A1型题)6个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑

- A.葡萄球菌肺炎
- B.合胞病毒肺炎
- C.革兰阴性杆菌肺炎

D.肺炎支原体肺炎

E.衣原体肺炎

答案：E

解析：■除选项 E，其余的选项的病原体感染所致的肺炎均有伴有发热，再有研究认为 6 个月以内婴儿无热性支气管肺炎应考虑衣原体肺炎。故本题选 E。

393.(A1 型题)诊断病毒性心肌炎的主要指标，错误的一项是

A.急慢性心功能不全或心脑综合征

B.有心脏扩大、奔马律或心包炎表现之一

C.多汗、肌痛、胸闷

D.发病 1 个月内血清 CK-MB 增高

E.心脏核素扫描发现心室扩大

答案：C

解析：◎病毒性心肌炎主要指标：①急、慢性心功能不全，或心脑综合征。②有奔马律或心包摩擦音。③心脏扩大。④心电图示严重心律失常。或明显的 ST-T 改变，或运动试验阳性，发病 1 个月内血清 CK-MB 增高。

394.(A1 型题)风湿性心肌炎的临床表现下列哪项是错误的

A.出现早搏和心动过速

B.心率增快

C.心前区第一心音减弱

D.严重时可出现奔马律

E.心尖区可听到隆隆样收缩期杂音

答案：E

解析：■选项 E.心尖区可听到隆隆样收缩期杂音是器质性杂音多见于二尖瓣关闭不全，风湿性心肌炎是心尖区可闻及轻度收缩期杂音；其余选项是风湿性心肌炎的临床表现。故本题选 E。二、

395.(A2 型题)患儿，2岁。体重 11kg。盛夏就诊，腹泻 2 天，量多次频，泻下急迫，大便呈黄色蛋花样，有少许黏液，精神稍差，皮肤弹性尚可，哭时有泪，尿黄量少。舌质红，苔黄腻，指纹紫。大便常规：WBC4~6/HP，RBC1~2/HP。应首先考虑的诊断是

A.大肠杆菌肠炎，轻度脱水

B.大肠杆菌肠炎，中度脱水

C.轮状病毒性肠炎，轻度脱水

D.轮状病毒性肠炎，中度脱水

E.急性细菌性痢疾，轻度脱水

答案：A

解析：此题暂无解析

396.(A2 型题)女性，3 个月。口腔、舌面满布白屑，面赤唇红，烦躁不宁，吮乳啼哭，大便干结，小便短黄。治疗应首选制霉菌素加

A.清热泻脾散

B.泻黄散

C.六味地黄丸

D.导赤散

E.清胃散

答案：A

解析：◎根据题干描述症状辨为心脾积热证，主方清热泻脾散。

397.(A2型题)患儿，5个月。急性腹泻，频繁呕吐2天，检查头颅，可能发现的体征是

A.囟门逾期不闭

B.囟门凹陷

C.囟门高凸

D.囟门宽大，头缝开解

E.囟门早闭

答案：B

解析：■患儿，5个月囟门正常是未闭合的，急性腹泻，频繁呕吐2天，可有不同程度的脱水，因此检查头颅，可能发现的体征是囟门凹陷，故本题选B。

398.(A2型题)急性肾炎患儿，肢体水肿，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治疗应首选

A.呋塞米加己椒苈黄丸

B.呋塞米加龙胆泻肝汤

C.毛花苷C加己椒苈黄丸

D.毛花苷C加龙胆泻肝汤

E.二氯嗪加己椒苈黄丸

答案：A

解析：◎根据题干辨为水气上凌心肺证，证候特点：肢体水肿，经久不退，尿量减少，咳嗽气急，心悸胸闷，口唇青紫，脉细无力。治法：润肺逐水，温阳扶正。方药：己椒苈黄丸。本病以循环充血为主，故应积极降低循环负荷，首选利尿药。出现心功能不全表现时可选用强心药如毛花苷C。

399.(A2型题)患儿，4岁。反复浮肿5个月，面色萎黄，神疲乏力，肢体浮肿，晚间腹胀，纳少便溏。查体：全身浮肿呈凹陷性，舌淡苔白滑，脉沉缓。实验室检查：尿蛋白明显增高，血浆蛋白降低，血清胆固醇 $5.97\text{mmol/L}$ 。诊断为肾病综合征，其证型是

A.风水相搏

B.湿热内侵

C.脾虚湿困

D.肝肾阴虚

E.脾肾阳虚

答案：C

解析：■患儿：无表证，A错；无热证，B、D错；无尿少，水肿不是以腰以下为主E错。面色萎黄，神疲乏力，纳少便溏典型的脾阳虚，肢体浮肿呈凹陷性，舌淡苔白滑，脉沉缓是湿邪困脾，故本题选C。

400.(A1型题)儿童多发性抽动症脾虚肝旺证治疗应首选的方剂是

A.醒脾散

B.炙甘草汤

- C.六味地黄丸
- D.人参归脾汤
- E.黄连温胆汤

答案：A

解析：此题暂无解析

401.(A1型题)以下诸项不属儿童多动症的临床特征的是

- A.冲动任性
- B.女性多于男性
- C.智力正常或基本正常
- D.注意力不集中
- E.动作过多

答案：B

解析：◎儿童多动症患者男性多于女性，冲动任性、注意力不集中、动作过多，但智力正常或基本正常。

402.(A1型题)多发性抽动症的基本病理改变是

- A.瘀血阻窍
- B.痰瘀互阻
- C.肝风内动
- D.肝风痰火胶结成疾
- E.痰蒙清窍

答案：D

解析：◎本病多因五志过极，风痰内蕴，导致肝风内动，肝风痰火互结所致。二、

403.(A2型题)患儿，女，5岁。面色不华，已逾3个月，指甲苍白，纳食不佳，四肢乏力，大便溏泻，舌淡苔薄白，脉细无力。血常规示小细胞低色素性贫血。治疗应首选

- A.八珍汤
- B.大补元煎
- C.参苓白术散
- D.保和丸
- E.补中益气汤

答案：C

解析：■纳食不佳，四肢乏力，大便溏泻，舌淡苔薄白，脉细无力是脾胃虚弱证，治疗应健脾和胃益气，因同时血常规示小细胞低色素性贫血故再佐以养血，参苓白术散：党参、茯苓、白术、扁豆、山药健脾益气，黄芪、当归益气养血，陈皮、砂仁行气和中使补而不滞，鸡内金、谷芽健脾消食助运。故本题选C。补中益气汤用于脾虚气陷和气虚发热证，补气升提有余而补血不足。

404.(B型题)患儿周围血常规检查：MCH:28pg/L,HGB:60g/L,PLT:80×10<sup>9</sup>/L,WBC:3.2×10<sup>9</sup>/L.其诊断是

- A.营养性缺铁性贫血
- B.血小板减少性紫癜
- C.营养性巨幼红细胞性贫血

D.再生障碍性贫血

E.混合性贫血

答案: D

解析: 此题暂无解析

405.(A1型题)女性第二性征在何年龄发育应考虑有性早熟问题

A.8岁以前

B.9岁

C.11岁

D.13岁

E.15岁

答案: A

解析: ●女性第二性征指内外生殖器外的女性特有的外部特征,如乳房、阴毛和腋毛等。各项第二性征指标发育的年龄、顺序和幅度有明显的个体差异。乳房的发育在第二性征中出现最早,多在10-11岁时,但也可早至8岁或晚至13岁开始。一般认为,女童在8岁之前出现乳房增大、阴毛、腋毛生长等第二性征的一种或一种以上者,或月经初潮开始于10岁以前者,均属于性早熟,所以答案A为正确答案。

406.(A1型题)下列选项,除了哪一项外均为性早熟的病因

A.肿瘤引起的

B.外源性性激素引起的

C.体质性真性性早熟,尚无特殊疗法,可用大剂量孕激素抑制促性激素的分泌

D.不完全性性早熟

E.食物引起的

答案: C

解析: 此题暂无解析

407.(B型题)哮喘未发之时,常怯寒自汗,容易感冒,发作前每有鼻塞流涕,其治法是

A.补肾纳气

B.补肺固卫

C.健脾化痰

D.温肺化痰,止咳平喘

E.回阳固脱,温肺平喘

答案: B

解析: 此题暂无解析

408.(B型题)哮喘发作,喘息喉鸣,痰多白沫,形寒无汗,四肢不温,面色晦滞带青,其治法是

A.补肾纳气

B.补肺固卫

C.健脾化痰

D.温肺化痰,止咳平喘

E.回阳固脱,温肺平喘

答案: D

解析：此题暂无解析

409.(A2型题)患儿，1岁。患维生素D缺乏性佝偻病，夜啼不宁，多汗，惊惕不安，行走不稳，出牙延迟。舌淡，苔薄白，指纹淡。治疗应首选

- A.四君子汤
- B.补肾地黄丸
- C.六味地黄丸
- D.益脾镇惊散
- E.资生健脾丸

答案：D

解析：■脾虚气弱，故多汗，肝失阴血濡养，肝木偏旺，则夜啼不宁，肝主筋，肝气不足，则行走无力。体虚发育迟缓，渐次由脾及肾，故囟门迟闭，齿生亦晚，苔薄白，指纹淡均为脾虚肝旺之象。治疗应健脾平肝，应首选益脾镇惊散，故正确答案是选项D。

410.(A2型题)某小儿，2个月。足月顺产，母乳喂养，为预防佝偻病服用维生素D，每日补充的合理剂量是

- A.200U
- B.400U
- C.2000U
- D.5000U
- E.10000U

答案：B

解析：◎婴幼儿期应用维生素D预防佝偻病。每天予维生素D400~800U。

411.(A2型题)患儿，2岁，发热3天，口腔、手足、四肢、臀部可见疱疹，疹色紫暗，疱液混浊，口臭流涎，小便黄，大便秘结，舌质红绛，苔黄厚腻，指纹紫。治疗首选

- A.甘露消毒丹
- B.清瘟败毒饮
- C.凉营清气汤
- D.清胃解毒汤
- E.透疹凉解汤

答案：B

解析：此题暂无解析

412.(A2型题)手足口病病儿，其疱疹紫暗稠密，痛痒剧烈伴高热不退，烦躁口渴，溲赤便秘，舌红绛，苔黄厚腻，脉滑数。治疗除清热解毒外，还应

- A.宣肺化湿
- B.清胃化湿
- C.泻脾化湿
- D.凉营化湿
- E.活血化湿

答案：D

解析：此题暂无解析

413.(A1型题)蛔虫病的发生，与下列哪项关系最为密切

- A.饮食不洁
- B.饮食不节
- C.过食生冷
- D.过食肥甘
- E.素体脾虚

答案：A

解析：◎蛔虫病的发生最为密切的是饮食不洁。

414.(A1型题)蛲虫病的预防措施不包括

- A.在集体儿童机构，开展普查普；
- B.进行卫生宣教工作
- C.每年预防性口服灭虫药物
- D.培养良好的卫生习惯。
- E.集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内

答案：C

解析：■在集体儿童机构，开展普查普，进行卫生宣教工作，培养良好的卫生习惯，集体儿童机构勤用湿扫法打扫室内，家庭中所有患者应同时治疗。故本题选 C。二、

415.(A1型题)下列各项，不属心脏呼吸骤停临床表现的是

- A.突然昏迷
- B.忽然失语
- C.心音消失或心跳过缓
- D.大动脉搏动消失
- E.瞳孔扩大

答案：B

解析：此题暂无解析

416.(A1型题)下列关于休克的叙述中，错误的是

- A.失血性休克的治疗是扩容
- B.感染性休克时可大剂量使用氢化考的松
- C.失血性休克时，止血是不可忽视的主要手段
- D.感染性休克时，应首先使用升压药
- E.感染性休克时应恢复有效循环血量

答案：D

解析：此题暂无解析

417.(A2型题)患儿，4岁。高热持续3天，神昏谵语，突然颈项强直，两目上视，口吐白沫，手足抽动，四肢厥冷。其宜选方剂是

- A.羚角钩藤汤
- B.清营汤
- C.清瘟败毒饮
- D.犀角地黄汤
- E.镇惊丸

答案：A

解析：此题暂无解析

418.(A2型题)患儿，5岁。腹痛绵绵2天，时作时止，痛时喜按，面白少华，神疲乏力，手足不温，食后腹胀，大便偏稀。唇舌较淡，脉沉。治疗应首选的方剂是

- A.少腹逐瘀汤
- B.小建中汤
- C.大承气汤
- D.香砂平胃散
- E.养脏散

答案：B

解析：此题暂无解析

419.(B型题)督脉的主治是

- A.肝、脾、肾病
- B.目病、咽喉病、热病
- C.后头、肩胛病，神志病
- D.中风、昏迷、热病、头面病
- E.前头、口齿、咽喉病，胃肠病

答案：D

解析：此题暂无解析

420.(B型题)手三阳经主治相同的是

- A.胸部病
- B.咽喉病、热病
- C.眼病、神志病、热病
- D.前阴病、妇科病
- E.神志病、脏腑病、妇科病

答案：B

解析：此题暂无解析

421.(B型题)足三阳经主治相同的是

- A.胸部病
- B.咽喉病、热病
- C.眼病、神志病、热病
- D.前阴病、妇科病
- E.神志病、脏腑病、妇科病

答案：C

解析：◎手三阳经相同主治咽喉病、热病。足三阳经相同主治眼病、神志病、热病。

422.(A1型题)八会穴中的脉会是

- A.太渊
- B.血海
- C.膈俞

D.章门

E.中脘

答案：A

解析：此题暂无解析

423.(A1型题)根据子母补泻取穴法，心经实证应选用

A.少冲

B.中冲

C.太渊

D.太白

E.太冲

答案：D

解析：此题暂无解析

424.(A1型题)根据子母补泻取穴法，心包经虚证应选用

A.少冲

B.中冲

C.太渊

D.太白

E.太冲

答案：B

解析：此题暂无解析

425.(A1型题)足太阳膀胱经的合穴是

A.阳陵泉

B.委中

C.委阳

D.合阳

E.小海

答案：B

解析：此题暂无解析

426.(A1型题)五行属水，又为合穴的是

A.太溪

B.侠溪

C.少府

D.中府

E.阴陵泉

答案：E

解析：此题暂无解析

427.(A1型题)耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘的骨度分寸是

A.13寸

B.14寸

C.16 寸

D.18 寸

E.19 寸

答案：D

解析：此题暂无解析

428.(A1 型题)肩胛骨内缘(近脊柱侧)至后正中线的骨度分寸是

A.3 寸

B.4 寸

C.5 寸

D.6 寸

E.8 寸

答案：A

解析：此题暂无解析

429.(A1 型题)根据骨度分寸法，脐中至耻骨联合上缘是

A.5 寸

B.7 寸

C.8 寸

D.9 寸

E.12 寸

答案：A

解析：◎骨度分寸法，脐中至耻骨联合上缘是 5 寸。

430.(A1 型题)眉间至后发际正中第 7 颈椎棘突下的骨度分寸是

A.12 寸

B.13 寸

C.14 寸

D.16 寸

E.18 寸

答案：E

解析：◎眉间至后发际正中第 7 颈椎棘突下的骨度分寸是 18 寸。

431.(A1 型题)在腕前区，桡骨茎突与舟状骨之间，拇长展肌腱尺侧凹陷中的穴位是

A.大陵

B.太渊

C.合谷

D.鱼际

E.后溪

答案：B

解析：此题暂无解析

432.(A1 型题)在手外侧，第 1 掌骨桡侧中点赤白肉际处的穴位是

A.大陵

- B.太渊
- C.合谷
- D.鱼际
- E.后溪

答案：D

解析：此题暂无解析

433.(A1型题)治疗咽痛、掌中热首选的是

- A.鱼际
- B.太渊
- C.列缺
- D.尺泽
- E.少商

答案：A

解析：此题暂无解析

434.(A1型题)治疗齿痛、项强首选的是

- A.鱼际
- B.太渊
- C.列缺
- D.尺泽
- E.少商

答案：C

解析：此题暂无解析

435.(A1型题)肺的募穴所属的经脉是

- A.肺经
- B.任脉
- C.胃经
- D.脾经
- E.肾经

答案：A

解析：此题暂无解析

436.(A1型题)手太阴肺经的终止穴是

- A.少商
- B.少泽
- C.少冲
- D.商阳
- E.至阴

答案：A

解析：此题暂无解析

437.(A1型题)不属于尺泽穴主治病证的是

- A.咯血、咽痛
- B.咳嗽、气喘
- C.急性吐泻
- D.中暑、小儿惊风
- E.齿痛、口眼歪斜

答案：E

解析：此题暂无解析

438.(A1型题)手太阴肺经的起始穴是

- A.少商
- B.中府
- C.商阳
- D.迎香
- E.肺俞

答案：B

解析：此题暂无解析

439.(A1型题)在肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷处的腧穴是

- A.神门
- B.少海
- C.曲泽
- D.尺泽
- E.曲池

答案：D

解析：◎尺泽穴位于肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷处。曲泽穴在肘微屈，肘横纹中，肱二头肌腱尺侧缘。神门在腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱桡侧缘。少海穴在屈肘时，肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线中点。曲池在当屈肘成直角肘横纹外侧端与肱骨外上髁连线中点。二、

440.(A1型题)曲池穴主治的病证是

- A.咳喘，口渴
- B.咳嗽，无脉症
- C.瘾疹，湿疹
- D.无汗，多汗
- E.惊悸，怔忡

答案：C

解析：此题暂无解析

441.(A1型题)太渊穴主治的病证是

- A.咳喘，口渴
- B.咳嗽，无脉症
- C.瘾疹，湿疹
- D.无汗，多汗
- E.惊悸，怔忡

答案：B

解析：此题暂无解析

442.(A1型题)位于肘区，屈肘成直角，在尺泽与肱骨外上髁连线中点凹陷处的腧穴是

- A.商阳
- B.曲池
- C.合谷
- D.尺泽
- E.手三里

答案：B

解析：此题暂无解析

443.(A1型题)位于手指，食指末节桡侧，指甲根角侧上方0.1寸处的腧穴是

- A.商阳
- B.曲池
- C.合谷
- D.尺泽
- E.手三里

答案：A

解析：此题暂无解析

444.(A1型题)手阳明大肠经的原穴是

- A.商阳
- B.合谷
- C.阳池
- D.偏历
- E.阳溪

答案：B

解析：此题暂无解析

445.(A1型题)手阳明大肠经的经穴是

- A.商阳
- B.合谷
- C.阳池
- D.偏历
- E.阳溪

答案：E

解析：此题暂无解析

446.(A1型题)循行“入下齿中”的经脉是

- A.小肠经
- B.大肠经
- C.胃经
- D.脾经
- E.肝经

答案：B

解析：此题暂无解析

447.(A1型题)下列腧穴中，可以治疗胆道蛔虫症的是

- A.商阳
- B.合谷
- C.曲池
- D.手三里
- E.迎香

答案：E

解析：此题暂无解析

448.(A1型题)应注意避开血管针刺的是

- A.列缺
- B.合谷
- C.血海
- D.太渊
- E.鱼际

答案：D

解析：此题暂无解析

449.(A1型题)手太阴肺经与手阳明大肠经的循行交接部位是

- A.拇指
- B.食指
- C.中指
- D.无名指
- E.小指

答案：B

解析：此题暂无解析

450.(A1型题)下列腧穴中，治疗高血压首选

- A.曲泽
- B.尺泽
- C.曲池
- D.中渚
- E.列缺

答案：C

解析：此题暂无解析

451.(A1型题)经脉循行中，不与目内眦或目外眦发生联系的是

- A.手少阳三焦经
- B.手太阳小肠经
- C.手阳明大肠经
- D.足阳明胃经

E.足少阳胆经

答案：C

解析：此题暂无解析

452.(A1型题)下列各项中，不正确的是

- A.肩髎属于手少阳三焦经
- B.养老属于手太阳小肠经
- C.肩髃属于手阳明大肠经
- D.支沟属于手太阳小肠经
- E.后溪属于手太阳小肠经

答案：D

解析：此题暂无解析

453.(A1型题)位于肘横纹中，肱二头肌腱桡侧缘的腧穴是

- A.神门
- B.曲泽
- C.尺泽
- D.曲池
- E.列缺

答案：C

解析：此题暂无解析

454.(A1型题)下列各项中，不属于手阳明大肠经腧穴的主治病证的是

- A.热病
- B.神志病
- C.皮肤病
- D.胸胁病
- E.头面五官疾患

答案：D

解析：此题暂无解析

455.(A1型题)下列腧穴中，治疗头项强痛应首选

- A.少泽
- B.尺泽
- C.列缺
- D.太渊
- E.鱼际

答案：C

解析：此题暂无解析

456.(A1型题)下列腧穴中，治疗高血压首选

- A.曲泽
- B.尺泽
- C.曲池

D.中渚

E.少海

答案：C

解析：◎曲池主治手臂痹痛、上肢不遂等上肢病证；热病；高血压；癫痫；腹痛、吐泻等肠胃病证；咽喉肿痛、齿痛等五官疼痛；癰疹、湿疹、瘰疬等皮、外科病证。二、

457.(A1型题)位于小腿内侧，内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后际的腧穴是

A.血海

B.阴陵泉

C.三阴交

D.悬钟

E.公孙

答案：C

解析：此题暂无解析

458.(A1型题)位于股前区，髌底内侧端上2寸，股内侧肌隆起处的腧穴是

A.血海

B.阴陵泉

C.三阴交

D.悬钟

E.公孙

答案：A

解析：此题暂无解析

459.(A1型题)善治水湿病证的腧穴是

A.隐白

B.公孙

C.阳陵泉

D.三阴交

E.阴陵泉

答案：E

解析：此题暂无解析

460.(A1型题)善治慢性出血证的腧穴是

A.隐白

B.公孙

C.阳陵泉

D.三阴交

E.阴陵泉

答案：A

解析：此题暂无解析

461.(A1型题)常用公孙穴治疗的是

A.乳痈

B.逆气里急

C.癰疹

D.四肢疼痛

E.全身疼痛

答案：B

解析：此题暂无解析

462.(A1型题)常用血海穴治疗的是

A.乳痈

B.逆气里急

C.癰疹

D.四肢疼痛

E.全身疼痛

答案：C

解析：此题暂无解析

463.(A1型题)位于小腿内侧，胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷中的腧穴是

A.复溜

B.悬钟

C.阳陵泉

D.足三里

E.阴陵泉

答案：E

解析：此题暂无解析

464.(A1型题)在足趾，大趾末节内侧，趾甲根角侧后方0.1寸的穴位是

A.隐白

B.大敦

C.太冲

D.至阴

E.足临泣

答案：A

解析：此题暂无解析

465.(A1型题)善于治疗呃逆的腧穴是

A.攒竹

B.承山

C.太溪

D.外关

E.照海

答案：A

解析：此题暂无解析

466.(B型题)起于目内眦的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.足阳明胃经
- C.足太阳膀胱经
- D.手太阳小肠经
- E.足少阳胆经

答案：C

解析：此题暂无解析

467.(A1型题)起于目锐眦的经脉是

- A.手阳明大肠经
- B.足阳明胃经
- C.足太阳膀胱经
- D.手太阳小肠经
- E.足少阳胆经

答案：E

解析：此题暂无解析

468.(A1型题)心俞穴的定位是

- A.在脊柱区，第3胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- B.在脊柱区，第5胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- C.在脊柱区，第6胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- D.在脊柱区，第7胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- E.在脊柱区，第9胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

答案：B

解析：此题暂无解析

469.(A1型题)肝俞穴的定位是

- A.在脊柱区，第3胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- B.在脊柱区，第5胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- C.在脊柱区，第6胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- D.在脊柱区，第7胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸
- E.在脊柱区，第9胸椎棘突下，后正中线旁开1.5寸

答案：E

解析：此题暂无解析

470.(A1型题)次髎穴的主治病证是

- A.滞产
- B.痛经
- C.丹毒
- D.呃逆
- E.便秘

答案：B

解析：此题暂无解析

471.(A1型题)委中穴的主治病证是

- A.滞产
- B.痛经
- C.丹毒
- D.呃逆
- E.便秘

答案：C

解析：◎次髎穴主治：①月经不调、痛经、带下等妇科病症；②小便不利；③遗精；④疝气；⑤腰骶痛，下肢痿痹。委中穴主治：①腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证；②腹痛，急性吐泻；③小便不利，遗尿；④丹毒。

472.(A1型题)下列腧穴中，常用于治疗呃逆的是

- A.睛明
- B.攒竹
- C.下关
- D.颊车
- E.印堂

答案：B

解析：此题暂无解析

473.(A1型题)下列有关睛明穴针刺操作的叙述，不正确的是

- A.遇到阻力时，可继续进针
- B.不捻转，不提插
- C.出针后按压针孔片刻
- D.针具宜细，消毒宜严
- E.禁灸

答案：A

解析：此题暂无解析

474.(A1型题)常用于治疗皮肤瘙痒等皮肤病证的腧穴是

- A.心俞
- B.肝俞
- C.脾俞
- D.肾俞
- E.膈俞

答案：E

解析：此题暂无解析

475.(A1型题)治疗急性吐泻有速效的腧穴是

- A.太溪
- B.委中
- C.承山
- D.内关
- E.昆仑

答案：B

解析：此题暂无解析

476.(A1型题)循行至头顶并入络脑的经脉是

- A.足厥阴肝经
- B.足太阳膀胱经
- C.手少阳三焦经
- D.足少阳胆经
- E.手太阳小肠经

答案：B

解析：此题暂无解析

477.(A1型题)下列经脉中，腧穴数最多的是

- A.督脉
- B.足太阳膀胱经
- C.足阳明胃经
- D.足少阳胆经
- E.手太阳小肠经

答案：B

解析：此题暂无解析

478.(A1型题)与腰阳关穴在同一水平线上的腧穴是

- A.脾俞
- B.大肠俞
- C.肝俞
- D.膈俞
- E.肾俞

答案：B

解析：此题暂无解析

479.(A1型题)通里穴位于前臂前区，尺侧腕屈肌腱桡侧缘，腕掌侧远端横纹上

- A.5寸
- B.4寸
- C.3寸
- D.2寸
- E.1寸

答案：E

解析：此题暂无解析

480.(A1型题)内关穴位于前臂前区，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间，腕掌侧远端横纹上

- A.5寸
- B.4寸
- C.3寸
- D.2寸

E.1 寸

答案：D

解析：此题暂无解析

481.(A1型题)善于治疗心痛、烦闷、口疮、口臭的腧穴是

- A.内关
- B.劳宫
- C.间使
- D.外关
- E.曲泽

答案：B

解析：此题暂无解析

482.(A1型题)善于治疗胃痛、呕血、呕吐、暑热病的腧穴是

- A.内关
- B.劳宫
- C.间使
- D.外关
- E.曲泽

答案：E

解析：此题暂无解析

483.(A1型题)用于治疗心痛、心悸、呕血、咯血、疔疮的腧穴是

- A.内关
- B.孔最
- C.间使
- D.外关
- E.郄门

答案：E

解析：此题暂无解析

484.(A1型题)在肘前区，肘横纹上，肱二头肌腱的尺侧缘凹陷中的腧穴是

- A.少海
- B.照海
- C.曲泽
- D.曲池
- E.尺泽

答案：C

解析：此题暂无解析

485.(A1型题)除心、心包、胸、神志病外，手厥阴经腧穴还可用于治疗的病证是

- A.胃病
- B.肾病
- C.肝病

D.胆病

E.脾病

答案：A

解析：此题暂无解析

486.(A1型题)下列不属于曲泽穴主治病证的是

A.心痛、善惊

B.胃痛、呕血

C.咳嗽、胸满

D.暑热病

E.肘臂挛痛

答案：C

解析：此题暂无解析

487.(A1型题)位于上腹部，脐中上4寸，前正中线上的腧穴是

A.关元

B.气海

C.膻中

D.中脘

E.中极

答案：D

解析：此题暂无解析

488.(A1型题)位于下腹部，脐中下4寸，前正中线上的腧穴是

A.关元

B.气海

C.膻中

D.中脘

E.中极

答案：E

解析：此题暂无解析

489.(A1型题)善于治疗形体羸瘦、脏气衰惫、乏力等气虚病证的腧穴是

A.阴陵泉

B.膻中

C.中极

D.气海

E.关元

答案：D

解析：此题暂无解析

490.(A1型题)善于治疗遗尿、小便不利、癃闭等泌尿系病证的腧穴是

A.阴陵泉

B.膻中

- C.中极
- D.气海
- E.关元

答案：C

解析：此题暂无解析

491.(A1型题)善于治疗气虚病证的腧穴是

- A.气海
- B.中极
- C.关元
- D.膻中
- E.肾俞

答案：A

解析：此题暂无解析

492.(A1型题)善于治疗阳虚病证的腧穴是

- A.气海
- B.中极
- C.关元
- D.膻中
- E.肾俞

答案：C

解析：此题暂无解析

493.(A1型题)气海穴的定位是在下腹部，前正中线上

- A.脐中下 0.5 寸
- B.脐中下 1 寸
- C.脐中下 1.5 寸
- D.脐中下 2 寸
- E.脐中下 2.5 寸

答案：C

解析：此题暂无解析

494.(A1型题)下列腧穴中，不属于任脉的是

- A.廉泉
- B.中极
- C.水沟
- D.承浆
- E.膻中

答案：C

解析：此题暂无解析

495.(A1型题)位于面部，颏唇沟的正中凹陷处的腧穴是

- A.承浆

- B.迎香
- C.廉泉
- D.地仓
- E.牵正

答案：A

解析：此题暂无解析

496.(A1型题)不属于神阙穴主治病证的是

- A.虚脱、中风脱证
- B.便秘、脱肛
- C.水肿、小便不利
- D.身体虚弱
- E.食谷不化

答案：E

解析：此题暂无解析

497.(A1型题)下列各组腧穴中，相距1寸的是

- A.中极、关元
- B.气海、关元
- C.气海、神阙
- D.列缺、太渊
- E.曲池、手三里

答案：A

解析：此题暂无解析

498.(A1型题)对横纹肌有良好的刺激收缩作用的是

- A.疏密波
- B.断续波
- C.锯齿波
- D.密波
- E.疏波

答案：B

解析：此题暂无解析

499.(A1型题)能促进气血循环，消除炎性水肿的是

- A.疏密波
- B.断续波
- C.锯齿波
- D.密波
- E.疏波

答案：A

解析：此题暂无解析

500.(A1型题)三棱针刺络法常取的腧穴是

- A. 十宣、井穴
- B. 曲泽、委中
- C. 肺俞、胃俞
- D. 合谷、太冲
- E. 列缺、照海

答案：B

解析：此题暂无解析

501.(A1型题)三棱针点刺法常取的腧穴是

- A. 十宣、井穴
- B. 曲泽、委中
- C. 肺俞、胃俞
- D. 合谷、太冲
- E. 列缺、照海

答案：A

解析：此题暂无解析

502.(A1型题)下列各项中，不属于三棱针操作方法的是

- A. 点刺法
- B. 散刺法
- C. 透刺法
- D. 刺络法
- E. 挑刺法

答案：C

解析：此题暂无解析

503.(A1型题)电针取穴应选用

- A. 身体左右两侧腧穴组成1对，选1~3对穴位为宜
- B. 身体左右两侧腧穴组成1对，选5~6对穴位为宜
- C. 身体同侧腧穴组成1对，选1~3对穴位为宜
- D. 身体同侧腧穴组成1对，选5~6对穴位为宜
- E. 根据病情选择腧穴，不拘左右，穴数不限

答案：C

解析：此题暂无解析

504.(A1型题)三棱针散刺法治疗的病证是

- A. 昏厥
- B. 中暑
- C. 发热
- D. 局限性顽癣
- E. 急性吐泻

答案：D

解析：此题暂无解析

505.(A2型题)患者微恶风寒，发热重，浊涕，痰稠或黄，咽喉肿痛，苔薄黄，脉浮数。治疗取大椎穴，宜采用的刺灸法是

- A.刺络拔罐法
- B.毫针捻转补法
- C.毫针提插补法
- D.毫针平补平泻法
- E.温针灸

答案：A

解析：此题暂无解析

506.(A2型题)患者腰部冷痛重着，拘挛不可俯仰，舌淡，苔白，脉紧，针灸治疗除阿是穴、大肠俞、委中外，还应选取

- A.膈俞、次髎
- B.命门、腰阳关
- C.肾俞、足三里
- D.肾俞、太溪
- E.悬钟、申脉

答案：B

解析：此题暂无解析

507.(A2型题)患者大便排出困难，腹中冷痛，面色白，畏寒喜暖，小便清长，舌淡苔白，脉沉迟。治疗除主穴外，还应加用

- A.合谷、内庭
- B.太冲、中脘
- C.脾俞、气海
- D.神阙、关元
- E.足三里、气海

答案：D

解析：此题暂无解析

508.(A2型题)患者胃脘疼痛，或隐痛或胀痛或刺痛，针灸治疗应取的腧穴是

- A.胃俞、脾俞、太冲
- B.期门、阳陵泉、中脘
- C.三阴交、膈俞、中脘
- D.足三里、内关、中脘
- E.合谷、太冲、中脘

答案：D

解析：此题暂无解析

509.(A1型题)遗尿肾气不足者，宜加用

- A.肾俞、命门、太溪
- B.行间、阳陵泉
- C.四神聪、列缺
- D.肺俞、气海、足三里

E.百会、命门、阴陵泉

答案：A

解析：此题暂无解析

510.(A1型题)针灸治疗气血虚弱痛经，宜加用

- A.太溪、肾俞
- B.阴陵泉、外关
- C.太冲、血海
- D.气海、脾俞
- E.关元、归来

答案：D

解析：此题暂无解析

511.(A1型题)针灸治疗肾气亏损痛经，宜加用

- A.太溪、肾俞
- B.阴陵泉、外关
- C.太冲、血海
- D.气海、脾俞
- E.关元、归来

答案：A

解析：此题暂无解析

512.(A1型题)漏肩风肩后部压痛明显者，应配用

- A.合谷
- B.足三里
- C.外关
- D.三阴交
- E.后溪

答案：E

解析：此题暂无解析

513.(A1型题)漏肩风肩外侧压痛明显者，应配用

- A.合谷
- B.足三里
- C.外关
- D.三阴交
- E.后溪

答案：C

解析：此题暂无解析

514.(A1型题)与漏肩风相关的经脉是

- A.手三阳、足太阳
- B.手三阴、手太阳
- C.手三阳、手太阴

D.手三阴、足少阳

E.手三阴、足阳明

答案：C

解析：此题暂无解析

515.(A1型题)治疗耳鸣的处方中，属于同名经配穴的是

A.翳风、中渚

B.听宫、中渚

C.行间、丘墟

D.中渚、侠溪

E.外关、合谷

答案：D

解析：此题暂无解析

516.(A1型题)治疗咽喉肿痛肺胃热盛者，应主选的是

A.中渚、风池

B.风池、外关

C.太渊、曲池

D.列缺、照海

E.内庭、鱼际

答案：E

解析：此题暂无解析

517.(A1型题)与上牙痛关系最密切的经脉是

A.手阳明大肠经

B.手太阳小肠经

C.足少阳胆经

D.足阳明胃经

E.手少阳三焦经

答案：D

解析：此题暂无解析

518.(A1型题)治疗耳鸣实证，应主选的是听会、翳风以及

A.合谷、风池

B.百会、风池

C.太溪、肾俞

D.中渚、侠溪

E.太冲、阳陵泉

答案：D

解析：此题暂无解析

519.(A1型题)治疗肾绞痛的主穴，除肾俞、关元外，还包括

A.膀胱俞、阴陵泉、委阳

B.膀胱俞、三阴交、阴陵泉

- C.三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D.三焦俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、阴陵泉、委中

答案：D

解析：此题暂无解析

520.(A1型题)治疗肾绞痛，主穴除肾俞、中极外，还包括

- A.膀胱俞、阴陵泉、委阳
- B.三焦俞、三阴交、委阳
- C.三焦俞、三阴交、阳陵泉
- D.膀胱俞、三阴交、阴陵泉
- E.三焦俞、阴陵泉、委中

答案：D

解析：此题暂无解析

521.(A1型题)有关针灸治疗胆道蛔虫症，叙述不正确的是

- A.治疗以足少阳经穴、胆的俞募穴为主
- B.毫针刺，用泻法
- C.可以选用针刺迎香透四白
- D.耳针治疗可取肝、胰胆、交感、神门、耳迷根等
- E.胆囊穴只用于治疗胆囊炎不用于治疗胆道蛔虫症

答案：E

解析：此题暂无解析

522.(A2型题)患者，男，65岁，突感上腹部剧烈疼痛，取硝酸甘油片含服，未能缓解。查体：脸色青白，血压 $80 / 60\text{mmHg}$ ( $10.67 / 7.98\text{kPa}$ )，除心率140次/分外，心肺听诊无异常，腹平软，无压痛、反跳痛，肠鸣音存在。应首先考虑的是

- A.胃痉挛
- B.胃穿孔
- C.急性胰腺炎
- D.心绞痛
- E.心肌梗死

答案：E

解析：■心绞痛及心肌梗死的疼痛多在胸骨后方和心前区或剑突下，可向左肩和左臂内侧放射，甚至达环指与小指，也可放射于左颈或面颊部，胸痛伴苍白、大汗、血压下降或休克多见于心肌梗死、夹层动脉瘤、主动脉窦瘤破裂和大块肺栓塞。因此根据题干患者是老年患者，有上腹部放射痛，低血压，服用硝酸甘油无效，故排除心绞痛，考虑心肌梗死，而胃痉挛是一过性，突发性疼痛，胃穿孔是持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹壁肌紧张或板样强直，急性胰腺炎是持续性疼痛，伴呕吐，呕吐后不缓解，向腰背放射，一般突发休克少见，故本题选E。

523.(A2型题)患者，男，24岁，近3年来反复餐后3小时上腹痛，持续至下次进餐后才缓解。

应首先考虑的是

- A.消化性溃疡
- B.胃癌

- C.慢性胃炎
- D.胃肠神经官能症
- E.胆囊炎

答案：A

解析：■消化性溃疡疼痛特点：长期性、周期性、节律性、疼痛部位（中上腹部，或在脐上方，或在脐上方偏右处），故本题选A。

524.(A2型题)某患者突发呼吸困难，吸气时胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，临床诊断可能是

- A.左心功能不全
- B.右心功能不全
- C.肺气肿
- D.气管异物
- E.大块肺梗塞

答案：D

解析：■吸气性呼吸困难：主要特点表现为吸气显著费力，严重者吸气时可见“三凹征”表现为胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷，此时亦可伴有干咳及高调吸气性喉鸣。三凹征的出现主要是由于呼吸肌极度用力，胸腔负压增加所致。常见于喉部、气管、大支气管的狭窄与阻塞。而鼻翼扇动，发绀明显是呼吸困难的表现之一，呼吸加深加快提示中毒性呼吸困难代谢性酸中毒可导致这样的表现，肺气肿是呼气性呼吸困难，大块肺梗塞是混合性呼吸困难，主要特点表现为吸气期及呼气期均感呼吸费力，呼吸频率增，快、深度变浅，左，右心功能不全是心源性呼吸困难，故本题选D。

525.(B型题)头痛病因中属颅内疾病的是

- A.偏头痛
- B.三叉神经痛
- C.神经衰弱
- D.癔症
- E.中暑

答案：A

解析：此题暂无解析

526.(B型题)骨髓增生明显活跃时，成熟红细胞与有核细胞的比值是

- A.1:1
- B.10:1
- C.20:1
- D.50:1
- E.200:1

答案：B

解析：此题暂无解析

527.(B型题)骨髓增生减低时，成熟红细胞与有核细胞的比值是

- A.1:1
- B.10:1

C.20:1

D.50:1

E.200:1

答案：D

解析：此题暂无解析

528.(A2型题)一甲亢患者，甲状腺肿大不明显，但食欲亢进、消瘦、血糖增高，医师忽视了甲状腺功能亢进的有关检查，最容易被误诊为

A.结核病

B.糖尿病

C.恶性肿瘤

D.败血症

E.吸收不良综合征

答案：B

解析：此题暂无解析

529.(A1型题)属病因诊断的是

A.心房颤动

B.心慌气短

C.下肢浮肿

D.二尖瓣狭窄

E.风湿性心脏病

答案：E

解析：此题暂无解析

530.(B型题)属病理解剖诊断的是

A.心房颤动

B.心慌气短

C.下肢浮肿

D.二尖瓣狭窄

E.风湿性心脏病

答案：D

解析：此题暂无解析

531.(B型题)属病理生理诊断的是

A.心房颤动

B.心慌气短

C.下肢浮肿

D.二尖瓣狭窄

E.风湿性心脏病

答案：A

解析：此题暂无解析

532.(B型题)寒战、咳嗽、咯血痰及肺实变体征的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案：A

解析：此题暂无解析

533.(B型题)肝颈静脉回流征阳性，颈静脉怒张的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案：E

解析：此题暂无解析

534.(B型题)慢性咳嗽、咯脓性痰、痰中带血的疾病是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.肝硬化
- C.慢性肾小球肾炎
- D.支气管扩张
- E.右心功能不全

答案：D

解析：此题暂无解析

535.(B型题)在诊断中排在第一位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案：A

解析：此题暂无解析

536.(B型题)在诊断中排在第二位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案：D

解析：此题暂无解析

537.(B型题)在诊断中排在第三位的应是

- A.主要疾病
- B.曾患过的疾病
- C.家族主要成员所患的疾病
- D.并发症
- E.伴发病

答案：E

解析：此题暂无解析

538.(B型题)病人住院期间的全部病情经过应记录在

- A.会诊记录
- B.入院记录
- C.病程记录
- D.出院记录
- E.死亡记录

答案：C

解析：此题暂无解析

539.(B型题)内容同住院病历，但重点更突出、更简要的是

- A.会诊记录
- B.入院记录
- C.病程记录
- D.出院记录
- E.死亡记录

答案：B

解析：此题暂无解析

540.(B型题)查体发现胸骨左缘第3、4肋间听到屏气后仍存在的摩擦音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

答案：C

解析：此题暂无解析

541.(B型题)查体发现心尖部听到隆隆样舒张中晚期杂音的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

答案：E

解析：此题暂无解析

542.(B型题)查体发现周围血管征的是

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.纤维蛋白性心包炎
- D.左侧胸膜炎
- E.二尖瓣狭窄

答案：B

解析：此题暂无解析

543.(A1型题)二尖瓣狭窄时的最主要的临床表现是

- A.二尖瓣面容
- B.心脏呈"梨形"
- C.二尖瓣区收缩期杂音
- D.心尖区隆隆样舒张中晚期杂音
- E.肺动脉区第二心音增强

答案：D

解析：此题暂无解析

544.(A1型题)属病因诊断的是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.寒战、高热
- C.呼吸衰竭
- D.病变在右肺上叶
- E.肺实变

答案：A

解析：此题暂无解析

545.(A1型题)肝颈静脉回流征阳性主要见于

- A.左心衰
- B.肝硬化
- C.心包积液
- D.急性心肌梗死
- E.肾功能不全

答案：C

解析：此题暂无解析

546.(A1型题)下列除哪项外，均是采录“既往史”所要求的内容

- A.过去健康情况
- B.预防接种情况
- C.传染病史
- D.过敏史
- E.是否到过传染病的流行地区

答案：E

解析：◎既往史包括患者既往的健康状况和过去曾患过的疾病（包括各种传染病）、外伤手术、预防注射、过敏。而 E 项是个人史中的一部分。

547.(A1 型题)下列除哪项外，均是采录“主诉”所要求的内容

- A. 主诉是迫使病人就医的最主要的症状
- B. 一般不超过 20 个字
- C. 确切的主诉常可作为诊断的向导
- D. 主诉的记录，尽量使用诊断术语
- E. 症状不突出者，可把就医的主要目的作为主诉

答案：D

解析：◎主诉是患者就医的最明显的症状或体征及持续时间，故尽可能地要求用患者自己的语言，不用医生的诊断术语。

548.(A1 型题)现病史是指

- A. 主要症状的特点
- B. 病人就诊的主要原因
- C. 疾病的原因与诱因
- D. 疾病诊治经过
- E. 该次得病的全部情况

答案：E

解析：◎现病史是病史中最重要的部分，包括现在所患疾病的最初症状、自开始到就诊时的全过程，即发生、发展、演变和诊治经过。A、C、D 项均为现病史的内容之一，不能代表现病史。而 B 项是主诉，只有 E 能完整代表现病史。

549.(B 型题)对结核杆菌和麻风杆菌作用强的药物是

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 阿米卡星
- D. 利福平
- E. 庆大霉素

答案：D

解析：此题暂无解析

550.(B 型题)对结核杆菌有高度选择性的药物是

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 阿米卡星
- D. 利福平
- E. 庆大霉素

答案：A

解析：此题暂无解析

551.(B 型题)易透过血脑屏障的药物是

- A. 异烟肼

- B.链霉素
- C.阿米卡星
- D.司帕沙星
- E.庆大霉素

答案：A

解析：此题暂无解析

552.(B型题)对结核杆菌有高度选择性的药物是

- A.异烟肼
- B.链霉素
- C.阿米卡星
- D.司帕沙星
- E.庆大霉素

答案：A

解析：◎异烟肼易透过血脑屏障，对结核杆菌有高度选择性，为抗结核病的首选药之一。

553.(A1型题)下列不是一线抗结核病的药物是

- A.利福平
- B.链霉素
- C.异烟肼
- D.乙胺丁醇
- E.氨基水杨酸

答案：E

解析：此题暂无解析

554.(A1型题)可引起视神经炎的药物是

- A.利福平
- B.链霉素
- C.异烟肼
- D.氯霉素
- E.乙胺丁醇

答案：E

解析：此题暂无解析

555.(A1型题)应用异烟肼时常并用维生素B6的目的是

- A.增强治疗
- B.减轻肝损害
- C.延缓抗药性
- D.防治周围神经炎
- E.减轻肾损害

答案：D

解析：此题暂无解析

556.(A1型题)有关异烟肼抗结核作用的叙述错误是

- A.对结核杆菌有高度选择性
- B.结核杆菌易产生耐药性
- C.穿透力强，易进入细胞内
- D.有杀菌作用
- E.能抑制结核杆菌蛋白质合成

答案：E

解析：此题暂无解析

557.(A1型题)利福平抗结核作用的特点是

- A.选择性高
- B.穿透力强
- C.耐药性缓慢
- D.毒性反应大
- E.对麻风杆菌无效

答案：B

解析：◎利福平的抗菌作用:①广谱抗菌，穿透力强。②对结核杆菌、麻风杆菌有强大抗菌作用。③沙眼衣原体和某些病毒也有抑制作用。④结核杆菌易产生耐药性，所以不宜单用。⑤抗菌作用机制是阻碍 mRNA 合成。

558.(A1型题)异烟肼与利福平合用治疗结核病，应定期检查

- A.心电图
- B.肾功能
- C.肝功能
- D.血象
- E.以上均非

答案：C

解析：◎异烟肼和利福平均有肝损伤作用，故联合使用时需要定期复查肝功能。

559.(A1型题)应用异烟肼抗结核，合用维生素 B 的目的是

- A.增强疗效
- B.延缓耐药性的产生
- C.延长异烟肼的作用时间
- D.减轻神经系统不良反应
- E.预防过敏反应

答案：D

解析：◎异烟肼的不良反应主要为:神经系统毒性——周围神经炎继发于维生素 B6 缺乏，多见于营养不良及慢乙酰化型患者，表现为手、脚震颤及麻木，同服维生素 B6 可治疗及预防此反应。

560.(A1型题)乙胺丁醇的主要不良反应是

- A.结晶尿
- B.球后视神经炎
- C.周围神经炎
- D.肝脏损害

E.耳毒性

答案: B

解析: ◎乙胺丁醇的不良反应有:视神经损伤、末梢神经炎、过敏反应和胃肠道反应。其中主要的且严重的不良反应为:视神经损伤。

561.(A1型题)应用异烟肼抗结核,合用维生素B的目的是

- A.增强疗效
- B.延缓耐药性的产生
- C.延长异烟肼的作用时间
- D.减轻神经系统不良反应
- E.预防过敏反应.

答案: D

解析: ■异烟肼的不良反应主要为:神经系统毒性——周围神经炎系继发于维生素B6缺乏,多见于营养不良及慢乙酰化型患者,表现为手、脚震颤、麻木,同服维生素B6可治疗及预防此反应。故本题选D。

562.(A1型题)抗恶性肿瘤药最常见的严重不良反应是

- A.视力损伤
- B.神经毒性
- C.皮肤损害
- D.变态反应
- E.骨髓毒性

答案: E

解析: 此题暂无解析

563.(A1型题)环磷酰胺对何种肿瘤疗效最显著

- A.卵巢癌
- B.急性淋巴细胞性白血病
- C.肺癌
- D.多发性骨髓瘤
- E.恶性淋巴瘤

答案: E

解析: 此题暂无解析

564.(A1型题)在体外没有抗癌作用的抗癌药物是

- A.阿糖胞苷
- B.阿霉素
- C.环磷酰胺
- D.卡莫司汀
- E.长春碱

答案: C

解析: 此题暂无解析

565.(A1型题)经代谢转变后,能抑制脱氧胸苷酸合成酶,干扰核算代谢的药物是

- A.门冬酰胺酶
- B.长春新碱
- C.长春碱
- D.氟尿嘧啶
- E.巯嘌呤

答案：D

解析：此题暂无解析

566.(B型题)上述描述，属显性感染的是

- A.病原体进入机体后，被非特异性免疫所清除
- B.病原体侵入机体后，仅引起特异性免疫应答，不出现任何临床表现
- C.病原体侵入机体后，既引起特异性免疫，又出现相应临床表现
- D.病原体侵入机体后，寄生于机体某些部位，被机体免疫功能局限化，机体免疫功能下降时，可引起相应的临床表现
- E.病原体侵入机体后，不引起相应的临床表现，但机体能排出病原体

答案：C

解析：◎A项病原体被清除；B项隐性感染；C:显性感染；D项潜伏感染；E项病原携带状态。

567.(B型题)感染过程中最常见的表现是

- A.病原体被清除
- B.隐性感染
- C.潜伏性感染
- D.病原体携带状态
- E.显性感染

答案：B

解析：◎显性感染为临幊上出现某一传染病所特有的综合征，感染过程的表现最易被识别。隐性感染只能通过免疫学检查才能发现，在感染过程中最常见。

568.(B型题)流行性出血热的传染源主要是

- A.病犬
- B.家猪
- C.鼠
- D.患者
- E.病禽

答案：C

解析：此题暂无解析

569.(B型题)蜘蛛痣、肝掌多见于哪型肝炎

- A.急性黄疸型
- B.急性无黄疸型
- C.急性重型
- D.慢性迁延性
- E.慢性活动性

答案：E

解析：此题暂无解析

570.(B型题)乙型脑炎主要经

- A.虫媒传播
- B.接触传播
- C.母婴传播
- D.消化道传播
- E.呼吸道传播

答案：A

解析：此题暂无解析

571.(B型题)可携带 HIV 通过血-脑屏障的细胞是

- A.CD 4 +T 细胞
- B.单核-吞噬细胞
- C.神经胶质细胞
- D.骨髓干细胞
- E.中性粒细胞

答案：B

解析：此题暂无解析

572.(B型题)乙肝病毒属

- A.杯状病毒
- B.嗜肝 DNA 病毒
- C.缺陷病毒
- D.黄病毒
- E.微小 RNA 病毒

答案：B

解析：此题暂无解析

573.(B型题)以人道主义精神关心爱护患者的医学道德品质是

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚实
- D.公正
- E.奉献

答案：A

解析：此题暂无解析

574.(B型题)对待患者一视同仁，在医疗资源分配等问题上公平公正的医学道德品质是

- A.仁爱
- B.严谨
- C.诚实
- D.公正
- E.奉献

答案: D

解析: 此题暂无解析

575.(B型题)医学人道主义的核心内容中不包括

- A. 尊重患者的生命
- B. 尊重患者的人格
- C. 尊重患者平等的医疗与健康权利
- D. 注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E. 患者的法律地位

答案: E

解析: 此题暂无解析

576.(B型题)医学人道主义的根本思想是

- A. 尊重患者的生命
- B. 尊重患者的人格
- C. 尊重患者平等的医疗与健康权利
- D. 注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E. 患者的法律地位

答案: A

解析: 此题暂无解析

577.(B型题)医学人道主义的核心内容中不包括的是

- A. 尊重病人的生命
- B. 尊重病人的人格与尊严
- C. 尊重病人平等的医疗与健康权利
- D. 注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E. 病人的法律地位

答案: E

解析: 此题暂无解析

578.(B型题)医学人道主义的根本思想是

- A. 尊重病人的生命
- B. 尊重病人的人格与尊严
- C. 尊重病人平等的医疗与健康权利
- D. 注重对社会利益及人类健康利益的维护
- E. 病人的法律地位

答案: A

解析: 此题暂无解析

579.(A1型题)医院以医学人道主义精神服务于人类社会，主要表现为

- A. 经济效益
- B. 社会效益
- C. 功利并重
- D. 功利主义

E.优化效益

答案：B

解析：此题暂无解析

580.(A1型题)不属于医德品质内容的是

A.仁爱

B.严谨

C.诚挚

D.公正

E.幸福

答案：E

解析：此题暂无解析

581.(A1型题)医德品质的内容中哪项是不正确的

A.仁慈

B.严谨

C.诚挚

D.公正

E.幸福

答案：E

解析：此题暂无解析

582.(A1型题)生命神圣论的积极意义不包括

A.对人的生命的尊重

B.推行医学人道主义，反对非人道的医疗行为

C.反对不平等的医疗制度

D.合理公正的分配卫生资源

E.实行一视同仁的医德规范

答案：D

解析：此题暂无解析

583.(A1型题)医学道义论要求医生

A.从医学自身规律和治疗疾病的内在要求出发，尽到一切医者应尽的职责

B.尽到法律法规所要求的职责

C.从良心出发尽职尽责

D.从规则出发尽职尽责

E.重视行为的后果

答案：A

解析：此题暂无解析

584.(A1型题)判断生命价值的依据是

A.内在价值

B.外在价值

C.生命质量

- D.健康程度
  - E.内在价值与外在价值的统一
- 答案：E  
解析：此题暂无解析

- 585.(A1型题)功利论是指
- A.关于责任、应当的理论
  - B.以人们行为的效果作为道德价值基础
  - C.考虑个别主体利益需求
  - D.主张医护人员遵守既定的原则规范
  - E.以人们的动机为道德价值基础
- 答案：B  
解析：此题暂无解析

- 586.(A1型题)生命质量的衡量标准不包括
- A.个体生命健康程度
  - B.个体生命德才素质
  - C.个体生命优化条件
  - D.个体生命治愈希望
  - E.个体生命预期寿命
- 答案：C  
解析：此题暂无解析

- 587.(A1型题)生命价值论指的是
- A.生命神圣与人道论的统一
  - B.生命神圣与生命质量的统一
  - C.美德论与义务论的统一
  - D.生命质量与生命价值论的统一
  - E.义务论与公益论的统一
- 答案：B  
解析：此题暂无解析

- 588.(A1型题)医学人道主义的核心内容不包括
- A.尊重患者的生命
  - B.尊重患者的义务
  - C.尊重患者的生命价值
  - D.尊重患者的人格
  - E.尊重患者的权利
- 答案：B  
解析：此题暂无解析

- 589.(A1型题)美德是以下几方面的和谐统一，其中不包括
- A.高尚的思想
  - B.品德

C.情操与语言

D.良心

E.行为

答案：D

解析：此题暂无解析

590.(A1型题)医学人道主义在历史发展时期中不包括

A.古代朴素的医学人道主义时期

B.现代革命的人道主义时期

C.实行革命的人道主义时期

D.近代医学人道主义时期

E.现代医学人道主义时期

答案：B

解析：此题暂无解析

591.(A1型题)医学伦理学具体原则中不包括的是

A.公益性原则

B.尊重的原则

C.不伤害的原则

D.自主的原则

E.公正的原则

答案：D

解析：此题暂无解析

592.(A1型题)不属于道义论在医学伦理中的局限性的是

A.忽视了动机

B.忽视了医学行为自身价值和后果

C.忽视了医学道德责任

D.忽视了对患者尽义务与对他人和社会尽义务

E.难以回答在现代医疗条件下产生的复杂问题

答案：A

解析：此题暂无解析

593.(A1型题)对不伤害原则的解释，正确的是

A.不伤害原则就是消除任何医疗伤害

B.不伤害原则就是要求医生对患者丝毫不伤害

C.因绝大多数医疗行为都存在着不同程度的伤害，所以不伤害原则是做不到的

D.不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡，把可控伤害控制在最低限度之内

E.对肿瘤患者进行化疗意味着绝对伤害

答案：D

解析：◎不伤害原则的解释:不伤害原则要求对医学行为进行受益与伤害的权衡,把可控伤害控制在最低限度之内。

594.(A1型题)患者的权利中不包括

- A.经济免责权
- B.平等医疗权
- C.疾病认知权
- D.法律诉讼权
- E.知情同意权

答案：A

解析：◎的权利包括基本医疗权、疾病认知权、知情同意权、保护隐私权、监督医疗权、免除一定的社会责任权、要求赔偿权。而经济免责权不属于上述范畴。

595.(A1型题)尊重患者知情同意权，其正确的做法是

- A.婴幼患儿可以由监护人决定其诊疗方案
- B.家属无承诺，即使患者本人知情同意也不得给予手术
- C.对特殊急诊患者的抢救都同样对待
- D.无须做到患者完全知情
- E.只经患者同意即可手术

答案：A

解析：◎知情同意权的主体一是成年患者本人。具有完全民事行为能力的患者，应是知情同意权的主体；二是法定代理人。对于未成年人患者，知情同意权的主体是其父母；对于精神病患者、神志不明的患者，知情同意权的主体是配偶、父母、成年子女和其他近亲属等。

596.(A1型题)生命神圣论的积极意义不包括的是

- A.对人的生命的尊重
- B.推行医学人道主义反对非人道的医疗行为
- C.反对不平等的医疗制度
- D.合理公正地分配卫生资源
- E.实行一视同仁的医德规范

答案：D

解析：◎生命神圣论是医学伦理学的基础理论，是强调人的生命神圣不可侵犯和具有至高无上的道德价值的一种伦理观念。而合理公正地分配卫生资源不属于生命神圣论的意义。

597.(A1型题)法律渊源是指法的各种具体表现形式，也叫

- A.法律形式
- B.法律责任
- C.立法权
- D.法律规范
- E.法定标准

答案：A

解析：此题暂无解析

598.(A1型题)我国卫生法律体系的内容是指

- A.地方卫生法规、规章
- B.卫生行政法规
- C.卫生法律
- D.《宪法》和基本法律

E.上述全部法律部门有机组成

答案：E

解析：此题暂无解析

599.(A1型题)我国卫生法基本原则不包括的内容是

- A.保护公民身体健康
- B.祖国传统医学与现代医学相结合
- C.预防为主
- D.兼顾经济与社会效益
- E.卫生工作社会化

答案：D

解析：●卫生法的基本原则主要有六个方面:1 保护公民身体健康原则；2 祖国传统医药学与现代医药学相结合原则；3 预防为主原则；4 国家卫生监督原则；5 卫生工作要动员全社会参加原则；6 卫生工作社会化原则。

600.(A1型题)卫生法中基本特征显示，随着社会的发展，在世界各国卫生立法中的共识是关注

- A.卫生标准
- B.技术规范
- C.社会公众利益
- D.卫生人员行为
- E.加强卫生管理

答案：C

解析：此题暂无解析