

37. 2006年1月9日在我国生效的是
 38. 2009年2月28日颁布的国务院第九号令是
答案：35.C, 36.B, 37.B, 38.A

(39~42题共用备选答案)

- A. 角色扮演
 - B. 小组讨论
 - C. 案例分析
 - D. 头脑风暴
 - E. 深入访谈
39. 能激发学员积极思考、创造性思维的方法是
 40. 主要用于改变培训者态度和技能的方法是
 41. 适合敏感问题评估的方法是
 42. 用于培训决策能力和分析问题、解决问题

的综合能力的方法是

答案：39.D, 40.A, 41.E, 42.C

(43~46题共用备选答案)

- A. 亲近与隔离
 - B. 前有悬崖，后有追兵
 - C. 鱼和熊掌都想要
 - D. 吸烟还是戒烟
 - E. 固着
43. 属于双趋式冲突的是
 44. 属于趋避式冲突的是
 45. 属于双避式冲突的是
 46. 属于双重趋避冲突的是

答案：43.C, 44.A, 45.B, 46.D

(王丽敏)

第七章 社会医学

一、以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。

A1型题

1. 关于社会医学学科性质描述正确的是
 A. 是社会学和生物医学之间的交叉学科
 B. 是社会学和管理学之间的交叉学科
 C. 是自然科学和生物医学之间的交叉学科
 D. 是自然科学和管理学之间的交叉学科
 E. 是管理学和生物医学之间的交叉学科
答案：A

解析：社会医学是从社会的角度出发，运用社会学的研究方法和成就来研究医学的健康问题，故而学科性质是社会学和生物医学之间交叉的一门学科。

2. 对健康描述最恰当的是
 A. 身体没有疾病就是健康
 B. 健康具有绝对性
 C. 包括躯体健康、心理健康和社会适应能力三方面
 D. 实验室检查结果在正常值范围之内
 E. 通过购买卫生服务可以改善的一种状态
答案：C

3. 1848年，第一次提出社会医学概念的人是
 A. 希波克拉底
 B. 马尔萨斯
 C. 法国医生盖林
 D. 法国医生格罗蒂扬
 E. 魏尔啸
答案：C
4. 在德国柏林大学开设社会卫生学讲座，首次提出健康、疾病与社会的相互关系的人是
 A. 希波克拉底
 B. 马尔萨斯
 C. 法国医生盖林
 D. 法国医生格罗蒂扬
 E. 魏尔啸
答案：D
5. 关于医学模式的本质，下列描述最正确的是
 A. 医学实践的总结
 B. 对疾病的总结
 C. 医学理论研究的发展
 D. 临床医学实践的发展
 E. 卫生管理、卫生发展战略研究的发展

答案: A

6.“保护健康就是保护机器,疾病就是机器失灵”的观点属于以下哪种医学模式的观点

- A. 神灵主义
- B. 自然哲学
- C. 机械论
- D. 生物
- E. 生物-心理-社会

答案: C

解析: 实验科学时代注重的是“用试验的方法研究自然”,在其思想影响下以及欧洲工业革命带来的机械学和物理学的进步,使得医学的研究从自然哲学转向了实验科学时代,诞生了机械论的医学模式。这个时期典型的代表著作有迪卡尔的《动物是机器》、拉美特利的《人是机器》,其观点认为人就是机器,保护健康就是保护机器,疾病就是机器出现故障和失灵,需要医生对其修补,忽视了人类生命机体的生物复杂性和社会复杂性,对人体的观察局限在片面性和机械性。

7. 预防接种、杀菌灭虫和抗生素的应用,有效地控制了急性传染病和寄生虫病,令人类取得了第一次卫生革命的胜利,这要归功于下列哪种医学模式的建立

- A. 神灵主义
- B. 自然哲学
- C. 机械论
- D. 生物

E. 生物-心理-社会

答案: D

8. 以下哪种医学模式的观点主要集中在两个理论上即二元论和还原论

- A. 神灵主义
- B. 自然哲学
- C. 机械论
- D. 生物
- E. 生物-心理-社会

答案: D

解析: 生物医学模式的观点主要集中在两个理论上即二元论和还原论;最典型的代表理论就是“流行病学三角模式”,其观点认为健康就要维持宿主、环境和病原体三者之间的动态平衡,病因是微生物,宿主是动物或人,环境局限于自然环境。其成就的典范主要体现在临幊上克服了手术的疼痛、感染和失血三大难关;疾病预防领域上,采用杀菌灭虫、预防接种和抗菌药物三个主要武器,取得了人类第一次卫生革命

的伟大胜利。其缺点主要表现在忽视了人的社会性、复杂的心理活动及主体意识,把人从社会的群体环境中孤立起来。

9. 在现代医学模式的影响下,使得卫生服务发生了扩大,这主要表现在

- A. 从预防服务扩大到治疗服务
- B. 从心理服务扩大到生理服务
- C. 从医院内服务扩大到医院外服务
- D. 从社会服务扩大到医院内服务
- E. 从照顾服务扩大到技术服务

答案: C

解析: 现代医学模式下,卫生服务出现了四个扩大:一是从治疗服务扩大到预防服务;二是从生理服务扩大到心理服务;三是从医院内服务扩大到医院外服务;四是从技术服务扩大到照顾服务。

10. 下列哪项不是促使生物-心理-社会医学模式产生的动因

- A. 疾病谱和死因谱的转变
- B. 人民健康需求的增加
- C. 医学科学与相关学科的发展与相互渗透
- D. 健康影响因素的多元化
- E. 现代医疗技术的发展

答案: E

解析: 促使现代医学模式产生的原因有四大背景:一是医学发展的社会化趋势;二是疾病谱和死因谱的转变;三是健康需求的普遍提高;四是医学科学与相关学科的发展与相互渗透。

11. 在生物-心理-社会医学模式下,认为影响人类的健康因素不包括

- A. 生物遗传因素
- B. 社会经济因素
- C. 生活方式及行为因素
- D. 医疗卫生服务因素
- E. 原生环境

答案: E

解析: 现代医学模式下,影响人类健康的因素有四类,分别是生物遗传因素、环境因素、生活方式及行为因素和医疗卫生服务因素。

12. 现代医学模式下的健康观认为健康是

- A. 生物健康
- B. 心理健康
- C. 社会健康
- D. 生物-心理-社会三维健康
- E. 躯体健康

答案: D

13. 一种社会因素可以直接作用于健康,也可以为其他社会因素的中介,或以其他社会因素为中介作用于健康,这是社会因素作用于健康的下列哪个特点

- A. 作用的广泛性
- B. 持久性
- C. 积累性
- D. 交互作用
- E. 作用的发散性

答案: D

解析: 社会因素影响人类的健康基本规律和特点主要表现在四个方面:一是泛影响性,主要是指社会因素的广泛存在、对人体危害作用的发散性等;二是恒常性,是指一种社会因素一旦形成对健康的影响,在一定期间内是稳定的,而且很难消除掉的;三是积累性,社会因素对健康的影响不是一次接触就能起到决定性作用的,往往需要很长时间的应答累积和功能损害累加或健康效应累加;四是交互作用,是指一种社会因素可以直接作用于健康,也可以为其他社会因素的中介,或以其他社会因素为中介作用于健康。

14. 社会经济发展对健康产生的负面作用不包括

- A. 环境的污染和破坏
- B. 大量化合物进入人类生活
- C. 社会压力突出
- D. 人口数量的增加
- E. 社会流动人口的增加

答案: D

15. 关于经济发展与健康的关系,下列表述不正确的是

- A. 社会经济的发展是提高人群健康水平的根本保证
- B. 人群健康与经济发展是相互促进的双向作用
- C. 社会经济发展是促进人群健康水平提

- 高的唯一重要的因素
- D. 社会经济发展在促进人类健康水平提高的同时,也带来了新的健康问题
- E. 社会经济的发展可明显改善人们的生活水平和生活质量

答案: C

解析: 社会经济发展水平与健康之间的关系,既有积极的作用,也有消极的作用,反过来健康水平的提高又能促进社会的经济发展;积极的作用主要体现在经济的发展带来居民收入的增加,营养状况、居住环境的改善,卫生投入的增加等;负面影响主要表现在环境的污染和破坏,大量的化学合成物进入人类生活、不良行为和心理压力突出,社会负性事件增加以及社会流动人口增加等。

16. 衡量和分析人体摄入的食物中各种营养素比例是否合理主要是通过

- A. 摄入总热量
- B. 粮食生产政策
- C. 食物的营养结构
- D. 生活习惯
- E. 食物消费

答案: C

解析: 评价居民营养状况包括居民摄入热量和食物的营养结构,居民摄入热量是衡量人群摄入的食物是否能维持基本生命功能;食物的营养结构是分析摄入食物中各种营养素比例的合理性。

17. 社会制度影响健康的途径不包括

- A. 通过分配制度
- B. 通过对卫生政策的决定作用
- C. 规范人的行为
- D. 伦理道德
- E. 社会规范

答案: D

18. 关于人口与健康关系的描述不正确的是

- A. 人口数量的增加,只会加重社会的负担
- B. 人口流动给居民健康带来有利的影响
- C. 人口年龄结构的变化,带来的一个重大的人口问题就是人口老龄化问题
- D. 性别比例失衡是滋生社会问题的根源之一
- E. 人口流动带来一些特殊的卫生问题,给

医疗卫生工作提出了新的要求

答案: A

19. 下列哪项是人口发展对健康带来的积极作用

- A. 保持一定的人口数量是社会发展的前提
- B. 人口数量的持续不断的增加
- C. 男性人口数所占的比重越来越高
- D. 人群的平均年龄增大
- E. 老年人口越来越多

答案: A

20. 一个国家的 60 岁及以上人口数达到总人口数的多少时,即可认为该国家是老龄化国家

- A. 7%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%
- E. 17%

答案: B

解析: 老龄化是指一个国家或地区的 60 岁及以上人口达到总人口的 10% 或 65 岁及以上达到总人口的 7% 时,即可认为该国家为老龄化国家。

21. 某一地区 2008 年总人口 2 万人,其中男性人口 1.2 万人,那么该地区总人口的性别比为

- A. 0.4
- B. 0.6
- C. 0.67
- D. 1.07
- E. 1.5

答案: E

解析: 性别比是指人口中男性人口数与女性人口数的比值。

22. 社会文化影响健康的途径不包括

- A. 教育
- B. 风俗习惯
- C. 宗教信仰
- D. 亚文化
- E. 生产力水平

答案: E

23. 下列关于文化因素与健康关系的描述不正确的是

- A. 风俗习惯对健康只会产生不利影响
- B. 教育通过培养人的文化素质来指导人的生活方式,进而影响健康

C. 宗教对健康的影响具有双面性

- D. 风俗习惯对人们健康的影响非常广泛
- E. 教育属于一种规范化文化,对人群健康有着重要的影响

答案: A

24. 社会医学研究最常用的研究方法是

- A. 调查研究
- B. 实验研究
- C. 卫生服务研究
- D. 生命质量评价
- E. 健康危险因素评价

答案: A

解析: 社会医学研究方法主要有调查研究、实验研究、健康状况评价、卫生服务研究、生命质量评价和健康危险因素评价,其最常用、应用最多的是调查研究。

25. 关于卫生服务的需求和利用研究属于

- A. 调查研究
- B. 实验研究
- C. 文献研究
- D. 健康危险因素评价
- E. 卫生服务研究

答案: E

26. 对社区人群生活方式的干预研究属于

- A. 调查研究
- B. 实验研究
- C. 生命质量评价
- D. 健康危险因素评价
- E. 卫生服务研究

答案: B

27. 关于定量研究与定性研究方法的区别,以下说法正确的是

- A. 定性研究需要的样本量一般要比定量研究的大
- B. 定性研究以客观为主,定量研究以主观为主
- C. 定性研究常用于理论构建,而定量研究常用于理论检验
- D. 定性研究偏于统计分析,定量研究倚重于描述分析
- E. 定性研究属于演绎分析,定量研究属于归纳分析

答案: C

解析:本题主要是要求掌握定量研究和定性研究的特点。定量研究的重点是获得研究现象的数量指标,常用概率的抽样方法进行统计分析,在较短的时间内完成,其结果可以外推到总体,常用于理论检验;而定性研究主要是描述研究事物的特点和规律,注重事物的过程而不是结果,对收集的资料进行总结和归纳分析,常用非概率的抽样方法,需要研究者与研究对象保持较长时期的接触,其结果只能代表研究对象的观点,一般不能外推,主要用于提出研究假说。

28. 定性研究方法常用于

- A. 推断事物的总体特征
- B. 研究事物的结果
- C. 快速评估
- D. 检验问卷的信度与效度
- E. 样本量较大时

答案: C

解析:定性研究方法的应用主要有四个方面:一是辅助定性研究设计和提出研究假说;二是协助分析和解释定量研究出现矛盾结果的原因;三是与定量研究相结合,可以揭示事物的现状、内在本质和规律;四是作为快速评估技术,为其他研究提供信息。

29. 下列关于定量研究叙述不正确的是

- A. 定量研究的重点是获得数量指标
- B. 常用的定量研究即问卷调查
- C. 定量研究常采用概率抽样方法抽取研究对象
- D. 定量研究通常在较短时间内完成,与研究对象的接触时间比较短
- E. 定量研究的结果一般不能外推

答案: E

30. 社会调查研究的基本程序正确的是

- A. 提出研究问题-设计研究方案-收集资料-分析资料与解释结果-研究结果的应用
- B. 提出研究问题-收集资料-设计研究方案-分析资料与解释结果-研究结果的应用
- C. 设计研究方案-提出研究问题-收集资料-分析资料与解释结果-研究结果的

应用

- D. 设计研究方案-收集资料-提出研究问题-分析资料与解释结果-研究结果的应用
- E. 收集资料-提出研究问题-设计研究方案-分析资料与解释结果-研究结果的应用

答案: A

解析:社会医学研究的基本程序主要有5个步骤,首先提出研究的问题,然后设计研究方案,根据研究方案收集相关资料,对收集到的资料进行分析并解释结果,最后将研究结果进行反馈与应用。

31. 社会调查研究首先要提出研究的问题,那么问题的提出不包括下列哪个原则

- A. 需要性原则
- B. 创新性原则
- C. 科学性原则
- D. 可行性原则
- E. 方便性原则

答案: E

解析:社会调查研究在提出研究问题的过程中,需要遵循需要性原则、创新性原则、科学性原则,同时还要考虑研究问题的可行性。

32. 进行预调查最常用的抽样方法是

- A. 单纯随机抽样
- B. 系统抽样
- C. 分层抽样
- D. 整群抽样
- E. 方便抽样

答案: E

解析:抽样方法有概率抽样和非概率抽样;概率抽样常用于定量研究,其主要方法有单纯随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样和多阶段抽样;非概率抽样方法常用于定性研究和预调查,其主要方法包括方便抽样、立意抽样、雪球抽样、偶遇抽样和定额抽样等。预调查的目的在于检验调查表是否设计得当,并不用于数据分析,一般采用最简单、最容易实现的非概率抽样方法。

33. 构成调查问卷的主体部分是

- A. 封面信
- B. 指导语
- C. 问题与答案
- D. 编码与登记
- E. 问卷封底

答案: C

解析: 调查问卷一般由封面信、指导语、问题和答案、编码与登记四部分构成,封面信是告知被调查者本次调查的目的、意义、内容及调查者的身份等;指导语是问卷填写的说明,告知被调查者如何回答问题、对问题中的一些概念或专业名词作出易懂的解释;问题和答案是问卷的灵魂和主体部分;编码和登记是为了将问题和答案转换成计算机可以识别的数码,以便于后期的数据统计分析,既可在调查前进行编码,亦可在调查后进行编码。

34. 对调查问卷设计的步骤描述不正确的是

- A. 明确研究目的并将其分解为一系列可测量的指标
- B. 建立问题库
- C. 从问题库中筛选合适的条目设计成问卷
- D. 对设计的问卷进行试用和修改
- E. 不需要进行效度和信度的检验

答案: E

解析: 问卷设计的步骤包括明确研究目的、建立问题库、设计问卷初稿、试用和修改、进行信度和效度检验 5 个步骤。

35. 调查问卷设计的过程当中,对于问题的设计需要注意的是

- A. 一个问题可以包括两个以上的问题
- B. 常用中性问题来提问
- C. 不能出现抽象的问题
- D. 不能出现敏感的问题
- E. 尽量使用一些俗语

答案: B

解析: 本知识点主要是要求掌握问题的设计常见的错误及注意事项,以避免在设计问题时出现。常见的错误一般有双重装填(一个问题包括两个及以上的问题)、诱导性的提问(常用中性问题来提问)、用词含糊不清、抽象问题和敏感问题过多(抽象、敏感问题尽量少用)。

36. 测量结果与试图要达到的目标之间的接近程度常用以下哪项指标来测量

- A. 复测信度
- B. 复本信度
- C. 折半信度
- D. 效度系数
- E. 信度系数

答案: D

解析: 本知识点要求掌握信度和效度的检验。信度是指所得结果的可靠程度,常用信度系数来评价,方法有复测信度、复本信度、折半信度;效度是指测量结果与试图要达到的目标之间的接近程度,常用效度系数来评价,主要包括表面效度、内容效度、结构效度、准则效度。

37. 关于参与性观察的特点,描述最恰当的是

- A. 结果可以重复
- B. 结果可以外推
- C. 能够翔实准确地获得第一手资料
- D. 需要的时间短
- E. 结果不受主观因素影响

答案: C

解析: 本题主要的目的是检验对参与性观察特点的掌握程度。参与性观察首先属于定性研究方法,一般是观察者深入到所观察的社区及人群中,通过仔细体验和观察获得第一手资料,其结果一般是定性的,难以量化、外推和重复调查,而且需要的时间也较长,且对调查者有很高的要求。

38. 对个别深入访谈描述正确的是

- A. 属于结构式访谈
- B. 灵活性较小
- C. 对访谈员要求不高
- D. 结果可以外推
- E. 一般只能在小样本人群中进行

答案: E

解析: 个别深入访谈是一种定性研究方法,研究者与被研究者面对面的进行交谈获得第一手资料的研究方法,其具有较高的灵活性,可用于研究个人隐私或敏感的问题,要求调查员具有高度熟练的访谈技巧和受过专门培训,记录和分析非常耗时,一般只能在小样本中进行,其结果亦不能外推。

39. 关于专题小组访谈,描述正确的是

- A. 是一种定量研究的方法
- B. 需要的时间长、费用高
- C. 用于快速需求评估
- D. 适合讨论非常敏感的问题
- E. 不需要主持人

答案: C

解析:专题小组讨论是通过召集一小组(一般6~12人)同类人员,对某一研究主题在主持人的协调下展开讨论的一种定性研究方法。常用于快速需求评估、解释定量研究结果、帮助研究设计、评估项目开展情况等;优点是省时省费,可以获得对某事物具有一定深度和广度的看法,缺点是不适合讨论敏感的问题。

40. 某地2008年年中人口数为20万人,年末人口数为22万人,出生率为25‰,该年总死亡人数为4400人,该地的人口自然增长率为
 A. 2‰ B. 3‰ C. 5‰
 D. 10‰ E. 15‰

答案:B

解析:首先要明确人口自然增长率的计算方法,其计算公式为人口的粗出生率减去粗死亡率,人口的粗出生率为每千人口中出生的活产婴儿数,粗死亡率为每千人口中死亡的人口数;分母每千人口常用两种计算方法,一个是在年初人口数与年末人口数之和除以2,另一个是用年中人口数。

41. 下列哪个指标是反映医疗服务需要的指标
 A. 两周患者未就诊率
 B. 两周患病率
 C. 每千人口拥有医生数
 D. 产前检查覆盖率
 E. 人均住院天数

答案:B

解析:反映居民医疗服务需要的指标主要由疾病的频率和严重程度两类指标组成,疾病的频率的指标主要有两周患病率、慢性病患病率等;疾病的严重程度的主要指标有两周卧床率、休工休学率、两周患病天数等。

42. 下列哪个指标是反映医疗服务利用的指标
 A. 两周患者未就诊率
 B. 两周患病率
 C. 每千人口拥有医生数
 D. 两周休工率
 E. 慢性病患病率

答案:A

解析:反映居民医疗服务利用的指标主要

由门诊服务利用、住院服务利用和预防保健服务利用三类指标组成。门诊服务利用指标主要有两周患者就诊率和未就诊率、两周就诊率;住院服务利用常用的指标有住院率和未住院率、人均住院天数;预防保健服务利用常用的指标有产前检查覆盖率、产后访视率、住院分娩率、儿童计划免疫接种率等。

43. 反映人群健康状况最重要、最敏感的指标是
 A. 粗死亡率 B. 婴儿死亡率
 C. 平均期望寿命 D. 两周患病率
 E. 5岁以下儿童死亡率

答案:B

44. 已知一个地区某年未满周岁的婴儿死亡数和该年的活产数,则能计算
 A. 婴儿死亡率
 B. 1岁以下人口死亡率
 C. 0~1岁人口死亡率
 D. 新生儿死亡率
 E. 粗死亡率

答案:A

45. 评价一个国家和地区的人群健康状况,下列哪个指标可以进行直接比较
 A. 出生率
 B. 死亡率
 C. 平均期望寿命
 D. 两周患病率
 E. 5岁以下儿童死亡率

答案:C

46. 计算平均期望寿命的主要依据是
 A. 出生人口数 B. 年龄别死亡率
 C. 总人口数 D. 粗死亡率
 E. 年龄组人口数

答案:B

47. 新生儿低体重是指新生儿出生时体重低于
 A. 1800g B. 2200g C. 2500g
 D. 2800g E. 3000g

答案:C

48. 评价人群健康常用的综合指标是

- A. 婴儿死亡率
- B. 5岁以下儿童死亡率
- C. 发病率
- D. 生活质量指数
- E. 平均期望寿命

答案: D

解析: 评价人群健康状况常用的综合指标有生活质量指数、美国社会健康学会指标、人类发展指数等。

49. 生活质量指数(PQLI)的计算不需要的指标是

- A. 婴儿死亡率
- B. 1岁平均期望寿命
- C. 国民生产总值
- D. 婴儿死亡指数
- E. 成人识字率

答案: C

解析: 生活质量指数也称为人口质量指数,是从健康和文化教育两方面反映人口质量的综合指标。它由三项指标构成,一是识字率指数,二是婴儿死亡指数,三是1岁平均寿命指数。其计算公式为 $PQLI = (\text{识字率指数} + \text{婴儿死亡指数} + 1\text{岁平均寿命指数})/3$; 识字率指数即为成人识字率; 婴儿死亡指数: $(229\% - \text{婴儿死亡率})/2.22$; 1岁平均寿命指数: $(1\text{岁平均寿命} - 38)/0.39$ 。

50. 下列哪项不是构成美国社会健康学会指标的要素

- A. 就业率
- B. 识字率
- C. 平均期望寿命
- D. 婴儿死亡率
- E. 粗死亡率

答案: E

解析: 美国健康学社会指标(ASHA)是评价一个国家或地区健康状况常用的综合指标,其计算公式为: $ASHA = (\text{就业率} \times \text{识字率} \times \text{平均寿命}/70 \times GNP \text{ 增长率}) / (\text{总出生率} \times \text{婴儿死亡率})$ 。

51. 健康危险因素的特点不包括

- A. 潜伏期长
- B. 特异性弱
- C. 联合作用明显
- D. 广泛存在
- E. 针对性强

答案: E

解析: 健康危险因素(health risk)是指能使疾病或死亡发生的可能性增加的因素,或者是能使健康不良后果发生概率增加的因素。包括环境危险因素、行为危险因素、生物遗传危险因素和医疗服务危险因素。其具有潜伏期长、特异性弱、联合作用明显、广泛存在的特点。

52. 健康危险因素评价是研究危险因素与以下哪种疾病发病率及死亡率之间数量依存关系及其规律性的一种技术

- A. 慢性病
- B. 传染病
- C. 地方病
- D. 常见病
- E. 多发病

答案: A

解析: 本题主要是要求掌握健康危险因素评价(health risk factors appraisal, HRA)的概念,HRA是研究危险因素与慢性病发病及死亡之间数量依存关系及其规律性的一种技术方法。它研究人们在各种危险因素的环境中发生死亡的概率,以及通过改变生产和生活环境,改变人们不良的行为生活方式,降低危险因素的作用,可能延长寿命的程度。

53. 健康危险因素评价的最关键步骤是

- A. 收集年龄别疾病死亡资料
- B. 收集个人的健康危险因素
- C. 将危险因素转化为危险分数
- D. 计算存在的死亡危险
- E. 计算评价年龄

答案: C

解析: 健康危险因素评价的步骤包括收集疾病、死亡资料,将危险因素转化为危险分数,计算组合危险分数,计算存在死亡危险,计算评价年龄,计算增长年龄,计算危险降低程度;其关键步骤是将个人的危险因素如何转化为危险分数。

54. 健康相关生命质量(HRQOL)具有

- A. 文化依赖性
- B. 经济依赖性
- C. 客观独立性
- D. 自然性
- E. 社会性

答案: A

解析: HRQOL是指在疾病、意外损伤及医

疗干预的影响下,测定与个人生活事件相联系的主观健康状态和个体满意度。健康状态和主观满意度构成了其主要内容,更多的是采用自我评价,常用的指标是主观指标,建立的基础是在个体的一定的文化价值体系下,故具有文化依赖性。

55. 健康相关生活质量评价的内容不包括

- A. 躯体健康
- B. 情绪反应
- C. 生活爱好
- D. 社会功能
- E. 主观满意度

答案: C

解析:健康相关生活质量的评价内容主要有四个方面。一是生理状态,包括活动受限、角色受限和体力适度;二是心理状态,包括情绪反应和认知功能;三是社会功能状态,包括社会交往和社会支持;四是主观判断和满意度,包括自身健康的判断、满意度与幸福感。

56. 目前国际上普遍认可的适用于普通人群生命质量测量的量表是

- A. 良好适应状态指数 QWB
- B. 疾病影响量表 SIP
- C. 世界卫生组织生存质量测定量表WHOQOL
- D. 36 条目简明健康量表 SF-36
- E. 欧洲生存质量测定量表 EQ-5D

答案: D

57. 目前生活质量评价常用的测量工具不包括

- A. 健康调查量表 SF-36
- B. 艾克森人格量表
- C. 疾病影响量表
- D. 世界卫生组织生存质量测定量表 WHOQOL-100
- E. 健康良好状态指数

答案: B

58. 生活质量评价应用的领域中不包括

- A. 人群健康状况的评定
- B. 疾病负担的评估
- C. 临床治疗方案的选择
- D. 卫生投资的效益评价
- E. 卫生资源状况

答案: E

59. 对社区卫生服务描述最恰当的是

- A. 以二级、三级卫生机构为主体的基层卫生服务
- B. 以个人为单位的基层卫生服务
- C. 以临床专科医生为骨干的基层卫生服务
- D. 以预防为主、需求为导向的基层卫生服务
- E. 以医疗为中心的基层卫生服务

答案: D

解析:社区卫生服务 (community health services, CHS) 是社区服务中一种最基本的、普遍的服务,是由全科医生(general practitioner, GP)为主的卫生组织或机构所从事的一种社区定向的卫生服务。是在政府主导、社会参与及上级卫生机构指导下,以基层卫生机构为主体、全科医师为骨干,合理使用卫生资源和适宜技术,以人的健康为中心、以家庭为单位、以社区为范围、以需求为导向,以妇女、儿童、老年人、慢性病病人、残疾人、低收入居民为重点,以解决社区主要卫生问题,满足基本医疗卫生服务需求为目的,融预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术服务等为一体的,有效的、经济的、方便的、综合的、连续的基层卫生服务。

60. 对社区卫生服务的对象描述最恰当的是

- A. 社区内的妇幼人群
- B. 社区内的残疾人口
- C. 社区内的老年人
- D. 社区内的贫困人口
- E. 社区内的所有人群

答案: E

61. 以下哪项不是社区卫生服务具有的特点

- A. 以预防为主的服务
- B. 以生物医学模式为指导
- C. 综合协调性服务
- D. 可及性服务
- E. 以家庭为单位的服务

答案: B

解析:社区卫生服务以现代医学模式为指导、以家庭为单位、以社区为基础、以预防为导

向,采用团队合作的工作方式,综合、持续、协调、可及的一种基层医疗服务。

62. 我国发展城市社区卫生服务,将社区卫生服务机构列为定点医疗机构,要求首诊在社区,实行逐级转诊制度,这是体现了社区卫生服务的哪种特点

- A. 综合性服务
- B. 可持续性服务
- C. 可及性服务
- D. 基层医疗服务
- E. 家庭为单位的服务

答案: D

解析:首诊在社区、实行逐级转诊,体现了全科医生守门人的角色,将居民常见的健康问题在社区内得到解决,主要体现了社区卫生服务是一种基层医疗服务的特点。

63. 对社区诊断描述正确的是

- A. 个体水平上的疾病判断
- B. 依据的是症状、体征和实验室检查结果
- C. 理论基础是临床专业知识
- D. 通常采用的是流行病学方法
- E. 是一种在疾病发生后的诊断

答案: D

解析:社区诊断是指依据社区医学的基本理论,运用社区医学的调查和分析方法,对社区存在或潜在的公共卫生问题、人群健康水平及影响人群健康的因素所做出的判断。

64. 下列哪项不是社区诊断的基本内容

- A. 确定社区的主要卫生问题
- B. 确定社区的主要危险因素
- C. 找出社区的高危人群
- D. 了解社区资源
- E. 社区卫生人才的培养

答案: E

解析:社区诊断的主要内容有三方面,一是确定主要卫生问题,二是确定高危人群,三是确定主要危险因素;同时,还要了解社区环境支持、卫生资源和服务的提供与利用情况,为社区卫生服务计划的制订提供科学依据。

65.《阿拉木图宣言》提出了2000年人人享有健

康,而下列哪项是实现这一全球策略目标的重要手段,得到了全体世界卫生组织成员国的认可

- A. 社区卫生服务
- B. 初级卫生保健
- C. 合作医疗
- D. 国际合作
- E. 消除贫困

答案: B

66. 为了实现21世纪人人享有卫生保健,世界卫生组织建议的行动纲领中不包括

- A. 与贫困作斗争
- B. 在所有的环境中促进健康
- C. 部门协调
- D. 将卫生列入可持续发展规划
- E. 加快建立市场经济的卫生服务体系

答案: E

67. 下列哪项不是初级卫生保健的基本任务

- A. 消除贫困
- B. 促进健康
- C. 预防
- D. 治疗
- E. 康复

答案: A

解析:初级卫生保健是一种基本的卫生保健,它依靠切实可行、学术上可靠又为社会所接受的方式和技术,是社区的个人与家庭通过积极参与,普遍能够享受的费用是社区或国家在发展的各个时期本着自力更生及自决精神能够负担得起的。基本任务包括促进健康、预防、治疗和康复四个方面,而消除贫困是实现初级卫生保健的基本策略。

68. 21世纪人人享有卫生保健的总体目标之一是

- A. 基本药物的供应
- B. 合理营养和安全饮用水的保障
- C. 传染病的预防接种
- D. 改善健康的公平程度
- E. 保护精神健康

答案: D

解析:21世纪人人享有卫生保健的总体目标有三个:一是增加期望寿命的同时提高生活质量,二是改善健康的公平性,三是可持续发展的卫生系统。

69. 对中国目前存在的卫生问题,描述最恰当的是

- A. 传染性疾病已成为居民的主要死因
- B. 慢性病患病率已得到有效控制
- C. 城乡居民健康状况之间差异不明显
- D. 城市卫生资源过剩,农村卫生资源缺乏
- E. 卫生法律体系健全

答案: D

解析: 中国目前存在的主要卫生问题有慢性非传染性疾病已成为居民的主要死因,旧的传染病未去新的又来,健康状况和卫生服务存在着明显的地区差异,卫生资源配置不合理,卫生体制不合理,卫生法律体系有待完善等。

70. 下列哪项是新时期中国的卫生工作方针
- A. 城乡并重
 - B. 医疗为主
 - C. 西医为重点
 - D. 依靠卫生部门
 - E. 全社会参与

答案: E

解析: 本题主要是要求掌握新时期的中国卫生工作方针,即以农村为重点、预防为主、中西医并重、依靠科技和教育、动员全社会参与。

71. 规范文化影响人类健康的主要途径是
- A. 影响人类的生活环境
 - B. 影响人类的劳动条件
 - C. 提高卫生资源的使用效率
 - D. 支配人类的行为生活方式
 - E. 干扰人们的心理过程

答案: D

72. Holmes 对生活事件的定量研究中显示,若一年内经历的生活事件为 150LCU,则
- A. 来年生病的可能性达 70%
 - B. 身心疾病的发生可能性达 50%
 - C. 抑郁症的发病率增加
 - D. 社会适应能力降低
 - E. 未来一年基本健康

答案: E

73. C型行为模式属于危险行为中的
- A. 不良生活方式
 - B. 致病行为模式
 - C. 不良疾病行为
 - D. 违反法律行为
 - E. 违反社会道德行为

答案: B

74. 有关调查统计,离异家庭中孩子抑郁症的患病率比同龄孩子高出 8 倍,这说明
- A. 家庭功能失调对健康有影响
 - B. 家庭环境对健康有影响
 - C. 有些疾病发病机制与家庭有关系
 - D. 家庭结构破坏对健康有影响
 - E. 家庭关系不良对健康有影响

答案: D

75. 按照观察法研究中研究者所处的位置和充当的角色,可以将观察分为
- A. 实验观察和实地观察
 - B. 局外观察和参与观察
 - C. 主观观察和客观观察
 - D. 结构式观察和无结构观察
 - E. 自然观察和非自然观察

答案: B

76. 从调查问卷中的问题类型上看包括
- A. 特征问题、价值观问题、行为问题
 - B. 特征问题、态度问题、价值观问题
 - C. 特征问题、态度问题、行为问题
 - D. 特征问题、道德观问题、行为问题
 - E. 特征问题、道德观问题、价值观问题

答案: C

77. 开放式问卷的优点是
- A. 答案标准化,便于资料的整理分析
 - B. 适用于答案较多、较复杂的问题
 - C. 适用于文化程度较低的应答者
 - D. 有助于提高问卷的回收率
 - E. 可以得到丰富资料,反映应答者深层次看法

答案: E

78. 生命质量评价是指具有一定生命数量的人在某一时间点上表现的状态,它主要强调
- A. 生存时间的长度
 - B. 疾病的严重程度
 - C. 慢性病发生的可能性
 - D. 生理健康程度
 - E. 个人对生活的感受和体验

答案: E

79. 下列哪项不是社区诊断的步骤
 A. 确定所需要的信息
 B. 收集信息
 C. 分析信息
 D. 社区诊断报告
 E. 社区综合防治策略与措施

答案: E

80. 以下哪项不是初级卫生保健的基本原则
 A. 成本-效益 B. 社会公正
 C. 促进健康 D. 社区参与
 E. 部门间协作行动

答案: C

81. 21世纪人人享有卫生保健的总体目标
不包括
 A. 增加期望寿命
 B. 提高生活质量
 C. 在国家内部和国家之间改善健康的公平程度
 D. 卫生系统可持续发展,保证人民利用这一系统所提供的服务
 E. 健康促进

答案: E

解析: 21世纪人人享有卫生保健的总体目标主要包括三部分,一是增加期望寿命的同时提高生活质量;二是在国家内部和国家之间改善健康的公平程度;三是创建可持续发展的卫生系统,并保证人民利用这一系统所提供的服务。

二、以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

B型题

(1~3题共用备选答案)

- A. 研究社会卫生状况
 B. 研究影响人群健康的因素
 C. 研究疾病的发病机制
 D. 研究社会卫生策略
 E. 研究疾病的治疗措施
 1. 社会医学研究的“社会诊断”是指
 2. 社会医学研究的“社会病因分析”是指
 3. 社会医学研究的“社会处方”是指

答案: 1. A, 2. B, 3. D

解析: 本知识点主要是掌握社会医学研究的内容,社会医学的研究内容是从群体的角度出发,其主要有三方面:一是社会健康问题的诊断,即研究社会卫生状况,主要是人群健康状况;二是社会病因的分析,即研究影响人群健康的因素,特别是社会因素;三是社会处方的制定,即研究社会卫生策略与措施。

(4~6题共用备选答案)

- A. 感知觉系统
 B. 循环系统
 C. 神经-内分泌-免疫调节网络
 D. 运动系统

E. 中枢神经系统

4. 社会因素作用的门户是
 5. 社会因素的中介是
 6. 社会因素作用的控制器是

答案: 4. A, 5. C, 6. E

解析: 本知识点主要是要求掌握社会因素影响健康的机制。社会因素被人的感知觉系统纳入,以神经-内分泌-免疫系统为中介,经过中枢神经系统的调节和控制,形成心理感受,产生心理反应及行为,即社会心理因素致病模式。

(7~9题共用备选答案)

- A. 躯体性应激源
 B. 心理性应激源
 C. 社会性应激源
 D. 文化性应激源
 E. 生理性应激源
 7. 能力不足与过高期望的矛盾属于
 8. 生活和工作的变化属于
 9. 强烈的噪声属于

答案: 7. B, 8. C, 9. A

解析: 应激源可分为4类:

(1) 躯体性应激源,是指对机体直接作用的刺激物,包括各种理化和生物刺激物。如高温、低温、强烈的噪声、损伤和疾病等。

(2) 心理性应激源,包括人际关系的冲突、个体的强烈需求、能力不足与过高期望的矛盾等。

(3) 社会性应激源,概括为两大类:①客观的社会学指标,指经济、职业、婚姻、年龄、受教育水平等差异;②社会变动性与社会地位的不合适,包括上述社会学指标的变迁、个人的社会交往、生活和工作变化、重大的社会经济变动等。

(4) 文化性应激源,指因语言、风俗习惯、生活方式、宗教信仰等改变造成的刺激或情景。

(10~11题共用备选答案)

A. 明确研究目的

B. 建立问题库

C. 设计问卷初稿

D. 试用和修改

E. 信度与效度的检验

10. 头脑风暴法用于

11. 主观评价法用于

答案: 10. B, 11. D

(12~13题共用备选答案)

A. 特异性

B. 稳定性

C. 真实性

D. 可信性

E. 敏感性

12. 问卷的效度反映了调查的

13. 问卷的信度反映了调查的

答案: 12. B, 13. C

(14~15题共用备选答案)

A. 33.3%

B. 40%

C. 42%

D. 66.7%

E. 72.4%

某地 2008 年年末总人口为 10 万人,15 岁以下人口数为 3 万人,60 岁及以上人口数为 1.2 万人

14. 人口负担系数是

15. 老少比是

答案: 14. E, 15. B

解析: 人口负担系数又称抚养比,是指非劳

动人口数与劳动人口数之间的比值,非劳动人口是指 15 岁以下人口和 60 岁及以上人口,劳动人口是指 15 岁及以上人口和 60 岁以下人口;老少比又称老龄化指数,是指 60 岁及以上人口数与 15 岁以下人口数之比。

(16~18 题共用备选答案)

A. 健康型

B. 自创性危险因素型

C. 难以改变的危险因素型

D. 一般性危险因素型

E. 遗传性危险因素型

16. 评价年龄 53.5 岁,实际年龄 51 岁,增长年龄 46 岁,这种类型属于

17. 评价年龄 53.5 岁,实际年龄 57 岁,增长年龄 53 岁,这种类型属于

18. 评价年龄 57 岁,实际年龄 53 岁,增长年龄 56 岁,这种类型属于

答案: 16. B, 17. A, 18. C

解析: 本知识点主要是要求掌握健康危险因素评价的应用,根据实际年龄、评价年龄和增长年龄三者之间不同的量值,将评价结果可以区分为四种类型:健康型:评价年龄小于实际年龄;自创性危险因素型:评价年龄大于实际年龄,并且评价年龄与增长年龄的差值大;难以改变的危险因素型:评价年龄大于实际年龄,但是评价年龄与增长年龄之差较小,在 1 岁以内;一般性危险型:评价年龄接近实际年龄,死亡水平相当于当地的平均水平。

(19~20 题共用备选答案)

A. 地理上可及

B. 价格上可及

C. 关系上可及

D. 服务上可及

E. 结果上可及

19. 要求居民步行 15 分钟就有一个社区卫生服务机构,体现的是社区卫生服务的哪个特点

20. 社区卫生服务机构的工作人员最好就来源于本社区或生活在本社区,体现的是社区卫生服务的哪个特点

答案: 19. A, 20. C

(高立军)