# 近8年临床笔试重复考点98条汇总

## 近8年重复考点

- 1.关于新生儿硬肿症,错误的是:多发生在夏季。
- 2.符合萎缩的描述正确的是: 萎缩器官实质细胞数减少或体积缩小。
- 3.子宫峡部的特点是:上端为解剖学内口,下端为组织学内口。
- 4.手术后的体位以下哪项是错误的:臂部手术后需取半卧位
- 5.关于休克型肺炎的治疗,下列哪项是不正确的: 慎用糖皮质激素。
- 6.婴幼儿每日维生素 D 的需要量为: 400~800IU.
- 7.早期妊娠最常见的临床表现:停经。
- 8.原发性肝癌最常见的主要体征是: 肝不规则肿大。
- 9.神经系统实现其调节功能的基本方式是:条件反射与非条件反射。
- 10.关于 DNA 的二级结构 (双螺旋结构) 正确的是: 两条反向的多核苷酸链。
- 11.右心功能不全的体征不包括: 心尖部舒张期奔马律。
- 12.产生药物副作用是由于: 药物作用的选择性低。
- 13.肝昏迷病人前驱期 (I期) 最早的临床表现是: 性格改变。
- 14.关于小儿静脉补钾浓度, 哪项正确: 0.1% 0.3%.
- 15.弥漫性血管内凝血,下列哪项实验室检查不正确: 血小板计数正常。
- 16.血胸的治疗下列哪项是错误的: **机化性血胸一般应在伤后 3 个月以后行手术** 治疗。
- 17.构成医疗事故的要件之一是:过失。
- 18.以下哪项不是肾小管性蛋白尿的常见病:肾小球肾炎。

#### 近 6 年重复试题

- 19.产后心脏负担最重的时期是:产后72小时。
- 20.关于标准差,下面哪个说法是正确的:标准差必定大于或等于零。
- 21.急性心梗的常见先兆症状是:心绞痛。
- 22.新生儿缺氧缺血性脑病的主要原因是: 围产期窒息。
- 23.引起垂体前叶功能减退的最常见原因是:产前产后大出血。
- 24.下列哪项是骨折的晚期并发症:创伤性关节炎。
- 25.与血栓形成关系密切的疾病是: 冠状动脉粥样硬化。

#### 近 5 年重复试题

- 26.关于上尿路结石治疗中不正确的是: **结石直径大于 0. 100px, 均不能采取非 手术治疗**。
- 27.人体内 02 , CO2 进出细胞膜是通过: 单纯扩散。
- 28.脑出血最常见的部位是:内囊。
- 29.施行麻醉前的禁食时间: 12 小时。
- 30.关于系统红斑狼疮,错误的是:过敏性疾病。
- 31.心力衰竭细胞是指肺淤血: 肺泡内吞噬含铁血黄素巨噬细胞。
- 32.心功能分级是根据:对体力活动的耐受性。
- 33.下列哪项不是成分血制品:右旋糖酐。
- 34.关于胸腔漏出液的描述,下列不正确的是:粘蛋白定性试验阳性。
- 35.下列关于血液组成的叙述,错误的是:与抗凝剂混匀的血液待血细胞沉降后,

## 上面的液体部分称为血清。

#### 近 4 年重复试题

- 36.早期发现直肠癌最重要的检查方法是:直肠指检。
- 37.关于化生下列不正确的是: 机化属于间质性化生。
- 38.干酪样坏死是一种特殊的凝固性坏死。
- 39.血管玻璃样变性常见于:良性高血压病的细动脉。
- 40.微血栓的主要成分是:纤维素。
- 41.淤血常见的原因中没有:动脉栓塞。
- 42.炎症渗出病变错误的是: 所有渗出的白细胞都具有吞噬作用。
- 43.急性炎症局部组织变红的主要原因是:血管扩张,血流加快。
- 44.不是恶性肿瘤:畸胎瘤。
- 45.高血压心脏病的病变特征: 左心室向心性肥大。
- 46.执业医师法适用于: 计划生育技术服务机构的医师。
- 47. 医师出生接产后,医疗机构可以出具的证明文件是:出生证明书。
- 48.医疗机构施行特殊检查时: 征得患者同意,并取得其家属或关系人同意及签

#### 字后实施。

- 49.慢性支气管炎最主要的病因是:长期吸烟。
- 50.诊断慢支急性发作伴细菌感染主要依据是: 痰量较多呈脓性。
- 51.我国引起肺心病最常见的病因:慢性阻塞性肺疾病。
- 52.导致哮喘反复发作的重要原因:气道高反应。
- 53.医院内获得性肺炎,最常见的致病菌是: 革兰阴性杆菌。
- 54.不能做支气管造影:病变较重累及双侧肺

- 55.细胞内结核无效的杀菌药是: 乙胺丁醇。
- 56. || 型呼吸衰竭时氧疗吸 02 浓度: 25%~34%.57.关于咳嗽描述正确的是: 支

气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间被动体位时加重,并有咳痰。

# 近 3 年重复试题

- 58.直接引起心脏容量负荷加重的疾病为: 主动脉瓣关闭不全。
- 59.冠心病的危险因素,除了: Hb 异常。
- 60.可引起低血钾的药物是: 呋塞米, 别名: 速尿。
- 61.动脉粥样硬化病变最常见累及哪一支冠状动脉: 左冠状动脉前降支。
- 62.急性心肌梗死最常见的心律失常是:室性期前收缩。
- 63.震颤常见于:动脉导管未闭。
- 64.二尖瓣狭窄最严重的并发症是: 急性肺水肿。
- 65.最容易引起心绞痛的是: 主动脉狭窄。
- 66.亚急性感染性心内膜炎的发病机制中不包括哪一项:血液高凝状态。
- 67.扩张型心肌病的临床表现错误的是:**发病年龄大多数为老年人。68.心包压塞**体征中不包括:心包摩擦音。
- 69.以下哪类心律失常,心律规则,心室率正常:心房扑动伴4:1房室传导。
- 70.有关心包摩擦音正确的是:胸骨左侧 3~4 肋间最响。
- 71.上消化道出血不正确的是: 急性大出血时血象检查为早期诊断和病情观察的依据。
- 72.判断慢性胃炎是否属于活动性的病理依据是:粘膜中有无中性粒细胞浸润。
- 73.胃溃疡多见于胃角和胃窦。

- 74.回盲部是肠结核好发的部位。
- 75.对结核性腹膜炎最具有诊断价值的是:腹腔镜检查。
- 76. X 线钡检呈跳跃征象 (Stier linsing) 提示为: **肠结核**
- 77.急性腹痛发病一周后,对胰腺炎有诊断价值是:血清脂肪酶。
- 78.诱发肝性脑病除外的是: 多次灌肠或导泻。
- 79.肝硬化最可靠的证据: 肝穿刺活检示假小叶形成。
- 80.贫血根据病因可分为:红细胞生成减少,红细胞破坏过多,失血三类。
- 81.红细胞增多常见于:严重慢性肺心病。
- 82.急粒与急淋的鉴别要点是: 前者原始细胞 POX 染色阳性。
- 83.对白血病化疗不正确的是: VP 方案中: P 指柔红霉素。
- 84.各种蛋白质平均含氮量约为: 16%.
- 85.关于 DNA 二级结构,描述错误的是: 碱基配对是 A 与 U, G 与 C.
- 86.下列关于酶的论述中错误的是:酶能催化化学上不可能进行的反应。
- 87. VitD3 活性形式是: 1.25 (OH) 2D3.
- 88.含金属钴的维生素是: VitB12.
- 89.糖酵解途径的关键酶是:磷酸果糖激酶。
- 90.在糖酵解和糖异生中均有作用的酶是:磷酶丙糖异构酶。
- 91.呼吸链中的递氢体是:辅酶 Q.92.属于必需脂肪酸的是;亚油酸。
- 93.载脂蛋白生理功能的叙述,错误的是:转运游离脂肪酸。
- 94.贫血概念是指单位容积外周血液中: HB、WBC、MCA 低于正常。
- 95.不属于甲亢临床表现的有: 月经过多。
- 96.卵巢肿瘤并发症哪项是错误的: 卵巢肿瘤嵌顿。

97.认识活动的最基本的心理过程是:感觉。

98.新斯的明最强的作用: 兴奋骨骼肌。

## ▼关注金英杰医考官方公众号

▼免费领取更多临床医考资料

