

2 卷中医助理第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 关于中医学的学科属性，以下哪项更准确
 - A. 科学
 - B. 哲学
 - C. 医学科学
 - D. 自然科学
 - E. 自然哲学
2. 中医学整体观念的内涵是
 - A. 人体是一个有机整体
 - B. 人和自然界是一个整体
 - C. 人和社会是一个整体
 - D. 五脏与六腑是一个整体
 - E. 人体是一个有机整体，人和环境相互统一
3. 人体是一个有机整体，其“中心”是
 - A. 脑
 - B. 六腑
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 奇恒之腑
4. 《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是
 - A. 恒动观念.
 - B. 辨证论治
 - C. 形神一体观
 - D. 整体观念
 - E. 辨证观念
5. 《素问·金匱真言论》所说“善病风疟”的季节是
 - A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
6. 采取异病同治方法的原因是
 - A. 疾病不同
 - B. 症状相同
 - C. 证候相同
 - D. 阶段不同
 - E. 体征不同

7. 构成人体的本原物质是

- A. 天气
- B. 清气
- C. 阳气
- D. 阴气
- E. 精气

8. 气的概念源于

- A. 阴阳说
- B. 水地说
- C. 五行说
- D. 云气说
- E. 元气说

9. 病人表现为得神提示的是

- A. 痰迷心窍，或痰火扰心，精神失常
- B. 精气充足，体健神旺
- C. 精气大伤，机能衰减，或邪气亢盛，功能障碍
- D. 精气不足，机能减退
- E. 精气衰竭，阴不敛阳，虚阳外越

10. 神气不足的表现是

- A. 形体羸瘦
- B. 精神不振
- C. 两目晦暗
- D. 面色无华
- E. 动作艰难

11. 区别假神与病情好转的最主要依据是

- A. 突然神识清醒，目光转亮
- B. 局部症状好转与整体病情恶化不相符合
- C. 欲进饮食，想见亲人
- D. 面色无华，两额泛红如妆
- E. 言语不休，语声清亮

12. 病人表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常属于

- A. 狂病
- B. 脏躁
- C. 痫病
- D. 惊风
- E. 癫病

13. 病人狂躁妄动，胡言乱语，少寐多梦，打人毁物，不避亲疏属

- A. 狂病
- B. 脏躁
- C. 痫病
- D. 惊风
- E. 癫病

14. 下列各项，属痫病表现的是

- A. 精神痴呆，喃喃自语

- B. 突然昏倒，口吐涎沫
 - C. 烦躁不安，神昏谵语
 - D. 精神不振，健忘嗜睡
 - E. 疯狂怒骂，打人毁物
15. 面色黧黑，肌肤甲错的临床意义是
- A. 痛证
 - B. 水饮
 - C. 寒证
 - D. 瘀血
 - E. 肾虚
16. 阳气暴脱病人的面色表现是
- A. 面色青黑
 - B. 面色淡白
 - C. 面色苍白
 - D. 面色青紫
 - E. 面白无华
17. 下列各项，不属于面色发黑临床意义的是
- A. 血瘀
 - B. 痰浊
 - C. 肾虚
 - D. 寒证
 - E. 水饮
18. 病人面色白虚浮多属
- A. 阳气暴脱
 - B. 血虚
 - C. 阳虚
 - D. 阳虚水泛
 - E. 气虚
19. 肾精久耗，阴虚火旺病人的面色可见
- A. 面色黛黑，肌肤甲错
 - B. 面黑干焦
 - C. 眼眶周围发黑
 - D. 面色青黑
 - E. 面黑暗淡
20. 虚证病人少见
- A. 面色嫩红
 - B. 满面通红
 - C. 面色淡白
 - D. 面色萎黄
 - E. 面色黧黑
21. 病人卧时向外，躁动不安属
- A. 阳证
 - B. 阴证
 - C. 寒证

- D. 虚证
- E. 虚寒证
- 22. 形瘦食多属
 - A. 形盛气虚
 - B. 形气有余
 - C. 阴虚火旺
 - D. 胃火亢盛
 - E. 脏腑精气衰竭
- 23. 肺气壅滞多表现为
 - A. 坐而仰首
 - B. 神倦俯卧
 - C. 但卧不得坐，坐则昏眩
 - D. 蜷卧缩足，喜加衣被
 - E. 坐而喜俯
- 24. 阳证、热证、实证表现为
 - A. 蜷卧缩足，喜加衣被
 - B. 卧时面常向外，身轻自能转侧
 - C. 但卧不得坐，坐则昏眩
 - D. 卧时面常向内，身重不能转侧
 - E. 喜静懒动，动之觉舒
- 25. 下列各项，不属于浮脉类的是
 - A. 需脉
 - B. 浮脉
 - C. 洪脉
 - D. 滑脉
 - E. 芤脉
- 26. 温病卫分证的脉象是
 - A. 滑数
 - B. 浮紧
 - C. 浮数
 - D. 洪数
 - E. 弦数
- 27. 弦脉的脉象是
 - A. 脉气紧张，端直而长
 - B. 脉来绷急，状如牵绳
 - C. 浮而搏指，滑数有力
 - D. 状如波涛，来盛去衰
 - E. 沉按实大，弦长有力
- 28. 滑脉的脉象是
 - A. 轻取即得，举之泛泛
 - B. 往来流利，应指圆滑
 - C. 厥厥动摇，滑数有力
 - D. 脉短如豆，滑数有力
 - E. 状如波涛，来盛去衰

29. 细脉的脉象是

- A. 沉细而软，应指无力
- B. 举之无力，按之空虚
- C. 极细极软，似有似无
- D. 脉体如线，应指明显
- E. 浮而细软，应指无力

30. 脉率迟缓，时见一止，止无定数的脉象是指

- A. 促脉
- B. 代脉
- C. 结脉
- D. 动脉
- E. 涩脉

31. 痰湿留聚或食积时的脉象是

- A. 长脉
- B. 短脉
- C. 滑脉
- D. 动脉
- E. 涩脉

32. 具有理气健脾、燥湿化痰功效的药物是

- A. 枳实
- B. 佛手
- C. 陈皮
- D. 薤白
- E. 川楝子

33. 治疗食积停滞，腹痛便秘，泻痢不畅，里急后重，痰浊阻塞气机，胸脘痞满，应选用的药物是

- A. 枳实
- B. 陈皮
- C. 佛手
- D. 香附
- E. 木香

34. 以行气宽中除胀为主的药物是

- A. 佛手
- B. 枳实
- C. 木香
- D. 陈皮
- E. 青皮

35. 治疗脏器下垂，应选用的药物是

- A. 陈皮
- B. 枳实
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 沉香

36. 枳实的功效是

- A. 行气宽中除胀为主
- B. 行气消痰除痞为主
- C. 燥湿化痰和胃为主
- D. 理气和胃降逆为主
- E. 行气止痛散结为主

37. 治疗肝气郁滞或肝胃不和所致的胁肋作痛兼见热象者，应选用的药物是

- A. 香附
- B. 延胡索
- C. 沉香
- D. 川楝子
- E. 木香

38. 佛手的功效是

- A. 疏肝和胃，行气止痛，燥湿化痰
- B. 疏肝破气，止咳化痰，行气止痛
- C. 疏肝解郁，行气止痛，化湿和胃
- D. 疏肝解郁，理气和中，燥湿化痰
- E. 破气消积，疏肝除痞，助阳止泻

39. 薤白的功效是

- A. 疏肝解郁，行气导滞
- B. 通阳散结，行气导滞
- C. 通阳散结，解毒消肿
- D. 散寒通阳，解毒散结
- E. 散寒发表，行气导滞

40. 善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是

- A. 香附
- B. 木香
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 陈皮

41. 下列具有降血脂作用，适用于高脂血症、高血压、冠心病的药物是

- A. 山楂
- B. 神曲
- C. 麦芽
- D. 稻芽
- E. 莱菔子

42. 具有杀虫消积、行气利水截疟功效的药物是

- A. 大腹皮
- B. 苦楝皮
- C. 槟榔
- D. 麦芽
- E. 川楝子

43. 槟榔杀绦虫时，其用量是

- A. 1~3g
- B. 5~10g

C. 0.1~0.2g

D. 15~25g

E. 30~60g

44. 具有燥湿化痰、祛风止痉、散结消肿功效的药物是

A. 天南星

B. 蝉蜕

C. 海藻

D. 防风

E. 蕲蛇

45. 治疗心下痞、梅核气，应选用的药物是

A. 天南星

B. 款冬花

C. 旋覆花

D. 桔梗

E. 半夏

46. 具有降气消痰、行水止呕功效的药物是

A. 旋覆花

B. 海蛤壳

C. 天南星

D. 款冬花

E. 细辛

47. 具有消痰、降肺胃气逆功效的药物是

A. 前胡

B. 紫苏子

C. 芥子

D. 白前

E. 旋覆花

48. 旋覆花入煎剂的用法是

A. 先煎

B. 后下

C. 冲服

D. 包煎

E. 另煎

49. 瓜蒌皮与川贝母均可治疗的病证是

A. 肺热咯血

B. 肺寒咳嗽

C. 肺热咳嗽

D. 肺虚咳嗽

E. 百日咳

50. 治疗外感风热表证，肺气不降，咳喘痰稠病证，应选用的药物是

A. 薄荷

B. 白前

C. 前胡

D. 牛蒡子

E. 桑叶

51. 下列各项，不属桔梗主治病证的药物是

- A. 肺痈
- B. 咳嗽
- C. 咽痛
- D. 痰证
- E. 眩晕

52. 下列各项中不属于“八法”内容的是

- A. 汗法、吐法
- B. 下法、清法
- C. 宣法、通法
- D. 清法、补法
- E. 和法、温法

53. 下列病证中不宜使用“下法”治疗的是

- A. 宿食
- B. 结痰
- C. 积水
- D. 蓄血
- E. 痞块

54. 下述各类药物中不属于“佐药”范畴的是

- A. 协助君臣药加强治疗作用的药物
- B. 引导诸药至病所的药物
- C. 用以消除或减少君臣药毒性的药物
- D. 用以制约君臣药峻烈之性的药物
- E. 针对次要兼证、兼病或某一症状发挥治疗作用的药物

55. 下列哪一项不是“丸剂”的特点

- A. 不易变质
- B. 服用方便
- C. 吸收缓慢
- D. 药力持久
- E. 适用于慢性虚弱性病证

56. 麻黄汤组成的药物中除麻黄外，其余的药物是

- A. 桂枝 杏仁 炙甘草
- B. 苏叶 白芷 生甘草
- C. 苏叶 杏仁 炙甘草
- D. 桂枝 苏叶 生甘草
- E. 桂枝 生姜 炙甘草

57. 下列各项中，不属于败毒散组成的药物是

- A. 柴胡 前胡
- B. 荆芥 豆豉
- C. 羌活 独活
- D. 桔梗 茯苓
- E. 人参 川芎

58. 止嗽散组成的药物中含有

- A. 苏梗
- B. 荆芥
- C. 百合
- D. 白芷
- E. 紫苏

59. 止嗽散组成的药物中不含有

- A. 桔梗
- B. 荆芥
- C. 百部
- D. 前胡
- E. 紫菀

60. 麻黄汤的功用是

- A. 散寒解表，降气平喘
- B. 解表蠲饮，止咳平喘
- C. 宣肺降气，祛痰平喘
- D. 祛痰止咳，降气定喘
- E. 发汗解表，宣肺平喘

61. 桑菊饮证的主要临床表现是

- A. 头痛身热，微恶风寒，有汗不多，口渴咽干，舌尖红，脉浮数
- B. 咳嗽，身热不甚，口微渴，脉浮微数
- C. 头痛，发热，汗出恶风，苔薄白，脉浮缓
- D. 身热，咳逆，气急鼻塞，苔薄黄，脉滑数
- E. 咳嗽咽痒，微有恶寒发热，苔薄白，脉浮缓

62. 大陷胸汤的药物组成是

- A. 大黄 厚朴 枳实
- B. 大黄 芒硝 甘遂
- C. 大黄 芒硝 厚朴
- D. 芒硝 枳实 甘遂
- E. 芫花 甘遂 大戟

63. 济川煎组成的药物中不含有

- A. 升麻
- B. 牛膝
- C. 麦冬
- D. 枳壳
- E. 泽泻

64. 热结旁流，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口干舌燥，脉滑实者。治宜选用

- A. 济川煎
- B. 黄龙汤
- C. 大承气汤
- D. 小承气汤
- E. 调胃承气汤

65. 四逆散组成的药物是

- A. 柴胡 枳壳 芍药 甘草
- B. 柴胡 枳实 芍药 炙草

- C. 柴胡 陈皮 芍药 甘草
- D. 柴胡 白术 芍药 甘草
- E. 柴胡 香附 芍药 甘草

66. 半夏泻心汤组成的药物中，除半夏、人参、炙甘草、干姜、大枣外，还有

- A. 黄连 黄柏
- B. 栀子 连翘
- C. 黄连 黄芩
- D. 柴胡 枳壳
- E. 黄芩 黄柏

67. 半夏泻心汤适用于

- A. 脾胃虚弱，寒热错杂。症见脘腹痞胀，恶食懒倦，大便不畅者
- B. 脾胃虚弱，寒热错杂。症见心下痞满，但满不痛，呕吐下利者
- C. 脾胃虚弱，水热互结。症见心下硬满，干噎食臭，肠鸣下利者
- D. 脾胃虚弱，痰浊内阻。症见心下痞硬，咳气不除，苔腻脉滑者
- E. 胃虚有热，和降失常。症见心胸烦闷，气逆欲呕，口干喜饮者

68. 蒿芩清胆汤中配伍半夏的主要用意是

- A. 燥湿化痰，和胃降逆
- B. 散结除痞，降逆止呕
- C. 散肝舒脾，降逆止呕
- D. 下气宽中，除痰消痞
- E. 温中散寒，散结除痞

69. 由石膏、知母、粳米、甘草组成的方剂是

- A. 青蒿鳖甲汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 蒿芩清胆汤
- D. 白虎汤
- E. 竹叶石膏汤

70. 体温上升期的临床表现是

- A. 皮肤潮红而灼热
- B. 畏寒或寒战，皮肤苍白无汗
- C. 呼吸加快、加强
- D. 心率减慢，脉搏有力
- E. 可有出汗，尿少色黄

71. 体温下降呈渐降形式的是

- A. 疟疾
- B. 输液反应
- C. 风湿热
- D. 肺炎球菌性肺炎
- E. 急性肾盂肾炎

72. 属感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热

- E. 广泛性皮炎
73. 甲状腺功能亢进引起发热的主要原因是
- A. 产热过多
 - B. 散热过少
 - C. 抗原-抗体反应
 - D. 坏死物质吸收
 - E. 植物神经功能紊乱
74. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是
- A. 颅内高压症
 - B. 小脑肿瘤
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 脑膜炎
 - E. 中暑
75. 头痛常在夜间发作的是
- A. 颅内占位性病变所致头痛
 - B. 高血压性头痛
 - C. 丛集性头痛
 - D. 眼源性头痛
 - E. 副鼻窦炎所引起的头痛
76. 昏睡的主要临床表现是
- A. 呼唤和推动身体不能使其清醒
 - B. 对强烈疼痛刺激可唤醒
 - C. 角膜、对光反射消失
 - D. 腱反射消失
 - E. 能正确回答问题
77. 可引起持续性广泛性剧烈腹痛的是
- A. 消化性溃疡
 - B. 胆道蛔虫梗阻
 - C. 肾结石
 - D. 肠梗阻
 - E. 急性弥漫性腹膜炎
78. 吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是
- A. 兴奋呼吸中枢
 - B. 使支气管痉挛
 - C. 使肺淤血
 - D. 肺泡弹性减弱
 - E. 呼吸中枢受抑制
79. 支气管哮喘发作时的主要临床表现是
- A. 胸闷、咳嗽
 - B. 出汗、微绀
 - C. 鼻痒、喷嚏
 - D. 双肩耸起
 - E. 呼气延长伴哮鸣音
80. 主动脉瘤引起嘶哑样咳嗽的主要原因是

- A. 压迫喉返神经
 - B. 气管受压
 - C. 刺激胸膜
 - D. 刺激支气管黏膜
 - E. 引起急性肺水肿
81. 引起痰分层现象的疾病是
- A. 慢性支气管炎
 - B. 肺脓肿
 - C. 肺结核
 - D. 肺炎链球菌肺炎
 - E. 心源性哮喘
82. 大咯血的日咯血量应是
- A. 100~200mL
 - B. 200~300mL
 - C. 300~400mL
 - D. 400~500mL
 - E. >500mL
83. 咯血量较大而能骤然停止的疾病是
- A. 支气管扩张症
 - B. 肺结核空洞
 - C. 肺脓肿
 - D. 二尖瓣狭窄
 - E. 肺炎球菌性肺炎
84. 符合溶血性黄疸表现的是
- A. 网织红细胞减少
 - B. 尿中尿胆原减少
 - C. 尿中有胆红素
 - D. 大便色浅
 - E. 结合胆红素与总胆红素比值 $<20\%$
85. 可引起黄疸持续性加重的疾病是
- A. 胆石症
 - B. 肝炎
 - C. 肝癌
 - D. 急性胰腺炎
 - E. 胆道蛔虫症
86. 正常人血中胆红素主要来自
- A. 骨髓内血红蛋白分解
 - B. 骨髓内在红细胞成熟前血红素分解
 - C. 骨髓内新生红细胞分解
 - D. 由肝、肾内铁卟啉蛋白产生
 - E. 周围血中红细胞被裂解
87. 阻塞性黄疸的主要特点是
- A. 血中非结合胆红素增高
 - B. 血中两种胆红素均增高

- C. 血中结合胆红素增高
 - D. 尿胆红素阴性
 - E. 尿胆原阳性
88. 先有体温升高后有意识障碍的疾病是
- A. 脑出血
 - B. 病毒性脑炎
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 巴比妥中毒
 - E. 冬眠灵中毒
89. 意识障碍伴呼吸缓慢的疾病是
- A. 代谢性酸中毒
 - B. 肝昏迷
 - C. 吗啡中毒
 - D. 尿毒症
 - E. 脑型疟疾
90. 意识障碍伴瞳孔散大的是
- A. 巴比妥类中毒
 - B. 吗啡类中毒
 - C. 颠茄类中毒
 - D. 有机磷农药中毒
 - E. 毒蕈类中毒
91. 可引起胸痛并向左肩、左前臂放射的是
- A. 急性心包炎
 - B. 纵隔疾病
 - C. 急性胸膜炎
 - D. 心绞痛
 - E. 食管炎
92. 头面部阵发性电击样疼痛的是
- A. 脑供血不足
 - B. 三叉神经痛
 - C. 偏头痛
 - D. 紧张性头痛
 - E. 高血压病
93. 心源性水肿最常见的病因是
- A. 左心衰竭
 - B. 右心衰竭
 - C. 渗出性心包炎
 - D. 缩窄性心包炎
 - E. 心绞痛
94. 肾源性水肿者，其水肿常先出现的部位是
- A. 下肢
 - B. 上肢
 - C. 眼睑
 - D. 胸腔

E. 腹腔

95. 下列各项，对急性阑尾炎最有诊断意义的体征是

- A. 发热
- B. 腰大肌试验阳性
- C. 结肠充气试验阳性
- D. 腹肌紧张
- E. 阑尾点固定性压痛

96. 幽门梗阻的体征有

- A. 肠型
- B. 移动性浊音
- C. 液波震颤
- D. 振水音
- E. 全腹膨隆

97. 可引起胆囊肿大、无压痛，伴显著黄疸的疾病是

- A. 胆囊炎
- B. 胆管炎
- C. 胰头癌
- D. 胆囊结石
- E. 胆总管结石

98. 可引起肝浊音界消失的疾病是

- A. 急性胃炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 急性胰腺炎
- D. 急性阑尾炎
- E. 胃溃疡穿孔

99. 下列关于正常脾脏大小的描述，正确的是

- A. 在左腋中线第 6~9 肋之间叩到脾浊音
- B. 在左腋前线第 9~11 肋之间叩到脾浊音
- C. 其长度为 7~9cm
- D. 其长度为 9~11cm
- E. 前方不超过腋前线

100. 肿大的脾触诊时的显著特征是

- A. 形态不规则，表面凸凹不平
- B. 质软，有压痛
- C. 质硬，有压痛
- D. 摩擦感
- E. 有明显切迹

101. 诊断主动脉瓣关闭不全最重要的体征是

- A. 靴形心
- B. 水冲脉
- C. 心尖区第一心音减弱
- D. 心尖部柔和收缩期杂音
- E. 主动脉瓣区舒张期杂音

102. 胸廓前后径与横径之比为 1:1, 肋骨与脊柱夹角大于 45°，此种胸廓为

- A. 正常胸廓
- B. 扁平胸
- C. 桶状胸
- D. 漏斗胸
- E. 鸡胸

103. 当实质性器官被含气组织覆盖时, 其叩诊音为

- A. 清音
- B. 浊音
- C. 实音
- D. 鼓音
- E. 过清音

104. 甲状腺功能减退病人可见的面容为

- A. 无欲貌
- B. 苦笑面容
- C. 面具面容
- D. 肢端肥大面容
- E. 黏液水肿面容

105. 长期服用肾上腺糖皮质激素的病人会出现的面容是

- A. 黏液性水肿病容
- B. 满月面容
- C. 二尖瓣面容
- D. 无欲貌
- E. 苦笑面容

106. 蜘蛛痣罕见的部位是

- A. 面颊部
- B. 前胸
- C. 上臂
- D. 手背
- E. 下肢

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(107~108 题共用备选答案)

- A. 半夏
- B. 瓜蒌
- C. 天南星
- D. 川贝母
- E. 桔梗

107. 治疗湿痰痰多, 咳嗽气逆, 应选用的药物是

108. 治疗寒痰湿痰, 咳嗽, 胸满胁痛, 破伤风, 应选用的药物是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 降逆止呕

- B. 祛风止痉
- C. 解毒消疮
- D. 理气调中
- E. 清热消肿

109. 半夏的功效是

110. 天南星的功效是

(111~112 题共用备选答案)

- A. 新久咳嗽，肺癆咳嗽
- B. 顽痰、老痰胶结，气逆喘咳实证
- C. 痰涎壅盛，咳嗽气喘
- D. 风痰眩晕，破伤风
- E. 肺热痰稠咳喘

111. 天南星的主治病证是

112. 浙贝母的主治病证是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 痰热咳嗽
- B. 水肿
- C. 肠燥便秘
- D. 肝火目赤肿痛
- E. 肠痈

113. 浙贝母的主治病证是

114. 昆布的主治病证是

(115~116 题共用备选答案)

- A. 包煎
- B. 研粉吞服
- C. 人汤剂
- D. 冲服
- E. 后下

115. 旋覆花的用法是

116. 车前子的用法是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 半夏配生姜
- B. 半夏配天南星
- C. 旋覆花配赭石
- D. 半夏配瓜蒌
- E. 川贝母配瓜蒌

117. 两药配伍可增强止呕作用，使痰祛饮化，逆降胃和而呕吐自止的药对是

118. 两药配伍可增强降肺胃逆气之力，适用于痰阻气逆呕恶的药对是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 地骨皮 桑白皮 粳米 甘草
- B. 生地 当归 丹皮 黄连 升麻
- C. 石膏 熟地 麦冬 知母 牛膝
- D. 生地 木通 竹叶 生甘草梢
- E. 芍药 丹皮 生地 犀角

119. 导赤散组成的药物是

120. 玉女煎组成的药物是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 生地 黄连
- B. 熟地 知母
- C. 黄芩 芍药
- D. 秦皮 黄柏
- E. 桃仁 薏苡仁

121. 清胃散组成的药物中含有

122. 玉女煎组成的药物中含有

(123~124 题共用备选答案)

- A. 清营解毒，透热养阴
- B. 清热开窍，豁痰解毒
- C. 清热解毒，凉血散瘀
- D. 清肺宁肝，凉血止血
- E. 清热开窍，息风止痉

123. 犀角地黄汤的功用是

124. 清营汤的功用是

(125~126 题共用备选答案)

- A. 左金丸
- B. 清营汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 玉女煎
- E. 竹叶石膏汤

125. 具有清泻肝火、降逆止呕功用的方剂是

126. 具有清胃热、滋肾阴功用的方剂是

(127~128 题共用备选答案)

- A. COPD
- B. 胸膜广泛粘连致严重胸廓畸形
- C. 原发性肺动脉高压
- D. 重症肌无力
- E. 胸廓改形术后

127. 慢性肺心病病因中属支气管、肺疾病的是

128. 慢性肺心病病因中属肺血管疾病的是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 胸部 X 线心影大小
- B. 放射性核素检查心室大小
- C. E/A 比值
- D. 左心室射血分数
- E. 血浆脑钠肽

129. 有助于心力衰竭诊断及判断预后的指标是

130. 有助于鉴别心源性哮喘与支气管哮喘的指标是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 病原体被清除

- B. 隐性感染
- C. 潜伏性感染
- D. 病原体携带状态
- E. 显性感染

131. 感染过程的表现中最易识别的是

132. 感染过程的表现中最常见是

(133~134 题共用备选答案)

- A. IgA
- B. IgD
- C. IgE
- D. IgG
- E. IgM

133. 在传染病恢复期出现, 持续时间较长的抗体是

134. 感染过程中首先出现, 常为近期感染标志的抗体是

(135~136 题共用备选答案)

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原携带状态
- C. 隐性感染
- D. 潜在性感染
- E. 显性感染

135. 人体与病原体处于相持状态, 不出现临床症状, 不排出病原体

136. 感染病原体后不出现临床表现, 但产生了特异性免疫

(137~138 题共用备选答案)

- A. 卫生法律
- B. 卫生行政法规
- C. 地方卫生法规
- D. 基本法律
- E. 卫生规章

137. 全国人民代表大会制定颁布的是

138. 全国人民代表大会常委会制定颁布的是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 法律的渊源
- B. 法律的规范
- C. 卫生法
- D. 卫生法律
- E. 卫生法规

139. 法的各种具体表现形式是指

140. 法律形式也叫作

(141~142 题共用备选答案)

- A. 医德观念、医德情感、医德意志、医德信念、医德理论
- B. 评价和调整医务人员行为的准则
- C. 医德教育
- D. 医德评价
- E. 医德修养

141. 属于医学道德意识现象的是
142. 属于医学道德规范现象的是
(143~144 题共用备选答案)
- A. “生平最爱听的声音, 就是婴儿出生后的第一声啼哭”
- B. “这是中医中药走向世界的一项荣誉, 它属于科研团队中的每一个人, 属于中国科学家群体”
- C. “把重病人都送到我这里来”
- D. “在患者面前, 我们永远是个小学生”
- E. “正确的知识、广博的经验、聪明的知觉及对患者的同情, 是为医者的四德”
143. 以上名言为屠呦呦所述的是
144. 以上名言为钟南山所述的是
(145~146 题共用备选答案)
- A. “每一个病例都是一个研究课题”
- B. “医生要有一切必要的知识, 要洁身自持, 要使患者信赖”
- C. “启我爱医术, 复爱世间人”
- D. “愿绝名利心, 一切为患者, 无分爱与憎, 不问富与贫, 凡诸疾病者, 一视如同仁”
- E. “人命至重, 有贵千金, 一方济之, 德逾于此”
145. 以上名言为张孝骞所述的是
146. 以上名言为孙思邈所述的是
(147~148 题共用备选答案)
- A. 接种疫苗
- B. 对密切接触者进行检疫
- C. 管好食品
- D. 隔离患者
- E. 开窗通风
147. 霍乱的重要预防措施是
148. 流感的主要预防措施是
(149~150 题共用备选答案)
- A. 血培养
- B. 血常规
- C. 病毒分离
- D. 影像学检查
- E. 粪便培养
149. 上述检查, 可确诊流感的是
150. 上述检查, 可确诊流脑的是

2 卷中医助理第二单元

A1 型题

答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。

请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

1. 人体是一个有机整体，其“中心”是
 - A. 脑
 - B. 六腑
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 奇恒之腑
2. 人体是一个有机整体，其“五脏六腑之大主”是
 - A. 脑
 - B. 心
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 肾
3. 《素问·脉要精微论》中“四变之动，脉与之上下”所体现的是
 - A. 恒动观念
 - B. 辨证论治
 - C. 形神一体观
 - D. 整体观念
 - E. 辨证观念
4. 《素问·金匱真言论》说所“善病洞泄寒中”的季节是
 - A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
5. 《素问·金匱真言论》所说“善病风疰”的季节是
 - A. 春季
 - B. 仲夏
 - C. 长夏
 - D. 秋季
 - E. 冬季
6. 《灵枢·顺气一日分为四时》“夫百病者……多以旦慧”，其原因是
 - A. 人气始生，病气衰
 - B. 人气长，长则胜邪
 - C. 人气始衰，邪气始生
 - D. 人气入脏，邪气独居于身
 - E. 人气抗邪，卫外为固
7. 中医学“证”的概念是
 - A. 疾病症状与体征的概括
 - B. 对疾病症状与体征的调查认识
 - C. 对疾病症状与体征的分析了解
 - D. 疾病过程中某一阶段的病理概括
 - E. 疾病全过程的总体属性、特征和规律

8. 下列表述中属于证的是

- A. 水痘
- B. 麻疹
- C. 血虚
- D. 头痛
- E. 恶寒

9. 下列表述中属于症的是

- A. 肺痈
- B. 消渴
- C. 肝阳上亢
- D. 心血亏虚
- E. 恶寒

10. 下列表述中属于证的是

- A. 气滞
- B. 疟疾
- C. 感冒
- D. 头痛
- E. 发热

11. 采取异病同治方法的原因是

- A. 疾病不同
- B. 症状相同
- C. 证候相同
- D. 阶段不同
- E. 体征不同

12. 昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是

- A. 前半夜
- B. 下午
- C. 上午
- D. 中午
- E. 后半夜

13. 阴阳双方在一个统一体中，协调共济称为

- A. 阴阳平衡
- B. 阴阳互藏
- C. 阴阳一体
- D. 阴阳自和
- E. 阴阳协调

14. “动极者镇之以静，阴亢者胜之以阳”，说明阴阳之间的关系是

- A. 阴阳互藏
- B. 阴阳互根
- C. 阴阳平衡
- D. 阴阳转化
- E. 阴阳制约

15. “阴平阳秘，精气乃治”，所体现的阴阳关系是

- A. 阴阳的对立制约

- B. 阴阳的对立消长
 - C. 阴阳的互根互用
 - D. 阴阳的消长平衡
 - E. 阴阳的相互转化
16. “热者寒之”治则，所体现的阴阳关系是
- A. 阴阳交感
 - B. 阴阳互根
 - C. 阴阳对立
 - D. 阴阳消长
 - E. 阴阳转化
17. 临床病证的虚实，主要取决于
- A. 正气的强弱
 - B. 正邪的消长
 - C. 阴阳的盛衰
 - D. 气血的盛衰
 - E. 气机的失调
18. “阴阳离决，精气乃绝”是指
- A. 阴阳平衡关系的破坏
 - B. 阴阳对立关系的破坏
 - C. 阴阳互根关系的破坏
 - D. 阴阳消长关系的破坏
 - E. 阴阳转化关系的破坏
19. “阳生阴长，阳杀阴藏”所体现的阴阳关系是
- A. 阴阳交感
 - B. 阴阳互根
 - C. 阴阳对立
 - D. 阴阳消长
 - E. 阴阳转化
20. 下列选项可用阴阳对立制约解释的是
- A. 寒极生热
 - B. 阴损及阳
 - C. 寒者热之
 - D. 重阴必阳
 - E. 阴中求阳
- 20 【答案】 C
21. 下列选项可用阴阳互根互用解释的是
- A. 寒极生热
 - B. 阴病治阳
 - C. 寒者热之
 - D. 重阴必阳
 - E. 阴中求阳
22. 下列选项中，不属于阴阳互根关系的是
- A. 阴在内，阳之守也
 - B. 孤阴不生，独阳不长

- C. 阳在外，阴之使也
 - D. 重阴必阳，重阳必阴
 - E. 阴损及阳，阳损及阴
23. 下列各项，不属于失神表现的是
- A. 神志昏迷
 - B. 形羸色败
 - C. 呼吸微弱
 - D. 目无精彩
 - E. 壮热面赤
24. 下列各项，不是精亏神衰失神表现的是
- A. 动作艰难
 - B. 呼吸气微
 - C. 肌肉瘦削
 - D. 神昏澹语
 - E. 面色无华
25. 区别假神与病情好转的最主要依据是
- A. 突然神识清醒，目光转亮
 - B. 局部症状好转与整体病情恶化不相符合
 - C. 欲进饮食，想见亲人
 - D. 面色无华，两额泛红如妆
 - E. 言语不休，语声清亮
26. 病人表情淡漠，神识痴呆，喃喃自语，哭笑无常，悲观失望，其临床意义是
- A. 温病邪热入于心包
 - B. 阳明热盛，扰乱神明
 - C. 肝风夹痰，蒙蔽清窍
 - D. 痰气郁结，蒙蔽心神
 - E. 气郁化火，痰火扰心
27. 午后颧红的临床意义是
- A. 真寒假热
 - B. 阴虚内热
 - C. 外感风热
 - D. 气虚发热
 - E. 阳明实热
28. 小儿鼻柱、眉间及口唇四周青紫的临床意义是
- A. 肝脾不调
 - B. 瘀血内阻
 - C. 小儿惊风
 - D. 疼痛剧烈
 - E. 寒凝气滞
29. 脾胃气虚的面色表现是
- A. 面色青灰
 - B. 面色萎黄
 - C. 面目一身俱黄
 - D. 面色青黄

E. 面黄虚浮

30. 根据《灵枢·五色》的分法，整个面部称为“阙”的部分是

- A. 鼻
- B. 耳门
- C. 眉间
- D. 颊侧
- E. 额

31. 干咳无痰或少痰而黏的临床意义是

- A. 风热犯肺
- B. 燥邪犯肺
- C. 热邪犯肺
- D. 痰热壅肺
- E. 痰湿阻肺

32. 脏腑在面部的分属，阙中所候脏腑是

- A. 心
- B. 肺
- C. 脾
- D. 肾
- E. 肝

33. 病人面色淡白无华，唇舌色淡多属于

- A. 阳气暴脱
- B. 血虚
- C. 阳虚
- D. 阳虚水泛
- E. 气虚

34. 一般面色白不见于以下何证

- A. 亡阳证
- B. 血虚证
- C. 阴虚证
- D. 阳虚证
- E. 气虚证

35. 下列各项，不属于心脾气血虚证临床表现的是

- A. 心悸怔忡
- B. 失眠多梦
- C. 食欲不振
- D. 腹胀便溏
- E. 舌红苔少

36. 下列各项，多见面目一身俱黄、色鲜明如橘皮色的是

- A. 脾胃气虚
- B. 脾虚湿蕴
- C. 肝脾不调
- D. 阳黄
- E. 阴黄

37. 下列各项，不是常色表现的是

- A. 面色长夏稍黄
 - B. 面色明润含蓄
 - C. 面色隐约微黄
 - D. 面色红黄隐隐
 - E. 面色潮红娇嫩
38. 面黄虚浮，称为
- A. 黄胖
 - B. 苍黄
 - C. 阳黄
 - D. 阴黄
 - E. 萎黄
39. 病人卧时向外，躁动不安属
- A. 阳证
 - B. 阴证
 - C. 寒证
 - D. 虚证
 - E. 虚寒证
40. 阴虚的表现是
- A. 形瘦气短，头晕眼花
 - B. 形瘦食少，舌淡苔白
 - C. 形瘦颧红，皮肤干皱
 - D. 卧床不起，骨瘦如柴
 - E. 形瘦能食，舌红苔黄
41. 下列各项，不是病色的特征是
- A. 鲜明暴露
 - B. 晦暗枯槁
 - C. 不应时应位
 - D. 某色独见
 - E. 因季节因素而变
42. 下列各项，不属于实脉类的脉象是
- A. 芤脉
 - B. 牢脉
 - C. 滑脉
 - D. 弦脉
 - E. 洪脉
43. 哮的临床意义是
- A. 痰饮内伏，复感外邪
 - B. 寒邪、热邪袭肺
 - C. 水气上凌心肺
 - D. 肺肾亏虚，气失摄纳
 - E. 肺脾气虚，内生痰湿
44. 下列各项，不具有脉长特点的脉象是
- A. 洪脉
 - B. 弦脉

C. 牢脉

D. 实脉

E. 动脉

45. 下列各项，不属于浮脉类的是

A. 需脉

B. 浮脉

C. 洪脉

D. 滑脉

E. 芤脉

46. 洪脉的临床意义是

A. 气分热盛

B. 湿热蕴结

C. 外感表证

D. 宿食积滞

E. 肝失疏泄

47. 下列各项，脉动不足一息五至的脉象是

A. 促脉

B. 动脉

C. 数脉

D. 滑脉

E. 疾脉

48. 具有解表散寒、温肺化饮、宣通鼻窍功效的药物是

A. 干姜

B. 辛夷

C. 生姜

D. 细辛

E. 苍耳子

49. 薄荷的功效是

A. 利咽透疹

B. 解毒透疹

C. 升举阳气

D. 息风止疼

E. 明目退翳

50. 辛凉解表药共有的功效是

A. 清利咽喉

B. 清利头目

C. 发散风热

D. 透发麻疹

E. 清肺止咳

51. 治疗风热音哑，肝热目赤，小儿夜啼，应选用的药物是

A. 薄荷

B. 柴胡

C. 葛根

D. 桑叶

E. 蝉蜕

52. 具有解表、明目功效的药组是

- A. 柴胡、薄荷
- B. 桑叶、菊花
- C. 柴胡、蔓荆子
- D. 葛根、蝉蜕
- E. 荆芥、防风

53. 具有解肌退热，升阳止泻功效的药物是

- A. 升麻
- B. 葛根
- C. 柴胡
- D. 桑叶
- E. 薄荷

54. 陈皮的主要功效是

- A. 疏肝解郁，化湿止呕
- B. 理气健脾，燥湿化痰
- C. 温肺化痰，行气止痛
- D. 温经散寒，行气活血
- E. 理气调中，温肾纳气

55. 治疗食积停滞，腹痛便秘，泻痢不畅，里急后重，痰浊阻塞气机，胸脘痞满，应选用的药物是

- A. 枳实
- B. 陈皮
- C. 佛手
- D. 香附
- E. 木香

56. 表现为典型弛张热的疾病是

- A. 风湿热
- B. 渗出性胸膜炎
- C. 疟疾
- D. 布鲁杆菌病
- E. 肺炎球菌性肺炎

57. 属感染性发热的疾病是

- A. 肝癌
- B. 斑疹伤寒
- C. 白血病
- D. 风湿热
- E. 广泛性皮炎

58. 下列可引起反射性呕吐的是

- A. 晕动病
- B. 脑膜炎
- C. 幽门梗阻
- D. 休克
- E. 有机磷中毒

59. 头痛常在夜间发作的是
- A. 颅内占位性病变所致头痛
 - B. 高血压性头痛
 - C. 丛集性头痛
 - D. 眼源性头痛
 - E. 副鼻窦炎所引起的头痛
60. 典型心绞痛的疼痛性质是
- A. 灼痛
 - B. 刺痛
 - C. 闷痛
 - D. 压榨样痛
 - E. 酸痛
61. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是
- A. 急性化脓性胆管炎
 - B. 结缔组织病
 - C. 急性腹腔内出血
 - D. 肠梗阻
 - E. 结核性腹膜炎
62. 吗啡中毒引起呼吸困难的主要原因是
- A. 兴奋呼吸中枢
 - B. 使支气管痉挛
 - C. 使肺淤血
 - D. 肺泡弹性减弱
 - E. 呼吸中枢受抑制
63. 咯血量较大而能骤然停止的疾病是
- A. 支气管扩张症
 - B. 肺结核空洞
 - C. 肺脓肿
 - D. 二尖瓣狭窄
 - E. 肺炎球菌性肺炎
64. 引起上消化道出血最常见的疾病是
- A. 胃癌
 - B. 胃炎
 - C. 急性胆囊炎
 - D. 消化性溃疡
 - E. 肝硬化
65. 表现为慢性头痛的疾病是
- A. 蛛网膜下腔出血
 - B. 血管性头痛
 - C. 脑膜炎
 - D. 脑出血
 - E. 脑外伤
66. 可表现为非凹陷性水肿的疾病是
- A. 急性肾炎

- B. 肾病综合征
 - C. 右心衰竭
 - D. 肝硬化
 - E. 甲状腺功能减退症
67. 幽门梗阻的体征有
- A. 肠型
 - B. 移动性浊音
 - C. 液波震颤
 - D. 振水音
 - E. 全腹膨隆
68. 可引起肝浊音界消失的疾病是
- A. 急性胃炎
 - B. 急性胆囊炎
 - C. 急性胰腺炎
 - D. 急性阑尾炎
 - E. 胃溃疡穿孔
69. 慢性阻塞性肺气肿时不会出现的体征是
- A. 桶状胸
 - B. 触觉语颤减弱
 - C. 肺下界下移
 - D. 肺下界移动度减小
 - E. 吸气期明显延长
70. 引起手足搐搦的常见疾病是
- A. 低钙血症
 - B. 小脑疾患
 - C. 肝性脑病
 - D. 帕金森病
 - E. 儿童的脑风湿病
71. ALT 基本正常, AST 显著增高, ALT/AST<1 的疾病是
- A. 肝硬化
 - B. 酒精性肝病
 - C. 脂肪肝
 - D. 急性病毒性肝炎
 - E. 慢性病毒性肝炎
72. 下列各项, 对急性心肌梗死最有诊断意义的是
- A. 心电图+血清酶
 - B. 测中心静脉压
 - C. X 线胸片
 - D. 测定血压及脉搏
 - E. 心音图
73. COPD 最主要的病因是
- A. 吸烟
 - B. 职业粉尘
 - C. 空气污染

- D. 感染
 - E. 氧化应激
74. COPD 典型的症状是
- A. 慢性咳嗽
 - B. 咳痰
 - C. 气短及呼吸困难
 - D. 喘息和胸闷
 - E. 食欲减退
75. 慢性肾炎与慢性肾盂肾炎最主要的鉴别点是
- A. 尿细菌培养阳性
 - B. 水肿
 - C. 尿蛋白
 - D. 低比重尿
 - E. 肾功能减退
76. 尿路感染最常见的致病菌是
- A. 大肠埃希菌
 - B. 副大肠杆菌
 - C. 类链球菌
 - D. 变形杆菌
 - E. 葡萄球菌
77. 治疗慢性肾盂肾炎的关键措施是
- A. 长期应用抗菌药物
 - B. 低蛋白饮食
 - C. 联合应用抗菌药物
 - D. 去除易感因素
 - E. 多饮水勤排尿
78. COPD 患者长期家庭氧疗的氧流量是
- A. 0.5~1L/min
 - B. 1~2L/min
 - C. 1.5~2.5L/min
 - D. 2~3L/min
 - E. 3.5~4.5L/min
79. 慢性肺心病最多见的并发症是
- A. 肺性脑病
 - B. 心律失常
 - C. 酸碱失衡
 - D. 消化道出血
 - E. 肾衰竭
80. 治疗慢性肺心病右心衰竭选用洋地黄制剂的原则是
- A. 速效类、常规剂量
 - B. 速效类、常规剂量的 1/2~2/3
 - C. 缓效类、小剂量
 - D. 缓效类、常规剂量
 - E. 缓效类、常规剂量的 1/2~2/3

81. 慢性肺心病的首要死亡原因是
- A. 酸碱失衡
 - B. 电解质紊乱
 - C. 心律失常
 - D. 消化道出血
 - E. 肺性脑病
82. 支气管哮喘最重要的发病机制是
- A. α 肾上腺素神经反应性增加
 - B. 气道慢性炎症
 - C. 迷走神经张力增高
 - D. β 肾上腺素受体功能低下
 - E. 气道高反应性
83. 缓解哮喘症状的首选药物是
- A. 氨茶碱
 - B. 麻黄素
 - C. 溴化异丙托品
 - D. 沙丁胺醇
 - E. 糖皮质激素
84. 慢性心力衰竭的治疗药物中，可以同时扩张静脉与动脉的药物是
- A. 硝苯地平
 - B. 硝普钠
 - C. 硝酸甘油
 - D. 酚妥拉明
 - E. 美托洛尔
85. 铁剂治疗缺铁性贫血后，首先出现的治疗反应是
- A. 红细胞总数升高
 - B. 血清铁增加
 - C. 血红蛋白升高
 - D. 血清铁饱和度增加
 - E. 网织红细胞升高
86. 成年人缺铁性贫血最主要的病因是
- A. 铁摄入不足
 - B. 慢性失血
 - C. 铁吸收障碍
 - D. 需铁量增加
 - E. 铁利用障碍
87. 下列哪项不影响铁剂吸收
- A. 胃大部切除
 - B. 胃空肠吻合
 - C. 萎缩性胃炎
 - D. 溃疡病
 - E. 长期腹泻
88. 下列各项，不属传染源的是
- A. 患者

- B. 隐性感染者
- C. 既往感染者
- D. 病原携带者
- E. 受染动物

89. 病原体侵入人体后引起疾病的主要因素是

- A. 机体的保护性免疫
- B. 机体的天然屏障作用
- C. 病原体的毒力与数量
- D. 病原体的侵入途径与特异性定位
- E. 病原体的致病力与机体的免疫机能

90. 在感染过程中，最常见的表现形式是

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 隐性感染
- C. 显性感染
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

91. 确定传染病检疫期的依据是

- A. 隔离期
- B. 传染期
- C. 最长潜伏期
- D. 最短潜伏期
- E. 平均潜伏期

92. 感染 HBV 后最早出现的抗体是

- A. 抗-HAV
- B. 抗-HBs
- C. 抗-HBc
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HDV

93. 下列有关甲肝病毒的叙述，正确的是

- A. 为嗜肝 DNA 病毒
- B. 只有一个血清型
- C. 60°C 30 分钟可被灭活
- D. 对紫外线照射不敏感
- E. 只有 1 个基因型

94. 诊断病毒性肝炎最可靠的依据是

- A. 发病季节
- B. 起病方式
- C. 症状及体征
- D. 接触史
- E. 病原学及肝功能检查结果

95. 下列有关流感流行病学的叙述，错误的是

- A. 潜伏期即有传染性
- B. 可经日常生活接触传播
- C. 各型之间无交叉免疫

- D. 感染后对同型病毒免疫力持久
E. 人类普遍易感
96. 下列各项，不属流感病毒性肺炎病理特征
- A. 肺充血
 - B. 肺水肿
 - C. 肺透明膜形成
 - D. 支气管黏膜坏死
 - E. 呼吸道黏膜充血
97. 抗流感病毒药奥司他韦作用机制是
- A. 抑制 RNA 聚合酶
 - B. 阻滞离子通道 M2
 - C. 抑制血凝素
 - D. 抑制神经氨酸酶
 - E. 激活神经氨酸酶
98. 流感病毒分型的依据是
- A. 核蛋白
 - B. 血凝素
 - C. 神经氨酸酶
 - D. 基质蛋白 M1
 - E. 核酸
99. 下列有关人禽流感的叙述，错误的是
- A. 由禽流感病毒引起
 - B. 也可感染其他哺乳动物
 - C. 12 岁以下儿童多见
 - D. 主要表现有高热、咳嗽、呼吸困难
 - E. 预后极差
100. 下列各项，不属人禽流感并发症的是
- A. 肺炎
 - B. 脑炎
 - C. 休克
 - D. 胸腔积液
 - E. ARDS
101. 下列标本，不用于人禽流感病毒分离的是
- A. 鼻咽分泌物
 - B. 口腔含漱液
 - C. 气管吸出物
 - D. 血液
 - E. 呼吸道上皮细胞
102. 下列有关乙脑极期表现的叙述，错误的是
- A. 高热、惊厥
 - B. 病理征阳性
 - C. 脑膜刺激征阳性
 - D. 瘫痪多不对称，肢体松弛
 - E. 颅高压表现及呼吸衰竭

103. 下列有关流行性乙型脑炎临床表现的叙述，错误的是
- A. 高热及惊厥
 - B. 呼吸衰竭常以周围性为主
 - C. 意识障碍及颅内高压表现
 - D. 强直性瘫痪
 - E. 脑膜刺激征及病理征阳性
104. 下列符合药物治疗的道德要求的是
- A. 对症下药、合理配伍
 - B. 联合用药、尽量周全
 - C. 知情同意、免担风险
 - D. 灵活用药、观察疗效
 - E. 少用药物、减少费用
105. 医生在器官移植问题上的道德责任，错误的是
- A. 对活体的捐献，要保证供者的利他动机
 - B. 杜绝任何商业目的的器官移植活动
 - C. 对尸体捐献需要有亲属签订的知情同意书
 - D. 对器官分配应遵循医学与社会标准
 - E. 医生在被抢救的患者病故后，可立即摘取器官
106. 下述内容不属于临床诊疗道德原则的是
- A. 知情同意原则
 - B. 身心统一原则
 - C. 最优化原则
 - D. 保密原则
 - E. 生命价值原则
107. 卫生法的概念是指
- A. 国家立法机关颁布的卫生法律
 - B. 国家行政机关颁布的卫生法规
 - C. 国务院卫生行政部门颁布的规章
 - D. 卫生行政部门颁布的技术规范
 - E. 全部上述保障人体健康的法律规范的总和
108. 下列哪部法律属于卫生法范畴
- A. 《中华人民共和国商标法》
 - B. 《中华人民共和国专利法》
 - C. 《中华人民共和国著作权法》
 - D. 《中华人民共和国药品管理法》
 - E. 《中华人民共和国合同法》
109. 医疗机构执业医师违反卫生行政管理的法律、法规应承担的行政责任中不属于“行政处罚”的是
- A. 警告
 - B. 罚款
 - C. 降职
 - D. 吊销执业医师证书
 - E. 没收违法所得

A2 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

110. 患者张某，男，67 岁，慢性肺心病史 6 年，因呼吸道感染原有症状、体征加重，因睡眠障碍服用镇静剂 3 天后，出现精神恍惚，烦躁不安，可能出现的并发症是

- A. 消化道出血
- B. 心律失常
- C. 肺性脑病
- D. 休克早期
- E. 酸碱平衡失调

111. 女性患者，26 岁，支气管哮喘病史 13 年，今晨上班途中因吸入汽车尾气突然发作，以喘憋、呼吸困难为主，伴心悸、乏力，遂急诊，为控制发作应首选的药物是

- A. 沙丁胺醇气雾剂
- B. 溴化异丙托品气雾剂
- C. 泼尼松口服
- D. 色甘酸钠
- E. 茶碱缓释片

112. 男性患者，23 岁，咳嗽、流涕 3 天后出现尿少、浮肿、恶心，血压 160/100mmHg，血红蛋白为 62g/L，血尿素氮 20mmol/L，血肌酐 810 μ mol/L，血钙 1.3mmol/L，尿常规：蛋白(++)，红细胞(+++)，最可能的诊断是

- A. 急性肾小球肾炎
- B. 急性肾炎
- C. 肾病综合征
- D. 高血压肾病
- E. 慢性肾炎急性发作

113. 男性患者，45 岁，不规则发热 3 个月，伴右下腹胀痛。颈部可见蜘蛛痣，肝肋下 4cm，质硬，稍触痛，肝表面可闻及血管杂音，脾肋下 1.5cm。外周血白细胞 $5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 60%，AFP800 μ g/L，HBsAg 阳性，最可能的诊断是

- A. 肝脓肿
- B. 肝硬化后肝癌
- C. 慢性活动性肝炎
- D. 肝炎后肝硬化
- E. 肝豆状核变性

A3 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

患者，女，72 岁。近 1 周精神不振，不吃不语，一直卧床睡觉。查体：体温 35℃，呼吸 12 次/分，心率 45 次/分，血压 100/70mmHg。嗜睡，皮肤苍白，颜面虚浮，心律齐，呼吸音清，未闻及啰音，腹平软，肝脾未扪及。血清 TSH 增高，TT₄、FT₄均降低。

114. 此患者诊断首先考虑为

- A. 低血糖症

- B. 黏液性水肿昏迷
 - C. 酮症酸中毒
 - D. 高渗性昏迷
 - E. 低钾血症
115. 治疗措施首选
- A. 静脉注射左甲状腺素
 - B. 静脉滴注氢化可的松
 - C. 静脉滴注左旋氧氟沙星
 - D. 静脉滴注 5%葡萄糖生理盐水
 - E. 静脉滴注氯化钾注射液
116. 下列哪项可有助于鉴别诊断
- A. FT₄水平的测定
 - B. TSH 水平的测定
 - C. TT₃水平的测定
 - D. TRH 兴奋试验
 - E. 血清 T₃水平的测定

B1 型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(117~118 题共用备选答案)

- A. 寄生虫
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 广泛皮炎
- D. 风湿热
- E. 白血病

117. 属感染性发热的疾病是

118. 属无菌坏死物质吸收而发热的疾病是

(119~120 题共用备选答案)

- A. COPD
- B. 胸膜广泛粘连致严重胸廓畸形
- C. 原发性肺动脉高压
- D. 重症肌无力
- E. 胸廓改形术后

119. 慢性肺心病病因中属支气管、肺疾病的是

120. 慢性肺心病病因中属肺血管疾病的是

(121~122 题共用备选答案)

- A. 病毒性肝炎
- B. 慢性酒精中毒
- C. 非酒精性脂肪性肝病
- D. 胆汁淤积
- E. 循环障碍

121. 我国肝硬化最常见的病因是

122. 欧美国家肝硬化最常见的病因是

(123~124 题共用备选答案)

- A. 杯状病毒
- B. 嗜肝 DNA 病毒
- C. 缺陷病毒
- D. 黄病毒
- E. 微小 RNA 病毒

123. 乙肝病毒属

124. 丙肝病毒属

(125~126 共用备选答案)

- A. 高热、咳嗽、呼吸困难
- B. 高热、腹痛、脓血便
- C. 高热、抽搐、意识障碍
- D. 高热、头痛、皮下出血
- E. 高热、表情淡漠、相对缓脉

125. 流脑的表现是

126. 人禽流感的表现是

(127~128 题共用备选答案)

- A. 无伤原则
- B. 行善原则
- C. 公正原则
- D. 尊重原则
- E. 平等原则

127. 在医疗服务中一视同仁，公平、正直地对待每一位患者，体现的是

128. 在诊治、护理过程中，不使患者受到身心损害，体现的是

(129~130 题共用备选答案)

- A. 卫生法律
- B. 卫生行政法规
- C. 地方卫生法规
- D. 基本法律
- E. 卫生规章

129. 全国人民代表大会制定颁布的是

130. 全国人民代表大会常委会制定颁布的是

(131~132 题共用备选答案)

- A. 肝阳化风证
- B. 阴虚动风证
- C. 血虚生风证
- D. 热极生风证
- E. 肝阳上亢证

131. 可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是

132. 可见眩晕肢体震颤，面白无华症状的是

(133~134 题共用备选答案)

- A. 胆郁痰扰证
- B. 痰蒙心神证

C. 热扰心神证

D. 痰瘀入络证

E. 痰火扰神证

133. 患者表情淡漠，神识痴呆，精神抑郁，苔腻脉滑，其辨证为

134. 患者发热口渴，胸闷气粗，心烦失眠甚则神昏谵语，其辨证为

(135~136 题共用备选答案)

A. 痿软舌

B. 强硬舌

C. 吐弄舌

D. 短缩舌

E. 胖嫩舌

135. 热盛伤津动风，可见

136. 心脾有热，可见

(137~138 题共用备选答案)

A. 面色苍白，口唇青紫

B. 头晕眼花，气短疲乏

C. 脘腹坠胀，便意频频，久泻脱肛

D. 神疲乏力，气短，汗出不止，劳累后加重

E. 全身瘫痪，神识朦胧

137. 气不固证的临床表现为

138. 气陷证的临床表现为

(139~140 题共用备选答案)

A. 咳嗽痰多，胸闷

B. 神昏，喉中痰鸣

C. 形体肥胖

D. 脘痞纳呆

E. 肌肤见圆滑包块

139. 痰泛于肌肤的临床表现是

140. 痰浊中阻，胃失和降的临床表现是

(141~142 题共用备选答案)

A. 脾不统血证

B. 脾虚气陷证

C. 寒湿困脾证

D. 脾阳虚证

E. 脾气虚证

141. 症见神疲乏力，气短懒言，脘腹坠胀，小便混如米泔，其证候是

142. 症见脘腹胀闷，泛恶欲呕，腹痛便溏身重，其证候是

(143~144 题共用备选答案)

A. 真寒假热

B. 真热假寒

C. 真实假虚

D. 真虚假实

E. 不虚不实

143. 热结肠胃，痰食壅积，以致经脉阻滞，气血不能畅达，致倦怠懒言，身羸瘦，脉细，此

为

144. 脏腑虚衰，气血不足，运化无力，致腹部胀满，呼吸喘促，二便闭涩等，此为
(145~146 题共用备选答案)

- A. 肝阳化风证
- B. 阴虚动风证
- C. 血虚生风证
- D. 热极生风证
- E. 肝阳上亢证

145. 可见步履不稳，眩晕欲仆症状的是

146. 可见眩晕肢体震颤，面白无华症状的是
(147~148 题共用备选答案)

- A. 肺肾气虚
- B. 肺气虚
- C. 脾肺气虚
- D. 心肺气虚
- E. 肾气不固

147. 久病咳喘，乏力少气，呼多吸少，自汗耳鸣，舌淡脉弱。其证候是

148. 久病咳喘，胸闷心悸，乏力少气，自汗声低，舌淡脉弱。其证候是
(149~150 题共用备选答案)

- A. 泽泻
- B. 滑石
- C. 茵陈
- D. 萆薢
- E. 地肤子

149. 具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

150. 具有利湿退黄，解毒疗疮功效的药物是

参考答案

2 卷中医助理第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	C	D	D	C	E	D	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	B	D	C	B	D	B	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	A	B	D	C	A	B	D	C

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	A	B	B	A	D	D	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	E	A	E	A	E	D	C	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	C	E	B	A	A	B	B	D	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	B	C	C	B	C	B	A	D	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	B	A	B	C	B	E	E	E	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	E	A	E	C	E	C	B	C	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	B	C	E	D	C	E	E	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
E	C	B	E	B	E	A	C	A	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	E	A	B	A	A	A	C	D	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	B	C	A	A	D	A	C	E	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	B	D	E	D	C	D	A	A	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	B	C	A	E	D	A	C	A

2 卷中医助理第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	D	C	D	A	D	C	E	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	C	E	A	C	B	C	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	D	E	D	B	D	B	C	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	B	C	E	D	E	A	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50C
E	A	A	E	D	A	D	D	A	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	B	B	A	A	B	C	C	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

A	E	A	D	B	E	D	E	E	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	A	A	C	A	A	D	B	C	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	B	D	B	E	B	D	C	E	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	C	B	E	D	E	D	A	C	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	D	B	A	E	B	E	D	C	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	A	B	B	A	D	A	E	A	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	B	B	D	D	A	C	A	D	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	C	B	E	D1	C	D	C	E	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	C	C	D	A	C	A	D	D	C