

2024年 乡村全科执业助理医师 第二单元 核心押题卷

1. 下列表述中不属于症的是

- A. 胸闷
- B. 恶寒
- C. 口苦
- D. 发热
- E. 消渴

参考答案: E

参考解析: “症”，是指疾病的单个症状，以及舌象、脉象等体征。如发热、畏寒、口苦、胸闷、便溏、苔黄、脉弦等。“证”，即证候，是疾病过程中某一阶段或某一类型的病理概括，一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成。

2. 下列各项中，属于阴的是

- A. 脉象洪大
- B. 面色鲜明
- C. 迟脉
- D. 脉象滑数
- E. 声高

参考答案: C

参考解析: 相对静止的、内守的、下降的、凝聚的、寒冷的、晦暗的、抑制的都属于阴。

3. 阳气暴脱病人的面色是

- A. 面白无华
- B. 面色淡白
- C. 面色苍白
- D. 面色青紫
- E. 面色青黑

参考答案: C

参考解析: 患者面色发白，多为气虚血少，或阳衰寒盛。面色淡白无华，唇舌色淡者，多属血虚证或失血证。面色㿠白者，多属阳虚证；若㿠白虛浮，则多属阳虛水泛。面色苍白者，多属亡阳、气血暴脱或阴寒内盛。

4. 下列各项中，不属于病色表现的是

- A. 面色淡青
- B. 面色淡黄
- C. 面色淡白
- D. 面色红赤
- E. 红黄隐隐

参考答案: E

参考解析: (补充)选项 E 属于我国正常人的面色特点。我国正常人的面色应是红黄隐隐、明润含蓄，是有胃气和有神气的表现。有胃气即隐约微黄、含蓄不露；有神气即光明润泽、容光焕发。故根据题干要求，此题的正确选项是 E。

5. 寒痰停肺咳嗽的特点是

- A. 咳声轻清低微
- B. 咳声重浊沉闷
- C. 咳声不扬痰黄稠

D. 阵发性痉挛性咳嗽

E. 干咳无痰或少痰

参考答案: B

参考解析: 咳声重浊沉闷, 多属实证, 是寒痰湿浊停聚于肺, 肺失肃降所致。

6. 大便泄泻臭如败卵, 多为

A. 伤食

B. 肝失疏泄

C. 阴血亏虚

D. 脾胃虚寒

E. 肠中郁热

参考答案: A

参考解析: 大便酸臭难闻者, 多为肠中郁热。大便溏泄而腥者, 多为脾胃虚寒。大便泄泻臭如败卵, 或夹未消化食物, 矢气酸臭者, 多为伤食。

7. 午后热甚, 身热不扬, 兼头身困重, 胸脘满闷, 舌苔黄腻等, 其临床意义是

A. 阳明腑实

B. 阴虚火旺

C. 湿温潮热

D. 气虚发热

E. 半表半里

参考答案: C

参考解析: 午后热甚, 身热不扬(肌肤初扪之不甚热, 但扪之稍久即感灼手), 兼见头身困重, 胸脘满闷, 舌苔黄腻等, 称为湿温潮热, 属湿温病。

8. 阳气精血亏虚、脏腑经脉失养所致疼痛的临床表现是

A. 隐隐作痛

B. 痛如刀绞

C. 胀满疼痛

D. 游走窜痛

E. 刺痛固定

参考答案: A

参考解析: 隐痛的临床意义: 多因阳气精血亏虚, 脏腑经脉失养所致。常见于头、胸、脘、腹等部位。

9. 往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠的脉象是

A. 沉脉

B. 尺脉

C. 滑脉

D. 弦脉

E. 细脉

参考答案: C

参考解析: 滑脉: 往来流利, 应指圆滑, 如盘走珠。

10. 下列关于表证特点的说法错误的是

A. 必发展为里证

B. 起病急

C. 病位浅

D. 病程短

E. 感受外邪所致

参考答案: A

参考解析: 表证的症状有怕冷、发热、头痛、身痛、鼻塞、无汗、脉浮等。一般说来，表证又可分为表寒证、表热证、其中，表寒证有怕冷、发热、无汗、鼻塞或流清鼻涕、口不渴、舌苔薄白；表热证有发热、怕寒、有汗或无汗、口渴、咽红或咽喉肿痛、舌尖红等。治疗表寒证时应使用辛温解表中药；治疗表热证时应使用辛凉解表中药。表证可能发展为里证，但不是一定的。故本题选 A。

11. 下列症状哪项是虚证的临床表现.

- A. 大便秘结
- B. 五心烦热
- C. 小便不通
- D. 痰涎壅盛
- E. 腹痛拒按

参考答案: B

参考解析: 阴虚证常见临床表现：头晕耳鸣，失眠多梦，健忘，腰膝酸软，性欲亢奋，遗精，女子经少或闭经；或崩漏，形体消瘦，咽干口燥，潮热，五心烦热，盗汗，颧红；舌红少苔或无苔，脉细数。故本题选 B。

12. 下列阳虚证临床表现错误的是

- A. 舌红少苔
- B. 口淡不渴
- C. 畏冷肢凉
- D. 小便清长
- E. 脉沉迟无力

参考答案: A

参考解析: 阳虚证临床表现为畏寒肢冷，口淡不渴，或渴喜热饮，自汗，小便清长，或尿少浮肿，大便稀溏，面色㿠白，舌淡胖嫩，苔白滑，脉沉迟无力。可兼有神疲，乏力，气短等表现。故本题选 A。

13. 患者视物模糊或夜盲症的临床意义是

- A. 肝阳上亢
- B. 肝阳虚
- C. 肝郁气滞
- D. 肝阴虚
- E. 肝血虚

参考答案: E

参考解析: 肝血虚证临床表现：头晕眼花，视力减退或夜盲，或肢体麻木，关节拘急，手足震颤，肌肉瞤动，或为妇女月经量少、色淡，甚则闭经，爪甲不荣，面白无华，舌淡，脉细。

14. 风水相搏证的水肿，先出现的部位为

- A. 腰部
- B. 背部
- C. 面部
- D. 双足
- E. 腿部

参考答案: C

参考解析: 风水相搏证的水肿为外感引起，以面部先出现。风水相搏证的临床表现：眼睑头

面先肿，继而遍及全身，上半身肿甚，来势迅速，皮肤薄而发亮，小便短少，或见恶寒重发热轻，无汗，舌苔薄白，脉浮紧。或见发热重恶寒轻，咽喉肿痛，舌苔薄黄，脉浮数。发病特点：发病急，病程短。临床表现：眼睑、颜面先肿，迅速遍及全身，皮薄光亮，小便短少，伴咽喉肿痛、咳嗽及表证。

15. 胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是

- A. 4 寸
- B. 6 寸
- C. 8 寸
- D. 9 寸
- E. 12 寸

参考答案：C

参考解析：胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是：8 寸。

16. 风寒和风热的辨证依据，下列哪项是错误的

- A. 恶寒、发热的轻重
- B. 渴与不渴
- C. 舌苔黄与白
- D. 脉浮与不浮
- E. 咽喉红肿疼痛与否

参考答案：D

参考解析：风寒证和风热证都可见脉浮，因此不能作为辨证鉴别依据。

17. 拔罐治疗风寒感冒，选取的穴位有

- A. 成池、大椎、肺俞
- B. 大椎、大抒、肺俞
- C. 中府、足三里
- D. 风池、大椎、大抒
- E. 三阴交、风池

参考答案：B

参考解析：拔罐法在颈椎、胸椎附近选择大椎、大抒、肺俞拔罐，拔罐后留罐 10~15 分钟起罐，或用闪罐法。故本题选 B。

18. 症见咳嗽气粗，或喉中有痰声，痰多质黏腻或黄稠，咯吐不爽，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。应辨证为

- A. 肺阴亏耗证
- B. 风燥伤肺证
- C. 肝火犯肺证
- D. 痰湿蕴肺证
- E. 痰热闭肺证

参考答案：E

参考解析：痰热闭肺证多由外感热邪或外感风寒，郁而化热，热灼肺津，炼液成痰，痰与热结，壅阻肺络所致。常见有咳嗽和气喘，其痰稠黏、色黄，甚至带血，咳时不爽可引起胸痛以及胸肋有胀满感，还可能出现身热面赤。舌质红，舌苔多黄腻，脉滑数或指纹青紫。故本题选 E。

19. 胸痹患者，胸闷如窒而痛，气短喘促，肢体沉重，体胖痰多，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A. 饮邪上犯
- B. 痰浊胸痹

C. 心血瘀阻

D. 寒凝气滞

E. 气虚血瘀

参考答案: B

参考解析: 肢体沉重说明体内有湿, 体胖痰多, 说明有痰, 舌苔浊腻, 说明有痰浊壅阻。痰浊胸痹的主要症状是: 心胸室闷, 气短喘促, 多形体肥胖, 肢体沉重, 腹痞, 痰多口黏; 苔浊腻, 脉滑。故本题选 B。

20. 不寐的发病部位主要在

A. 脑

B. 心

C. 肝

D. 肺

E. 肾

参考答案: B

参考解析: 不寐, 是以经常不能获得正常睡眠为特征的一类病证。多为情志所伤、饮食不节、劳逸失调、久病体虚等因素引起脏腑机能紊乱, 气血失和, 阴阳失调, 阳不入阴而发病。病位主要在心, 涉及肝胆脾胃肾, 病性有虚有实, 且虚多实少。故本题选 B。

21. 下列关于中风的基本病机说法正确的是

A. 痰火上逆, 扰动清窍

B. 经络阻滞, 脑窍失养

C. 阴阳失调, 神机逆乱

D. 脑髓空虚, 清窍失养

E. 阴阳失调, 气血逆乱, 上犯于脑

参考答案: E

参考解析: 中风病是由于正气亏虚, 饮食、情志、劳倦内伤等引起气血逆乱, 产生风、火、痰、瘀, 导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外为基本病机, 以突然昏仆、半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩或不语、偏身麻木为主要临床表现的病证。故本题选 E。

22. 中风与厥证的不同点是

A. 是否有肢厥

B. 是否有牙关紧闭

C. 是否有后遗症

D. 是否有神昏

E. 是否有口吐涎沫

参考答案: C

参考解析: 中风多具有突然昏仆, 不省人事, 半身不遂, 偏身麻木, 口眼歪斜, 言语謇涩等特定的临床表现。轻症仅见眩晕、偏身麻木、口眼歪斜、半身不遂等。厥证也有突然昏仆、不省人事之表现, 一般而言, 厥证神昏时间短暂, 发作时常伴有四肢逆冷, 一般移时可自行苏醒, 醒后无半身不遂、口眼歪斜、言语不利等表现。所以, 是否有后遗症是中风与厥证最主要的鉴别点。故本题选 C。

23. 风寒头痛选用的代表方是

A. 银翘散

B. 羚角钩藤饮

C. 川芎茶调散

D. 天麻钩藤颗粒

E. 养血清脑颗粒

参考答案: C

参考解析: 风寒头痛。主要症状: 头痛连及项背, 常有拘急收紧感, 或伴恶风畏寒, 遇风尤甚, 舌淡红, 苔薄, 脉浮紧。治法: 疏风散寒止痛。常用中成药: 川芎茶调散。

24. 肝阳上亢型眩晕的治疗原则主要是

- A. 平肝潜阳, 清火息风
- B. 滋养肝肾, 补气行血
- C. 清肝泻火, 降逆化痰
- D. 补虚泻实, 调整阴阳
- E. 以上均不是

参考答案: A

参考解析: 肝阳上亢型眩晕法宜平肝潜阳, 清火息风。故本题选 A。

25. 下列哪一项不是瘀血阻络胁痛的特点

- A. 胁肋刺痛
- B. 胸闷腹胀
- C. 痛有定处
- D. 入夜痛甚
- E. 舌质紫暗

参考答案: B

参考解析: 胁痛之瘀血阻络证。证候主症: 胁肋刺痛, 痛有定处, 痛处拒按, 入夜痛甚, 胁肋下或见有癥块, 舌质紫暗, 脉沉涩。

26. 患者胃痛暴作, 恶寒喜暖, 得温痛减, 遇寒加重, 口淡不渴, 或喜热饮, 舌淡苔薄白, 脉弦紧。其证候是

- A. 寒邪客胃
- B. 饮食伤胃
- C. 肝气犯胃
- D. 湿热中阻
- E. 瘀血停胃

参考答案: A

参考解析: 胃痛-寒邪客胃主要证候: 胃痛暴作, 恶寒喜暖, 得温痛减, 遇寒加剧, 口淡不渴。苔薄白, 脉弦紧。

27. 呕吐之食滞胃脘证治疗方药为

- A. 藿香正气丸
- B. 左金丸
- C. 香砂养胃丸
- D. 保和丸
- E. 麻仁润肠丸

参考答案: D

参考解析: 食滞胃脘证治疗用保和丸。故本题选 D。

28. 关于麻子仁丸主治正确的是

- A. 热秘
- B. 气虚秘
- C. 冷秘
- D. 气秘

E. 阴虚秘

参考答案: A

参考解析: 热秘主症: 大便干结, 小便短赤, 身热面赤, 口干口臭, 腹胀而痛, 舌红苔黄燥, 脉滑数。治法: 泻热导滞, 润肠通便。中成药: 麻子仁丸。故本题选 A。

29. 治疗内伤发热之阴虚发热证, 最佳选方为

- A. 一贯煎
- B. 麦味地黄丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 当归六黄丸
- E. 左归丸

参考答案: C

参考解析: 内伤发热之阴虚发热证。主要症状: 午后潮热, 或夜间发热, 不欲近衣, 手足心热, 烦躁, 少寐多梦, 盗汗, 口干咽燥。舌质红, 或有裂纹, 苔少甚至无苔, 脉细数。治法: 滋阴清热。常用中成药: 知柏地黄丸。

30. 针灸治疗腰痛, 寒湿腰痛加

- A. 肾俞
- B. 膈俞
- C. 昆仑
- D. 腰阳关
- E. 腰夹脊

参考答案: D

参考解析: 针灸治疗腰痛。主穴: 阿是穴、大肠俞、委中。配穴: 寒湿腰痛加腰阳关; 瘀血腰痛加膈俞; 肾虚腰痛加肾俞。腰脊中线痛加腰夹脊、后溪; 腰脊两侧痛加志室、昆仑; 腰骶部痛加次髎、腰俞; 腰眼部痛明显加腰眼。

31. 患者腰痛如刺, 痛有定处, 痛处拒按, 日轻夜重, 轻者俯仰不便, 重则不能转侧, 舌质暗紫, 或有瘀斑, 脉涩。其治法是

- A. 散寒行湿, 温经通络
- B. 清热利湿, 舒筋止痛
- C. 活血化瘀, 通络止痛
- D. 温补肾阳, 补虚止痛
- E. 滋补肾阴, 补虚止痛

参考答案: B

参考解析: 瘀血腰痛主要症状: 腰痛如刺, 痛有定处, 痛处拒按, 日轻夜重, 轻者俯仰不便, 重则不能转侧。舌质暗紫, 或有瘀斑, 脉涩。

32. 治疗行痹, 应首选

- A. 乌头汤
- B. 薏苡仁汤
- C. 九味羌活丸
- D. 宣痹汤
- E. 健痹颗粒

参考答案: C

参考解析: 行痹。主要症状: 肢体关节、肌肉疼痛酸楚, 屈伸不利, 可涉及肢体多个关节, 疼痛呈游走性, 初起可见有恶风、发热等表证。苔薄白, 脉浮或浮缓。治法: 祛风通络, 散寒除湿。常用中成药: 九味羌活丸、祖师麻片。

33. 发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病是

- A. 痰
- B. 疔
- C. 痿
- D. 有头疽
- E. 无头疽

参考答案: C

参考解析: 痿是指发生在肌肤浅表部位、范围较小的急性化脓性疾病。

34. 湿疮根据发病部位不同，其名称也不同，不包括

- A. 脐疮
- B. 肾囊风
- C. 四弯风
- D. 乳头风
- E. 粟疮

参考答案: E

参考解析: 根据发病部位的不同，其名称也不同，如发于耳部者，称为旋耳疮；发于阴囊部者，称为肾囊风；发于脐部者，称为脐疮；发于肘、膝弯曲部者，称为四弯风；发于乳头者，称为乳头风。根据皮损形态不同，名称各异，如浸淫全身，滋水较多者，称为浸淫疮；以丘疹为主者，称为血风疮或粟疮。

35. 寒凝血瘀型痛经的临床特点是

- A. 经行小腹绵绵作痛，小腹空坠喜按揉
- B. 经后小腹隐隐作痛，腰骶酸胀，头晕耳鸣
- C. 经期小腹冷痛拒按，得热痛减，行经量少，色暗有块
- D. 经后小腹冷痛喜按，得热则舒
- E. 经行小腹胀痛拒按，经色紫黯有块，血块排出后痛减

参考答案: C

参考解析: 痛经寒凝血瘀证。主要症状：经前或经期小腹冷痛拒按，得热痛减；月经或有推后，量少，经色暗而有瘀块；面色青白，肢冷畏寒；舌暗，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。常用中成药：少腹逐瘀颗粒、痛经丸。

36. 肝郁型月经先后无定期的主要证候中，错误的是

- A. 月经周期或先或后
- B. 经量或多或少
- C. 经行不畅，色黯有块
- D. 胸胁、乳房胀痛
- E. 小腹绞痛，拒按

参考答案: E

参考解析: 月经先后无定期肝郁证。主要症状：经来先后无定，经量或多或少，色暗红或紫红，或有血块，或经行不畅；胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，嗳气食少；苔薄白或薄黄，脉弦。治法：疏肝理气调经。常用中成药：逍遥丸。

37. 下列除哪项以外都属于带下病

- A. 带下量多，色黄质稠，有臭气
- B. 经行之前，带下量多，色白，无臭气
- C. 带下清冷，量多，质稀薄，终日淋漓不断
- D. 带下量多，色黄绿如脓，气味秽臭

E. 赤白带下，量多，质稠，气味秽臭

参考答案：B

参考解析：带下量多，色白或淡黄，质清稀，质稀薄，无臭味，绵绵不断者，多属脾虚湿困；带下量多，色质清稀如水，无臭味，有冷感者属肾阳虚；带下量多或不甚多，色黄或赤白相兼，质稠或有臭气为阴虚挟湿；带下量多色黄或黄绿，质脓性黏稠，有臭气，或如泡沫状，或豆渣状，为湿热下注；带下甚多，色黄绿如脓，或浑浊如米泔，或赤白相兼，或五色杂下，质稠，恶臭难闻，属湿毒热结重证。带下量少伴有阴道干涩或性交痛等症状者，多少肝肾亏损。故本题选B。

38. 肺炎喘嗽痰热闭肺证的临床表现为

- A. 恶寒发热，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀
- B. 发热恶风，咳嗽气急，痰黄而黏，口渴咽红
- C. 发热烦躁，咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出
- D. 低热盗汗，干咳无痰，面色潮红，舌红少苔
- E. 面白少华，动则汗出，咳嗽无力，纳差便溏

参考答案：C

参考解析：小儿肺炎喘嗽痰热闭肺。主要症状：咳嗽痰多，色黄黏稠，难以咯出，甚则喉间痰鸣，或伴发热口渴，烦躁不安，小便黄少，大便干结。舌质红，苔黄腻，脉滑数或指纹青紫。治法：清热化痰，宣肺止咳。常用中成药：清金化痰丸。

39. 小儿湿热泄泻证的特点是

- A. 大便稀烂夹乳片，气味酸臭
- B. 大便溏烂，食后作泻，气味不臭
- C. 大便稀烂，完谷不化，气味臭如败卵
- D. 大便呈蛋花汤样，气味臭秽
- E. 大便清稀夹有泡沫，臭气不甚

参考答案：D

参考解析：小儿湿热泄泻证大便泻下急迫，量多次频，呈黄褐稀水或蛋花汤样，或夹少许黏液，气味臭秽，腹痛阵作，发热烦躁，口渴，肢倦乏力，小便短黄，肛门红赤。故选D。

40. 与面瘫关系密切的经穴是

- A. 足太阳、足阳明经穴
- B. 手阳明、足太阳经穴
- C. 手足阳明经穴
- D. 足厥阴、手阳明经穴
- E. 手少阳、足太阳经穴

参考答案：C

参考解析：面瘫治疗以局部穴和手足阳明经穴为主。

41. 漏肩风的治法是

- A. 祛风寒湿，温经通脉
- B. 祛风止痛，散寒除湿
- C. 散寒止痛，通经活络
- D. 祛湿止痛，温经散寒
- E. 通经活络，祛风止痛

参考答案：E

参考解析：漏肩风治法：通经活络，祛风止痛。以局部阿是穴及手阳明、手少阳、手太阳经穴为主。主穴：肩前、肩髃、肩髎、肩贞、阿是穴、曲池、阳陵泉。

42. 下列不宜与西药氢氧化铝凝胶、氨茶碱同时服用的是

- A. 黄连上清丸
- B. 麻杏止咳露
- C. 防风通圣丸
- D. 六味地黄丸
- E. 止咳定喘丸

参考答案: D

参考解析: 六味地黄丸与西药氢氧化铝凝胶、氨茶碱、碳酸氢钠、复方氢氧化铝片(胃舒平)不宜同时服用, 因后四种西药为碱性药物, 同时服用则会发生酸碱中和, 使中药、西药均失去治疗作用。

43. 采用直接吞服法的制剂是

- A. 蜜丸剂
- B. 滴丸剂
- C. 糊丸剂
- D. 糖浆剂
- E. 散剂

参考答案: D

参考解析: 中成药中的露剂、合剂、乳剂、酒剂、酊剂、糖浆剂、流浸膏剂等液体制剂, 均可采用直接吞服的服用方法。

44. 风热感冒患者宜选用的中成药是

- A. 桂枝合剂
- B. 正柴胡饮颗粒
- C. 双黄连合剂
- D. 葛根芩连丸
- E. 午时茶颗粒

参考答案: C

参考解析: 双黄连合剂【功效主治】疏风解表, 清热解毒。用于外感风热所致的感冒, 症见发热、咳嗽、咽痛。

45. 下列中成药与西药降压药合用, 易降低降压药作用的是

- A. 防风通圣丸
- B. 天王补心丸
- C. 杞菊地黄丸
- D. 消渴丸
- E. 桂枝茯苓丸

参考答案: A

参考解析: 防风通圣丸的组成中含有麻黄, 含麻黄碱的中成药与降压药不宜合用, 因为麻黄碱可使血管收缩, 可能会降低降压药的作用。

46. 用于肠胃积热, 胸腹胀满; 大便秘结的中成药是

- A. 补中益气丸
- B. 四神丸
- C. 保和丸
- D. 麻仁润肠丸
- E. 气滞胃痛颗粒

参考答案: D

参考解析：麻仁润肠丸【功效主治】润肠通便。用于肠胃积热，胸腹胀满，大便秘结。

47. 明目地黄丸中的君药是

- A. 熟地黄
- B. 牡丹皮
- C. 茯苓
- D. 枸杞子
- E. 当归

参考答案：A

参考解析：方中熟地黄质润甘补微温，入肝肾经，善滋阴养血、填精固本，精血充则神旺，神旺则目睛明，故为君药。故选 A。

48. 跌打损伤，闪腰岔气，筋伤骨折，瘀血肿痛，宜选用的中成药

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 大活络丹
- D. 连翘败毒丸
- E. 京万红软膏

参考答案：B

参考解析：跌打丸【功效主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，筋断骨折，瘀血肿痛，闪腰岔气。

49. 具有清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛功能的常用中成药是

- A. 固经丸
- B. 花红颗粒
- C. 消糜栓
- D. 妇炎平胶囊
- E. 妇科千金片

参考答案：B

参考解析：花红颗粒具有清热解毒，燥湿止痛，祛瘀止痛的作用。

50. 乌鸡白凤丸主治的病证是

- A. 气滞血瘀的痛经
- B. 肝肾两虚的闭经
- C. 血热妄行的崩漏
- D. 脾肾两虚的带下
- E. 气血两虚的月经不调

参考答案：E

参考解析：乌鸡白凤丸主治补气养血，调经止带。用于气血两虚，身体瘦弱，腰膝酸软，月经不调，崩漏带下。故选 E。

51. 按照医学心理学的特点，在人类疾病的诊疗过程中不需要强调的是

- A. 疾病过程中心身相关性
- B. 认知评价对疾病的影响
- C. 医院科学管理的迫切性
- D. 情绪对健康的迫切影响
- E. 人格特征对健康的作用

参考答案：C

参考解析：医学心理学的基本观点 1. 心身统一的观点；2. 社会对个体影响的观点；3. 认知

评价的观点；4. 主动适应与调节的观点；5. 情绪因素作用的观点；6. 人格特征作用的观点

52. 医学心理学的基本观点不包括

- A. 心身统一的观点
- B. 主动适应与调节的观点
- C. 认知评价的观点
- D. 情绪影响的观点
- E. 道德约束的观点

参考答案：E

参考解析：①我国医学心理学工作者根据多年的实践和研究，概括出6个基本观点：心身统一的观点、社会对个体影响的观点、认知评价的观点、主动适应和调节的观点、情绪因素作用的观点、个性特征作用的观点。②医学心理学的基本观点不包括道德约束的观点（E），故本题选E。

53. 在偏僻乡村中，有些村民患病后会根据祖辈传下来的经验去采集一些草药服用。从“医学模式”的角度，这种医疗行为属于

- A. 神灵主义医学模式
- B. 自然哲学医学模式
- C. 机械论医学模式
- D. 生物医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

参考答案：B

参考解析：自然哲学医学模式：随着社会生产的发展，人类逐渐认识自然现象，并努力用自然主义的观点解释肿瘤的病因病机，且在使用中积累了大量有药理作用的动植物、矿物治疗疾病的经验，这是经验主义的医学模式——自然哲学的医学模式。故选B。

54. 医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的患者，应当依法采取的措施是

- A. 立即抢救
- B. 及时转诊
- C. 继续观察
- D. 提请上级医院派人会诊
- E. 请示当地卫生局依法处理

参考答案：B

参考解析：对于超出自己医疗服务范围或者限于医疗条件和技术水平不能诊治的患者，应当如实向患者或其家属介绍病情，并应及时转诊。

55. 健康教育和健康促进的伦理要求不包括

- A. 履行义务，参加充分利用一切机会和场合积极主动的开展健康教育
- B. 积极参加有利于健康促进的公共政策的制定、支持性环境的创建和卫生保健体系的建立
- C. 深入农村、社区，将健康教育与健康促进工作渗透在初级卫生保健工作中
- D. 不断完善自我，以科学态度和群众喜闻乐见的形式开展健康教育和健康促进工作
- E. 依法开展卫生监督和管理，从源头控制职业性损害，对劳动者的安全和健康负责

参考答案：E

参考解析：E选项属于职业性损害防控的伦理要求。

56. 《医疗废物管理条例》规定，对于医疗卫生机构产生的污水、传染病患者或者疑似传染病患者的排泄物，下列处理正确的是

- A. 直接排入污水处理系统
- B. 交医疗废物集中处置单位处置

- C. 收集、运送至暂时贮存地点
- D. 按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后仍然需要集中处理
- E. 按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统

参考答案：E

参考解析：《医疗废物管理条例》规定，医疗卫生机构产生的污水、传染病患者或者疑似传染病患者的排泄物，应当按照国家规定严格消毒；达到国家规定的排放标准后，方可排入污水处理系统。故本题选 E。

57. 乡村医师使用抗菌药物过程中，以下哪类行为错误
- A. 发热原因不明者，在弄清病原学诊断前，不用抗菌药物
 - B. 尽量避免应用广谱抗菌药物
 - C. 疑为病毒性疾病的使用抗菌药物
 - D. 尽量避免局部应用抗菌药物
 - E. 联合使用抗菌药物，必须有严格的指征

参考答案：C

参考解析：抗菌药物应用过程中需注意：已确定或疑为病毒性疾病的不能使用抗菌药物，抗菌药物对病毒无效。故本题选 C。

58. 《抗菌药物临床应用管理办法》规定，医院以外的其他医疗机构中依法享有处方权的医师、乡村医生和从事处方调剂工作的药师，要经过相关培训、考核。经考核合格的，授予相应的抗菌药物处方权或者抗菌药物调剂资格。负责培训、考核的部门是
- A. 县级以上地方卫生部门培训中心
 - B. 省级以上地方卫生部门培训中心
 - C. 省级以上地方卫生行政部门
 - D. 市级以上地方卫生行政部门
 - E. 县级以上地方卫生行政部门

参考答案：E

参考解析：二级以上医院应当定期对医师和药师进行抗菌药物临床应用知识和规范化管理的培训。医师经本机构培训并考核合格后，方可获得相应的处方权。其他医疗机构依法享有处方权的医师、乡村医生和从事处方调剂工作的药师，由县级以上地方卫生行政部门组织相关培训、考核。经考核合格的，授予相应的抗菌药物处方权或者抗菌药物调剂资格。

59. 全国人大常委会颁发和施行《中华人民共和国人口与计划生育法》的目的是
- A. 实现人口增长
 - B. 增强就业保障
 - C. 减轻社会压力
 - D. 维护社会稳定
 - E. 维护公民的合法权益

参考答案：E

参考解析：2001 年 12 月 29 日第九届全国人大常委会第 25 次会议通过了《中华人民共和国人口与计划生育法》，其目的是为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。故本题选 E。

60. 吴某在被所在医疗机构取消处方权后仍旧为患者开具药品处方，所幸未造成严重后果，此时卫生行政部门可以对吴某进行的处罚是
- A. 给予警告
 - B. 责令暂停执业活动 3 个月
 - C. 罚款

D. 责令暂停执业活动 2 年

E. 吊销执业证书

参考答案: A

参考解析: 未取得处方权的人员及被取消处方权的医师不得开具处方。未造成严重后果, 卫生行政部门可以对吴某进行的处罚是给予警告。

61. 女, 35 岁。在 3 天前的山体滑坡中失去丈夫与孩子, 痛不欲生。参与应急处理的心理治疗师判断该女性的精神状态属于应激反应, 导致其反应的主要应激源所属类型为

A. 职业性应激源

B. 心理性应激源

C. 文化性应激源

D. 社会性应激源

E. 生理性应激源

参考答案: D

参考解析: 由题干知患者 3 天前的山体滑坡中失去丈夫与孩子, 属于社会应激。社会性应激源指生活事件、日常困扰、重大变故和文化冲突等。故选 D。

62. 某患者因夜间突发右上腹绞痛被送至急诊, 诊断为急性胆囊炎。接诊的乡村全科医生因经验不足, 怕担风险, 未做任何处理即要求患者到 10km 外的中心医院就诊, 致使患者耽误了治疗, 胆囊穿孔, 中毒性休克, 后虽经抢救挽救了生命, 但医药费给患者带来了沉重的经济负担。该医生的行为主要违反了下列哪一项医学伦理基本原则

A. 有利原则

B. 行善原则

C. 不伤害原则

D. 尊重原则

E. 公正原则

参考答案: A

参考解析: 医学伦理的基本原则具体包括尊重、有利、不伤害、公正等四个原则。有利原则中提到, 为使医务人员的行为对患者确有助益, 对医务人员有以下要求: ①医务人员的行为应尽可能减轻或解除患者的痛苦; ②对患者利害共存时, 要使行为给患者带来最大的益处和最小的危害; ③在使患者受益的同时而不会给他人带来太大的伤害等。题中该医生的行为没有在患者利害共存时做到“最大的益处、最小的危害”。故本题选 A。

63. 某肝癌患者病情已到晚期, 处于极度痛苦之中, 自认为是肝硬化, 寄希望于治疗。病情进展和疼痛发作时, 多次要求医生给以明确说法和治疗措施。此时, 医生最佳的伦理选择应该是

A. 正确对待保密与讲真话的关系, 经家属同意后告知实情, 重点减轻病痛

B. 恪守保密原则, 继续隐瞒病情, 直至患者病死

C. 遵循病人自主原则, 全面满足病人要求

D. 依据知情同意原则, 应该告知病人所有信息

E. 依据有利原则, 劝导病人试用一些民间土方

参考答案: A

参考解析: 医务人员要尊重患者知情同意权和选择的权利。

64. 王先生为某位疑似甲类传染病患者的密切接触者, 根据《传染病防治法》规定, 医疗机构应对其采取的措施是

A. 对疫点进行卫生处理

B. 强制隔离治疗

C. 在指定场所进行医学观察

D. 在指定场所单独治疗

E. 划定疫点

参考答案: C

参考解析: 对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者,在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

65. 患儿李某,因发热3日到县医院就诊,门诊接诊医生张某检查后发现李某的颊黏膜上有柯氏斑,初步诊断为麻疹。按照传染病防治法的规定,张某应当

A. 嘱患儿家长带李某去市传染病医院就诊

B. 请上级医生会诊,确诊后隔离治疗

C. 向医院领导报告,确诊后由防疫部门进行转送隔离

D. 向医院领导报告,确诊后对李某就地进行隔离

E. 在规定时间内,向当地防疫机构报告

参考答案: E

参考解析:《传染病防治法》规定,医疗机构及其执行职务的人员发现规定的传染病疫情或者发现其他传染病暴发、流行以及突发原因不明的传染病时,应当遵循疫情报告属地管理原则,按照国务院规定的或者国务院卫生行政部门规定的内容、程序、方式和时限报告。

66. 张某的孩子出生后即被医院注射了乙肝疫苗,但在出院的费用清单中发现有乙肝疫苗的收费项目。该医院违反了

A. 医疗事故处理条例

B. 执业医师法

C. 传染病防治法

D. 预防接种制度

E. 强制隔离治疗措施

参考答案: D

参考解析:国家免疫规划项目的预防接种实行免费。医疗机构、疾病预防控制机构与儿童的监护人应当相互配合保证儿童及时接受预防接种。

67. 医生刘某看药品经营能挣钱,便与院领导拉关系,请假离岗搞药品销售,时间近三年,对刘某离岗二年以上的行为,医院应当报告准予注册的卫生行政部门的期限是

A. 离岗满二年的10日内

B. 离岗满二年的15日内

C. 离岗满二年的30日内

D. 离岗满二年后三个月内

E. 离岗近三年的当时

参考答案: C

参考解析: 医师注册后有下列情况之一的,其所在的医疗、预防、保健机构应当在30日内报注册主管部门备案:①调离、退休、退职;②被辞退、开除;③省级以上卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

68. 患者死亡而医患双方当事人不能确定死因或对死因有异议的,具备尸体冻存条件的,尸检应当在患者死亡后多久时间内进行

A. 24小时内

B. 48小时内

C. 3天内

D. 5天内

E. 7 天内

参考答案: E

参考解析: 根据《医疗事故处理条例》规定, 患者死亡, 医患双方当事人不能确定死因或者对死因有异议的, 应当在患者死亡后 48 小时内进行尸检; 具备尸体冻存条件的, 可以延长至 7 日。故本题选 E。

69. 青年李某, 男性, 因包茎到某医院做包皮环切术。在局部注射利多卡因后, 即刻出现休克反应, 经全力抢救无效死亡。经专家会诊认为其死亡是利多卡因变态反应所致, 在临床中极为少见。根据医疗事故处理条例规定, 李某的死亡后果应当属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 因不可抗力造成的不良后果
- E. 因患者体质特殊而发生的医疗意外

参考答案: E

参考解析: 在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的不属于医疗事故。

70. 某人在医院以师承方式进行中医学习已近 5 年, 他想从事中医医疗活动, 需具备的条件是

- A. 证明学习满 5 年即可
- B. 通过医院考核
- C. 患者评议良好
- D. 通过资格考试并注册取得执业证书
- E. 通过市级考核

参考答案: D

参考解析: 以师承方式学习中医或者经多年实践, 医术确有专长的人员, 由至少两名中医医师推荐, 经省、自治区、直辖市人民政府中医药主管部门组织实践技能和效果考核合格后, 即可取得中医医师资格; 按照考核内容进行执业注册后, 即可在注册的执业范围内, 以个人开业的方式或者在医疗机构内从事中医医疗活动。

71. 患者, 女, 18 岁。近 2 个月来月经后期, 常感少腹冷痛, 按压疼痛加重, 喜暖, 口不渴, 舌淡, 苔白而润, 脉紧。其临床意义

- A. 寒凝
- B. 痰湿
- C. 肝郁
- D. 肾虚
- E. 阳虚

参考答案: A

参考解析: 月经后期: 连续 2 个月经周期出现月经延后 7 天以上的症状。多因营血亏损、肾精不足, 或因阳气虚衰, 无以化血所致; 亦可因气滞血瘀、寒凝血瘀、痰湿阻滞、冲任不畅所致。

72. 患者, 女, 16 岁。昨日淋雨后, 头痛鼻塞, 咽喉干痛, 微恶风寒。今晨就诊时, 可见身热, 微恶风寒, 头痛, 略有汗出, 咽喉干痛, 舌边尖稍红, 苔薄白, 脉浮数。体温 38.5°C, 咽红, 扁桃体不肿大。通过中医八纲辨证分析, 此为

- A. 表证
- B. 热证

C. 寒证

D. 里证

E. 痛证

参考答案: A

参考解析: 表证临床表现为发热恶寒(或恶风); 舌苔薄白, 脉浮, 头身疼痛, 鼻塞流涕或喷嚏, 咳嗽气喘。故本题选A。

73. 患者, 男, 22岁。近2天来, 恶风寒, 鼻塞流清涕, 头身疼痛, 喷嚏频发, 舌淡红, 苔薄。其最可能出现的脉象是

A. 虚脉

B. 弦脉

C. 沉脉

D. 细脉

E. 浮脉

参考答案: E

参考解析: 浮脉主表证。

74. 患者, 女, 23岁, 未婚。月经周期或先或后, 经量或多或少, 色黯有块, 经行不畅, 乳房胀痛, 舌苔薄白, 脉弦。其证型是

A. 脾虚肝郁

B. 肾虚

C. 肾虚肝郁

D. 肝郁

E. 肝郁化热

参考答案: D

参考解析: 乳房作胀, 舌苔薄白, 脉弦为肝郁气滞特点。肝郁气滞证临床表现: 情志抑郁, 善太息, 胸胁、少腹胀满疼痛, 走窜不定。或咽部异物感, 或颈部瘿瘤、瘰疬, 或胁下肿块。妇女可见乳房作胀疼痛, 月经不调, 痛经。舌苔薄白, 脉弦。病情轻重与情绪变化关系密切。

75. 患者咳嗽, 气息粗促, 痰多色黄质黏稠, 咳吐不爽, 胸胁胀满, 口干欲饮, 大便秘结, 舌苔黄腻, 脉滑数。其治法是

A. 疏风散寒, 宣肺止咳

B. 清热肃肺, 豁痰止咳

C. 滋阴润肺, 化痰止咳

D. 燥湿化痰, 理气止咳

E. 疏风清热, 肃肺化痰

参考答案: B

参考解析: 痰热咳嗽主要症状: 咳嗽气粗, 痰黄粘稠, 胸闷口干, 大便秘结。舌黄腻, 脉滑数。治法: 清热肃肺, 豁痰止咳。

76. 患者, 男, 55岁。虚烦不寐, 处事易惊, 胆怯心悸, 气短自汗, 倦怠乏力; 舌淡, 脉弦细。中医辨证为

A. 不寐之心肾不交证

B. 不寐之肝火扰心证

C. 不寐之痰热扰心证

D. 不寐之心胆气虚证

E. 不寐之心脾两虚证

参考答案: D

参考解析：心胆气虚证，不寐，多噩梦，易于惊醒，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力；舌淡，脉弦细。故本题选D。

77. 患者，男，31岁。胃痛暴作，恶寒喜暖，脘腹得温则痛减，口淡不渴，喜热饮，舌苔薄白，脉弦紧。治疗应首选

- A. 藿朴夏苓汤
- B. 桂枝合剂
- C. 小建中颗粒
- D. 黄芪建中汤
- E. 良附丸

参考答案：E

参考解析：胃痛之寒邪客胃证。证候主症：胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，遇寒加重，口淡不渴，或喜热饮，舌淡苔薄白，脉弦紧。治法：温胃散寒，行气止痛。代表方：良附丸、附子理中丸。

78. 男，25岁。2天来胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，舌质紫暗，脉沉涩。其治法是

- A. 清热利湿
- B. 养阴柔肝
- C. 祛瘀通络
- D. 疏肝理气
- E. 祛瘀软坚

参考答案：C

参考解析：瘀血阻络胁痛主要症状：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜尤甚，胁肋下或见有癥块。舌紫暗，脉沉涩。治法：祛瘀通络。

79. 女，50岁。1周前因情志不舒而出现胃脘胀痛，痛连两胁，嗳气、矢气则痛舒，胸闷嗳气，喜长叹息，大便不畅，舌苔薄白，脉弦。其诊断是

- A. 胃痛饮食伤胃证
- B. 胃痛脾胃虚寒证
- C. 胃痛肝气犯胃证
- D. 胁痛肝气郁滞证
- E. 胁痛肝络失养证

参考答案：C

参考解析：胃痛-肝气犯胃主要症状：胃脘胀痛，攻撑作痛，脘痛连胁，胸闷嗳气，喜叹息，大便不畅，得嗳气、矢气则舒，遇烦恼则痛作或痛甚。苔薄白，脉弦。

80. 患者突然呕吐，脘闷不舒，兼见恶寒发热，头身疼痛，舌苔白腻，脉濡缓。治宜选用

- A. 保和丸
- B. 小半夏汤
- C. 香苏散
- D. 平胃散
- E. 藿香正气丸

参考答案：E

参考解析：呕吐之外邪犯胃证。主要症状：突然呕吐，起病较急，常伴有发热恶寒，头身疼痛，胸脘满闷，不思饮食。舌苔白，脉濡缓。治法：疏邪解表，化浊和中。常用中成药：麝香正气丸/软胶囊/水。

81. 患者，男，49岁。患泄泻多年，症见肠鸣腹胀，食少不化，五更泄泻，久泻不止，面黄

肢冷。证属肾阳不足，宜选用的中成药是

- A. 理中丸
- B. 薯蓣丸
- C. 启脾丸
- D. 四神丸
- E. 大补阴丸

参考答案：D

参考解析：根据题干中患者的症状可判断为肾阳不足所致的泄泻。四神丸主治：温肾散寒，涩肠止泻。用于肾阳不足所致的泄泻，症见肠鸣腹胀，五更溏泄，食少不化，久泻不止，面黄肢冷。故本题选D。

82. 老年患者，大便干结，腹中胀满，口干口臭，面红身热，心烦不安，多汗，时欲饮冷，小便短赤；舌红，苔黄燥，脉滑数。针灸治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A. 梁门、公孙
- B. 合谷、内庭
- C. 脾俞、气海
- D. 肝俞、太冲
- E. 上脘、外关

参考答案：B

参考解析：该患者辨证为热秘，针刺法热秘配合谷、内庭。

83. 患者发热，热势较低，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面色少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

参考答案：C

参考解析：内伤发热之血虚发热证。主要症状：发热，热势多为低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡。舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。常用中成药：归脾丸。

84. 患者，女，25岁。近期腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重；舌体淡，苔白腻，脉沉而迟缓。其证型为寒湿腰痛，其代表方为

- A. 小活络丸
- B. 左归丸、右归丸
- C. 甘姜苓术汤
- D. 身痛逐瘀汤
- E. 四妙丸

参考答案：A

参考解析：小活络丸主治舒筋活络，散风止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病，症见肢体关节疼痛，或冷痛，或刺痛，或疼痛夜甚、关节屈伸不利、麻木拘挛。故本题选A。

85. 患者，男，51岁。症见肌肉、关节疼痛，局部肿大，僵硬畸形，屈伸不利，腰膝酸软，畏寒乏力。宜选用的中成药是

- A. 安宫牛黄丸
- B. 妙药颗粒
- C. 川芎茶调丸

- D. 苏合香丸
- E. 血府逐瘀丸

参考答案: B

参考解析: 根据题干, 患者症状应为尪痹, 即西医中的类风湿关节炎。尪痹颗粒, 补肝肾, 强筋骨, 祛风湿, 通经络。用于久痹体虚, 关节疼痛, 局部肿大、僵硬畸形, 屈伸不利及类风湿性关节炎见有上述证候者。故本题选 B。

86. 患儿, 6岁。暑假外出游玩时, 左项后发际处出现2个各约3cm大小的肿块, 上有黄白色脓头, 周围色红而硬, 伴发热, 纳食不香, 口渴引饮, 小便黄, 舌质红, 苔薄黄, 脉滑数。内治应首选的中成药是

- A. 六神丸
- B. 防风通圣丸
- C. 二妙丸
- D. 参苓白术丸
- E. 补中益气丸

参考答案: B

参考解析: 根据患儿上述症状表现为疖阴虚内热证, 其治法是养阴清热解毒, 治疗首选防风通圣丸。故选 B。

87. 产妇, 女, 29岁。于夏秋季节出现局部皮肤红肿结块, 灼热疼痛, 根盘很浅, 范围局限。伴发热, 口干, 便秘, 涩赤。舌苔薄腻, 脉滑数。其用药为

- A. 六神丸
- B. 五味消毒丸
- C. 连翘败毒丸
- D. 大承气汤
- E. 防风通圣丸

参考答案: A

参考解析: 根据题目患者的症状可诊断为疖之暑热浸淫证, 其治法为清暑化湿解毒。常用中成药为六神丸。故本题选 A。

88. 女, 20岁。双下肢及双前臂突现红斑, 原因不明, 其上有丘疹、水疱, 搔抓后糜烂、流滋, 边界弥漫, 剧烈瘙痒, 大便干结, 小便黄赤, 伴心烦口渴, 身热不扬, 舌红, 苔薄黄, 脉滑。其治法是

- A. 凉血祛风止痒
- B. 散风清热止痒
- C. 养血润燥止痒
- D. 活血解毒利湿
- E. 清热利湿止痒

参考答案: E

参考解析: 根据患者症状诊断为湿疮温热蕴肤证, 症状表现发病快, 病程短, 皮损有潮红、丘疱疹, 灼热瘙痒无休, 抓破渗液流脂水; 伴心烦口渴, 身热不扬, 大便干小便短赤。舌红, 苔薄白或黄, 脉滑或数。故选 E。

89. 朱某, 经前小腹胀痛拒按, 经血量少, 色紫黯有块; 胸胁、乳房胀痛不适; 舌质黯, 有瘀点, 脉弦。诊断痛经, 辨证属

- A. 肝郁气滞
- B. 肝脾不调
- C. 肾虚肝郁

D. 寒凝血瘀

E. 气滞血瘀

参考答案: E

参考解析: 痛经气滞血瘀证。主要症状: 经前或经期小腹胀痛拒按, 经血量少, 行而不畅, 色紫暗有块, 块下痛减; 乳房胀痛, 胸闷不舒; 舌质紫暗或有瘀点, 脉弦。

90. 患者, 女, 25岁。长期月经不调, 月经量少, 淋漓不净, 生产后恶露不绝。以上症状适合选用

A. 玉屏风颗粒

B. 橘红丸

C. 益母草颗粒

D. 桂枝茯苓丸

E. 艾附暖宫丸

参考答案: C

参考解析: 益母草颗粒的药物组成为益母草, 功效主治为活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝, 症见月经量少、淋漓不净、产后出血时间过长; 产后子宫复旧不全见上述证候者。故本题选C。

91. 患者, 女, 43岁。带下量多, 色黄质稠, 小腹隐痛, 腰骶酸痛, 经行腹痛, 证属湿热瘀滞, 治当清热解毒, 燥湿止带, 祛瘀止痛, 下列选用的中成药正确的是

A. 花红颗粒

B. 千金止带丸

C. 安坤颗粒

D. 妇科十味丸

E. 白带丸

参考答案: A

参考解析: 花红颗粒的功能主治为清热解毒, 燥湿止带, 祛瘀止痛, 用于湿热瘀滞所致带下病, 月经不调, 症见带下量多, 色黄质稠, 小腹隐痛, 腰骶酸痛, 经行腹痛; 慢性盆腔炎、附件炎见上述证候者。故本题选A。

92. 患儿, 5岁。咳嗽2天, 咳嗽痰多, 色黄黏稠, 难以咯出, 喉间痰鸣, 发热, 烦躁不安, 小便黄少, 大便干结, 舌质红, 苔黄腻, 脉滑数。其治法是

A. 健脾补肺, 益气化痰

B. 清热化痰, 宣肺止咳

C. 疏风散寒, 宣肺止咳

D. 滋阴润燥, 养阴清肺

E. 疏风清肺, 润燥止咳

参考答案: B

参考解析: 小儿咳喘—痰热闭肺主要症状: 咳嗽痰多, 色黄黏稠, 难以咯出, 甚则喉间痰鸣, 或伴发热口渴, 烦躁不安, 小便黄少, 大便干结。舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或指纹青紫。治法: 清热化痰, 宣肺止咳。

93. 患儿, 3岁。脘腹胀满, 腹痛即泻, 泻后痛减, 粪便酸臭, 或如败卵, 喀气腐浊, 不思饮食, 夜卧不安, 舌苔厚腻。其治法是

A. 疏风散寒, 燥湿止泻

B. 清肠解毒, 利湿止泻

C. 解表散热, 疏肝和胃

D. 消食化滞, 运脾和胃

E. 健脾益气，升提止泻

参考答案：D

参考解析：伤食泄泻主要症状：脘腹胀满，腹痛即泻，泻后痛减，粪便酸臭，或如败卵，嗳气腐浊，不思饮食，夜卧不安。舌苔厚腻或微黄，脉滑实或指纹淡紫。治法：消食化滞，运脾和胃。

94. 女，18岁。今年6月外出旅游归来，突然感觉耳后疼痛，一侧面部麻木，额纹消失，鼻唇沟变浅，口角下垂，病侧闭目困难，微恶寒，发热，舌淡红，苔薄黄，脉浮数。针刺治疗除取主穴外，还应选取的配穴是

A. 风府、太阳

B. 气海、风池

C. 曲池、列缺

D. 曲池、外关

E. 太冲、外关

参考答案：D

参考解析：面瘫治疗——针灸治疗，主穴：阳白、颤髎、颊车、地仓、翳风、合谷。风寒证加风池、列缺；风热证加外关、曲池；气血不足加足三里、气海；人中沟歪斜加水沟；鼻唇沟浅加迎香。据患者微恶寒，发热，舌淡红，苔薄黄，脉浮数考虑为风热证，故选D。

95. 患者，男，35岁。症见胃脘隐隐作痛，脘闷嘈杂，泛酸纳少，气短懒言，便溏肠鸣。宜选用的中成药是

A. 香砂养胃丸

B. 气滞胃痛颗粒

C. 保和丸

D. 附子理中丸

E. 金匮肾气丸

参考答案：A

参考解析：香砂养胃丸【功效主治】温中和胃。用于胃阳不足、湿阻气滞所致的胃痛、痞满。

96. 患者，男，30岁。咳嗽1周，痰多色黄而黏稠，口干胸闷，舌红苔黄腻，脉滑数。其诊治是

A. 风寒咳嗽，玉屏风颗粒

B. 风热咳嗽，橘红丸

C. 肺热咳嗽，急支糖浆

D. 痰湿咳嗽，急支糖浆

E. 痰热咳嗽，橘红丸

参考答案：E

参考解析：橘红丸【功效主治】清肺，化痰，止咳。用于痰热咳嗽。

97. 患者，女，29岁。患热毒蕴结肌肤所致的疮疡，欲使用连翘败毒丸治疗，下列各项错误的是

A. 问诊清楚，孕妇禁用

B. 忌食辛辣，油腻之品

C. 疮疡阴证者慎用

D. 红肿热痛，溃脓稠厚者可用

E. 红肿发硬，灼热疼痛者可用

参考答案：D

参考解析：连翘败毒丸【功效主治】清热解毒，消肿止痛。用于热毒蕴结肌肤所致的疮疡，

症见局部红肿热痛、未溃破者。【注意事项】1. 孕妇禁用。2. 瘰疬阴证者慎用。3. 忌食辛辣、油腻、海鲜之品。

98. 患者，男，26岁。感冒4天，服感冒胶囊不见缓解，症见恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，证属外寒内热，表里俱实，宜选用

- A. 黛蛤散
- B. 防风通圣丸
- C. 牛黄至宝丸
- D. 新雪颗粒
- E. 清胃黄连片

参考答案：B

参考解析：防风通圣丸，为表里双解剂，具有解表通里，清热解毒之功效，用于外寒内热，表里俱实，恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，痄腮初起，风疹湿疮。故本题选B。

99. 患者，男，55岁。为降转氨酶，服用护肝片治疗。疗程结束时，正确的停药方法是

- A. 谷丙转氨酶指标下降了，递减剂量
- B. 谷丙转氨酶指标正常了，即可停药
- C. 肝功能全面好转了，即可停药
- D. 肝功能全面好转了，递减剂量
- E. 肝功能全面好转了，原量服药

参考答案：D

参考解析：护肝片【注意事项】如果肝功能全面好转，需停用本药品时应递减剂量，不宜骤停，以免ALT反跳。

100. 患儿，5岁。发热咳嗽2天。症见发热恶风，咳嗽不爽，痰黄黏稠，舌红，苔薄黄，脉浮数。治疗应首选的中成药是

- A. 小儿肺咳颗粒
- B. 通宣理肺丸
- C. 小儿咳喘灵颗粒
- D. 感冒清热颗粒
- E. 清金化痰丸

参考答案：A

参考解析：小儿肺咳颗粒的功效主治：健脾益肺，止咳平喘。用于肺脾不足，痰湿内壅所致咳嗽或痰多稠黄，咳吐不爽，气短，喘促，动辄汗出，食少纳呆，周身乏力，舌红苔厚。故选A。

综合分析题

患者，女，20岁。气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，伴食欲不振。中医属脾胃系病症。

101. 此证应该选用的中成药是

- A. 归脾丸
- B. 参苓白术丸
- C. 橘红丸
- D. 藿香正气水
- E. 生脉饮

参考答案：A

参考解析：归脾丸的主要成分是党参、白术（炒）、炙黄芪、炙甘草、茯苓、远志（制）、酸

枣仁（炒）、龙眼肉、当归、木香、大枣(去核)，辅料为炼蜜，有益气健脾，养血安神的作用，用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力；食欲不振，崩漏便血。故本题选 A。

102. 以上选用的药的功效为

- A. 温肾健脾，固涩止泻
- B. 益气健脾，养血安神
- C. 解表通里，清热解毒
- D. 芳香化湿，解表散寒
- E. 消食导滞，和中止泻

参考答案：B

参考解析：归脾丸的功能主治为益气健脾，养血安神。故本题选 B。

综合分析题

患者，25岁。夏季之后，身体局部出现红肿热痛，但是没有溃烂，临幊上首选的方剂是连翹敗毒散。

103. 连翹敗毒丸的药物组成不包括

- A. 金银花
- B. 蒲公英
- C. 桔子
- D. 苍术
- E. 当归

参考答案：D

参考解析：连翹敗毒丸：药物组成——金银花、连翹、蒲公英、紫花地丁、大黃、梔子、黃芩、黃連、黃柏、苦參、白鮮皮、木通、防風、白芷、蟬蛻、荆芥穗、羌活、麻黃、薄荷、柴胡、天花粉、玄參、浙貝母、桔梗、赤芍、當歸、甘草。

104. 连翹敗毒丸方中引药直达肌肤的药物是

- A. 蟬蛻
- B. 木通
- C. 桔梗
- D. 苦參
- E. 甘草

参考答案：C

参考解析：连翹敗毒丸方中當歸辛溫走竄，能補血活血止痛，亦可防苦燥與寒涼太過；桔梗性平宣散，專入肺經，既宣肺排脓，又引諸藥直达肌肤；甘草甘平解毒，調和諸藥。

综合分析题

患者，男，43岁。被热水轻度烫伤，疮疡肿痛、创面溃烂。

105. 患者应该选用的中成药为

- A. 保和丸
- B. 妍痹颗粒
- C. 七厘散
- D. 防风通圣散
- E. 京万红软膏

参考答案：E

参考解析：京万红软膏具有活血解毒，消肿止痛，去腐生肌之功效，用于轻度水、火烫伤，疮疡肿痛，创面溃烂。故本题选 E。

106. 所选中成药的功能是

- A. 清热解毒，镇惊止痛
- B. 清热利湿，利胆止痛
- C. 祛热除湿，行气止痛
- D. 生肌解毒，消肿止痛
- E. 芳香开窍，行气止痛

参考答案：D

参考解析：京万红软膏具有生肌解毒、消肿止痛的功能。故本题选 D。

综合分析题

患者，女，40岁。近2年来月经或提前或延后，经量或多或少，色暗红或紫红，胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，嗳气食少；苔薄白或薄黄，脉弦。确诊为月经先后无定期。

107. 根据患者的临床表现，可以判断为哪种证型

- A. 肝郁型
- B. 肾虚型
- C. 脾虚型
- D. 血瘀型
- E. 气虚型

参考答案：A

参考解析：肝郁证。主要症状：经来先后无定，经量或多或少，色暗红或紫红，或有血块，或经行不畅；胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，嗳气食少；苔薄白或薄黄，脉弦。治法：疏肝理气调经。常用中成药：逍遥丸。肝郁证。主要症状：经来先后无定，经量或多或少，色暗红或紫红，或有血块，或经行不畅；胸胁、乳房、少腹胀痛，脘闷不舒，时叹息，嗳气食少；苔薄白或薄黄，脉弦。治法：疏肝理气调经。

108. 治疗选用的中成药是

- A. 右归丸
- B. 左归丸
- C. 逍遥丸
- D. 柴胡舒肝丸
- E. 补肾地黄丸

参考答案：C

参考解析：常用中成药：逍遥丸。

综合分析题

患者，女，28岁。经期小腹胀痛拒按，经血量少，行而不畅，血色紫暗有块，块下痛减；乳房胀痛，胸闷不舒；舌质紫暗，脉弦。临床诊断为痛经。

109. 该患者证型为

- A. 阴虚火旺证
- B. 寒凝血瘀证
- C. 肾气亏损证
- D. 气滞血瘀证

E. 气血虚弱证

参考答案: D

参考解析: 气滞血瘀证主要证候为经前或经期小腹胀痛拒按, 胸胁、乳房胀痛, 经行不畅, 经色紫暗有块, 块下痛减; 舌紫暗, 或有瘀点, 脉弦。故本题选 D。

110. 中医治法为

- A. 补肾填精, 养血止痛
- B. 补气养血, 和中止痛
- C. 理气行滞, 祛瘀止痛
- D. 益气养血, 化瘀通络
- E. 温经散寒, 祛瘀止痛

参考答案: C

参考解析: 气滞血瘀证应该理气行滞, 祛瘀止痛。故本题选 C。

111. 该患者应选用的中成药是

- A. 川芎茶调丸
- B. 血府逐瘀胶囊
- C. 华佗再造丸
- D. 枸菊地黄丸
- E. 膻下逐瘀汤

参考答案: B

参考解析: 血府逐瘀胶囊功能主治为: 活血祛瘀, 行气止痛, 用于气滞血瘀所致的胸痹, 头痛日久, 痛如针刺而有定处, 内热烦闷, 心悸失眠, 急躁易怒。

综合分析题

患者, 女, 48岁。近1个月来自觉午后至夜有发热, 发有定时, 睡时汗出, 醒后即止, 兼有五心烦热, 舌红少苔, 脉细数。

112. 该患者的发热类型为

- A. 潮热
- B. 壮热
- C. 身热不扬
- D. 高热
- E. 日晡潮热

参考答案: A

参考解析: 潮热, 指按时发热, 或按时热势加重, 如潮汐之有定时的症状。潮热可分为日晡潮热、骨蒸潮热、湿温潮热和瘀血潮热。仅知该患者有发热, 有定时, 故能诊断为潮热, 而不能进一步确诊为日晡潮热。故本题选 A。

113. 该患者的汗出类型为

- A. 黄汗
- B. 盗汗
- C. 战汗
- D. 自汗
- E. 无汗

参考答案: B

参考解析: 该患者睡时汗出, 醒后即止, 故为盗汗。盗汗多见于阴虚内热或气阴两虚证。故本题选 B。

114. 其病机是

- A. 阴虚
- B. 气虚
- C. 血虚
- D. 阳虚
- E. 气血两虚

参考答案: A

参考解析: 由汗出类型、发热类型、五心烦热、舌红少苔、脉细数知患者为阴虚。故本题选A。

综合分析题

患者，女，24岁。妊娠3个月，身体健康，脉象应指往来流利，如珠走盘。

115. 此脉应属于

- A. 紧脉
- B. 弦脉
- C. 滑脉
- D. 弱脉
- E. 细脉

参考答案: C

参考解析: 滑脉的脉象特征是往来流利，应指圆滑，如盘走珠。故本题选C。

116. 此脉除了孕妇外，正常情况下还可见于

- A. 青壮年
- B. 老年人
- C. 儿童
- D. 哺乳期妇女
- E. 更年期妇女

参考答案: A

参考解析: 滑脉多见于痰湿、食积和实热等病证，亦是青壮年的常脉、妇女的孕脉。故本题选A。

117. 在病理情况下，该脉的主病为

- A. 痛证、痰饮、气滞
- B. 痛证、寒证、食积
- C. 痛证、食滞、血瘀
- D. 痰湿、食滞、实热
- E. 寒证、瘀血、食积

参考答案: D

参考解析: 在病理情况下，该脉的主病为痰湿、食滞、实热。故本题选D。

综合分析题

患者，女，50岁。大便不干硬，虽有便意，但排便困难，用力努挣则汗出短气，便后乏力，面白神疲，肢倦懒言。舌淡苔白，脉弱。由症状辨病属便秘。

118. 其辨证为

- A. 热秘
- B. 气虚秘

- C. 寒秘
- D. 实秘
- E. 以上都不是

参考答案: B

参考解析: 大便不干硬, 虽有便意, 但排便困难时气虚无力运行, 致使大便停滞不出, 挣则汗出短气, 便后疲乏是气虚无以固摄所致。故本题选 B。

119. 其治法宜

- A. 补胃和脾
- B. 滋阴养血
- C. 益气养阴
- D. 益气润肠
- E. 润燥行瘀

参考答案: D

参考解析: 气虚则要益气, 便秘则需润肠, 因而治宜益气润肠。故本题选 D。

120. 治疗常用中成药是

- A. 麻仁丸
- B. 归脾丸
- C. 生脉饮
- D. 补中益气丸
- E. 参苓白术丸

参考答案: D

参考解析: 气虚则要补中益气, 补中益气丸用于气虚之体倦乏力, 内脏下垂。故本题选 D。

综合分析题

患者出现昏迷, 大小便失禁, 恶心、喷射性呕吐, 120 急诊入院后诊断为大面积脑出血。

121. 该患者的求医行为类型属于下列哪项

- A. 主动求医型
- B. 被动求医型
- C. 强制求医型
- D. 指导求医型
- E. 许可求医型

参考答案: B

参考解析: 求医行为类型分以下三类: 主动求医型、被动求医型、强制求医型。被动求医型是指尚未发育成熟的未成年人, 意识丧失、缺乏自知能力和体质虚弱的老龄患者等, 需由患者家长、家属或他人作出求医决定而产生的求医行为。患者大面积脑出血, 处于昏迷状态, 其属于被动求医行为。故本题选 B。

122. 该案例中所形成的医患关系模式是

- A. 主动-被动型
- B. 指导-合作型
- C. 契约许可型
- D. 指导参与型
- E. 共同参与型

参考答案: A

参考解析: 医患关系模式是医学模式在人际关系中的具体体现, 主动-被动型是其中的一种。

这种模式是反映患者置于被动地位，而医生处于主动的主导地位的一种模式，常用于手术、麻醉、抗感染治疗等技术。对休克、昏迷、某些精神疾病、智力严重低下的患者，这种模式是适合的。故本题选 A。

123. 经过积极治疗，患者清醒后始终不能接受以后可能行动不便的事实，对自己未来感到绝望，这属于患者角色不适应中哪项

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为减退
- D. 角色行为强化
- E. 角色行为异常

参考答案：E

参考解析：患者无法承受患病或不治之症的挫折和压力，对患者角色感到厌倦、悲观、绝望，由此导致的行为异常，称为角色行为异常。角色行为异常患者会表现出对自己疾病的不接受及悲观情绪。故本题选 E。

综合分析题

某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未作任何处理，即让家属把患者送到 20 里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔、中毒性休克，后虽经抢救保住了生命，但医药费用去 2 万多元。

124. 对当班医生的正确伦理评价是

- A. 没有什么问题，不想接诊的病人就可以让他转诊
- B. 没有什么问题，风险太大时首先要保护好自己
- C. 没有什么问题，当时情况可以转诊
- D. 错误，违反首诊负责制要求，给病人造成严重伤害
- E. 错误，没有把这件事报告给院长，擅自决定转诊

参考答案：D

参考解析：医生在接诊危重患者时，应果断对疾病的严重情况和危险程度做出判断，不要对自身的治疗能力过于自信而耽误患者的转诊，从而延误病情、耽误患者的救治。医生应以最大限度保护患者生命健康为目的，及时转诊患者，不应为了自己的经济利益而不予救治。

125. 对医生的行为进行伦理评价时，应该主要考虑的是，是否做到了

- A. 有利原则中的努力使病人受益的要求
- B. 有利原则中的努力预防难以避免的伤害
- C. 有利原则中的对利害全面权衡，选择受益最大、伤害最小的行动方案
- D. 不伤害原则中的不应发生有意的伤害
- E. 不伤害原则中的不给病人造成本可避免的各种损害

参考答案：C

参考解析：为使医务人员的行为对患者确有助益，对医务人员有以下要求；①医务人员的行为应尽可能减轻或解除患者的痛苦；②对患者利害共存时，要尽力使医护行为给患者带来最大的益处和最小的危害；③在使患者受益的同时而不会给他人带来太大的伤害等。

综合分析题

女，18岁。近几个月来常因琐事与父母发生激烈争吵，闷闷不乐，被诊断为抑郁症而入院治疗。2周后，其父母去探视，患者起初表现出既想见又不想见的矛盾心理，但最终还是决定拒绝见其父母，医生根据病情同意了患者的决定。

126. 该患者起初的心理状态属于

- A. 双重趋避冲突
- B. 趋避冲突
- C. 回避冲突
- D. 双避冲突
- E. 双趋冲突

参考答案: B

参考解析: 趋避冲突是心理冲突的一种, 指同一目标对于个体同时具有趋近和逃避的心态。这一目标可以满足人的某些需求, 但同时又会构成某些威胁, 既有吸引力又有排斥力, 使人陷入进退两难的心理困境。

127. 是否允许患者父母探视应首先遵循的伦理原则

- A. 协同一致原则
- B. 患者家属自主原则
- C. 患者利益至上原则
- D. 公正原则
- E. 公益原则

参考答案: C

参考解析: 患者正处于医生的治疗期间, 应该适当尊重患者的选择, 也是对当时患者的心理治疗有着很大的帮助。

128. 根据《精神卫生法》, 医生可以限制患者父母会见患者的理由是

- A. 医疗机构尚未作出再次诊断结论
- B. 未取得医疗机构负责人同意
- C. 为了避免妨碍治疗
- D. 患者父母要求见面的理由不充分
- E. 未取得当地卫生计生行政部门批准

参考答案: C

参考解析: 患者正在处于治疗期, 为了患者的病情以及治疗, 有权利对影响患者病情以及治疗的一切负面影响作出正确的决定。

综合分析题

某小学组织学生接种乙肝疫苗, 有 5 名学生出现头痛、呕吐、四肢乏力, 因而送医院就诊。首诊医师及时处置并报告医院有关部门, 经医护人员解释、安抚后, 39 名学生未经治疗症状很快消失, 5 名学生仍有恶心, 并伴有焦虑, 医院组织专家会诊后排除了疫苗和其他躯体疾病所致。

129. 根据《疫苗流通与预防接种管理条例》, 该事件所出现的情况属于

- A. 药品不良反应
- B. 预防接种异常反应
- C. 医疗事故
- D. 突发公共卫生事件
- E. 群体性心因性反应

参考答案: E

参考解析: 因心理因素发生的个体或者群体的心因性反应, 不属于疫苗接种异常反应的情形。

130. 对上述 5 名未愈学生的焦虑症状, 适宜的心理干预方法是

- A. 行为塑造

- B. 放松训练
- C. 厌恶疗法
- D. 催眠疗法
- E. 冲击疗法

参考答案：B

参考解析：放松训练：学会使自身保持轻松。

综合分析题

孙某是一肝癌晚期患者，现到其住所地的某医疗机构门诊就诊，要求长期使用麻醉药品。

131. 此时应当由谁亲自诊查患者并建立相应的病历

- A. 主治医师
- B. 主任医师
- C. 治疗医师
- D. 住院医师
- E. 首诊医师

参考答案：E

参考解析：门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，首诊医师应当亲自诊查患者，建立相应的病历，要求其签署《知情同意书》。

132. 该医疗机构应当要求孙某多长时间复诊或者随诊一次

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 4个月
- E. 6个月

参考答案：C

参考解析：医疗机构应当要求长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症患者和中、重度慢性疼痛患者，每3个月复诊或者随诊一次。

综合分析题

某村卫生室医生赵某，持有乡村医生证书，已获得开具抗菌药物的资格，由于该卫生室抗菌药物使用量、使用率等情况良好，受到卫生计生行政部门表彰。

133. 赵某有权开具的抗菌药物是

- A. 特殊使用级抗菌药物
- B. 限制使用级抗菌药物
- C. 非限制使用级抗菌药物
- D. 价格相对较高的抗菌药物
- E. 对细菌耐药性影响较大的抗菌药物

参考答案：C

参考解析：具有初级专业技术职务任职资格的医师，在乡、民族乡、镇、村的医疗机构独立从事一般执业活动的执业助理医师以及乡村医生，可授予非限制使用级抗菌药物处方权。

134. 经委托负责对赵某所在的村卫生室抗菌药物的使用量、使用率等情况进行排名并予以公示的单位是

- A. 村卫生室
- B. 县人民医院

- C. 乡镇卫生院
- D. 县卫生计生监督机构
- E. 县疾病预防控制机构

参考答案: C

参考解析: 受县级卫生行政部门委托, 乡镇卫生院负责对辖区内村卫生室抗菌药物使用量、使用率等情况进行排名并予以公示, 并向县级卫生行政部门报告。

综合分析题

患者, 女, 35岁。3岁儿子走丢, 因思念孩子致胸脘痞满, 不思饮食, 倦怠乏力, 日渐消瘦。某医诊治后嘱其父高声责骂她, 女子无故被骂, 既气又怒, 放声大哭。大哭后见有食欲, 开始进食, 病情好转。

135. 根据七情致病特点, 此病应属于

- A. 思伤肾
- B. 思伤脾
- C. 思伤肺
- D. 思伤肝
- E. 思伤心

参考答案: B

参考解析: 中医思为脾之志。思考本是人的正常生理活动, 倘若思虑太过, 甚至空怀妄想, 谋虑拂逆, 皆可导致气结不行, 积聚于中, 所谓“思伤脾”。故本题选B。

136. 其脏腑气机变化为

- A. 气缓
- B. 气消
- C. 气上
- D. 气结
- E. 气乱

参考答案: D

参考解析: 思则气结, 即指过度思虑伤脾, 导致脾气郁滞, 运化失职。临床可见不思饮食, 腹胀纳呆, 便秘或便溏等症。该患者表现符合气结。故本题选D。

137. 医生所采用的治法根据是

- A. 悲胜怒
- B. 恐胜思
- C. 喜胜悲
- D. 恐胜喜
- E. 怒胜思

参考答案: E

参考解析: 喜胜悲, 悲胜怒, 恐胜喜, 怒胜思, 思胜恐, 怒属木, 思属土, 木克土, 故愤怒能抑制忧思。故本题选E。

综合分析题

患者, 男, 20岁。胃脘疼痛, 胀满拒按, 暖腐吞酸, 呕吐不消化食物, 其味腐臭, 吐后痛减, 不思饮食, 大便不爽; 苔厚腻, 脉滑。中医辨证为呕吐。

138. 中医证型为

- A. 痰饮内阻证

- B. 脾胃虚寒证
- C. 食滞胃脘证
- D. 肝气犯胃证
- E. 外邪犯胃证

参考答案: C

参考解析: 食滞胃脘症状: 呕吐酸腐, 腹胀满, 暖气厌食, 得食愈甚, 吐后反快, 大便秽臭或溏薄或秘结; 苔厚腻, 脉滑实。故本题选 C。

139. 本病的治则治法为

- A. 温补脾肾, 益气回阳
- B. 疏邪解表, 芳香化湿
- C. 消食导滞, 和胃止痛
- D. 疏肝理气, 和胃降逆
- E. 以上都不是

参考答案: C

参考解析: 食滞胃脘治则: 消食导滞, 和胃止痛。故本题选 C。

综合分析题

患儿, 12岁。发热咳嗽3天, 证见高热烦躁, 咳嗽痰多, 色黄粘稠, 难以咯出, 甚则喉间痰鸣, 面赤口渴, 大便干燥, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。

140. 根据患儿的表现, 属于何种证型

- A. 风寒闭肺
- B. 肺热闭肺
- C. 痰热闭肺
- D. 毒热闭肺
- E. 阴虚肺热

参考答案: C

参考解析: 小儿肺炎喘嗽痰热闭肺。主要症状: 咳嗽痰多, 色黄黏稠, 难以咯出, 甚则喉间痰鸣, 或伴发热口渴, 烦躁不安, 小便黄少, 大便干结。舌质红, 苔黄腻, 脉滑数或指纹青紫。

141. 最佳治法是

- A. 辛温宣肺, 化痰止咳
- B. 辛凉宣肺, 清热化痰
- C. 开肺化痰, 止咳平喘
- D. 清热化痰, 宣肺止咳
- E. 清热解毒, 泻肺开闭

参考答案: D

参考解析: 治法: 清热化痰, 宣肺止咳。

142. 治疗首选方

- A. 华盖散
- B. 通宣理肺丸
- C. 清金化痰丸
- D. 小儿咳喘灵颗粒
- E. 清宣止咳颗粒

参考答案: C

参考解析: 常用中成药: 清金化痰丸。

综合分析题

一小儿，女患者，11岁。患甲状腺癌，并有颈淋巴结转移。医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术。按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害。当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院。过了不久，患儿家属考虑到癌症将危及病人的生命。故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦。医生经过再三考虑，决定打破常规，采用一种新的术式，既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏。患者及家属同意做此手术，尽管这种术式的治疗效果当时尚不能肯定。手术进行得很顺利，随访远期疗效也很好。

143. 在该事例中，涉及了病人权利的是哪一项

- A. 享有基本的医疗权
- B. 享有自我决定权
- C. 享有自我选择权
- D. 享有知情同意权
- E. 以上都是

参考答案：E

参考解析：①“当患儿母亲听到要造成这些后遗症后，断然拒绝治疗，带孩子出院”一自我决定权。②“患儿家属考虑到癌症将危及病人的生命。故再次来到医院，要求给予治疗，并请求医生尽可能不给孩子留下终身伤残的痛苦”一自我选择权。③“医生告诉患儿母亲，女孩需做甲状腺癌根治术。按常规手术后要造成颈部塌陷变形，肩下垂，身体的外观和功能都要受到一定损害”一知情同意权。④患者都享有基本的、合理的诊治、护理的权利和获得健康的权利—基本的医疗权。

144. 下面说法哪一点是错误的

- A. 病人应该在医师指导下对治疗作出负责的决定并与医师合作执行
- B. 既要为病人考虑眼前疗效，又考虑远期疗效
- C. 医生不可以强求病人做不同意做的手术
- D. 医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式的做法是不可取的
- E. 医生为病人着想、勇担风险是值得赞扬的

参考答案：D

参考解析：虽然医生打破常规，采用治疗效果不肯定的术式，但是既收到治疗效果，又使女孩子保留外形美观，功能不受破坏，所以不算错误，做法可取（D错），故本题选D。

综合分析题

女，38岁。近4个月来情绪低落，兴趣索然，自觉“高兴不起来，生不如死”，自己的脑子不灵了，“像是生了锈的机器”，认为自己成了家庭和社会的累赘，“成了废物”，有胸闷、心悸、心慌的症状，觉得是得了心脏病。主动性言语及活动明显减少，生活被动，愿独处。曾多次自杀未遂，睡眠不好，早醒。

145. 该病人的精神症状不包括

- A. 情绪低落
- B. 思维迟缓
- C. 自责自罪观念
- D. 夸大妄想
- E. 意志活动减退

参考答案：D

参考解析：夸大妄想指以自负、自感伟大或优越为内容的病态信念。常伴有其他幻想性妄想，可作为偏执狂、分裂症（常为偏执型）、躁狂症和脑器质性疾病（特别是麻痹性痴呆）的症状。某些人格障碍的病人有出现这种妄想的素质。

146. 该病人的思维表现不包括

- A. 思维云集
- B. 思维迟缓
- C. 自杀企图
- D. 疑病观念
- E. 自责自罪观念

参考答案：A

参考解析：通过题干描述除思维云集未提及，其它选项在其中都有所提及

147. 该病人首要注意的问题是防止

- A. 活动少而引起的合并感染
- B. 拒食导致营养不良
- C. 自杀行为
- D. 冲动伤人
- E. 症状波动的瓣

参考答案：C

参考解析：生命至高无上，该题目中已提到患者有自杀倾向，所以首要注意他的自杀行为。

综合分析题

患者，女，3岁。大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。中医诊断为小儿泄泻。

148. 该小儿中医辨证应该为

- A. 伤食泄泻
- B. 湿热泄泻
- C. 脾虚泄泻
- D. 风寒泄泻
- E. 脾肾阳虚进泻

参考答案：D

参考解析：风寒泄泻证：临床表现为大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽；舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。故本题选D。

149. 中医采取的治法是

- A. 清热化湿，解毒熄风
- B. 疏风散寒，燥湿止泻
- C. 消食化滞，健脾和胃
- D. 芳香化诞，解表散寒
- E. 清肠解毒，利湿止泻

参考答案：B

参考解析：风寒泄泻的治法为疏风散寒，燥湿止泻。故本题选B。

150. 选用中成药为

- A. 参苓白术散
- B. 小儿消食丸
- C. 苏合香丸

D. 川芎茶调丸

E. 藿香正气液

参考答案: E

参考解析: 藿香正气口服液具有解表化湿, 理气和中之功效, 用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒, 症见头痛昏重, 胸膈痞闷, 腹胀痛, 呕吐泄泻; 肠胃型感冒见上述症候者。故本题选 E。