

《中药学综合知识与技能》

入学测评卷

一、最佳选择题(共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 以下不属于中药药学服务新进展的是

- A. 药物重整
- B. 开展药学监护
- C. 开展中药药物警戒工作
- D. 中药临方炮制研究
- E. 中药知识科普与药学信息服务

【答案】B

2. 根据中医理论，“症”、“证”、“病”含义不同，下列表述中属于“证”的是

- A. 恶寒发热
- B. 胸胁胀满
- C. 膀胱湿热
- D. 胃脘灼痛
- E. 绝经前后诸证

【答案】C

3. “阳中求阴”指的是

- A. “壮水之主，以制阳光”
- B. “益火之源，以消阴翳”
- C. “用补阳药时，须佐用补阴药”
- D. “用补阴药时，须佐用补阳药”
- E. “损其有余，实则泻之”

【答案】D

4. 以下根据五行相生规律确定的治法是

- A. 益火补土法
- B. 抑木扶土法
- C. 泻南补北法
- D. 培土制水法
- E. 佐金平木法

【答案】A

5. 下列有关脾的生理特性的描述，说法正确的是

- A. 贮痰之器
- B. 生痰之源
- C. 水之上源
- D. 水之下源
- E. 罢极之本

【答案】B

6. 张某近来与家人多次发生矛盾，心情不畅，两胁胀痛，月经不调，与之关系最密切的脏腑生理功能失常为

- A. 心主神明失常
- B. 肺主治节失常
- C. 肝主疏泄失常
- D. 肾主藏精失常
- E. 脾主运化失常

【答案】C

7. 临床上治疗血瘀证时，常配伍行气药或补气药，体现的气血关系主要是

- A. 血能生气
- B. 血能载气
- C. 气能生血
- D. 气能行血
- E. 气能摄血

【答案】D

8. 以下有关气的生理功能的说法错误的是

- A. 推动作用失常使血液、津液生成不足，运行滞缓，发生血虚、血行不利或水液潴留等病变
- B. 温煦作用失常可致畏寒喜暖、四肢不温、血行滞缓、津液凝聚等病变
- C. 防御作用失常容易受邪而发生各种病变
- D. 固摄作用失常可能导致脏腑脱垂、胎动不安等
- E. 营养作用失常影响生长发育，甚至出现早衰

【答案】E

9. 奇经八脉是指在十二经脉之外“别道而行”的八条经脉，包括督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。关于各经脉作用、基本功能的说法，错误的是

- A. 督脉调节阳经气血
- B. 任脉调节阴经气血
- C. 任脉调节十二经气血
- D. 带脉约束诸经

E. 阴阳维脉维系阴阳

【答案】C

10. 下列经脉的名称，错误的是

- A. 手少阴心经
- B. 足少阳胆经
- C. 手厥阴三焦经
- D. 足太阴脾经
- E. 手太阴肺经

【答案】C

11. 某女，22 岁。身体喜热，不爱运动，耐夏不耐冬，其体质类型应辨为

- A. 偏阴质
- B. 偏阳质
- C. 阴阳平和质
- D. 气虚质
- E. 阴虚质

【答案】A

12. 易袭阳位，生性动摇不定，具有升发轻扬特性的邪气是

- A. 暑邪
- B. 燥邪
- C. 湿邪
- D. 风邪
- E. 寒邪

【答案】D

13. 患者表现为目光晦暗，瞳仁呆滞，精神萎靡，形体羸瘦，反应迟钝，呼吸气微，甚至意识模糊，此为

- A. 得神
- B. 失神
- C. 少神
- D. 假神
- E. 神乱

【答案】B

14. 舌体软弱，伸卷无力，转动不便，是为舌痿，其病机多为

- A. 热入心包、痰浊内阻
- B. 气血虚极、阴液亏损、筋脉失养
- C. 热极生风或虚风内动
- D. 心脾有热

E. 中风或中风之先兆

【答案】B

15. 神疲欲寐，闭眼即睡，呼之即醒或蒙眬迷糊，似睡非睡，似醒非醒者，称为“但欲寐”，其病机多为

- A. 阴血不足、阳热亢盛
- B. 心脾两虚、血不养心
- C. 胆郁痰扰、食滞内停
- D. 邪入心包、热盛神昏
- E. 少阴为病、心肾阳虚

【答案】E

16. 八纲辨证中，用以分析邪正盛衰的两纲是

- A. 阴阳
- B. 表里
- C. 寒热
- D. 虚实
- E. 气血

【答案】D

17. 患者面白无华，肌肤枯槁，爪甲色淡，关节麻木不利，月经量少色淡，舌淡，脉弦细。应诊断为

- A. 脾气虚证
- B. 心血虚证
- C. 肝血虚证
- D. 肝阴虚证
- E. 寒滞肝脉

【答案】C

18. 以下适宜用“塞因塞用”治法治疗的病证是

- A. 气滞腹胀
- B. 瘀血崩漏
- C. 湿热淋证
- D. 肾虚泄泻
- E. 气虚便秘

【答案】E

19. 用药咨询服务过程中，医生、护士、患者、公众共同咨询关注的内容是

- A. 药物滴注速度
- B. 药物不良反应
- C. 药物价格信息

D. 药物最新进展

E. 药物相互作用

【答案】B

20. 处方对药品品质或质地提出要求的药名术语是

A. 紫丹参

B. 田三七

C. 嫩桂枝

D. 江枳壳

E. 子黄芩

【答案】E

21. 下列有关中药饮片处方用名中，不属于正名的是

A. 重楼

B. 木蝴蝶

C. 西红花

D. 银杏

E. 菴蔚子

【答案】D

22. 服用藿香正气丸，宜选用的药引是

A. 姜汤

B. 米汤

C. 盐水

D. 黄酒

E. 芦根煎汤

【答案】A

23. 具有温胃消食、破积利胆功效的藏药方剂是

A. 八味沉香散

B. 十味黑冰片丸

C. 七味红花殊胜丸

D. 六味安消散

E. 十三味蒜蓂丸

【答案】B

24. 血清淀粉酶（AMY）活性增高常见于

A. 急性胃肠炎

B. 病毒性肝炎

C. 慢性胆囊炎

D. 急性胰腺炎

E.病毒性心肌炎

【答案】D

25.首重医德，著有“大医精诚”、“大医习业”等专论的古文献典籍是

- A.《外台秘要》
- B.《伤寒论》
- C.《金匱要略》
- D.《重修政和经史证类备用本草》
- E.《千金要方》

【答案】E

26.根据斗谱编排的基本原则，最宜与桃仁同放于一斗或上下药斗的药物是

- A.苦杏仁
- B.阿魏
- C.红花
- D.陈皮
- E.党参

【答案】C

27.药师调剂处方时，必须做到“四查十对”，以下对于“四查”的描述，错误的是

- A.查处方
- B.查药品
- C.查药名
- D.查配伍禁忌
- E.查用药合理性

【答案】C

28.根据最新版《中国药典》，下列中药，孕妇慎用的是

- A.麝香
- B.珍珠
- C.桂枝
- D.朱砂
- E.紫苏

【答案】C

29.某男，25岁，每日大便3~4次，便质稀溏，稍食生冷油腻之品则腹泻症状加重，该患者应忌用的中药是

- A.利湿药
- B.健脾药
- C.固涩药
- D.补气药

E.苦寒药

【答案】E

30.根据中药饮片的贮藏要求，含挥发油多的药材和饮片

- A.应置阴凉、干燥处
- B.应贮于通风、干燥处
- C.应密闭贮藏于缸、罐中
- D.应密封保存，并有通风设备，阴凉贮存
- E.专人管理，置阴凉、通风、干燥处贮藏

【答案】A

31.执业药师对方剂进行审核时，发现有丁香和郁金配伍，其存在的配伍问题是

- A.相使药同用
- B.相杀药同用
- C.相反药同用
- D.相恶药同用
- E.相畏药同用

【答案】C

32.某女，28岁。皮肤出现红色风团，灼热剧痒，遇热加剧，得冷则减，伴有发热，恶寒，咽喉肿痛；舌红，苔薄白，脉浮数。中医诊断为瘾疹，证属风热犯表，治以消风散加减【荆芥、防风、当归、地黄、苦参、蝉蜕、牛蒡子、知母、石膏（捣碎、先煎）】，处方中的知母，

调配时，应付

- A.醋炙品
- B.清炒品
- C.生品
- D.盐炙品
- E.蜜炙品

【答案】C

33.运动员慎用的毒性中药是

- A.斑蝥
- B.轻粉
- C.生半夏
- D.红粉
- E.马钱子

【答案】E

34.传统汤剂是将药物用煎煮或浸泡后去渣取汁的方法制成的液体剂型。关于汤剂煎煮程序的说法，错误的是

- A. 为便于煎出有效成分，在煎煮前先加常温水浸泡至少 30 分钟
- B. 第一煎加水量一般高于药面 2~5cm，第二煎加水量酌减
- C. 每剂药煎好后，趁热滤出煎液
- D. 汤剂煎好后，成人一次服用量为 400~600ml
- E. 剩余残渣挤出的残液量不超过残渣总重量的 20%

【答案】D

35. 中药传统养护技术对抗贮存法是采用两种或两种以上药物同贮，相互克制，起到防止虫蛀、霉变作用的养护方法。采用对抗贮存法养护山药时，可同贮的中药饮片是

- A. 泽泻
- B. 萆澄茄
- C. 细辛
- D. 冰片
- E. 牡丹皮

【答案】E

36. 某女，63 岁，耳鸣日久，声低，遇疲劳加重，伴倦怠乏力，纳差便溏，舌淡，苔白脉细弱。治宜选用的基础方剂为

- A. 银翘散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 耳聋左慈丸
- D. 益气聪明汤
- E. 附子理中丸

【答案】D

37. 某男，35 岁。因热病伤阴，虚火上炎，熏灼咽喉导致咽喉肿痛，自感咽部干燥，微痛，干痒，灼热，有异物感，干咳少痰，伴颧红潮热，耳鸣多梦；舌红苔少，脉细数。宜选用的中成药是

- A. 清咽利膈丸
- B. 六神丸
- C. 板蓝根颗粒
- D. 玄麦甘桔含片
- E. 金嗓开音丸

【答案】D

38. 某女，27 岁。口腔黏膜溃疡，疼痛，灼热，口渴喜饮，便秘，尿赤，舌红苔黄，脉数。诊断为口疮，宜选用的中成药是

- A. 导赤丸
- B. 芎菊上清丸
- C. 银翘解毒丸

- D.羚羊清肺丸
- E.牛黄化毒片

【答案】A

39.某男，21 岁，职业运动员。上周感冒后，出现鼻塞，流涕黄稠量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，伴头痛，发热。诊断为鼻渊。该患者应慎用的中成药是

- A.鼻渊通窍颗粒
- B.利鼻片
- C.鼻渊片
- D.胆香鼻炎片
- E.鼻渊舒胶囊

【答案】A

40.某男，1 岁。食欲不振，噎腐酸馊，偶见呕吐食物，脘腹胀满，大便酸臭，夜眠不安，手足心热；舌红苔黄厚腻，指纹紫滞。应采用的治法是

- A.健脾助运，消食化滞
- B.健脾益气，清热通腑
- C.和胃消食，清化湿热
- D.健脾益气，佐以助运
- E.消乳化食，和中导滞

【答案】E

二、配伍选择题(共 50 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个备选项最符合题意)

[41~42]

- A.呼吸运动
- B.精血互生
- C.先天后天
- D.气血运行
- E.阴阳互资

41.根据藏象学说，五脏之间的关系，心与肺的关系主要体现在

42.根据藏象学说，五脏之间的关系，心与肾的关系主要体现在

【答案】D、B

- A.黏腻停滞

- B.阻遏气机
- C.收缩牵引
- D.凝结阻滞
- E.沉重秽浊

43.某男, 36 岁。胸闷脘痞, 小便短涩, 大便不爽, 属于湿邪所致。其病因的性质是
44.某女, 55 岁。全身关节肌肉疼痛较剧烈, 阴雨天加重, 属于寒邪所致。其病因的性质是

【答案】B、D

- A.实中夹虚
- B.虚中夹实
- C.真实假虚
- D.真虚假实
- E.因虚致实

45.实邪结聚, 阻滞经络, 气血不能外达, 其病机是
46.实热内盛, 伤津耗气, 其病机是

【答案】C、A

- A.阴阳亡失
- B.阴阳偏衰
- C.阴阳偏盛
- D.阴阳格拒
- E.阴阳互损

47.身热反不恶寒, 四肢厥冷, 下利清谷, 脉微欲绝, 病机属于
48.冷汗淋漓, 四肢厥逆, 神情淡漠, 脉微欲绝, 病机属于

【答案】D、A

- A.面黄如橘
- B.面色萎黄
- C.面黄晦暗
- D.面黄红润
- E.面黄虚胖

49.肝胆湿热、内蕴脾胃, 常见的面色特征是
50.脾气虚衰、湿邪内阻, 常见的面色特征是

【答案】A、E

- A.色白稀薄, 淋漓不断, 腰膝酸软, 小便频数
- B.色白稀薄, 绵绵不断, 神疲乏力, 纳少便溏
- C.色黄如脓, 臭秽难闻, 小腹疼痛, 口苦咽干
- D.色白稀薄, 量多如崩, 不思饮食, 四肢不温
- E.色黄如脓, 小腹拒按, 口舌青紫, 头晕目眩

51.带下病湿热下注证的临床症状主要是

52.带下病脾虚湿盛证的临床症状主要是

【答案】C、B

A.膈下逐瘀汤

B.少腹逐瘀汤

C.清热调血汤

D.清中汤

E.清骨散

53.某女，精气小腹灼热胀痛，色暗红，质稠有块，伴经前低热，小便黄赤。舌紫红，苔黄腻，脉滑涩。治宜选用的基础方剂为

54.某女，经行小腹冷痛，得热则舒，量少，色紫暗有块；伴形寒肢冷，小便清长，脉沉紧。治宜选用的基础方剂为

【答案】C、B

A.疏肝解郁，化痰散结

B.疏风清肺

C.疏肝清胃，通乳消肿

D.调摄冲任

E.清热解毒，托里透脓

55.某女，28岁，产后乳汁郁积结块，皮色微红，肿胀疼痛感；伴恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘。舌苔薄，脉数。宜选用的治法是

56.某女，32岁，乳房肿块，质韧不坚，胀痛，随喜怒消长；伴胸闷肋胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦，苔薄黄，脉弦滑。宜选用的治法是

【答案】C、A

A.补中益气丸

B.知柏地黄丸

C.丹栀逍遥丸

D.血府逐瘀丸

E.木香顺气丸

57.某女，32岁，阴虚火旺致发热，症见潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤，治宜选用的中成药是

58.某男，45岁，肝郁化火，胸胁胀痛，烦闷急躁，颊赤口干，食欲不振，宜选用的中成药是

【答案】B、C

A.行痹

B.痛痹

C.着痹

D. 疝痹

E. 热痹

59. 关节疼痛游走不定者，多见于

60. 疼痛较剧，遇寒加重，得热痛减者，多见于

【答案】A、B

A. 归脾汤

B. 半夏厚朴汤

C. 甘麦大枣汤

D. 柴胡疏肝散

E. 丹栀逍遥散

61. 患者症见情绪不宁，多思善疑，头晕神疲，心悸胆怯，食少纳呆，面色不华。舌质淡，苔薄白，脉细。治宜选用的方剂是

62. 患者症见精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，喜怒无常，舌质淡，脉弦。治宜选用的方剂是

【答案】A、B

A. 甘姜苓术汤

B. 四妙丸

C. 身痛逐瘀汤

D. 左归丸

E. 右归丸

63. 腰部疼痛，暑湿、阴雨天加重，活动后减轻，身体困重，小便短赤，舌红苔黄腻，脉濡数，治宜选用的基础方剂为

64. 腰部冷痛，得热则舒，肢冷畏寒，面色㿔白，舌淡胖有齿痕，脉沉细无力，治宜选用的基础方剂为

【答案】B、E

A. 济生肾气丸

B. 实脾饮

C. 疏凿饮子

D. 五皮散合胃苓汤

E. 越婢加术汤

65. 患者男，69 岁，全身水肿日久，下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶。治宜选用的基础方剂为

66. 患者女，53 岁，遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，大便干结。舌红，苔黄腻，脉濡数。治宜选用的基础方剂为

【答案】D、C

A. 分清五淋丸

B.五淋化石丸

C.五淋丸

D.萆薢分清丸

E.前列回春胶囊

67.某男，35 岁，症见小便短数，尿色黄赤，灼热涩痛，大便干结。治宜选用的中成药是

68.某男，56 岁，症见小便频数，沥涩不畅，腰膝酸软，乏力，脉细。治宜选用的中成药是

【答案】A、E

A.阴阳两虚

B.脾胃气虚

C.阴虚燥热

D.气阴两虚

E.肾阴亏虚

69.某男，55 岁，有糖尿病史，近来口渴引饮，咽干口燥，多食善饥，倦怠乏力，便溏洩多，形体消瘦，舌淡红，苔白而干，脉弱。辨析其证候是

70.某女，65 岁，患消渴，症见烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦。辨析其证候是

【答案】D、C

A.龙胆泻肝汤

B.当归六黄汤

C.归脾汤

D.玉屏风散

E.参苓白术散

71.某女，39 岁，症见睡则汗出，醒则自止，心悸怔忡，失眠多梦，神疲气短，面色少华。舌质淡，舌苔白，脉细。治宜选用的基础方剂为

72.某男，63 岁，症见汗出恶风，稍劳尤甚，易于感冒，体倦乏力，面色少华。舌苔薄白，脉细弱。治宜选用的基础方剂为

【答案】C、D

A.一贯煎

B.龙胆泻肝汤

C.柴胡疏肝散

D.血府逐瘀汤

E.逍遥散

73.胁肋重着疼痛，口苦口黏，胸闷纳呆，恶心呕吐，小便黄赤，大便不爽，身目发黄，舌红苔黄腻，脉弦滑数。治宜选用的基础方剂是

74.胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。治宜选用的基础方剂是

【答案】B、A

- A.左归丸
- B.归脾汤
- C.半夏白术天麻汤
- D.天麻钩藤饮
- E.通窍活血汤

75.某女，62岁，眩晕动则加剧，劳累即发，面色淡白，神疲乏力，倦怠懒言，唇甲不华，发色不泽，舌淡苔薄白，脉细弱。治宜选用的基础方剂为

76.某男，35岁，身体肥胖，近来头重昏蒙，伴视物旋转，胸闷恶心，呕吐痰涎，食少多寐。苔白腻，脉濡。治宜选用的基础方剂是

【答案】B、C

- A.川芎茶调散
- B.芎芷石膏汤
- C.天麻钩藤饮
- D.加味四物汤
- E.通窍活血汤

77.某男，48岁，头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，胁痛，舌红苔黄，脉弦。治宜选用的基础方剂是

78.某女，36岁，头痛如裂，伴有发热恶风，口渴欲饮，面红目赤，便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数。治疗宜选用的基础方剂是

【答案】C、B

- A.冷秘
- B.虚秘
- C.热秘
- D.气秘
- E.燥秘

79.某男，32岁，便秘，便出不爽，胸胁痞满，肠鸣矢气，腹中胀痛，暖气频作，那是减少，舌苔薄腻，脉弦。辨析其证候应为

80.某女，37岁，便秘，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐，舌苔白腻，脉弦紧。辨析其证候是

【答案】D、A

- A.腹泻肠鸣，粪便臭如败卵，夹有不消化食物
- B.黎明之前，肠鸣腹痛，泻后则安，腰膝酸软
- C.泄泻腹痛，粪色黄褐，肛门灼热，烦热口渴
- D.大便溏泄，水谷不化，面色萎黄，食少倦怠
- E.紧张之时，腹痛欲便，矢气频作，胸胁胀闷

81.泄泻之脾胃虚弱的主要临床特点是

82.泄泻之湿热伤中的主要临床特点是

【答案】D、C

A.黄芪建中汤加减

B.清中汤加减

C.一贯煎合芍药甘草汤加减

D.柴胡疏肝散加减

E.良附丸加减

83.某男, 35 岁。胃脘疼痛, 痛势急迫, 脘闷灼热, 口干苦, 口渴不欲饮, 纳呆恶心, 小便色黄, 大便不畅, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。中医诊断为胃痛, 应选用的方剂为

84.某女, 36 岁, 胃痛隐隐, 喜温喜按, 空腹痛甚, 得食痛减, 神疲纳少, 四肢倦怠, 手足不温, 便溏, 苔白, 脉虚弱迟缓。中医诊断为胃痛, 应选用的基础方剂为

【答案】B、A

A.肝火扰心证

B.痰热扰心证

C.心脾两虚证

D.心肾不交证

E.心胆气虚证

85.某男, 35 岁, 近来心烦不寐, 胸闷脘痞, 泛恶暖气, 伴口苦头重, 目眩。舌偏红, 苔黄腻, 脉滑数。辨析其证候是

86.某女, 29 岁, 近来不易入睡, 心悸健忘, 神疲食少, 伴四肢倦怠, 腹胀便溏, 面色少华, 舌淡苔薄, 脉细无力。辨析其证候是

【答案】B、C

A.速效救心丸

B.益心舒胶囊

C.丹蒞片

D.冠心苏合滴丸

E.活心丸

87.胸闷, 心前区刺痛, 心悸, 气短, 乏力, 舌紫, 脉细。宜选用的中成药是

88.胸闷隐痛, 心悸气短, 动则汗出, 头晕乏力, 心烦失眠, 面色不华, 舌淡红有瘀斑苔少, 脉结。宜选用的中成药是

【答案】E、B

A.咳嗽属肺阴亏耗证

B.肺胀属肺肾气虚证

C.咳嗽属风燥伤肺证

D.喘证属肾不纳气证

E.喘证属肺肾阴虚证

89.患者胸部膨满，呼吸浅短难续，声低气怯，甚则张口抬肩不能平卧，痰白如沫，胸闷心慌，腰膝酸软，小便清长。舌紫暗，脉沉细无力。中医应为

90.患者咳嗽日久，干咳少痰，痰中带血，午后咳甚，时而五心烦热。舌红，苔少，脉细数。中医诊断为

【答案】B、A

三、综合分析选择题（共 20 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

某男，45 岁。有吸烟、饮酒嗜好。外感 1 周后，出现咳嗽，喉中痰鸣，咳痰量多，色黄质黏稠，气味腥，面赤，身热，息粗，胸肋胀满，咳时引痛，口干而黏，欲饮水，舌红苔黄腻，脉滑数。

91.四诊合参，辨析其证候是

- A.肺阴亏耗
- B.风热犯肺
- C.风燥伤肺
- D.痰湿蕴肺
- E.痰热郁肺

92.应采用的治法是

- A.滋阴润肺，止咳化痰
- B.清热肃肺，豁痰止咳
- C.健脾燥湿，化痰止咳
- D.疏风清肺，润燥止咳
- E.疏风清热，宣肺止咳

93.宜选用的中成药是

- A.二母宁嗽丸
- B.风热咳嗽胶囊
- C.清肺化痰丸
- D.蛇胆陈皮胶囊
- E.百合固金丸

【答案】E、B、C

（二）

某女，56 岁。患痹证 5 年，证属尪痹，治以桃红饮（桃仁、红花、川芎、当归尾、麝香、威灵仙）合独活寄生汤（独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细辛、秦艽、茯苓、桂心、防风、甘草、川芎、人参、芍药、当归、地黄）加减。

94.关于方中饮片品种选择的说法，错误的是

- A.威灵仙宜选用酒威灵仙
- B.川芎宜选用生川芎
- C.牛膝宜选用怀牛膝
- D.杜仲宜选用生杜仲
- E.地黄宜选用熟地黄

95.麝香多入丸散，《中国药典》规定其每日内服剂量为

- A.0.01~0.03g
- B.0.03~0.1g
- C.0.1~0.3g
- D.0.3~0.5g
- E.0.5~1g

【答案】D、B

（三）

某男，28 岁，职业举重运动员。近 2 周因比赛将至，强化训练后，出现肛缘肿物隆起，灼热疼痛，咳嗽、行走、坐位时均可使疼痛加剧，小便黄，大便干燥，排便时可见少量鲜血，舌红苔黄腻，脉弦数，诊断为痔疮。

96.因含盐酸罂粟碱，该患者应慎用的中成药是

- A.龙珠软膏
- B.参蛇花痔疮膏
- C.肛泰软膏
- D.马应龙麝香痔疮膏
- E.消痔软膏

97.患者用药治疗期间，仍坚持训练，一天突发肛内肿物脱出，嵌顿，坠胀疼痛，医师检查发现肛缘水肿，血栓形成，触痛明显。宜选用的中成药是

- A.槐角丸
- B.麻仁胶囊
- C.痔康片
- D.脏连丸
- E.痔宁片

【答案】C、E

（四）

某男，17 岁，皮肤大片风团，色红，瘙痒剧烈，伴有脘腹疼痛，暖气恶心，神疲纳呆，大

便秘结；舌红苔薄黄，脉弦滑数。诊断为瘾疹。

98.应采用的治法是

- A.疏风散寒止痒
- B.疏风解表，通腑泄热
- C.养血祛风，润燥止痒
- D.疏风清热止痒
- E.清热凉血，祛风止痒

99.宜选用的中成药是

- A.荆肤止痒颗粒
- B.防风通圣丸
- C.皮敏消胶囊
- D.消风止痒颗粒
- E.润燥止痒胶囊

【答案】B、B

(五)

某男，64岁。患水肿病数月，刻下症见全身水肿，双下肢明显，按之没指，小便短少，身体困重，胸闷，纳呆，泛恶，苔白腻，脉沉缓。检验结果显示血清尿素氮 12.5mmol/L，血清肌酐 202μmol/L，血尿酸 512μmol/L，血清肌酸激酶 200U/L，血清总胆红素 17.0μmol/L。

100.检验结果中反映肾功能的指标是

- A.血清尿素氮、血清肌酐
- B.血清肌酸激酶、血尿酸
- C.血清尿素氮、血清总胆红素
- D.血清肌酸激酶、血清尿素氮
- E.血清总胆红素、血清肌酐

101.四诊合参，宜选用的基础方剂是

- A.实脾饮
- B.五皮散合胃苓汤
- C.疏凿饮子
- D.越婢加术汤
- E.济生肾气丸合真武汤

102.宜选用的中成药是

- A.肾炎解热片
- B.肾炎温阳片
- C.肾炎灵胶囊
- D.肾炎四味片
- E.肾炎消肿片

103. 该患者长期服用小剂量阿司匹林，有可能引起升高的生化检验指标是

- A. 尿酸
- B. 血清肌酐
- C. 血清肌酸激酶
- D. 血清尿素氮
- E. 血清总胆红素

【答案】A、B、E、A

(六)

某女，70 岁。素患青光眼，刻下心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，下肢浮肿，夜间不能平卧；舌淡苔白，脉虚弱。诊断为心悸。

104. 四诊合参，辨析其证候是

- A. 心脾两虚
- B. 心阳不振
- C. 阴虚火旺
- D. 瘀阻心脉
- E. 痰浊痹阻

105. 根据辨证，应采用的治法是

- A. 补血养心，益气安神
- B. 活血化瘀，理气通络
- C. 滋阴清火，养心安神
- D. 温补心阳，安神定悸
- E. 宣通心阳，祛痰活血

106. 宜选用的中成药是

- A. 人参归脾丸
- B. 参松养心胶囊
- C. 七叶神安片
- D. 益心舒胶囊
- E. 芪苈强心胶囊

107. 根据病史，该患者应禁用的中成药是

- A. 参仙升脉口服液
- B. 参桂胶囊
- C. 心力丸
- D. 心宝丸
- E. 活心丸

【答案】B、D、E、D

(七)

某男，59 岁。近 3 年经常眩晕，头胀头痛，昨日突发口眼喎斜，舌强，语言不利，半身不遂；舌红苔黄，脉弦。诊断为中风。

108. 四诊合参，辨析其证候是

- A. 风阳上扰
- B. 风痰入络
- C. 阴虚风动
- D. 血虚生风
- E. 热极生风

109. 应采用的治法是

- A. 益气养血，化瘀通络
- B. 补益肝肾，活血化痰
- C. 滋阴清热，祛痰活血
- D. 平肝潜阳，活血通络
- E. 祛风化痰，通络开窍

110. 宜选用的基础方剂是

- A. 真方白丸子
- B. 血府逐瘀汤
- C. 补阳还五汤
- D. 天麻钩藤饮
- E. 通窍活血汤

【答案】A、D、D

四、多项选择题(共 10 题，每题 1 分。每题的备选项中，有 2 个或者 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分)

111. 某男，29 岁。昨日因饮食不洁导致泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，气味臭秽，肛门灼热，烦热渴，小便短黄。诊断为泄泻，证属湿热伤中。可选用的中成药有

- A. 肠胃宁片
- B. 肠康片
- C. 固本益肠片
- D. 泻痢消胶囊
- E. 白蒲黄片

【答案】BDE

112. 某男，42 岁。阳事不举，精薄清冷。伴神疲倦怠，形寒肢冷，面色无华，头晕耳鸣，腰膝酸软，小便清长。诊断为阳痿，证属肾阳不足。可选用的中成药有

- A. 强龙益肾胶囊
- B. 益肾灵颗粒
- C. 疏肝益阳胶囊

- D.黄精赞育胶囊
- E.海龙始蚘服液

【答案】ABE

113.可用米汤送服的中成药有

- A.附子理中丸
- B.独活寄生丸
- C.四神丸
- D.更衣丸
- E.人参养荣丸

【答案】CDE

114.药斗的排列有一定的规律和要求，其中因饮片外观性状相似但功效不同，不宜排列在一起的有

- A 酒黄精与盐知母
- B 生蒲黄与海金沙
- c 紫苏子与菟丝子
- D 蛇床子与地肤子
- E 炙甘草与炙黄芪

【答案】BCDE

115.阳虚证可用的治法有

- A.阴中治阳
- B.阳中求阴
- C.阴病求阳
- D.阳病治阴
- E.益阳滋阴

【答案】AC

116.宜空腹服用的有

- A.桂枝汤
- B.保和丸
- C.十枣汤
- D.酸枣仁汤
- E.桃核承气汤

【答案】CE

117.属于奇恒之腑的有

- A.脑
- B.骨
- C.胆
- D.髓
- E.脉

【答案】ABCDE

118.医生处方时会将几种疗效基础相似或协同作用的饮片缩写在一起并开，炒四仙应付的饮片有

- A.炒山楂
- B.炒槟榔

- C.炒谷芽
- D.炒神曲
- E.炒麦芽

【答案】ABDE

119.青光眼患者禁用的中药有

- A.闹羊花
- B.天仙子
- C.马钱子
- D.洋金花
- E.千金子

【答案】BD

120.中药处方对饮片的调配、煎法、用法等方面的特殊要求，常以脚注形式体现用时需捣碎的中药饮片有

- A.丁香
- B.补骨脂
- C.川楝子
- D.五味子
- E.豆蔻

【答案】ACDE